

1751  
Paris  
Bibliothèque de Paris

1884



4926512  
L. XXIX

5115



*Picco*








PHARMACOPŒA  
GENERALIS  
EDITA  
A

D. JACOBO REINBOLDO  
SPIELMANN.

EDITIO PRIMA VENETA.  
TOMUS PRIMUS.



V E N E T I I S,

Sumptibus JOANNIS ANTONII PEZZANA.

---

M D C C L X X V I.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.



THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION

1897

NEW YORK

1897

NEW YORK

1897



NEW YORK

1897



NEW YORK



# P R Æ F A T I O.

**S**isto opus, de cuius argumento me aliquid unquam typis evulgaturum esse, ne per somnum quidem cogitassem. Nimiis Medicamentorum collectionibus nos esse obrutos & do-  
lui semper & adhuc doleo. Enimvero casu excitatus, ut præci-  
puos qui prostrant Rei medicamentariæ Indices curatius rimarer,  
non inutilem prorsus operam navaturus mihi videbar, si quæ ho-  
die in usu sunt medicamenta exacte & dilucide recenserem. *Dis-  
pensatoria* certe & *Pharmacopœas*, quæ extant, ejusmodi laborem  
flagitare, nemini dubium videri poterit, qui quidem perpenderit,  
vel certis ea tantum regionibus aut civitatibus esse accomodata,  
vel insignibus, quibus recentior Medicina splendet, incrementis  
minus quam par est respondere, vel descriptiones etiam Præpara-  
tionum continere hiulcas, mancas, imo plane falsas.

E re præterea Medicorum esse, quis non videt? Syllabum pro-  
stare, unde Medici, quorumcumque locorum titulos deligant,  
quos in Officinis asservandos præscribant; quousque Rerumpubli-  
carum Administratores de salute civium solliciti sua auctoritate  
comprobent ac Pharmaceuticæ penus normam esse jubeant: quod  
quidem si fiet, non amplius integra edentur volumina, quoties  
civitatum Antistites Rei Medicamentariæ curam agere instituerint;  
una aut altera pagella exhibebit indicem omnium medicamento-  
rum, quæ in Pharmacopoliis urbis aut regionis præstari jubentur.

Equidem me multa, quæ hodiernus usus nequaquam desiderat,  
quin inconcinnas etiam compositiones, huic Medicamentorum Ca-  
talogo inseruisse lubentissime fateor; sed hæc cavere non potui in  
opere non Medicis modo exquisite rationalibus, sed illis quoque  
dicato, qui vel auctoritatibus, vel præjudicatis opinionibus aliisve  
rationibus ducti a Præceptoribus Auctoribusque accepta remedia  
missa facere nolunt. Quin imo vulgi quoque desideriis satisfacien-  
dum esse duxi, qui crebro non tam a Medicis præscripta Medica-  
menta, quam quæ cæcus rumor utcunque probaverit, ex Pharma-  
copoliis petere soleat.

Multa interim in hoc opere desiderabuntur remedia, in Practi-  
corum libris commendata, qui vel adhuc dum in plurium mani-  
bus versantur; multa quæ in formulis a majoribus ad nos trans-  
missis præscribuntur; quæ tamen cum de die in diem remissius  
expetantur, omittere non dubitavi. Nec inanem spem esse du-  
cam, fore ut illi quoque, qui Artis nostræ principiis non sunt



imbuti, experientia magistra perspecturi sint olim, quæ habemus recentiora, viribus non modo paria, sed utique superiora veteranis istis esse. Si qui vero sunt, quos tristes hæ Medicinæ rudioris reliquiæ delectent, illis HORSTII *Pharmacopœa Galeno-Chemica Catholica* Francofurt. 1651. fol. JUNGKEN *Corpus Pharmaceutico-Chymico-Medicum* Francof. 1697. 4°. & *Pharmacopœa Schræderiana* editio Germanica Norimb. 1746. & 1748. fol. abunde satisfacient.

Descriptiones Simplicium non ex libris desumfi, sed ad ipsa specimina concinnavi: in quo cum unice meis sensibus fiderim; characteres, quos trado, ab illis, qui vulgo exhibentur, non raro recedunt. Præparationum nullam admisi, cujus parandi ratio non ipsi mihi experto esset probata.

Simplicium, unde medicamenta desumimus, titulos *Linneanos* adhibui, ut altius progressuri habeant, ubi quicquid ad eorum historiam pertinet invenire possint. Vegetabilium icones ex opere *Blackwelliano*, quod in omnibus manibus esse vellem, citavi (\*). Plures imo etiam quandoque meliores potuisssem adducere; nisi id consilium a scopo libri Lectoribus dicati, quorum longe plurimi sumtuosas librorum collectiones facere nequeunt, alienum esse duxissem. Exoticorum, quæ in Horto nostro Academico asservantur, culturam adjeci.

Libræ voce cum vage admodum soleant uti; per totum opus non sum usus, sed ejus valorem Unciis expressi.

Consultum imo necessarium etiam duxi, in libro *Pharmacopœorum* artem continente, medicamentorum vires summatim indicare, generosiorum quoque doses determinare. Licet enim prudentissime legibus cautum sit, ne Praxi Medicæ se immisceant *Pharmacopolæ*; nunquam tamen obtinebitur, quin in casibus, qui leviores esse videntur, illorum opera expectatur; *Medicastro*rum præterea pestis in diem latius serpens Formulas quoque morbo curando contrarias imo deleterias in diem gignat. Ipsi quoque Medici interdum aliquid humani pati festinantique eorum calamo errores elabi possunt; itaque ne *Officinæ* sanitatis morborum imo mortis materiam subministrant; medicamentorum effectus nosse omnino *Pharmacopœum* oportet, in promptu habere, quæ sanitati vacillanti succurrant; remedia, & sibi quoque cavere, ne sua saltem ex culpa victimarum, quæ *Medicastro*rum audacia letho immolat, augeatur numerus, & ipsos insuper *Artis* magistros, sicubi hallucinati sint, monere.

PP. Calendis Novembris MDCCLXXXII.

(\*) In hac nostra editione addidimus icones plantarum, & animalium, de quibus consulendus est index in initio primi voluminis.



# SYLLABUS AUCTORUM.

- A**GRICOLA Georg. *De ortu & causis Subterraneorum*. VVitteberg. 1612. Utor editione *Libris de re Metallica*, Basil. 1657. fol. adjecta.]  
*Amstelodamensis Pharmacopœa*. Amstelod. 1639. 12°.  
**ANDERNACHUS** Joh. Gunth. *De Medicina veteri & nova*. Basil. 1571. fol.  
**ANDROMACHUS** Archiater **NERONIS** apud **GALENUM**.  
**APONENSIS** Petrus obiit prioribus Seculi XIV. annis. *De venenis* 1473. 4°. Utor editione Venet. 1565. fol.  
**ARBUTHNOT** Carol. *Tabula antiquorum nummorum, mensurarum, ponderum &c.* per **KOENIG** Traject. ad Rhen. 1756. 4°.  
*Argentoratensis Pharmacopœa* 1725. fol. revisa & ad usum modernum accommodata 1757. fol.  
**AUBLET** Fusée *Histoire des plantes de la Guiane Françoise*, Londres 1775. 4°.  
*Augustana Pharmacopœa* 1601. fol. renovata & aucta prodiit 1684. fol.  
**AUGUSTIS** de Quiricus *Lumen Apothecariorum*, Venet. 1517. fol.  
**AVICENNA** Seculi XI. Auctor *Canon*. Vene. 1488. 4°. Utor editione Venet. 1582. fol.  
*Austriaca Provincialis Pharmacopœa*, Viennæ 1774. 8°.  
**BACHER** apud **RICHARD** *Recueil d'Observations*,  
**BARBETTE** Paulus *Praxis* 1665. 8°. Cito *Opera* 1688. 4°.  
**BARCHUSEN** Joh. Conrad. *Pyrosophia* Lugd. Bat. 1695. 4°. Utor editione multum aucta sub titulo *Elementorum Chemiæ*, Lugd. Bat. 1718. 4° divulgate.  
**BARTOLETTUS** Fabric. *Encyclopedia Hermetico-Dogmatica*, Bononiæ 1619. 4°.  
*Bateana Pharmacopœa* curante **SHIPTON**, Londin. 1688. 8°. Cito editionem Lovanii 1752. 8°. impressam.  
**BEAUME** *Elemens de Pharmacie*, Paris 1767. 8°. Utor editione Parisiens. 1773. 8°. publicata.  
**BAZINGHEN** Abot de *Traité des Monnoies*, Paris 1764. 4°.  
**BEGUINUS** Joh. *Tyrocinium Chymicum*, Paris. 1608. 12°. Cito editionem a **BLASIO** adornatam, Amstel. 1669. 12°.  
**BENEDICTUS** Alexand. *de Re Medica*, Venet. 1535. fol.  
**BERCKLEY** Georg. *Siris or a chain of physical reflexions and inquiries concerning the virtues of Tharwater*, London 1744. 8°. Utor versione Gallica, Amstelodami 1745. 8°. edita.  
*Bergamensis Pharmacopœa* 1581. fol.  
**BERGIUS** Peter Jonas *Materia Medica*, Stockh. 1778. 8°.  
*Berolinenses* vid. *Dispensatorium Brandenburgicum*.  
**BIERLING** Casp. Theophil. *Adversariorum curiosorum Centuria*, Jenæ 1679. 4°.  
**BIRCKMANN** apud **QUERCETANUM**.  
**BLACK** in *Essais and Observations Physical and literary by a Society in Edinburgh*. Voll. II. 1756. 8°.  
**BLACKVELL** Elisabeth *Curious Herbal*, London 1739. fol. Cito versionem latinam & germanicam multum correctam & auctam, Norimberg. 1750 - 1773. 6. Voll. fol.  
**BLECHHOLZ** apud *Brunsvicensis*.  
**BLONDEL** in **LEMERY** *Pharmacopée Universelle*.  
**BOECLERUS** in *Pharmacopœa Argentoratensi*.  
**BOERHAVE** Hermann *de Materia Medica*, Lugd. Bat. 1719. 8°. Cito editionem L. B. 1721. 8°.



- BONTIUS Jacob. *Methodus medendi cum PISONE de rebus utriusque Indie*, Amstelod. 1658. fol.
- Brandenburgicum *Dispensatorium*, Berol. 1698. fol. Cito editionem a FAGINO (BUCHNER) illustratam.
- BRASSAVOLA Antonius *Musa Examen omnium Catapotiorum & Pilularum*, Basil. 1543. 4°.
- Examen omnium Electuariorum, Pulverum & Confectionum*, Venet. 1548. 8°.
- Examen omnium Trochiscorum, Unguentorum, Ceratorum, Emplastrorum, Cataplasmatum & Collyriorum*, Venet. 1551. 8°.
- BRASSAVOLÆ *Examen omnium Linctuum, Pulverum, Aquarum, Oleorum*, Venet. 1553. 8°.
- De Medicamentis tam simplicibus, quam compositis Catharticis*, Tigur. 1555. 8°.
- Examen omnium Simplicium*, 1556. 12°.
- BROSSARD apud MORAND in *Memoires de l'Academie de Chirurgie* T. II.
- Brunsvicense *Dispensatorium Pharmaceuticum* 1777. 4°.
- BUFFON Comes *Histoire naturelle générale & particuliere*, Paris 1749-1782. XXIX. Voll. 4°.
- BUSSIUS Georg. in HOFFMANN *Observat. Physico-Chymic.* & apud SCHELHAMMER de *Nitro*, Amstel. 1709. 8°.
- CADET in *Academ. Royale des Sciences*.
- CAMERARIUS apud *Wurtembergenses*.
- CELSUS Aulus Cornelius Seculo Augusto floruit. Ejus libri de *Re Medica*, Florentiæ 1478. fol. impressi, crebro recusi, optimi editi sunt a KRAUSE, Lips. 1766. 8°.
- CHARAS Moyse *Pharmacopée Royale Galenique & Chymique* Paris 1672. 8°. insigniter aucta, Lyon. 1753. 4°.
- CLAUDER Gabriel *Methodus balsamandi*, Jenæ 1684. 4°.
- CLAVE' *Cours de Chymie*, Paris 1646. 8°.
- CLOS DU' apud LEMERY *Pharmacopée*.
- Coloniensis Pharmacopœa* per HOLZHEMIUM 1627. fol.
- CORDI Valerii *Dispensatorium*, Norimb. 1535. Utor editione, quæ prodit Norimb. 1592. fol.
- CORNACHINUS Marc. Anton. *Methodus, qua omnes corporis humani affectiones curantur*, Florent. 1629. 4°.
- COSTÆUS Johanues in editione *Operum MESUE*.
- CRAANEN Theodor. apud GRÆBNER *Medicina vetus restituta*, 1695. 4°.
- CRATO de Krafftheim Johann. *Consiliorum & Epistolarum Medicinalium* Libri quinque, Francof. 1691-1693. 8°. Sextus & Septimus 1611. 8°. Auctor obiit an. 1585.
- CROLLII Olsvald *Basilica Chymica*, Francof. 1609. 4°.
- DAGUIN in LEMERY *Pharmacopée Universelle*.
- DAMOCRATES primo seculo floruit. Apud GALENUM.
- Danica Pharmacopœa*, Hafniæ 1772. 4°.
- DARELIUS apud VVALIBAUM.
- DECKER Friderici *Exercitationes practicae*, Lugd. Batavor. & Amstelod. 1673. 8°.
- DIGBY Renelmus *Recueil des Remedes & secrets tirés des Memoires du Chevalier DIGBY* par MALBEC, Paris 1699. 8°.
- DIOSCORIDES Pedacius Anazarbeus primo seculo floruit. Libri de *Materia Medica* latine, Colon. 1478. fol. Græce 1495. fuerunt impressi. Cito editionem SARACENI 1598. Francof. fol.
- DIPPEL Democriti Christiani *Krankheit und Arzney des menschlichen Lebens*, Frankfurt und Leipzig 1746. 8°. Latine prodierat Lugduni Batav. 1711. 8°.
- DORNCRELLIUS Tobias *Dispensatorium novum*, Ulyssip. 1600. 4°. Cito editionem, quæ Jenæ 1645. 8°. prodit.



DOVER apud Edinburgenses.

Dresdenses apud ZVVOELFFER.

DURIET apud VVALLBAUM.

ECHHOLD apud SCHROEDER.

Edinburgensis Collegii Medici Pharmacopœa 1722. 8°. Cito editiones 1736. & 1747. 8°.

EISENSCHMID Joh. Caspar de Ponderibus & Mensuris Veterum, Argent. 1737. 8°.

ELLER Joh. Theodor. *nutzliche und aufersehene Anmerkungen von Krankheiten und Operationen, vvelche in Lazareth der Charité zu Berlin vorgefallen*, Berlin 1730. 8°.

EMMERICUS apud JUNCKEN.

FALCK N. D. *Treatise on the medical qualities of Mercury*, London 1776. 8°.

FALLOPII Gabriel Opera, Francof. ad Mœnum 1584. fol.

FERNELIUS Johann. *Universa Medicina*, Paris. 1554. fol. Cito Opera Parisiis 1638. 8°. publicata.

FIORAVENTI *Secreti razionali intorno alla Medicina, Chirurgia & Alchimia*, Venezia 1600. 8°.

Florentinum *Antidotarium ex Italico sermone Latinum factum per CLUSIUM*, Antverp. 1561. 8°.

FLORENZOLA in *Pharmacopœa Augustana*.

FOEUILLET in LEMERY *Pharmacopée*.

FORDYCE on putrid and inflammatory Fevers, London 1773. 8°.

FORESTUS Peter Libri *Curationum & Observationum Medicinalium*, Lugd. Bat. 1591. 1606. 8°. Cito editionem Rothomag. 1653. fol.

FRACASTORIUS Hieronym. de *Sympathia & Antipathia & de Contagione*, Venet. 1546. 4°. Utor editione Genevæ 1671. 8°. divulgata.

FULLER Thomas *Pharmacopœa extemporanea*, London. 1705. 8°. Utor editione ibid. 1714. 12°. impressa.

*Pharmacopœa domestica*, London 1733. 12°.

FUNNIUS in *Actis Societatis Harlemensis* T. II.

GABRIEL Gabriel in *Quæstione HIERONYMI BONIPERTI de Materie imminutione & de totius evacuanda Materie ratione*, Patav. 1550. 4°.

GALENUS Claudius Seculi II. Auctor ex numerosissimis tractatibus huc pertinent;

*De Alimentorum facultate*, Paris. 1530. 4°.

*De simplicium Medicamentorum Facultate*, Paris. 1520. fol.

*De Compositione Medicamentorum secundum loca*, Parisiis 1530. fol.

*De Compositione Medicamentorum secundum Genera*, Paris. 1530. fol.

*Euporista seu de Medicamentis facile parabilibus*, Paris. 1530. 8°.

*Succedanea sive Substituta*, Paris. 1530. 8°.

*De Theriaca*, Paris. 1534. fol.

*De Ptisana*, Paris. 1536. 4°.

*De Purgantium Medicamentorum facultate*, Paris. 1544. 4°.

*Antidotorum Libri*, Thoruni 1607. 4°.

Hi Tractatus aliquoties seorsim, crebrius cum reliquis sub titulo *Operum* prodierunt. Utor eorum nona JUNTARUM editione, Venetiis 1623. fol.

GALLUS, qui Seculo I. floruisse videtur, apud GALENUM.

GARZONIUS in *Antidotario Bonariensi*.

GAUBIUS Hieronym. David. de *Methodo concinnandi Formulas*, Leidæ 1738. 8°. Cito editionem Lugd. Bat. 1752. 8°.

GEBER Seculi VIII. Auctor. Utor editione *Operum*, quæ Gedani 1682. 8°. prodit.

GEOFFROY in *Codice Parisiensi* & in *Tractatu de Materia Medica*, Paris. 1741. 8°.

GLASER Christoph. *Traité de Chymie*, Paris 1667. 8°.

GLAUBER Joh. Rudolph. circa medium Seculi superioris cepit *Tractatus Chymicos* ede-



- edere. Cito *Opera Chymica* idiomate Germanico impressa, Franckfurt am Mayn 1658. 4°. & *Continuationem* ibid. 1659. 4°.
- GMELIN in *Dispensatorio VVurtembergensi*.
- GOULARD *Oeuvres de Chirurgie*, Pezenas 1766. 12°. II. Voll.
- GRULING Philipp. *Florilegium Hippocraticum Galenico-Chymicum* 1665. 4°. Utor editione Lipsiæ 1680. 4°.
- GUALTERUS in *Codice Parisino*.
- GULDENKLEE Timæi Balthasar *Epistole & Consilia*.
- GUNDELSHEIMER in *Dispensatorio VVurtembergensi*.
- HALY Abbas sub finem Seculi X. vixit, *Regalis Dispositio*, Venet. 1492. fol.
- Hamburgense Dispensatorium* per KALDE 1616. fol.
- HANCKENIUS apud VVALBAUM.
- HARTMANN Johannes *Praxis Chymiatrica a filiis edita*, Lips. 1633. 4°. Utor editione a MAURITIO HOFFMANN illustrata, Lips. 1728. 4°.
- HEISTER Laurent. *Chirurgia Germanice*, Norimb. 1718. 4°. Latine, Lugd. Bat. 1739. 4°. & in *Dispensatorio Brunsvicensi*.
- HELMONTIUS Joh. Baptist. van Anno 1644. obiit. *Opera*, Lugd. Bat. 1648. 4°. Cito editionem, quæ curante VALENTINI Hafniæ 1707. 4°. prodiit.
- Helvetica Pharmacopœa*, Basil. 1771. fol.
- HELVETIUS *Traité des Maladies les plus fréquentes*. Paris 1724. 8°. Est editio tertia.
- HIÆRNE in notis Cl. MURRAY ad opus *Rosenianum*.
- HILDANUS Guilielm. Fabricius *Observationes Chirurgicae* 1598. edi cœptæ. Omnes collectæ occurrunt in *Operibus* a BEYERO editis, Francofurti ad Mœnum 1646. fol.
- HIPPOCRATES V. ante C. N. Seculo vixit, Utor ejus *Operibus* Græce & Latine per FOESIUM editis Francof. 1695. fol.
- HOFFMANN in JACOBI *Descriptiones methodi Mercurium Sublimatum Corrosivum minus copiosiusque exhibendi*, Monast. VVestphal. 1772. 8°.
- HOFFMANN Friderici *Observationes Physico-Chymicae*, Halæ 1722. 4°.
- Medicina Consultatoria*, Halæ 1721-1739. 4°.
- videatur POTERIUS.
- HOLLANDUS Isaac Seculi XV. Auctor. Ejus Scriptorum crebrius impressorum editione utor sub titulo *Bevvahrte Chymische Schrifften*, Viennæ 1746. 8°. impressa.
- HOMBERG in *Académie Royale des Sciences*.
- HUXHAM Johann. *Observationes Medicae & Chymicae de Antimonio*, *Operum Physico-Medicorum* a REICHELTE editorum Tomo tertio insertæ.
- JOUBERT Laurent *Pharmacopœa* per ZANGMEISTER, Lugd. 1579. 8°.
- ISENBURG Comes apud VVALLBAUM.
- JUNCKEN Joh. Helfr. *Corpus Pharmaceutico-Medicum*, Francof. 1697. 4°.
- KALDE videatur *Hamburgense Dispensatorium*.
- KHUNRAD Conrad *Medulla Destillatoria & Medica*, Lipsiæ 1549. 8°. Utor editione Hamburg. 1605. 4°.
- KIEFER in *Pharmacopœa Argentoratensi*.
- KLEIN Ludov. Godofred. *Selectus rationalis medicamentorum*, Lips. 1756. 8°.
- KORMANN apud SCHULZ in *Praelectionibus in Dispensatorium Brandenburgicum*.
- KUNCKEL Johann van Lœvvenstern *Laboratorium Chymicum*, Hamburg. 1716. 8°.
- Utor editione 1738. 8°.
- KUNCKEL *Chymische Tractatein* a BURGGRAVE editi, Frankf. und Leipzig 1724. 8°.
- LANFRANCUS *Practica*, quæ dicitur *Ars completa totius, Chirurgia*, Venet. 1490. fol.
- LANGELOT Joel in *Miscellaneorum Natura Curiosorum* Decade prima.
- LANGIUS Johannes *Epistola* Hanov. 1605. 8°. Auctor a. 1565. mortuus est.
- LEIBNITZ Godofr. VVilhelm. *Protogæa*, Götting. 1749. 4°.



- LEMERY Nicolas *Cours de Chymie*, Paris 1676. 8°. Utor editione notis BARON illustrata, Paris. 1756. 4°.
- Pharmacopée universelle*, Paris 1698. 4°.
- LENTILIUS Rosin. *Miscellanea Practica*, Ulmæ 1698. 4°.
- LEVVIS VWilliam *Materia Medica*, London 1761. 4°.
- LIBAVIUS Andreas *Syntagma Arcanorum Chymicorum*, Francof. 1611-1613. fol.
- Epistole Chymice*, Francof. 1595-1599. 8°.
- Singularia*, Francof. 1599-1601. 8°.
- LIGER *sur la Poudre des Charrenx* 1720. Hæc scheda inserta est Dissertationi MILLARS de explorata Kermes mineralis in medendo efficacia, Argent. 1752.
- LINNÆUS Carol. *Systema Nature*, Holmiæ 1766. 1768. III. T. 8°.
- LOBELIUS Matthias *Historia Stirpium*; Antvverp. 1676. fol.
- Londinensis Pharmacopœa* 1632. fol. In linguam Gallicam versa & eximie illustrata prodit Paris. 1764. 4°. II. Voll. Utor editione Londinensi 1746. 8°.
- LOYVER Richard *Descriptio Decocti Avenacei* creberrime excusa. Cito editionem Germanicam Beuthen 1755. 8°, additionibus plurium Medicorum auctam.
- LUDOVICI Daniel *Pharmacia moderno seculo applicanda*. Utor *Operibus* a MICHAELI editis, Francof. ad Mœnum 1712. 4°.
- LUCE de in *Recueil Periodique* T. IV.
- LULLIUS Raymundus Seculo XIII. floruit. *Scripta Chemica*, ejus nomen præ se ferentia medio seculo XVI. fuerunt impressa. Utor eis, quas MANGETTUS *Bibliotheca Chemica* inseruit.
- MACBRIDE David *Experimental Essays*, London 1764. 8°. Cito editionem auctam, London 1767. 8°.
- MACQUER *Dictionnaire de Chymie*, Paris 1778. 4°. 3. Voll.
- MAETS Carol. Ludovic. *Chemia rationalis*, auctore P. T. Lugd. Bat. 1687. 4°.
- MAGNUS Auctor Seculi II. apud GALENUM.
- MANARDUS Johann. *Epistole*, Paris. 1528. 8°. Utor editione quæ Basileæ 1540. fol. prodit.
- MANLIUS Johann Jacob. *Luminare majus*, Venet. 1496. fol. Cito editionem Venetam, 1553. fol.
- MASSARIAS Dominic. Vicent. *De ponderibus & mensuris*, Tigur. 1584. 8°.
- MATHIOLUS Petr. Andr. *Commentarii in Dioscoridem*, Venet. 1548. 4°. Italice. Utor editione *Operum* a CASPARE BAUHINO 1598. fol. publicata.
- MAYLRNE *Medicamentorum formule*, Londin. 1640. fol. Recusæ cum operibus a BROVVN Londin. 1703. fol. editis.
- MEAD Richard *Mechanical account of Poisons*, London 1702. 8°. Cito *Opera*, Gœtting. 1748. 8°.
- MEYER Joh. Frider. *Chymische Versuche zur nachern Erkenntnis des ungelöschten Kalks*, Hannover und Leipzig 1746. 8°.
- MESUE Damascenus Seculo XII. floruisse dicitur. *Libri de Re Medica*, Antvverpiæ 1479. sunt impressi. Utor *Operibus* a COSTÆO, Venet. 1589. fol. editis.
- MICHAEL Johann. *Opera Medico-Chirurgica*, Norimberg. 1688. 4°.
- MINDERER Raymund *Aloedarium Marocostinum*, August. Vindel. 1616. 8°.
- Medicina militaris, seu liber castrensis Euporista ac facile parabilia medicamenta continens*, Aug. Vind. 2621. 8°.
- MOEBIUS Godofred. apud HOFFMANN in *Clave Schræderiana*.
- MOEGLING apud ZELLER & VVEISSMANN in *Dissertatione de Docimasia, signis, causis & noxa Vini Lithargyrio mangonifati*, Tubing. 1707. 4°.
- MONTANUS Jos. Baptist. *Explicatio eorum, quæ pertinent tam ad qualitates simplicium medicamentorum, quam ad eorundem compositionem*, Venet. 1555. 8°.
- MOTAGNANA *Antidotarium*, Venet. 1565. fol.



- MORETTE du apud BAUME',  
 MORT le Jacob. *Pharmacia Medico-Physica*, Lugd. Bat. 1684. 8°. & in MORLEY  
*Collectaneis Chymicis*.  
 MYNSICHT Adrianus van *Thesaurus & Armentarium Medico-Chymicum*, Ham-  
 burg. 1631. 4°. Utor editione Genev. 1697. 8°.   
 MYREPSUS Nicolaus Seculi XIII. Auctor. Codex Græcus nunquam impressus est. Ver-  
 tente FUCHSIO idiomate latino prodiit Basil. 1549. fol.  
 NICOLAUS vid. PRÆPOSITUS & MYREPSUS.  
*Norimbergense Dispensatorium* 1666. fol.  
 ORIBASII Seculo IV. floruit. Ejus scripta in linguam Latinam versa prodierunt Pa-  
 ris. 1558. 8°. Utor eisdem *Medice artis Principibus* ab HENRICO STEPHANO,  
 Parisiis 1567, fol. adjectis.  
*Palatinum Dispensatorium*, Manhem. 1764. fol.  
 PALMARIUS Jul. *de morbis contagiosis*, Lutet. Paris. 1578. 4°. Cito editionem Fran-  
 cof. 1601. 8°.   
 PARACELSI Philipp. Aureol. Theophrast. Bombast. ab Hohenheim verum nomen fuit  
 HOCHENER; anno 1541. obiit. Opera idiomate Germanico prodierunt, edente  
 HUSER, Basil. 1588-1590. X. Tomis; Latine autem, Francof. 1603. 4°. Utor  
 editione Genevensi 1658. fol. 3 Voll.  
*Parisiensis Pharmacopœa* anno 1637. primum prodiit. Cito editionem sua titulo  
*Codici Medicamentarii* a BOYERO publicatam Paris. 1758. 4°.   
 PERARD apud BAUME'.  
 PISO Guilhelm. *de India utriusque re naturali & medica*, Amstel. 1608. fol.  
 PLENCK Joseph. Jacob. *Pharmacia Chirurgica*, Viennæ 1775. 8°.   
 PLUMER in *Essais and Observations by the Society of Edinburgh*. 1732. 8°.   
 POMET Pierre *Histoire générale des Drogues*, Paris 1694. fol. Utor editione Paris.  
 1735. 5°. 2 Voll.  
 PORTLANDIÆ COMES in CLEPHANE *Medical Observations and Inquiries* T. I.  
 POTERII Petr. *Insignes Curationes & singulares Observationes* Venet. 1615. 8°.   
*Pharmacopœa Spagyrica nova & inaudita*, Bonon. 1622. 8°. Utor *Operibus curan-*  
*te* FR. HOFFMANN editis, Francofurti ad Moenum 1698. 4°.   
 PRÆPOSITUS Nicolaus Alexandrinus Seculo XIV. vixit *Dispensatorium ad Aromaterios*,  
 Venetiis 1471. fol. Cito editionem Lugd. 1505. 4°.   
*Pragense Dispensatorium*, Vetro-Pragæ 1739. fol.  
 PRINGLE John *Observations on the diseases of the Army*, London 1764. 8°. Est edi-  
 tio quarta.  
 PYTHAGORAS sexto ante C. N. Seculo vixit; apud GALENUM.  
 QUERCETANUS du Chesne Joseph. *Antidotaire spagyrique*, Lyon 1576. 8°. Editio au-  
 ctior prodiit sub titulo *Pharmacopœa Dogmaticorum restituta*, Paris. 1607. 8°.   
 Cito editionem Francof. 1615. 4°.   
*Ratisbonense Dispensatorium* 1727. fol.  
 REINESIUS Thomas *Chymiatra*, Geræ 1624. 4°.   
 RENODÆUS Renoy Johann. *Institutiones Pharmaceutica*, Paris. 1608. Cito editionem  
 Francofurt. 1615. 4°.   
 RETZ Andr. Joh. *Schvedische Academie*, 1770. 8°.   
 RHAZES seculo X. floruit. *Continens Brixia* 1486. fol. *Libri ad Mansorem* Venetiis  
 1497. fol. sunt impressi. Utor *Operibus* Basil. 1544. fol.  
 RICHARD de Hauteferck *Formule medicamentorum nosodochiis militaribus adaptata*:  
 in *Recueil d'Observations de Medecine des Hopitaux militaires*, Paris 1766. 4°.   
 RIEDLIN in *Dispensatorio Argentoratensi*.  
 RINGELMANN in *Pharmacopœa Danica*.  
 RIVERIUS Lazarus medio Seculo superiore inclaruit. Cito *Opera* Genevæ 1737. fol.  
 Ro-



- ROSEN von Rosenstein Nils *Anweisung zur Kenntniss und Cur der Kinderkrankheiten*; Holmiæ 1764. Suecice. Utor editione Germanica egregiis additionibus Illustris MURRAY aucta, Gœtting, 1781. 8°.
- ROSSICA Pharmacopœa, Petropol. 1778. 4°.
- ROTH Gottfried *Anleitung zur Chymie*, Leipzig 1717. 8°. Utor editione Frankfurt und Leipzig 1739. 8°. Auctor obiit anno 1710.
- RUFFUS Seculo primo ad finem vergente creditur floruisse. *De purgantibus*, Paris. 1555. 8°. Utor *Operibus* a CLINCH editis Londin. 1744. 4°.
- RULAND Martin. *Curationum Empyricarum & Historiarum in certis locis & notis personis expertarum & rite probatarum Centurie*, Basil. 1578. 16°.
- SAINTYVES *Traité des maladies des yeux*, Paris 1722. 12°. Cito editionem Amsterdam. 1736. 12°.
- SALA Angelus *Tractatus Chemicos* cepit edere anno 1608. Omnes prodierunt collecti Francofurt. 1647. 4°. Utor editione aucta sub titulo *Collectaneorum Chymicorum opera & studio J. D. Thom.* Francof. 1693. 4°. impressa.
- SCHMUCKER *vermischte chirurgische Schriften*, Berlin & Stettin 1776 & 1779. 8°.
- SCHROEDER Joh. *Pharmacopœa Medico-Physica*, Ulmæ 1641. Utor editione Francof. 1668. 4°.
- SCHULZII Joh. Henr. *Praelectiones in Dispensatorium Brandenburgicum* 1735. Utor editione Norimb. 1753. 8°.
- SEIGNETTE in *Académie Royale des Sciences* 1731. & Dissertatione ENCKELMANN *de Sale Alkali Seignette*, Argent. 1756.
- SENNERTUS Daniel *Practica Medicina* 1628-1635. 4°.
- SERAPIO Seculo X. videtur floruisse. *De simplicibus Medicinis Opus* per BRUNFELS Argentorat. 1531. fol.
- SLONNE in GAUBII *Methodo conscribendi formulas*.
- SNELLEN Paul. *Salis communis triumviratus*, Amstel. 1714. 8°.
- STAHL Georg. Ernest. *Opusculum Chymico-Physico-Medicum*, Halæ 1715. 4°. & in *Dispensatorio Brandenburgico*.
- STARCKEY Georg. *Pyrotechnia Anglica*, London 1658. 12°. Utor versione Germanica, Norimb. 1722. impressa.
- STOERCK Anton. *Libellus, quo demonstratur Colchici Autumnalis radicem non solum tute posse exhiberi hominibus &c.* Vindobon. 1763. 8°.
- STOUGHTON in BAUME' *Elémens de Pharmacie*.  
*Suecica Pharmacopœa*, Holmiæ 1775. 8°. Editio altera & emendata prodiit 1779. 8°.
- SYDENHAM Thom. *Observationes Medice circa morborum constitutiones*, London 1667. 8°.  
*Dissertatio Epistolaris de Observationibus nuperis circa curationem Variolarum confluentium, nec non de affectione Hysterica*, London 1682. 8°.  
*Progressus integri in omnibus fere morbis curandis*, London 1693. 12°.  
 Utor *Operibus* Lugd. Bat. 1741. 8°.
- SYLVIVS Jacob. *Methodus medicamenta componendi*, Lutet. 1541. 8°.  
*De medicamentorum simplicium delictu, preparationibus, Mistionis modo*, Paris. 1542. 8°.  
 Utor *Operibus Medicis* a MOREAU editis, Colon. Allobrog. 1630. fol.
- SYLVIVS Francisc. de le Boe *Opera*, Amstelod. 1679. 4°.  
 Cito editionem Genevæ 1681. fol.
- TACHENIVS Otto *Hippocrates Chemicus*, Venet. 1666. 8°.  
 Cito editionem Brunsvic. 1668. 12°.  
*De morborum Principe*, Bremæ 1668. 12°. Cito editionem Osnabrug. 1675. 12°.
- THIBAUT Pierre *Cours de Chymie*, Paris 1667. Utor editione Lyon 1672. 8°.
- TILLET in *Académie Royale des Sciences* 1767.



- TRILLER Daniel VVilhelm. *Dispensatorium Pharmaceuticum Universale*, Francof. ad Moen. 1764. 4°.
- TURNER Daniel *Siphylis a practical Dissertation on the venereal disease*, Lond. 1717. 8°.
- Tunquineses in *Philosoph. Transact.* N°. 474.
- VALENTINUS Basilus. Auctoris seculi XV. scripta crebro tam seorsum quam in Theatris & Museis Chymicis collecta sunt impressa. Utor *Chymische Schriften* per PETRÆUM 1740. 8°.
- VARIGNANA Guilhelm. *Opera*, Basil. 1545. 4°.
- VICAT Philipp. Rudolph. *Observationes Practicae*, Bernæ 1780. 8°.
- VERNY F. *Pharmacopée de Bauderon augmentée de remarques*, Lyon 1681. 4°.
- Vicennense Austriaco *Dispensatorium*, Vindobonæ 1719. fol. recusum 1765.
- VIGO Johannes de *Practica*, Romæ 1514.
- VILLANOVANUS Arnoldus. De Villa nova verum nomen est. BACHUONE Seculo XIV. floruit. *Opera*, Venet. 1505. fol. Utor editione Basil. 1585. fol.
- VITET *Pharmacopée de Lyon* 1778. 4°.
- UTECHT apud ZVVINGER in *Dissertat. de Nitro*.
- VVALDSCHMID Joh. Jac. *Institutiones Medicine rationalis*, Marburg 1683. 8°.
- VVALLBAUM Joh. Jul. *Index Pharmacopolii completi*, Leipzig 1767. fol. :
- VVALLERIUS Joh. Gottschalck *Systema Minerale*, Holm. 1772. 8°. 2 Voll.
- VVEBER Joh. Carol. *Anchora Sanciatorum*, Brigæ 1677. 8°.
- VVECKER Joh. Jacob. *Antidotarium speciale*, Basil. 1581. 4°.
- Pharmacia in artis formam redacta*, Jenæ 1675. 4°. Utor editione Jenæ 1693. 4°.
- VVEDEL Georg. VVolfgang *Pharmacia Acroamatica*, Jenæ 1686. 4°.
- Compendium Chymie*, Jenæ 1715. 4°.
- VVEISMANN Joh. Frid. in *Academ. Natur. Curios. Novor. Act.* T. I.
- VVEPFER Joh. Jac. *Observationes Medico-Practicae*, Tiguri 1745. 4°. Obiit anno 1695.
- VVERLHOFF Paul. Goutlieb in *Dispensatorio Brunsvicensi*.
- VVESTENDORF Joh. Christoph. *Dissertatio de optima Acetum concentratum ejusdemque Naphtham conficiendi ratione*, Gœttin. 1772. 4°.
- VVHYTT Robert *Observations on the nature, causes and cure of those disorders which have been commonly called nervous, hypochondriacal or hysteric*, Edinburgh. 1765. 8°.)
- VVIDSTOECK in *Stralsundisch Magazin* Vol. I.
- VVILDEGANSIUS in *Dispensatorio Brunsvicensi*.
- VVirtembergica *Pharmacopœa*, Stuttgartard 1740. fol. recentissime recusa 1771. fol.
- VVOLFF in QUERCETANI *Pharmacopœa Dogmatica*.
- VVOLFF Joh. Philipp. in *Academ. Natur. Curios. Act.* Vol. VII.
- VVURZ apud HILDANUM -
- ZELLER apud VVirtembergenses.
- ZVVOELFFER Joh. *Annotationes in Pharmacopœam Augustanam*, Norimberg. 1667. fol.
- Pharmacopœa Regia*, Norimberg. 1668. fol.





# PROLEGOMENA.

## §. I.

**P***Harmacopœa*, quam etiam *Pharmaciam* appellare solent, est Ars Medicamenta colligendi, præparandi & dispensandi. Antiquitus per longam seculorum seriem ipsorum Medicorum proprium hoc negotium erat. Qui unice vendendis substantiis, quæ ad restituendam sanitatem conducere putabantur, operam dabant *Seplasiarii*, *Aromatarii*, *Pigmentarii*, *Medicamentarii*, *Unguentarii*, *Myropola Pharmacopola* *Circumforanei* nominati, a Medicis æque ac a recentioris ævi Pharmacopœis erant sane quam diversissimi. Cum vero tam cognitionum Medico acquirendarum amplitudo, quam medicamentorum copia insigniter crevisset, Medentes etiam accuratius in morbo, quos tractandos susceperant, inquisivissent & tali scrutinio multum temporis dandum esse sensissent, quin & horum operi crebrius ægrotantes imploravissent; Clinici curam medicamentorum dispensandorum propriis hominibus reliquerunt, qui *Pharmaceutæ*, *Pharmacopole* & labente ævo *Apothecarii*, *Confectionarii* &c. dicebantur. Qua temporis periodo Pharmaceutæ proprium artificum genus constituere cœperint, accurate determinari nequit; cum eorum nulla apud Auctores priorum a Christo nato seculorum mentio occurrat. *MESUE Senior* autem, qui sub initio seculi IX vixit, cum Pharmacopœi filius fuisse feratur, probabilem conjecturam suppeditat, Pharmacopœam tanquam Artem a Clinice distinctam inter Arabes, postquam scilicet una cum reliquis litteris ad Saracenos Medicina quoque transferat, ortam esse. Litteras inde in Europam reduces Pharmacia quoque est secuta, cognitaque mox insigni ejus ad vitam communem utilitate, Rerumpublicarum Proceres hanc artem exercentibus propria jura concesserunt, justos eorum limites constituerunt, legibusque caverunt, ne Arti saluberrimæ spurii impostores maligni se intrudere & maculam adspargere possint.

## §. II.

Antiquiores jam Medici circa medicamentorum simplicium delectum erant occupati. *MANTIAS*, qui proximo ante Christum natum seculo vixit, primus de *compositione Medicamentorum* scripsisse *GALENO* dicitur, cui & ipsis, in hoc artis genere versatissimo multarum, quibus prisci medentes utebantur, compositionum notitiam debeamus. *MESUE* rem pharmaceuticam qualis apud Arabes obtinuerat, nobis reliquit. Post  
rena-



renatas in Europa litteras, crescente in dies Artis nostræ ambitu, copiosa sese exeerunt volumina, quibus Medicamentorum parandorum rationes exponebantur. Hi tractatus *Luminaria*, *Antidotaria*, *Pharmacopœe*, *Dispensatoria* inscribebantur; & priores quidem horum auctores SALADINUS scilicet, NICOLAUS uterque, & MANLIUS GALENUM & MESUE maximam partem compilant. Orta sub initio seculi XVI nova Chemicorum secta cum Medicina in *Galenicam* & *Chemicam* distingueretur, Pharmacia eandem partitionem subiit; & *Chémica* quidem parti illas annumerabant præparationes, quæ opè Operationum Chemicarum peragerentur, reliquas hætenus usitatas simpliciores *Galenica* relinquentes; utranque vero receperunt, quæ exinde prodierunt Pharmacopœæ. Magistratus cum perspicerent, quanti ad salutem communem interesset, ut medicamenta rite pararentur, nec tanti momenti negotium vago singulorum arbitrio committeretur, vel etiam imperitiæ artificum relinqueretur, publica auctoritate non ediderunt solum Præscriptiones Medicamentorum, sed etiam sanxerunt. Inter primos *Florentini*, *Bergamenses*, *Norimbergenses*, *Augustani*, *Parisni* salubre hoc consilium ceperunt, quos dein longo maxima pars Europæ est secuta, ita ut hodie paucæ urbes existant, quæ non *Pharmacopœa* typis evulgaverint; sed plurimæ quoque hujus generis Collectiones a privatis sunt editæ, & prostat jam tanta eorum copia, ut singulas recensere nimis esset prolixitatis; adjudicare autem summæ arrogantia.

## S. III.

Præter ea, quæ sunt Viri boni & probi, requiritur non modo ut Pharmacopœus calleat lingua, quibus conscripti sunt libri, unde cognitiones ad artem suam facientes & hauriat & augeat. Latine & Gallicæ notitiæ carere nequit, sed eximii ipsi usus etiam erunt Anglica & Germanica, nec male his Italica quoque jungeretur. Omnibus præterea Scientiis, quibus Chémia nititur, omnino necesse est, ut animum habeat imbutum, Logica nimirum, Physica, & Mathesi. Nec circa delectum Medicamentorum simplicium officiis suis poterit defungi, nisi Historiam Naturalem habuerit perspectam; qui enim ignorat characteres, unde omnia Corpora naturalia agnoscuntur, nec accurate nosse poterit ista, quæ ad scopos medicatos faciunt. Sed in ipsa Pharmaciæ administratione præterea plura occurrunt, quæ tanquam leviora litteris non consignantur, non pauca etiam, ad quæ rite exsequenda omnino iteratum crebro exercitium requiritur. Itaque prudenter omnino legibus cautum est, ut juvenes, antequam Pharmacopœorum jura assequantur, tirocinia artis sub ductu probatorum Artificum ponant. Optima ratio bonum Pharmacopœum formandi, ea mihi quidem esse videtur, ut primum in Gymnasio Litteras humaniores tiro & prima Logices æque ac Matheseos principia ediscat. Cursu Gymnasii non abrupto, sed rite emenso, committatur Pharmacopœo probe instructo & in eo saltem per triennium in omnibus, quæ ad Artem faciunt, negotiis sedulo se exercent, nec labores, quos vel viliores esse putet, infumere detrectet. Omne quod ipsi a laboribus pharmaceuticis superest tempus, repetendis & colendis, quæ in Gymnasio tractaverat, studiis impendat; finito tirocinio in officina quadam multum frequentata per unum aut alterum annum ministrum agat, nec unquam culturam scientiarum, quibus in Gymnasio imbutus erat, negligat; egregie omnino suis rebus ibit consultum, si hoc ministerii tempus in aliquo emporio transiget & tabernas mercatorum, quos Seplasiarios hodie dicimus, sedulo frequentabit. Per idem tempus meliora quæque rerum Pharmaceuticarum Elementa, in quem censum NEUMANNUM maxime atque Clarissimum BEAUME' refero, studiose legat ac relegat. Hac methodo praxi Pharmaciæ abunde exercitatus & imbutus, adeat Academiam egregie instructam, Botanicæ ibi ceterisque Historiæ Naturalis partibus, ut & Physicæ & Chémicæ studio incubiturus, nec non Lectionum, quibus Materies Medica illustratur & regulæ Methodi Formularum conscribendarum tra-



traduntur, assiduus futurus auditor. Hac ratione formatus Pharmacopœus dignitatem Artis suæ tuebitur, publica commoda insigniter promovebit, ad provehendam Medicinam, augendamque Naturæ cognitionem Scientiæque Naturalis ambitum ampliandum haud inanem operam contribuet, una cum Medico salutem civium pariter consulat, Doctoris Medicinæ nequaquam, ut vulgo videtur, famulus, sed frater, collega, cooperator, amicus.

§. IV.

Pharmacopœa in ampla area, certe in platea latiore extrui debet. Ipsa penetralia luci sint penetrabilia, ita tamen ut ades a Solis meridiani inprimis, ardore satis sint defensæ. Neque minus ex altera parte cavendum, ne humor medicamentis noceat. Omnibus ac singulis Pharmacopœæ receptaculis inscribantur litteris majusculis tituli, unde, quæ continent, appareat; uni receptaculo plura uno corpora non inferantur; diaphragmata confusione ægre obsistunt; vasa pro variis, quæ includunt, substantiis vel ex ligno tiliaceo, vel singulari opera, vel ex vitro sint parata, metallica ob facile contagium semper sunt suspecta. Proxima Pharmacopœæ sit cella fornicata æstate calori, hieme frigori impenetrabilis, ubi Aquæ, Vina, Succus, Syrupi, Spiritus, Tincturæ, Electuaria &c. asserventur. Nec longe a Pharmacopolio distet Apotheca, sive promus condus, unde scilicet pro re nata promi condita possint. Vicinum pariter sit Laboratorium fornicatum, puteo, caminis & fornacibus instructum; cui quoque contiguam, omnino proficuum, velim esse officinam, in qua Decocta, Unguenta & cetera, quæ Galenica dicuntur, medicamenta parentur. In superna domus contignatione Vegetabilia indigena asservari solent. Capsæ quibus condantur, sint ex ligno inodoro factæ, operculo tectæ & nomine substantiæ, quam continent, inscriptæ. Ipsa contignatio sit ut aëri pervia, ita a solis æstu satis tuta. Mundities denique per omnes domus partes prima sit ac postrema Pharmacopœi cura.

§. V.

Præcipuam suppellectilem Chemicam in *Institutionibus Chemicæ* descripsi, reliquam ipse rerum usus ultro poscet. Explicandis vero jam ponderum ac bilancium generibus eo diutius immorandum videtur, quo majori circa eorum usum circumspectione opus est. Bilancium probitatem perspicimus lancium ad jugum & ponderum in lancibus situm alternando. Quo longius est jugum, eo distinctior ponderum mensura patet. Requiritur bilancium variæ librationis aliæ non nisi aliquot Granorum, aliæ Drachmarum duarum, rursus aliæ Semunciarum & Unciarum, item aliæ aliquot Unciarum librandarum; & ita porro, quæ totas libras ponderant, pro harum numero variæ debent esse conformationis. Aquis, Spiritibus, Acetis propriæ mensuræ metallicæ respondent, determinantibus uncis Drachmas, Semuncias, Uncias. Medici Libram in duodecim Uncias, Unciam in octo Drachmas, Drachmam in tres Scrupulos, Scrupulum, Parisini quidem *Gracos* imitantes, in quatuor & viginti, reliquæ vero gentes ad normam *Salernitarum* in viginti Grana dividunt, Granum ejusque partes minime Grano Piperis, ut vulgo solet, sed lamini metallicis accuratissime definitis librandæ sunt. Libræ civili vulgo sedecim Unciæ tribuuntur. Sed ipsa Libra pro variis regionibus in immensum variat. In Germania propria Libra Medica obtinet; ceteræ gentes Libra comuni pro ponderandis etiam medicamentis utuntur.

Diversissimarum nostri ævi Librarum rationem ad Libram Parisiensem redactam tam ex Clarissimi Auctoribus ABOT DE BAZINGEN & TILLET quam ex propriis observationibus hic exhibeo.



Libra Amstelodamensis, quæ per omne Belgium ob-

tinet	I.	---	---	42.
Argentoratensis	---	15.	5.	15.
Berolinensis	---	15.	2.	32.
Bernensis æquat Parisinam				
Coloniensis	---	15.	2.	13½.
Dantiscana	---	15.	2.	7.
Florentina	---	11.	---	50.
Frankofurtana ad Mœnum	---	15.	---	10.
Genevensis	I.	---	---	18.
Genuensis	---	10.	5.	60.
Hafniensis	---	15.	3.	20⅔.
Hamburgensis	---	15.	2.	15½.
Holmiensis	---	13.	7.	8.
Lisbonnensis	---	15.	7.	68.
Londinensis	---	12.	3.	12.
Lugdunensis	---	13.	4.	48.
Madridensis	---	15.	---	16.
Manhemienfis	---	15.	2.	20½.
Maffiliensis	---	13.	7.	62.
Medica in Germania passim usitata	---	15.	4.	48.
Milanensis	---	9.	3.	---
Monachienfis	---	15.	2.	23.
Neapolitana	---	10.	7.	54.
Romana	---	11.	---	50.
Varsoviensis	I.	10.	4.	24.
Veneta	---	8.	6.	---
Viennensis	I.	2.	2.	32.

Londinensis, Genuensis, Florentina Uncia nec non Neapolitana & Romana duodecimam libræ partem æquat.

In mensurandis fluidis Libram vulgo *Schopinam*, *Seidel*, *Quart*, Angli *Pint* appellant, sed *Quart* Brandeburgensium sex & triginta Uncias, *Pinta* Parisiensium duas libras, *Demiseptier* autem semilibram æquat. *Mensura* quatuor Libris respondet. *Gallon* sive *Congius* octo continet libras; quatuor & viginti mensuræ apud nostrates *Ohmæ* nomine venit; *Muid* Parisiensium ducentis octoginta octo Pintis constat.

## §. VI.

Antiquitatis quoque ponderum valor, cum multum lucis intelligendis Veterum scriptis subministret, ex EISENSCHMIDIO & MASSARIO ad Libram Parisinam redactus hic subjungendus videtur.

Romani Libram, quæ ipsis etiam *Pondo* aut *As* audiebat, in duodecim Uncias dividebant. Pondus Unciarum undecim *Deuncem*, decem *Dextantem*, novem *Dodrantem*, octo *Bessem*, septem *Septuncem*, sex *Semissem*, quinque *Quincuncem*, quatuor *Trientem*, trium *Quadrantem*, duarum *Sextantem*, Unciam unam cum dimidia *Sescuncem* nominabant.



*Libr. Paris. Unc. Dr. Gr.*

*Apud Romanos.*

Centum p. ponderavit	67.	II.	2.	48.
Libra	---	IO.	6.	48.
Uncia	---	---	7.	16.
Duella	---	---	2.	29.
Sicilicus	---	---	I.	58.
Sextula	---	---	I.	14.
Denarius	---	---	I.	2.
Consularis	---	---	---	65.
Imperialis five Drachma	---	---	---	37.
Victoriatus	---	---	---	21.
Scriptulum	---	---	---	11.
Obolus	---	---	---	4.
Siliqua	---	---	---	---

*Apud Græcos.*

Τάλαντον	54.	2.	5.	24.
Μνᾶ, Mina	---	14.	3.	40.
Δραχμή	---	---	I.	11.
Ὀβολός	---	---	---	13.
Κεράτιον	---	---	---	4.
Χαλκός	---	---	---	2.
Λεπτόν	---	---	---	$\frac{1}{3}$ .

*Apud Arabes & Græcos Recentiores & Latino-Barbaros.*

Alchemion	---	14.	3.	40.
Manes, Ominos	---	10.	6.	28.
Sacrajati	---	2.	6.	41.
Sacros, Auguen, Adar, Affatil	---	---	7.	16.
Nux magna vel Regalis	---	---	3.	44.
Sextarius, Stater	---	---	3.	44.
Nux parva	---	---	2.	50.
Alcovanus	---	---	2.	29.
Aureus, Alcaubolus	---	---	I.	14.
Atogochilos, Holca, Alchi, Darchimi, Ologi-	---	---	---	---
nat, Nabach, Avellana, Bondacate	---	---	I.	11.
Balanus, Lupinus, Bachilea, Faba Ægyptia vel	---	---	---	---
Syriaca	---	---	---	42.
Faba Alexandrina, Tremessis, Kemeraja	---	---	---	30.
Ganchus, Gormin, Gramma, Harmi, Kermet,	---	---	---	---
Faba Græca	---	---	---	21.
Seminet, Cumulus, Annulus, Onolassent, Ono-	---	---	---	---
loffich	---	---	---	11.
Danich	---	---	---	8.
Kirat, Kararit, Autulas, Alkilat	---	---	---	4.

Aqua



Aquæ frigidaë Mensuræ Romanæ æquant Parisinas sequenti ratione.

	Libr.	Unc.	Dr.	Gr.
Culeus	1133.	6.	2.	—
Amphora seu Cadus	56.	2.	7.	24.
Urna	28.	1.	3.	48.
Congius	7.	—	2.	66.
Sextarius	1.	1.	7.	44.
Hemina	—	10.	1.	18.
Quartarius	—	5.	—	45.
Acetabulum	—	2.	4.	23.
Cyatus	—	1.	5.	30.
Ligula	—	—	3.	24.

*Mensuræ Græcæ:*

Μετρητής	84.	4.	3.	—
Χῆς	7.	—	2.	66.
Ζέτης	1.	1.	7.	44.
Κοτύλη	—	8.	7.	58.
Τέτραρτον	—	4.	3.	65.
Ὁξύβαρον	—	2.	1.	69.
Κύαδος	—	1.	4.	—
Κογχή	—	—	6.	—
Μύσρον	—	—	3.	—
Χίρη	—	—	2.	—
Κοχλιάριον	—	—	1.	—

*Mensuræ Arabum Medicorum Recentiorum & Latino-Barbarorum.*

	Libr.	Unc.	Dr.	Gr.
Missohaos	3.	8.	1.	33.
Aben, Kist, Ejub, Eberia, Mina Romana	1.	6.	—	—
Fiala, Hassitius, Kassitium	—	10.	1.	18.
Rejelati, Calyx	—	5.	—	44.
Cornusum, Pugillum	—	3.	2.	68.
Anesime, Æsasse, Kassuff	—	3.	4.	20.
Conos, Coatus, Alcantus, Almunesi, Cuabus, Briale	—	1.	5.	34.
Bachates parva	—	—	5.	56.
Cochlear maximum	—	—	4.	44.
magnum	—	—	1.	52.
Colanos, Raclanarium	—	—	1.	28.
Cochlear parvum, Flagerina, Cyanes	—	—	1.	11.
minimum, Fahaliel	—	—	—	42.

Nostro ævo Libram signo ℥, Unciam ʒ, Drachmam ʒ, Scriptulum seu Scrupulum ʒ solent denotare, quibus Characteribus, signum β ubi additur, pondus dimidium denotat. Characteres id genus Auctorum Veterum invenies collectas apud ARBUTHNOT & EISENSCHMID.



## §. VII.

In colligendis Vegetabilibus hæc veniunt notanda. Radices annuæ colligendæ sunt, quum primum caulem vel folia protruserint, biennes altero a satione feminis vere, perennes, sive vere sive primo autumno, antequam lignescant. Folia decerpas efflorescentium florum, Flores gemmarum via explicitarum tempore; Fructus, ubi maturuerint. Cortex arborum, si qui desiderantur, semper Libri, quos *Cortices medicinales* dicunt, recipiantur. Multæ sunt Florum genera una cum calycibus in usum trahenda, quippe his partibus interest virtus; huc præsertim Aromatica ex Didynamia descriptæ pertinent. Flores & folia minora una cum cauliculis, quibus adherent, in usum trahuntur. *Symphites* dici solent, quæ hunc in modum carpuntur. Collectio Animalium & Mineralium, cum præter ea, quæ vel suis locis dicentur vel cum illis esse nullissima, nil habeat proprii, nullam moram injicit. Exsiccatio optime calore centum circa graduum Thermometri Fahrenheitiani aut quadraginta Reaumuriani suscipitur qualem furni dare solet; huic scopo & plurimis aliis laboribus Pharmaceuticis egregie inservit conclave, quod tali fornici superstructum est. Crassiores Radices, quo melius exsiccari queant, in taleolas sunt secandæ. Sereno semper cælo Plantarum partes sunt colligendæ, nullo rore madidæ. Vegetabilia culta, cum largius nutrimentum hauriant, præstant silvestribus; nec bene Veteres contrarium docuerunt. Aromatica & fragrantia eo sunt efficaciora, quo sub calidiore cælo vegetarunt; frigidius Tetrâdynamicis magis favet.

## §. VIII.

Medicamenta sicca in vasis ligneis curate testis asservantur. Limatura Martis, ne rubiginem contrahat, Salia in aere humescentia, ne deliquium patiantur, vitris condenda sunt. Liquores tutissime vitris committuntur. Exulent omnino omnia vasa ex Cupro seu Stanno fabricata; ultimum metallum enim in supellectilem efformatum fere Plumbum recepit; quod facili & perniciosi contagii esse constat. Potest tamen usus Stanni concedi asservandis Unguentis, Oleis infusis aliisque remediis, quæ non nisi extus adhibentur. Mollia & liquida ex Saccharo parata Medicamenta vasis porcellaneis, vel ubi hæc pretiosiora sint visa, ex Argilla teneriore exquisitè paratis, quæ *Fayence* dicunt, aut Argillaceis Plumbo non incrustatis, inmittuntur. Aromata, & quæ reliqua principia volatilia habent, diu sub forma Pulveris non asservare licet.

## §. IX.

Medio ævo compendii causa aliqualia Medicamenta ad communes locos ac titulos referre moris erat; en præcipuos.

*Flores quatuor Cordiales*

Borraginis, Buglossi, Violarum, Rosarum, ultimi debent omitti, si tres tantum præscribuntur.

*Fragmenta quinque Lapidum pretiosiorum*

Granati, Hyacinthi, Sapphiri, Smaragdi, Carneoli.



*Radices quinque Aperientes.*

Apii, Petroselini, Fœniculi, Asparagi, Rusci.

*Semina quatuor Frigida.*

Cucurbitæ, Citrulli, Melonis, Cucumeris.

*Herbæ quinque Emollientes.*

Althææ, Malvæ, Mercurialis, Parietariæ, Violariæ.





## I N D E X

- A**  
*al*, I. 10.  
 Abelmofchi, I. 1.  
*Abricosen*, I. 13.  
*Abricots*, I. 13.  
*Abrotano*, I. 1.  
 Abrotanum, I. 1. III. 5.  
*Absynthe*, I. 1.  
 Absynthium, I. 1. III. 6.  
 Acacia, I. 2. III. 7.  
*Acajou*, I. 9.  
*Acaju*, I. 9.  
 Acanthus, I. 2. III. 7.  
 Acer, I. 2.  
*Acero*, I. 2.  
*Aceto*, I. 3.  
 Acetofa, I. 2. III. 8.  
*Acetofa*, I. 2.  
 Acetofella, I. 3. III. 8.  
*Acetofella*, I. 3.  
 Acetum, I. 3. II. 3.  
     Antisepticum, II. 3.  
     Aromaticum, II. 3.  
     Bezoardicum, II. 4.  
     Camphoratum, II. 4.  
     Chalybeatum, II. 4.  
     Colchicum, II. 4.  
     Concentratum, *Stahl*, II. 4.  
         *VVestendorf*, II. 4.  
     Destillatum, II. 5.  
     Hystericum, II. 5.  
     Odoratum, II. 5.  
     Saturninum, II. 5.  
     Scilliticum, II. 5.  
*Ache*, I. 12.  
 Acidum Tartari Chryfiallifatum, II. 140.  
     Destillatum, II. 150.  
*Ackerfchvrendel*, I. 108.  
 Acmella, I. 3.  
 Aconitum, I. 3. III. 8.  
 Acorus, I. 3. 25. III. 9.  
*Acqua di archibugiata*, II. 23.  
 Actes grana, I. 95.  
 Adamas, I. 3.  
 Adhatoda, I. 4. III. 9.  
 Adiantum, I. 3. III. 10.  
 Ægagropila, I. 4.  
*Äpfel*, I. 37.  
 Æris Flores, II. 5.  
*Ærugo*, I. 109.  
 Æs, I. 4. 45.  
     ustum, II. 6.  
 Æther Vitrioli, II. 6. 99.  
 Æthiops Antimonialis, II. 6.  
     Martialis, II. 6.
- Æthiops Mineralis, II. 6.  
     Vegetabilis, I. 89.  
 Ætites, I. 4.  
 Agallochum Lignum, I. 4.  
*Agaric*, I. 4.  
*Agarico*, I. 4.  
 Agaricus, I. 4. III. 9.  
     Mineralis, I. 63.  
     Præparatus, II. 6.  
     Pedis equini facie, I. 4.  
*Agley*, I. 12.  
*Aglio*, I. 5.  
 Agnus callus, I. 4. III. 10.  
*Agresta*, I. 109.  
*Agricome*, I. 28.  
 Agrimonia, I. 4. III. 11.  
*Agrimonia*, I. 4.  
*Agstein*, I. 103.  
*Aigremoine*, I. 4.  
*Ail*, I. 5.  
*Aimant*, I. 69.  
*Airelles*, I. 76.  
*Airone*, I. 12.  
*Alabaster*, I. 4.  
*Alabastro*, I. 4.  
*Alabastrum*, I. 4.  
*Alabatre*, I. 4.  
*Alant*, I. 49.  
*Alaun*, I. 7.  
*Albicocca*, I. 13.  
 Album Græcum, I. 4.  
*Alcachingi*, I. 5.  
 Alcähelt Glauber. II. 109.  
 Alkali Ammoniacum aquosum, II. 149.  
     causticum, II. 29.  
     Fluor, II. 149.  
     Minerale Tartarifatum. II. 139.  
     de Rocou, I. 54.  
     Vegetabile Tartarifat. II. 158.  
     Vitriolatum, II. 158.  
     Volatile causticum, II. 149.  
*Alce*, I. 5.  
 Alcea, I. 5. III. 11.  
*Alcée*, I. 5.  
 Alces Ungulæ, I. 5.  
 Alchymilla, I. 5. III. 15.  
*Alderstein*, I. 4.  
 Alhandal Trochisci, I. 41.  
 Alkanna, I. 5. III. 12.  
 Alkekengi, I. 5. III. 15.  
*Alleluja*, I. 3.  
*Allermannsharnisch*, I. 108.  
*Alliaire*, I. 5.  
 Alliaria, I. 5. III. 13.  
*Alliaria*, I. 5.



*Allium*, I. 5. III. 14.  
     *Afcalonicum*, I. 5.  
     *Scorodoprasum*, I. 5. III. 14.  
*Allume*, I. 7.  
*Alnus*, I. 6. III. 16.  
*Aloes*, I. 6. III. 13.  
     *Depurata*, II. 7.  
     *Infuccata*, I. 6. II. 7.  
     *Lignum*, I. 6.  
     *Lota*, I. 6. II. 7.  
     *Rofata*, I. 6. II. 7.  
     *Violata*, I. 6. II. 7.  
*Alpschos*, I. 19.  
*Alraun*, I. 69.  
*Alfine*, I. 6. III. 17.  
*Altea*, I. 6.  
*Althæa*, I. 6. III. 16.  
*Alumen*, I. 7.  
     *Catinum*, I. 100.  
     *Plumosum*, I. 8.  
     *Romanum*, I. 7.  
     *Rupeum*, I. 7.  
     *Saccharinum*, II. 7.  
     *Tinctum*, II. 7.  
     *Ustum*, II. 7.  
*Alun*, I. 7.  
*Amandes*, I. 9.  
*d' Amandes pâte*, II. 129.  
*Amara dulcis*, I. 7.  
*Amatita*, I. 57.  
*Amazonum Lapis*, I. 77.  
*Ambra*, I. 7.  
     *Liquida*, I. 7.  
*Ambra grigia*, I. 7.  
*Ambre gris*, I. 7.  
*Ambre jaune*, I. 103.  
*Ambroisie*, I. 22.  
*Ameise*, I. 52.  
*Amethystus*, I. 7.  
*Amianthus*, I. 8.  
*Amianto*, I. 8.  
*Amidon*, I. 9.  
*Ammi*, I. 8. III. 17.  
*Ammoniacum Gummi*, I. 8.  
     *Sal*, I. 8.  
*Amomi semen*, I. 8.  
*Amomum*, I. 8.  
*Amygdalæ*, I. 9.  
*Amylum*, I. 9.  
*Anacardium*, I. 9.  
*Anagallide*, I. 9.  
*Anagallis*, I. 9. III. 18.  
*Anas*, I. 9.  
*Anatron*, I. 51.  
*Anchusa*, I. 9.  
*Anckenbliumlein*, I. 90.  
*Ancusa*, I. 5.  
*Ancoline*, I. 12.  
*Andorn*, I. 70.

*Andorn*, *Schvvarzer*, I. 18.  
*Andonillers*, I. 34.  
*Anet*, I. 9.  
*Anethum*, I. 9. III. 18.  
*Aneto*, I. 9.  
*Angelica*, I. 10. III. 19.  
*Anglicum Sal*, I. 10.  
*Anguilla*, I. 10.  
*Anguilla*, I. 10.  
*Anguille*, I. 10.  
*Anguria*, I. 39.  
*Anice*, I. 10.  
*Anice della China*, I. 100.  
*Anime Gummi*, I. 10.  
*Anis*, I. 10.  
*Anis de la Chine*, I. 10.  
     *Stern*, I. 10.  
*Anisum*, I. 10. III. 19.  
     *stellatum*, I. 10.  
*Anitra*, I. 9.  
*Anodynum minerale*, II. 8.  
*Anonide*, I. 79.  
*Anser*, I. 11.  
*Anserina*, I. 11. III. 20.  
*Anthora*, I. 11. III. 20.  
*Anthos*, I. 11.  
*Anthos*, I. 92.  
*Antophylli*, I. 11.  
*Antidotus Mithridatis*, II. 59.  
*Antihæcticum Poterii*, II. 7.  
*Antimoine*, I. 11.  
*Antimonium*, I. 11.  
     *Diaphoreticum*, II. 8.  
     *Præparatum*, II. 8.  
*Antiquarium Riverii*, II. 115.  
*Apalachine*, I. 11.  
*Aparine*, I. 11. III. 20.  
*Aparine*, I. 11.  
*Aper*, I. 11.  
*Apium*, I. 12. III. 21.  
*Apozema*, II. 8.  
     *Febrifugum laxans*, II. 50.  
*Appio di montagna*, I. 80.  
*Apri dentes*, I. 11.  
*Aqua Absynthii composita*, II. 9.  
     *Acustica*, II. 9.  
     *Alexiteria*, II. 9.  
     *Aloetica Mercurialis*, II. 20.  
     *Aluminosa Fallopii*, II. 10.  
         *Parisiensium*, II. 10.  
     *Anhaltina*, II. 10.  
     *Anodyna*, II. 10.  
     *Apoplectica*, II. 10.  
     *Aromatica*, II. 11.  
     *Asthmatica*, II. 11.  
     *Balsami Embryonum*, II. 11.  
     *Benedicta Rulandi*, II. 12.  
     *Calcis*, II. 12.  
         *composita*, II. 12.



Aqua Caponis, II. 12.  
 Carbunculi, II. 12.  
 contra Cariem II. 14.  
 Carmelitarum, II. 13.  
 Carminativa *Dornacrelli* II. 13.  
     Regis Boruss. II. 13.  
     Vulgaris, II. 13.  
 Catapultarum, II. 14.  
 Cinnamomi Buglossata, II. 14.  
     Cordialis, II. 14.  
     Cydoniata, II. 14.  
     Hordeata, II. 14.  
     Simplex, II. 14.  
     cum Vino, II. 14.  
     sine Vino, II. 14.  
     Vulgaris, II. 14.  
 Colonienfis, II. 14.  
 Confortativa, II. 14.  
 Cornu Cervi citrata, II. 14.  
     Tenellorum, II. 22.  
 Divina, II. 15.  
 Epileptica, II. 15.  
 Fimi, II. 15.  
 Florum omnium, II. 15.  
 Fœtida, II. 15.  
 Fortis, II. 16.  
     Mercurialis, II. 16.  
     præcipitata, II. 16.  
 ad Gingivas, II. 16.  
 Grysea, II. 16.  
 Hungarica, II. 17.  
 Hyrundinum, II. 16.  
     cum Castoreo, II. 17.  
 Laxativa Angelica, II. 17.  
     Viennensis, II. 17.  
 Magnanimitatis, II. 17.  
 Mastichina, II. 18.  
 Mellis, II. 18.  
     Odorata, II. 18.  
 Melissæ composita, II. 18.  
 Menthæ composita, II. 18.  
 Mercurialis, II. 18.  
     *Charras*, II. 105.  
 Mercuriata, II. 18.  
 Millepedum, II. 19.  
 Mirabilis, II. 15.  
 Mulsa, II. 19.  
 Myrrhæ, II. 19.  
 Ophthalmica alba, II. 19.  
     *Charras*, II. 19.  
     Cœlestis, II. 19.  
     Cærulea, II. 19.  
     *Daguin*, II. 19.  
 Panis, II. 20.  
 Perlata, II. 14.  
 Pestilentialis, II. 20.  
     *Hartmann*, II. 150.  
 Phagedænica, II. 20.  
 Picis, II. 96.

Aqua *Rabelii*, II. 20.  
 Raphani composita, II. 20.  
 Reginæ Hungariæ, II. 17.  
 Regis, II. 20.  
 Sclopetaria, II. 21.  
 Serpylli composita, II. 20.  
 Sino pari, II. 21.  
 Stibiata, II. 21.  
 Styptica *Berolinensium*, II. 21.  
     *Danorum*, II. 21.  
*Thediana*, II. 21.  
 Theriacalis, II. 22.  
     *Londinensium*, II. 22.  
 Ad Tormina Infantum, II. 22.  
 de Tribus, II. 107.  
 Typhor. Cervi composita, II. 22.  
 Vegeto mineralis, II. 22.  
 Veronicæ cum Vino, II. 22.  
 Vinosa, II. 9.  
 Violacea, II. 22.  
 Viridis, II. 22.  
 Vitæ mulierum, II. 23.  
     Saponacea, II. 23.  
 Vitriolica, II. 23.  
     Cærulea, II. 23.  
     *Londin.* II. 21.  
 Vulneraria aquosa, II. 24.  
     *Baumè*, II. 24.  
     *Lemery*, II. 23.  
     Mercurialis, II. 24.  
     Mineralis, II. 24.  
     Rubra, II. 24.  
     Vinosa, II. 24.  
 Aquila alba, II. 24.  
*Aquila Lignum*, I. 6.  
 Aquilegia, I. 12. III. 21.  
 Arabicum Gummi, I. 12. 32.  
*Araignée*, I. 12. III. 22.  
 Aranea, I. 12. III. 22.  
 Arbor vitæ, I. 12.  
 Arcanum Corallinum, II. 24. 106.  
     Duplicatum, II. 25. 138.  
     Tartari, II. 25. 158.  
 Ardea, I. 12.  
 Argent, I. 12.  
*Argentine*, I. 11.  
*Argento*, I. 12.  
 Argentum, I. 13.  
     Vivum, I. 73.  
*Aristotoche de vigne*, I. 13.  
 Aristolochia, I. 13. III. 22.  
     *longa*, I. 13.  
*Aristologia di vite*, I. 13.  
 Armeniaca, I. 13. III. 23.  
 Armenius lapis, I. 13.  
*Armolse*, I. 14.  
 Armoracia, I. 13. III. 23.  
 Arnica, I. 14. III. 15.  
*Aron*, I. 15.



*Arèet de bœuf*, I. 79.  
*Arroche*, I. 16.  
     *puante*, I. 111.  
*Arophi Paracels.* II. 161.  
*Arsenicum*, I. 14.  
*Artanita*, I. 45.  
*Artemisia*, I. 14. III. 24.  
     *Artemisia*, I. 14.  
*Arum*, I. 15. III. 25.  
*Arundo*, I. 15. III. 24.  
*Asarum*, I. 15. III. 25.  
*Asbestus*, I. 8.  
*Asche*, I. 15.  
*Ascia*, I. 15.  
*Assenzio Comune*, I. 1.  
*Assenzio Pontico*, I. 1.  
*Aspalatum iignum*, I. 15.  
*Asparago*, I. 15.  
*Asparagus*, I. 15. III. 26.  
*Asperge* I. 15.  
*Asphaltum*, I. 15.  
*Asphodelus*, I. 15. III. 25.  
*Asplenium*, I. 15.  
*Asia dulcis*, I. 15. 19.  
     *Fœtida*, I. 15.  
*Astrantia*, I. 16. III. 26.  
*Atrepice*, I. 16.  
     *Fetida*, I. 16.  
     *Selvaggia*, I. 16.  
*Atractylis*, I. 16. III. 27.  
*Atriplex*, I. 16. III. 28. 29.  
*Attich*, I. 43.  
*Avellana*, I. 16. III. 27.  
*Avena*, I. 16. III. 27.  
*Augentroft*, I. 50.  
*Aunée*, I. 6. 49.  
*Avoine*, I. 16.  
*Avorio*, I. 48.  
*Aurantia*, I. 16. III. 28.  
*Auricula Judæ*, I. 17. III. 30.  
*Auricula Muris*, I. 17. III. 31.  
*Auripigmentum*, I. 14. 17.  
*Aurone*, I. 1.  
*Aurum*, I. 17.  
     *Fulminans*, II. 25.  
     *Horizontale*, II. 25.  
     *Potabile*, II. 25.  
*Autruche noir*, I. 16.  
     *Oeufs*, I. 102.  
*Azedarach*, I. 18.  
  
*Bachbungen*, I. 18.  
*Bacile*, I. 43.  
*Bacilli ad fornacem*. II. 25.  
     *de Liquiritia*, II. 25.  
*Baculi pectorales*, II. 98.  
*Baer*, I. 111.  
*Balanus Myrepicus*, I. 19.  
*Balaustiorum Flores*, I. 56. III.

*Baldrian*, I. 108.  
*Baleine*, I. 35.  
*Ballotta*, I. 18. III. 30.  
*Balsama*, II. 25. 31.  
*Balsamappel*, I. 74.  
*Balsamita*, I. 18. III. 30.  
*Balsamo di aghi*, II. 26.  
     *di Cartagena*, I. 106.  
*Balsamum adstringens*, II. 25.  
     *Anodynum*, II. 25.  
     *Apoplecticum*, II. 26.  
     *Arcæi*, II. 26.  
         *liquefactum*, II. 26.  
     *Aromaticum*, II. 26. 30.  
     *Canadense*, I. 26.  
     *Carpaticum*, I. 29. 90.  
     *Caryophyllorum*, II. 31.  
     *Catholicum*, II. 26. 29.  
     *Gellenfe*, II. 26.  
     *Cephal. Saxonicum*, II. 26.  
     *Chalybeatum*, II. 26.  
     *Cinnamomi*, II. 31.  
     *Commendatoris*. II. 29.  
     *ad Dentitionem*. II. 26.  
     *Fioraventi*, II. 27.  
     *Hystericum*, II. 27.  
     *Ischæmaticum*, II. 27.  
     *Lavendulæ*, II. 31.  
     *Lectorense*, II. 28.  
     *Lithuanicum*, II. 28.  
     *Locatelli*, II. 28.  
     *ad Loricand. cadaver*, II. 21.  
     *Majoranæ*, II. 31.  
     *Mercuriale*, II. 28.  
     *Metensium*, II. 32.  
     *Nervinum*, II. 28.  
     *Odontalgicum*, II. 29.  
     *Ophthalmicum*, II. 29.  
         *Rubrum*, II. 29.  
     *Pectorale*, II. 29.  
     *Rutæ*, II. 31.  
     *Samaritanum*, II. 30.  
     *Saponaceum*, II. 30.  
     *Saturni*, II. 30.  
     *Schauerianum*, II. 30.  
     *Scherzeri*, II. 30.  
     *Sulph. Antimoniale*, II. 31.  
         *Crassum*, II. 31.  
         *Rulandi*, II. 31.  
     *Tranquillans*, II. 31.  
     *Traumaticum*, II. 32.  
         *Edinburgensium*, II. 32.  
         *Londinesium*, II. 32.  
     *Viride*, II. 32.  
     *Vitæ externum*, II. 33.  
         *Funnii*, II. 32.  
         *Hoffmanni*, II. 32.  
         *Teichmeyeri*, II. 33.  
*Vulnerar. Edimburg.* II. 33.



Balsamum, Vulnerar. Londinens. II. 33.

Minder, II. 33.

Stahlii, II. 33.

Bamiæ Moschatæ, I. 1.

Barba di Becco, I. 107.

Barba Capræ, I. 18. III. 31.

Barbarea, I. 18.

Barbe de bouc, I. 107.

Bardana, I. 18.

Bardana, I. 18. III. 33.

Barenklau, I. 23.

Barlupp, I. 68.

Barwurzel, I. 73.

Basilic, I. 18.

Basilicum, I. 18. III. 32.

de Bassora Gummi, I. 107.

Baumwoll, I. 21.

Baurensenf, I. 106.

Bdellium, I. 18.

Beaume d' Aiguilles, II. 26.

de Carthagine, I. 106.

Condom, II. 28.

de Laiture, II. 28.

de Vinceguere, II. 28.

Beaumier, I. 72.

Bec de grue, I. 55.

Beccabunga, I. 18. III. 33.

Bedeguar, I. 46.

Behen album, I. 19. III. 33.

Nuces, I. 19.

Rubrum, I. 19.

Belemnites, I. 19.

Belgivino, I. 19.

Belladonna, I. 19. III. 35.

Belledame, I. 16.

Bellis, I. 19. III. 34. 35.

Benedictenwurzel, I. 29.

Bengalensis Nux, I. 19.

Benoite, I. 29.

Benzoës, I. 19.

Berben, I. 20.

Berberis, I. 20. III. 35.

Bergkummel, I. 99.

Bergmunze, I. 25.

Bergsalz, I. 94.

Bernstein, I. 103.

Bersingstein, I. 83.

Bertram, I. 89.

wilder, I. 88.

Berufkraut, I. 42. 99.

Beschreykraut, I. 99.

Besenkraut, I. 101.

Beta, I. 20. III. 35.

Betaine, I. 20.

des Montagnes, I. 14.

Betonica, I. 20. III. 37.

Betonien, I. 20.

Bettlerlause, I. 111.

Bettonica, I. 20.

Tom, I.

Bettonica, delle Montagne, I. 14.

Bettstrob, I. 54.

Betula, I. 20. III. 37.

Betulla, I. 20.

Beurre, I. 23.

Beyfus, I. 14.

Bezetta, I. 20.

Bezoar, I. 21.

Bezoardicum Joviale, II. 7. 33.

Martiale, II. 33.

Minerale, II. 34.

Bibergeil, I. 31.

Biberklee, I. 107.

Bienjoin, I. 19.

Bierre, I. 34.

Bieta, I. 20.

Bigarreaux, I. 33.

Bilsam, I. 60.

Bimsenstein, I. 88.

Bingelkraut, I. 73.

Birke, I. 20.

Birne, I. 89.

Birra, I. 34.

Bisam, I. 75.

Samen, I. 1.

Bismuthum, I. 21.

Bistorta, I. 21. III. 37.

Bitumen Judaicum, I. 15.

Blasewasser, I. 54.

Blaireau, I. 105.

Blanc de Baleine, I. 35.

Manger, II. 94.

de Plomb, I. 35.

Blatta Byzantina, I. 21.

Bled noir, I. 51.

Sarrasin, I. 51.

Bley, I. 86.

Bleyweis, I. 35.

Bleywurzel, I. 47.

Bluet, I. 45.

Blutstein, I. 57.

Blutegel, I. 59.

Bock, I. 59.

Bocksbart, I. 107.

Bodentilla, I. 11.

Boerenklau, I. 23.

Bœuf, I. 22.

Bohnen Sau-. I. 51.

Kraut, I. 96.

welsche, I. 50.

Bois gentil, I. 73.

de Garou, I. 73.

Saint, I. 73.

Boletum Cervinus, I. 21.

Boli Lithontriptici, II. 34.

in Quartana, II. 34.

Vermifugi, II. 34.

Bolus, I. 21.

Anthelminticus purgans, II. 34.

d

Bo-



Bolus, *Armena præparata*, II. 34.  
 Bombax, I. 21. III. 38.  
 Bonette, I. 23.  
 Bonne dame, I. 16.  
 Bonus Henricus, I. 21. III. 38.  
 Borax, I. 21.  
 Boretzsch, I. 22.  
 Borraggine, I. 22.  
 Borrago, I. 22. III. 39.  
 Bos, I. 22.  
 Boffo, I. 24.  
 Botrys, I. 22. III. 39.  
     *Mexicana*, I. 22.  
 Bouc, I. 59.  
 Bougie, II. 69.  
 Bouillon blanc, I. 108.  
 Bovist, I. 22.  
 Bovista, I. 22.  
 Bouleau, I. 20.  
 Bouquetine, I. 85.  
 Bourgène, I. 52.  
 Bourrache, I. 22.  
 Bousserole, I. 111.  
 Branca ursina, I. 23.  
 Branche ursine, I. 23.  
 Brassica, I. 22. III. 40.  
 Bratachite, I. 23.  
 Braunwurx, I. 98.  
 Bray sec, I. 41.  
 Brionia, I. 23.  
 Britannica, I. 23.  
 Brochet, I. 68.  
 Brod, I. 81.  
 Brombeeren, I. 92.  
 Bruchkraut, I. 59.  
 Brunella, I. 23. III. 39.  
 Brunkressen, I. 77.  
 Bruscus, I. 23. 93.  
 Brustbeerlei, I. 62.  
     *schwarz*, I. 98.  
 Bruyere, I. 49.  
 Bryonia, I. 23. III. 41.  
 Bubendistel, I. 48.  
 Buchen, I. 51.  
 Buchs, I. 24.  
 Buchwaizen, I. 51.  
 Bue, I. 22.  
 Bufo, I. 23. III. 41.  
 Bufonites, I. 23.  
 Bugle, I. 23.  
 Buglossum, I. 23. III. 41.  
 Bugula, I. 23.  
 Bugula, I. 23. III. 42.  
 Buis, I. 24.  
 Bursa Pastoris, I. 23. III. 42.  
 Burzel, I. 87.  
 Butiro, I. 23.  
 Butte, I. 46.  
 Butter, I. 23.

*Butterweckel*, I. 82.  
 Butyrum, I. 23.  
     *Antimonii*, II. 7.  
     *Cacao*, I. 24. II. 34.  
     *Majoranæ*, II. 34.  
     *Rubrum*, II. 35.  
     *Viride*, II. 35.  
 Buxus, I. 24. III. 42.  
 Caapeba, I. 24.  
 Cabaret, I. 15.  
 Cabbage barck, I. 24.  
 Cacao, I. 24.  
 Cacio, I. 30.  
 Cacciù, I. 32.  
 Cachou, I. 32.  
 Caffè, I. 24.  
 Cajeput, I. 25.  
 Caille de lait, I. 54.  
 Caillon, I. 100.  
 Calambuc, I. 6.  
 Calament, I. 25.  
 Calaminaire, I. 25.  
 Calaminaris lapis, I. 25.  
 Calamintha, I. 25. III. 44.  
 Calamita, I. 69.  
 Calamus Aromaticus, I. 25. III. 42.  
 Calcaire, I. 25.  
 Calcarius, I. 25.  
 Calcitrappa, I. 25. III. 44.  
 Calendula, I. 25. III. 44.  
 Calmus, I. 25.  
 Calomelas, II. 115.  
 Calx, I. 25.  
     *Antimonii lota*, II. 8.  
 Camedrio, I. 35.  
 Camillen, I. 35.  
 Camomilla, I. 35.  
 Camomille, I. 35.  
 Campechianum Lignum, I. 25.  
 Camphora, I. 26.  
 Camphorata, I. 26.  
 Canard, I. 9.  
 Cancrorum Chelæ, I. 26.  
     *Lapides*, I. 26.  
     *Oculi*, I. 26.  
 Candelæ Chirurgicæ, II. 35.  
     *Fumales*, II. 35.  
     *Mercuriales*, II. 35.  
 Candeola, II. 69.  
 Canella alba, I. 26.  
 Canellæ Clavelli, I. 26. 39.  
 Canelle, I. 38.  
     *Girofflèe*, I. 30.  
 Canessirinde, I. 41.  
 Canna, I. 15.  
 Cannabis, I. 27. III. 45.  
 Canneberge, I. 81.  
 Cannella, I. 38.



- Cannella, Garofonata*, I. 30.  
*Cantarelle*, I. 27.  
*Cantharides*, I. 27. III. 45.  
*Caoutchou*, I. 32.  
*Capaun*, I. 27.  
*Capelvenere*, I. 27.  
*Capillaire*, I. 27.  
*Capillus Veneris*, 27. III. 43.  
*Capo*, I. 27.  
*Capparis*, I. 27. III. 45.  
*Cappero*, I. 27.  
*Cappone*, I. 27.  
*Capres*, I. 27.  
*Caprier*, I. 27.  
*Caprifoglio*, I. 27.  
*Caprifolium*, I. 27.  
*Capro*, I. 59.  
*Capucine*, I. 77.  
*Capucinerlein*, I. 77.  
*Carabè*, I. 103.  
*Carannæ Gummi*, I. 28.  
*Cardamine*, I. 28. III. 46.  
*Cardamomum*, I. 28. III. 46.  
*Cardenbenedictum*, I. 28.  
     *wilde*, I. 16.  
*Cardiaca*, I. 28. III. 46.  
*Cardoncello*, I. 98.  
*Cardopatium*, I. 29.  
*Cardo salutaris*, I. 29.  
*Cardosanto*, I. 28.  
*Cardius benedictus*, I. 28. III. 47.  
     *Mariæ*, I. 28. III. 47.  
     *Tomentosus*, I. 28. III. 47.  
*Caricæ*, I. 29.  
*Carlina*, I. 29. III. 48.  
*Carneol*, I. 29.  
*Carneolus*, I. 29.  
*Carobes*, I. 100.  
*Carolo*, I. 48.  
*Carouge*, I. 100.  
*Carpe*, I. 29.  
*Carpio*, I. 29.  
*Carpione*, I. 29.  
*Carpobalsamum*, I. 71.  
*Carthamus*, I. 29. III. 48.  
*Caruba*, I. 100.  
*Carvi*, I. 29. III. 48.  
*Caryophyllata*, I. 29. III. 49.  
*Caryophylli*, I. 30. III. 49.  
*Cascarilla*, I. 30.  
*Casseus*, I. 30. 63.  
*Casse en batons*, I. 30.  
*Cassepierre*, I. 82.  
*Cassia Caryophyllata*, I. 30.  
     *pro Clysteribus*, II. 35.  
     *Extracta*, II. 36.  
     *Fistola*, I. 30.  
     *Fistula*, I. 30. III. 50.  
     *Ligneæ*, I. 30.  
*Cassia cum Manna*, II. 35.  
*Cassia Flores*, I. 39.  
*Cassonade*, I. 93.  
*Cassumunar*, I. 31.  
*Castagna*, I. 31.  
*Castanea*, I. 31. III. 50.  
*Castanie*, I. 31.  
     *Ross*, I. 59.  
     *wilde*, I. 59.  
*Castoreo*, I. 31.  
*Castoreum*, I. 31. 51.  
*Cassuminar*, I. 31.  
*Catagambar*, I. 31.  
*Cataignes d'eau*, I. 107.  
*Cataplasma Anodynum*, II. 36.  
     *Antisepticum*, II. 36.  
     *ex Bryonia*, II. 36.  
     *Emolliens*, II. 36.  
     *Maturans*, II. 36.  
     *de Mica Panis*, II. 36.  
     *Pomaceum*, II. 37.  
     *Resolvens*, II. 37.  
     *Saponaceum*, II. 36.  
     *ad Scirrhus*, II. 37.  
*Catapotia ad Catarrhos*, II. 118.  
*Cataputia*, I. 31. 32. III. 51.  
*Catapuzza*, I. 32.  
*Catechu*, I. 32.  
*Catholicum*, II. 37.  
*Catrame*, I. 86.  
*Catus*, I. 32.  
*Causticum Antimoniale*, II. 7.  
     *Commune*, II. 37.  
     *Mitius*, II. 37.  
     *Lunare*, II. 97.  
     *Potentiale*, II. 37. 97.  
*Ceci*, I. 37.  
*Celeri*, I. 12.  
*Celidonia maggiore*, I. 36.  
     *minore*, I. 36.  
*Cendres gravellees*, I. 38.  
*Centaurea minore*, I. 32.  
*Centauree petite*, I. 32.  
*Centaurium minus*, I. 32. III. 53.  
*Centumnodia*, I. 33. III. 52.  
*Cepa*, I. 33. III. 54. 55.  
*Cera*, I. 33.  
     *Arborea*, II. 37.  
     *Citrina*, II. 37.  
     *ad Crines*, II. 37.  
     *Viridis*, II. 37.  
*Cerasa*, I. 33. III. 53.  
*Ceraforum Gummi*, I. 34.  
*Cerasus Racemosa*, I. 34. III. 53.  
*Ceratum*, II. 38. 69.  
     *Amygdalatum*, II. 38.  
     *Cosmeticum*, II. 38.  
     *Detergens*, II. 38.  
     *ad Labia*, II. 38.



Ceratum, Refrigerans, II. 38.  
     Saturninum, II. 38.  
 Cerberus triceps, II. 129.  
 Cerfoglio, I. 34.  
 Cerefolium, I. 34. III. 54.  
 Cereoli, II. 38. 69.  
 Cerevisia, I. 34.  
 Cerf, I. 34.  
 Cerfeuil, I. 34.  
 Cerises, I. 33.  
     à grappes, I. 34.  
 Cervaria, I. 55.  
 Cervo, I. 34.  
 Cerussa, I. 35.  
     Antimonii, II. 38.  
 Cervus, I. 34. III. 56.  
 Ceterach, I. 35. III. 54.  
 Ceti Sperma, I. 35.  
 Chachvile, I. 30.  
 Chalcitis, I. 110.  
 Chalybs, I. 51.  
 Chamædrys, I. 35. III. 56.  
 Chamæpitys, I. 35. III. 57.  
 Chamaras, I. 97.  
 Chamomilla, I. 35. III. 57.  
 Chanvre, I. 27.  
 Chapon, I. 27.  
 Chardon benit, I. 28.  
     à Foulon, I. 48.  
     Marie, I. 28.  
     Roland, I. 49.  
     Sauvage, I. 29.  
 Chassetaupe, I. 31.  
 Chassis, I. 91.  
 Chat, I. 32.  
 Chataigne, I. 31.  
     d'Eau, I. 107.  
 Chauffetrappe, I. 25.  
 Chaux vive, I. 25.  
 Cheiri, I. 36. III. 58.  
 Chelidoine, I. 36.  
 Chelidonium, I. 36. III. 59.  
 Chene, I. 89.  
 Chermes, I. 36.  
 Chevrefeuille, I. 27.  
 Chicorée, I. 37. 49.  
 Chiendent, I. 56.  
 Chinæ Cortex, I. 36.  
     Radix, I. 37.  
 Chiovi di Garofano, I. 30.  
 Chocolata, II. 39.  
 Choux, I. 22.  
     marin, I. 101.  
 Chrysolithus, I. 37.  
 Ciboule, I. 33.  
 Cicer, I. 37. III. 58.  
 Cicerbita, I. 101.  
 Cichorium, I. 37. III. 50.  
 Cicoria, I. 37.

Cicum, I. 55.  
 Cicuta, I. 37. III. 59.  
 Cigue, I. 37.  
     des Marais, I. 84.  
 Cina, I. 38.  
 Cinghiale, I. 11.  
 Cineres, II. 39.  
     Clavellati, I. 38.  
     Depurati, II. 39.  
 Cini, I. 46.  
 Cinnabaris, I. 38.  
     Antimonii, II. 7.  
     Gremor, II. 39.  
     Facilia, II. 39.  
     Nativa præparata, II. 40.  
 Cinnamomum, I. 38.  
 Cinoglossa, I. 46.  
 Ciperò longo, I. 46.  
     rotondo, I. 46.  
 Cipolla, I. 33.  
     bislunga, I. 33.  
 Cipresso, I. 45.  
 Cire, I. 33.  
 Ciriesia à grappolo, I. 34.  
 Ciriege, I. 33.  
 Citreum Malum, I. 39. III. 61.  
 Citron, I. 39.  
 Citronade, I. 39.  
 Citrullus, I. 39. III. 60.  
 Clareta, II. 40.  
 Claretum Aurantiorum Florum, II. 41.  
     Barbadense, II. 40.  
     Cacao, II. 40.  
     Caffée, II. 41.  
     Coronarium, II. 41.  
     Fructuum, II. 41.  
     Huile de Venus, II. 41.  
     Nucleorum, II. 41.  
 Clematis, I. 40. III. 61.  
 Cloportes, I. 74.  
 Cloux de Girofiles, I. 30.  
 Clyfma Carminativum, II. 42.  
     Commune, II. 42.  
     Emolliens, II. 42.  
     Leniens, II. 42.  
     Nutriens, II. 42.  
     Opiatum, II. 42.  
     Simplex, II. 42.  
     ad Soporosos affectus, II. 42.  
     Terebynthinarum, II. 42.  
 Clyffus Antimonii, II. 8.  
 Cnidium Granum, I. 40.  
 Cobaltum, I. 40.  
 Cocciniglia, I. 40.  
 Coccionella, I. 40.  
 Coccognidium, I. 40. III. 62.  
 Cocculi, I. 40.  
 Cochenille, I. 40.  
 Cochlea, I. 40. III. 61.



- Cochlearia*, I. 40. III. 62.  
*Coclearia*, I. 40.  
*Cocomero*, I. 44.  
*Coda Cavallina*, I. 49.  
*Codagapala*, I. 41.  
*Coinges*, I. 45.  
*Colchicum*, I. 41. III. 63.  
*Colla di pesce*, I. 61.  
*Colle des poissons*, I. 61.  
*Collutorium Antiscorbuticum*, II. 42.  
     *Gingivale*, II. 43.  
     *Odontalgicum*, II. 43.  
*Collyrium adstringens*, II. 43.  
     *Album*, II. 164.  
     *Cæruleum*, II. 19.  
     *Comitis du Bourg*, II. 19.  
     *Helvetii*, II. 97.  
     *Lanfranci*, II. 43.  
     *Resolvens*, II. 43.  
     *Roborans*, II. 43.  
     *Sapphirinum*, II. 19. 43.  
*Colocynthis*, I. 42. III. 62.  
*Colofonia*, I. 41.  
*Colombo*, I. 41.  
*Colophonium*, I. 41.  
*Coloquint*, I. 41.  
*Coloquintida*, I. 41.  
*Colsat*, I. 76.  
*Colubrinum Lignum*, I. 41.  
*Conchæ*, I. 41.  
     *Citratæ*, II. 43. 109.  
     *Præparatæ*, II. 44.  
*Conchiglie*, I. 41.  
*Concombre*, I. 44.  
     *Sauvage*, I. 44.  
*Condita*, II. 44.  
*Conditum de Cidoniis*, II. 106.  
*Confectio Alkermes*, II. 44.  
     *Anisi Laxativa*, II. 44.  
     *Cinnamomi Regia*, II. 45.  
     *Diacodion*, II. 156.  
     *Hamech*, II. 45.  
     *de Hyacintho*, II. 45.  
     *Japonica*, II. 56.  
     *de Rebecha*, II. 46. 166.  
     *Universalis*, II. 46. 55.  
*Confectiones siccæ*, II. 45.  
*Conserva Millepedum*, I. 74.  
     *Rosarum solida*, II. 137.  
*Conservæ*, II. 46.  
     *Vitriolatæ*, II. 46.  
*Consolida*, I. 42. III. 65.  
     *Major*, I. 42. 103.  
     *Media*, I. 23. 42.  
*Consolida maggiore*, I. 103.  
*Consoude grande*, I. 103.  
*Contra Semence*, I. 38.  
*Contra jerva*, I. 42.  
*Conyza Cærulea*, I. 42. III. 64.
- Conyza Media*, I. 42. III. 64.  
     *Vulgaris*, I. 42. III. 64.  
*Copaiba Balsamum*, I. 42.  
*Copal Gummi*, I. 42.  
*Coq*, I. 18.  
*Coquelicot*, I. 81.  
*Coquelourde*, I. 88.  
*Coquerets*, I. 5.  
*Coquilles*, I. 41.  
*Corailles*, I. 42.  
*Cerallen*, I. 42.  
*Corallenmoos*, I. 43.  
*Corallia*, I. 42. 43. III. 66.  
     *Præparata*, II. 44.  
*Corallina*, I. 43. III. 68.  
*Corallina de Corse*, I. 53.  
*Coralline de Malte*, I. 58.  
*Cortander*, I. 43.  
*Coriandro*, I. 43.  
*Coriandrum*, I. 43. III. 63.  
*Corinthen*, I. 82.  
*Corna*, I. 43. III. 65.  
*Cornalina*, I. 29.  
*Cornaline*, I. 29.  
*Corne de Cerf*, I. 43.  
*Corneille*, I. 68.  
*Cornichons*, I. 44.  
*Corniole*, I. 43.  
*Cornouilles*, I. 43.  
*Cornu Cervi*, I. 34.  
     *Auratum*, II. 46.  
     *sine Igne præparat.* II. 47.  
     *Philosoph. præparat.* II. 47.  
     *Præparatum*, II. 47.  
     *Raspatum*, I. 34.  
     *Rasura*, I. 34.  
     *Tornatum*, I. 34.  
     *Ustum*, II. 47.  
*Cornuum præparatio*, II. 47.  
*Coronopo*, I. 43.  
*Coronopus*, I. 43. III. 67.  
*Corrector*, II. 140.  
*Corteccia Peruviana*, I. 36.  
*Cortex Peruvianus*, I. 36.  
*Coryli Lignum*, I. 16.  
*Cosmeticum Clavii*, II. 47. 103.  
*Costo*, I. 18.  
*Costus*, I. 43.  
     *Hortensis*, I. 18.  
*Cotogni*, I. 45.  
*Coton*, I. 21.  
*Cotone*, I. 21.  
*Cotula foetida*, I. 36.  
*Couleuvre*, I. 23.  
     *Bois*, I. 41.  
*Courbaril*, I. 10.  
*Courge*, I. 44.  
*Craic*, I. 43.  
*Cranium humanum*, I. 43.



*Crapaud*, I. 23.  
*Crapaudine*, I. 23. 99.  
*Crassula*, I. 43. III. 66.  
*Crayon rouge*, I. 92.  
*Cremor Barbadensis*, II. 40.  
     *Lactis*, I. 63.  
     *Tartari*, II. 47.  
*Crepitus Lupi*, I. 22. 43.  
*Crescione*, I. 28.  
*Cresson*, I. 77.  
     *d' Eau*, I. 77.  
     *des Prés*, I. 28.  
     *de Roche*, I. 77.  
     *Sauvage*, I. 77.  
*Creta*, I. 43.  
*Crenzelkraut*, I. 98.  
*Crenzkraut*, I. 44.  
*Crichmum*, I. 43. III. 68. 69.  
*Crocus*, I. 43. III. 68.  
     *Antimoniatus*, II. 47.  
     *Antimonii*, II. 47. 48. 95.  
     *Martis, adstringens*, II. 47.  
     *Aperitivus*, II. 47.  
     *Metallorum*, II. 48. 95.  
     *Solis*, II. 48.  
*Croifette*, I. 44.  
*Cropal*, I. 41.  
*Cruciata*, I. 44. III. 70.  
*Crues*, I. 34.  
*Crytalli Lunæ*, II. 48. 97.  
*Crytallum Minerale*, II. 48. 98.  
*Crytallus montana*, I. 44.  
     *præparata*, II. 48.  
*Cubebæ*, I. 44.  
*Cucumer*, I. 44.  
*Cucumis*, I. 44. III. 70. 71.  
*Cucurbita*, I. 44. III. 73.  
*aux Cuillerées herbe*, I. 40.  
*Cuivre*, I. 45.  
*Culilavvan*, I. 44.  
*Cuminum*, I. 45. III. 72.  
*Cupressus*, I. 45. III. 67.  
*Cuprum*, I. 45.  
     *Ammoniacum*, II. 48. 146.  
*Curage*, I. 83.  
*Curassavensis Cortex*, I. 17.  
*Curcuma*, I. 45.  
*Cuscuta*, I. 45. III. 73.  
*Cyanus*, I. 45. III. 71.  
*Cyclamen*, I. 45. III. 74.  
*Cydonia*, I. 45. III. 74.  
*Cymbalaria*, I. 46. III. 74.  
*Cymbelkraut*, I. 46.  
*Cynoglossum*, I. 46. III. 75.  
*Cynosbatos*, I. 46.  
*Cyperus longus*, I. 46. III. 70.  
     *Rotundus*, I. 46.  
*Cyprés*, I. 45.

*Dachs*, I. 105.  
*Dactyli*, I. 46. III. 26.  
*Daguet*, I. 34.  
*Datteln*, I. 46.  
*Datterl*, I. 46.  
*Dattes*, I. 46.  
*Daucus*, I. 47. III. 76.  
*Decoctum album*, II. 48.  
     *Amarum*, II. 48.  
     *Antipforicum*, II. 48.  
     *Antiscorbuticum*, II. 49.  
     *Antivenereum*, II. 49.  
         *Laxans*, II. 49.  
     *Avenaceum*, II. 49.  
     *Chinæ Radicis*, II. 49.  
     *Citri*, II. 50.  
     *Commune*, II. 50.  
     *Cornu Cervi citrat.* II. 50.  
     *Febrifugum*, II. 50.  
         *Laxans*, II. 50.  
     *ad Fungos Articular.* II. 50.  
     *Hordei*, II. 50. 51.  
         *Citratum*, II. 50.  
     *Ipecacuanhæ*, II. 51.  
     *Lapathi*, II. 51.  
     *Lignorum*, II. 51.  
     *Pectorale*, II. 51.  
     *Saturninum*, II. 51.  
     *Sudoriferum*, II. 51.  
*Défenses*, I. 12.  
*Defrutum*, I. 110.  
*Dens Leonis*, I. 104.  
*Dent de Cheval marin*, I. 59.  
*Dentalia*, I. 47.  
*Dentaria*, I. 47. III. 77.  
*Dente di Caval marino*, I. 59.  
*Dentellaria*, I. 47. III. 47.  
*Dentium præparatio*, II. 52.  
*Diacrydion*, II. 52.  
*Diacaryon*, II. 135.  
*Diacodion*, II. 52.  
*Diacodium liquidum*, II. 154.  
*Diacrydium*, I. 96. II. 52.  
*Diacydonium Aromaticum*, II. 52.  
     *Jalappinum*, II. 52.  
     *Lucid. Jalapp.* II. 52.  
     *Simplex*, II. 53.  
*Diamant*, I. 3.  
*Diamante*, I. 3.  
*Diaphoreticum Joviale*, II. 7.  
*Dictamnus*, I. 47. III. 78.  
*Digestivum liquefactum*, II. 53.  
*Digitalis*, I. 47. III. 78.  
*Dinrenbeerlein*, I. 66.  
*Dipsacus*, I. 48. III. 79.  
*Doitier*, I. 47.  
*Domppe Venin*, I. 59.  
*Doronicum*, I. 48. III. 81.  
*Douse amere*, I. 7.



Draconis sanguis, I. 48.  
 Dracunculus, I. 48. III. 80.  
 Dragun, I. 48.  
 Dreche, I. 69.  
 Dreyfaldigkeit, I. 60.  
 Dulcamara, I. 48.  
 Durchwachs, I. 83.  
 Durrwurzel, I. 42.  
 Dyll, I. 9.  
 Eau d'Arquebuse, II. 29.  
   de Bouquet, II. 41.  
   Divine, II. 40.  
   de Lavande, I. 65.  
   de Luce, II. 149.  
   Sans pareille, II. 21.  
   de Madame la Vrilliere, II. 43.  
   de Violettes Beaumè, II. 22.  
 Ebenum Lignum, I. 48.  
 Ebertswurzel, I. 29.  
 Ebulo, I. 48.  
 Ebulus, I. 48. III. 81.  
 Ebur, I. 48.  
   Fossile, I. 48.  
   Ustum, I. 48. II. 53.  
 Eclair, I. 36.  
 Eclegma, II. 53.  
 Edera, I. 57.  
 Ehrenpreis, I. 108.  
   uweiblein, I. 49.  
 Egel, I. 59.  
 Eiche, I. 89.  
 Einbeere, I. 82.  
 Einhorn, I. 110.  
 Eisen, I. 51.  
 Eisenhutlein, I. 3.  
 Eisenkraut, I. 108.  
 Elæosaccharum, II. 53.  
   Aurantiorum, II. 53.  
   Citri, II. 53.  
   Myrrhæ, II. 54.  
 Elaterium, II. 54.  
 Elatina, I. 49.  
 Elatine, I. 49. III. 79.  
 Electuarium Anthelminticum, II. 54.  
   Antifebrile, II. 54.  
   e Baccis Lauri, II. 54.  
   Cathol. II. 55.  
     pro Clyster II. 55.  
     Dupl. c. Rh. II. 55.  
   Chalybeatum, II. 56.  
   Dentific. II. 56.  
   Diasatyrium, II. 56.  
   Diascord. Frac. II. 56.  
     Suecor. II. 56.  
   Diatragacanthæ, II. 57.  
   ad Gingiv. Trill. II. 57.  
   Gingivale, Argent. ibid.  
   Hamech, II. 45.

Electuarium Hiera picra, II. 57.  
   Hydragogum, II. 58.  
   pro Infantibus, II. 58.  
   Joviale, II. 58.  
   Lenitiv. Austr. II. 58.  
     Florenz. II. 58.  
     ad morbos Pforicos, II. 58.  
   de Manna, II. 59.  
   Mithridaticum, II. 59.  
   Mundificans, II. 59.  
   pro Pecoribus, II. 60.  
   Pectorale, II. 60.  
   Philonium Rom. ibid.  
   Purgans, II. 60.  
   Requies Nicol. II. 60.  
   Resumtivum, II. 61.  
   ad Stomacacen, II. 61.  
   ad Tæniæ, II. 58.  
   Tamarind. II. 58. 61.  
   Theriaca Andr. II. 61.  
 Elemi Gummi, I. 49.  
 Elendsklauen, I. 5.  
 Elephantenlaus, I. 9.  
 Elffenbein, I. 48.  
 Elixir, II. 62.  
   Acidum Dippelii, II. 20. 62.  
     Haller, II. 63.  
   Aloes Saponaceum, II. 63.  
   Antharthriticum, II. 63.  
   Anthelminticum, II. 63.  
   Anticolicum Crocatum, II. 63.  
   Antinephriticum, II. 20.  
   Antipodag. Dippelii, II. 20.  
     Guldenklee, II. 63.  
   Antiscorbuticum, II. 64.  
   Antivenereum, II. 64.  
   Aperitivum, II. 64.  
   Balsamicum Hoffm. II. 64.  
     Pectorale, II. 64.  
     Temperatum, II. 65.  
     VVerlhofii, II. 65.  
   Citri, II. 65.  
     Purgans, II. 65.  
   de Garus, II. 65.  
   Juniperinum, II. 66.  
   Pectorale Regis Daniæ, II. 66.  
     Ringelmanni, II. 66.  
     VWedelii, II. 66.  
   Polychrestum, II. 66.  
   Proprietatis sine Acido, II. 66.  
     Album, II. 66.  
     Amarum, II. 64.  
     Dulce, II. 66.  
     Paracelsi, II. 67.  
     Rhabarbar, II. 67.  
     Stahl's, II. 63.  
   Stomachicum Edinb. II. 67.  
     Rosenstein, II. 67.  
     Stoughton, II. 67.



Elxir Uterinum, II. 68.

Viscerale Roseæ, II. 68.

Vitæ Matth., II. 68.

Vitriol Mynsich., II. 69.

Acidum Edinb., II. 69.

Dulce Edinb. II. 69.

Elfenbaum, I. 34.

Elleboro, I. 57.

Ellera terrestre, I. 57.

Emeraude, I. 100.

Emery, I. 100.

Emplastrum, II. 69.

Abbat. de Gracè, II. 70.

Adhæsivum, II. 70.

Album coctum, II. 70.

de Ammoniaco, II. 70.

c. Mercur. II. 70.

Anglicum, II. 71.

Anodynum, II. 71.

in Cancro, II. 71.

Antapoplecticum, II. 71.

Attrahens, II. 72.

de Baccis Lauri, II. 72. 74.

Suecor. II. 74.

de Belladonna, II. 72.

de Betonica, II. 72.

ad Bubones vener. II. 72.

Camphoratum, II. 72.

Catagmaticum, II. 73.

Cephalicum, II. 73.

de Cicuta, II. 73.

Citrinum, II. 73.

ad Clavos Pedum, II. 73.

Commune, II. 73. 75.

de Crusta Panis, II. 73.

de Cumino, II. 74.

Defensivum, II. 74.

Diabotanum, II. 74.

Diachalcitis, II. 75.

Diachylon c. Gum. II. 75.

Diapalmæ, II. 76.

Diaphœnicon, II. 76.

Diaphoreticum, II. 76.

Diapompholygos, II. 76.

Diafulphuris, II. 76.

Divinum, II. 76.

ad Dolor. dentium, II. 73. 77.

Domus Misericordiæ, II. 73. 79.

Epispaticum, II. 77.

Filii Zacharia, II. 81.

Ad Fonticulos, II. 38.

ad Fracturas, II. 73.

Frigidum, II. 77.

ad Fungos Articuli, II. 77.

de Galbano, II. 78.

ad Gangliâ, II. 77.

Gryseum, II. 78.

Gummosum, II. 75.

ad Hernias, II. 78.

Emplastrum de Hyoscyamo, II. 78.

Incognitum, II. 78.

Ischiaticum, II. 79.

de Lap. Calamin. II. 75.

VVeck. II. 78.

ad Lupiam, II. 79.

Magneticum, II. 79.

Mammillare, II. 79.

Malaëticum, II. 79.

Manus Dei, II. 77.

de Meliloto, II. 79.

Mercuriale, II. 79.

de Minio, II. 73. 79.

Miraculosum, II. 79. 81.

de Nicotiana, II. 79.

Nigrum, II. 80.

Noricum, II. 79. 80.

Opodeldoch, II. 77. 80.

Oxycroceum, II. 80. 81.

Polychr. II. 70. 80. 81.

de Ranis, II. 80.

c. Merc. II. 81.

Santalinum, II. 81.

Saponatum, II. 81.

Saturn. Barbett. II. 81.

Goulard, II. 81.

Mynsicht. II. 81.

de Spermate Ceti, II. 81.

Ranarum II. 82.

Spleneticum, II. 73. 82.

Stictic. Crollii, II. 82.

Plenck. II. 70. 82.

Stomachicum, II. 74.

de Tacamahaca, II. 82.

ad Tempora, II. 73. 82.

Tetrapharmacum, II. 73.

Triapharm. II. 79. 82.

Vesicatorium, II. 82.

Viride, II. 73. 83.

Emulsiô, II. 83.

Arabica, II. 83.

Balsamica, II. 83.

Camphorata, II. 83.

Nitrata, II. 83.

Simplex, II. 83.

Violata, II. 83.

Encens, I. 79.

Ende, I. 34.

Endivia, I. 49. III. 81.

Endivien, I. 49.

Engelsus, I. 87.

Englischer Taffet, II. 71.

Ens Veneris, II. 83.

Entalia, I. 49.

Ente, I. 9.

Enula, I. 6.

Enula, I. 49. III. 87.

Eparica, I. 58.

Ephen, I. 57.



*Epine blanche*, I. 81.  
*Vinette*, I. 20.  
*Epithymum*, I. 45. 49.  
*Epirimo*, I. 45.  
*Eponge*, I. 101.  
*Eppich*, I. 12.  
*Epsonense Sal*, I. 10.  
*Epurge*, I. 32.  
*Equisetum*, I. 49. III. 82. 83.  
*Erable*, I. 2.  
*Erba di S. Barbara*, I. 13.  
*Benedetta*, I. 29.  
*Giudaica*, I. 42.  
*Erbacali*, I. 43.  
*Erdbeeren*, I. 52.  
*Erica*, I. 49. III. 84.  
*Erinaceus*, I. 49. III. 86. 87.  
*Eringe*, I. 49.  
*Erisamo*, I. 50.  
*Erlen*, I. 6.  
*Ernaria*, I. 59.  
*Erndtrose*, I. 69.  
*Eruca*, I. 49. III. 82.  
*Ervum*, I. 80.  
*Eryngium*, I. 49. III. 85.  
*Erysimum*, I. 50. III. 86.  
*Eschalodes*, I. 5.  
*Eschenbaum*, I. 52.  
*Esprit de Savon*, II. 23.  
*Essentia*, II. 83.  
*Alexipharmaca*, II. 84.  
*Temperata*, II. 84.  
*Amara*, II. 84.  
*Ambraë*, I. 7. II. 84.  
*Sicca*, II. 85.  
*Anodyna*, II. 85.  
*Antimonii*, II. 12. 85.  
*Balsamica*, II. 85.  
*Bezoardica*, II. 85.  
*Calami*, II. 85.  
*Camphoræ*, II. 85. 150.  
*Carminativa Triller*, II. 85.  
*Vvedel*, II. 86.  
*Castorei*, II. 86.  
*Catholica*, II. 86.  
*Purgans*, II. 63.  
*Chinæ*, II. 86.  
*Dulcis*, II. 86.  
*Fuliginis*, II. 86.  
*Hysterica*, II. 87.  
*Lignorum*, II. 87.  
*Sicca Aurantiorum*, II. 53.  
*Citri*, II. 53.  
*Myrrhæ*, II. 54.  
*Stomach. Hoffmann*, II. 87.  
*Polychresta*, II. 87.  
*Succini*, II. 87.  
*Traumatica*, II. 88.  
*Effig*, I. 3.  
*Tom*, I.

*Estragon*, I. 48.  
*Esula*, I. 50. III. 87.  
*Etain*, I. 102.  
*Eufraise*, I. 50.  
*Eupatoire*, I. 50.  
*Eupatorio*, I. 50.  
*Eupatorium*, I. 50. III. 11.  
*Euphorbium*, I. 50.  
*Euphrasia*, I. 50. III. 88.  
*Extractum*, II. 88.  
*Aconiti*, II. 88.  
*Aloes*, II. 7.  
*Belladonnæ*, II. 88.  
*Catholicum*, II. 88.  
*Chelidonii Majoris*, II. 88.  
*Cicutæ*, II. 88.  
*Cochleariæ*, II. 88.  
*Hellebori nigri*, II. 88.  
*Hyoscyami*, II. 88.  
*Liquiritiæ gummof.* II. 89.  
*Marocostinum*, II. 89.  
*Nicotianæ*, II. 88.  
*Opii*, II. 89.  
*Cydoniatum*, II. 89.  
*Panchymagogum*, II. 90.  
*Rudi*, II. 90.  
*Saturni*, II. 90.  
*Strammonei*, II. 88.  
*Taraxaci*, II. 88.  
*Eydexe*, I. 64.  
*Eyerweiss*, I. 54.  
*Faba*, I. 50. III. 90.  
*Crassa*, I. 50.  
*Marina*, I. 110. III. 214.  
*Sancti Ignatii*, I. 50.  
*Farberrhoethe*, I. 92.  
*Faggio*, I. 51.  
*Fagopyrum*, I. 51. III. 88.  
*Fagus*, I. 51. III. 88.  
*Fangzahne*, I. 12.  
*Faon*, I. 34.  
*Farfara*, I. 51. III. 89.  
*Farfaro*, I. 51.  
*Farinæ Emollientes*, II. 90.  
*Resolventes*, II. 90.  
*Farren*, I. 51.  
*Fava marina*, I. 110.  
*Favagello*, I. 43.  
*Faulbaum*, I. 52.  
*Febrifugum Craanii*, II. 90.  
*Fecula*, II. 90.  
*Feigen*, I. 29.  
*Feigbohnen*, I. 68.  
*Feigwarzwurzel*, I. 36.  
*Felandrio*, I. 84.  
*Felce*, I. 51.  
*Feldkressen*, I. 77.  
*Fel Vitri*, I. 51.



*Fenchel*, I. 52.  
*Fenouil*, I. 52.  
     *de Mer*, I. 43.  
*Fer*, I. 51.  
*Ferrum*, I. 54.  
*Fette Henne*, I. 43. 50.  
*Fève des Marais*, I. 50.  
*Fichi*, I. 29.  
*Fieberkraut*, I. 105.  
*Fiel de Verre*, I. 51.  
*Figues*, I. 29.  
*Filipendula*, I. 51. III. 90.  
*Filix*, I. 51. III. 91.  
*Fingerhut*, I. 47.  
*Finocchio*, I. 52.  
*Flor di donna*, I. 28.  
*Fioraliso*, I. 45.  
*Fiorrancio*, I. 25.  
*Fischbeid*, I. 99.  
*Flachs*, I. 67.  
*Flacseide*, I. 45.  
*Flambe batarde*, I. 3.  
*Flammula Jovis*, I. 40. III. 61.  
*Fleurs de Muscade*, I. 68.  
*Fliegen Spanische*, I. 27.  
*Flæhkraut*, I. 83.  
*Floehsaamen*, I. 88.  
*Flores Antimonii*, II. 90.  
     *Benzoës*, II. 91.  
     *Salis Ammoniac. Mart.* II. 91.  
     *Sulphuris*, II. 91.  
     *Viridis Æris*, II. 91.  
     *Zinci*, II. 91.  
*Fœniculum*, I. 52. III. 91.  
     *Dulce*, I. 52.  
     *Italicum*, 52.  
*Fœnugræcum*, I. 52. III. 92.  
*Fomentatio frigida*, II. 92.  
*Fomentum Anodynum*, II. 92.  
     *ad Erysipelas*, II. 92.  
*Formica*, I. 52.  
*Fotus ad Gangrænam*, II. 92.  
*Fougere*, I. 51.  
*Fourmi*, I. 52.  
*Fragaria*, I. 52. III. 92.  
*Fragole*, I. 52.  
*Fraicasse*, I. 33.  
*Frais de Grenouilles*, I. 89.  
*Fraïses*, I. 52.  
*Fraïsiar*, I. 52.  
*Framboïses*, I. 93.  
*Franchipane*, I. 63.  
*Frangula*, I. 52. III. 92.  
*Franzosenholz*, I. 56.  
*Frassino*, I. 52.  
*Fraueneis*, I. 55.  
*Frauenhaar*, I. 27.  
*Frauenmantel*, I. 5.  
*Frauenmuzz*, I. 18.

*Fraxinus*, I. 52. III. 91.  
*Frêne*, I. 52.  
*Fromage*, I. 30.  
*Frosch*, I. 89.  
*Froschlaich*, I. 89.  
*Fu*, I. 84.  
*Fuchs*, I. 111.  
*Fuden faule*, I. 41.  
*Fuligine*, I. 53.  
*Fuligo*, I. 53.  
*Fumaria*, I. 53. III. 93.  
*Fume terre*, I. 53.  
*Fummosterno*, I. 53.  
*Fünf Finger Kraut*, I. 82.  
*Furfures*, I. 53.  
     *Amygdalarum*, I. 9.  
  
*Ganserich*, I. 11.  
*Gaglio*, I. 54.  
*Galanga*, I. 53.  
*Galbanum*, I. 53.  
*Galbuli*, I. 45.  
*Galda*, I. 52.  
*Galega*, I. 54. III. 94.  
*Galeopsis*, I. 54. III. 94.  
*Galitzenstein*, I. 110.  
*Gallæ*, I. 54. III. 95.  
*Gallapfel*, I. 54.  
*Gallina*, I. 54.  
*Gallitrichum*, I. 59.  
*Gallium*, I. 54. III. 95.  
*Galmey*, I. 25.  
*Gamanderlein*, I. 35.  
*Gans*, I. 11.  
*Garance*, I. 92.  
*Garderobe*, I. 1.  
*Gargarisma Acetosum*, II. 92.  
     *Adstringens*, II. 92.  
     *Antiscorbuticum*, II. 92.  
     *Detergens*, II. 92.  
     *Emolliens*, II. 92.  
     *Mercuriale*, II. 93.  
     *ad Picuitam*, II. 93.  
     *c. Spir. Sal. Ammon.* II. 93.  
*Gartencypressen*, I. 1.  
*Gatto*, I. 32.  
*Gauchheil*, I. 9.  
*Geigenharz*, I. 41.  
*Geisbart*, I. 18.  
*Geisruten*, I. 54.  
*Gelatina*, II. 93. 135.  
     *Analeptica*, II. 93.  
     *Cornu Cervi Amygd.* II. 94.  
         *Citrata*, II. 94.  
     *Cydoniorum*, II. 53.  
     *Fructuum*, II. 94.  
     *Liquiritiæ*, II. 89.  
*Gelatum*, II. 135.  
*Gelsomino*, I. 61.



*Gemsenkugel*, I. 4.  
*Gemsenwurzel*, I. 48.  
*Genet*, I. 54.  
*Genevre*, I. 62.  
*Genippi*, I. 1.  
*Genista*, I. 54. III. 95.  
*Gentiana*, I. 55. III. 100.  
*Gentianella*, I. 55.  
*Gentienne*, I. 55.  
*Genziana* *bianca*, I. 55.  
     *fosca*, I. 55.  
     *negra*, I. 55.  
*Geranio*, I. 55.  
*Geranium*, I. 55. III. 98. 99.  
*Germandrèe*, I. 35.  
*Gerste*, I. 59.  
*Gewveih*, I. 34.  
*Giacinto*, I. 60.  
*Giallamina*, I. 25.  
*Gichero*, I. 15.  
*Giftheil*, I. 11.  
*Giglio bianco*, I. 66.  
*Gilla*, II. 94.  
*Ginepro*, I. 62.  
*Ginestra*, I. 54.  
*Gingembre*, I. 112.  
*Ginseng*, I. 55.  
*Girasole*, I. 57.  
*Girofflèe*, I. 36.  
*Giuggole*, I. 62.  
*Giusquiamo*, I. 60.  
*Glacies Mariæ*, I. 55.  
*Glas*, I. 110.  
*Glasgall*, I. 51.  
*Glaskopf*, I. 57.  
*Glaskraut*, I. 82.  
*Gliedkraut*, I. 99.  
*Globuli Carminativi*, II. 94.  
     *Martiales*, II. 94.  
     *Moschati*, II. 95.  
*Globus ad Erysipelas*, II. 94.  
*Glouteron*, I. 18.  
     *petit*, I. 111.  
*Glu*, I. 109.  
*Gluten Pectorale*, II. 89. 95.  
*Glycyrrhiza*, I. 55. III. 94.  
*Goensblumen*, I. 19.  
*Goensdistel*, I. 101.  
*Gold*, I. 17.  
*Golden Günsel*, I. 23.  
*Goldenvilderthon*, I. 3.  
*Goldwurzel*, I. 15.  
*Gomma arabica*, I. 12.  
*Gomme Senegal*, I. 12.  
*Gossypium*, I. 56.  
*Gottesgnadenkraut*, I. 56.  
*Goudron*, I. 86.  
*Goutte de Lin*, I. 45.  
*Grains de Musc*, I. 1.

*Grains du Canellier*, I. 39.  
*Gramen*, I. 56. III. 97.  
*Gramigna*, I. 56.  
*Granato*, I. 56.  
*Granatum*, I. 56. III. 97.  
*Granatus*, I. 56.  
*Grani di Muscò*, I. 1.  
*Grasblume*, I. 107.  
*Grateron*, I. 11.  
*Gratiola*, I. 56. III. 101.  
*Grattecul*, I. 46.  
*Gremil*, I. 73.  
*Grenouille*, I. 89.  
*Grieskraut*, I. 72.  
*Grindwurzel*, I. 64.  
*Grosseilles*, I. 91.  
*Grossularia*, I. 91.  
*Grualtum*, I. 16.  
*Grundheil*, I. 80.  
*Grunspan*, I. 109.  
*Guajacum*, I. 56.  
*Gui*, I. 109.  
*Guimauve*, I. 6.  
*Gundelreb*, I. 57.  
*Guttæ Anglicæ*, II. 95.  
     *Generalis de la Motte*, II. 95.  
     *Albæ*, II. 95.  
*Gummi*, I. 56.

*Haarstrang*, I. 84.  
*Haas*, I. 66.  
*Habern*, I. 16.  
*Hæmatites*, I. 57.  
*Hagenbutte*, I. 46.  
*Hahnenfus*, I. 90.  
*Hahnenfuslein*, I. 27.  
*Halicacabum*, I. 5. III. 15.  
*Hanf*, I. 27.  
*Hanneton*, I. 97.  
*Harnkraut*, I. 67.  
*Harnkrautel*, I. 59.  
*Hartriegel*, I. 66.  
*Harz*, I. 90.  
*Haselnuss*, I. 16.  
     *Remische*, I. 16.  
*Haselwurzel*, I. 15.  
*Hauchechel*, I. 79.  
*Hausblase*, I. 61.  
*Hauswurzel*, I. 98.  
*Hecht*, I. 68.  
*Hedera*, I. 57. III. 102.  
*Hederæ Gummi*, I. 57.  
*Heide*, I. 49.  
*Heidelbeeren*, I. 76.  
*Heidenkorn*, I. 51.  
*Helenæ S. Radix*, I. 58.  
*Helenium*, I. 49. III. 87.  
*Helianthemum*, I. 57. III. 101.  
*Heliotropium*, I. 57. III. 102.



*Helleboræ batard*, I. 57.  
*Helleborus*, I. 57. III. 103.  
*Helminthochorton*, I. 58.  
*Henne*, I. 54.  
*Hepar Antimonii*, II. 95. 135.  
*Hepatica*, I. 58. III. 104. 105.  
*Hepatique d'eau*, I. 58.  
*Herbe de S. Barbe*, I. 18.  
     *aux Chats*, I. 77.  
     *à Eternuer*, I. 88.  
     *de la Goutte*, I. 91.  
     *aux Perles*, I. 73.  
     *aux Pucès*, I. 88.  
*Herisson*, I. 49.  
*Hermodyctyli*, I. 58. III. 104.  
*Herniaria*, I. 59. III. 106.  
*Herniole*, I. 59.  
*Heron*, I. 12.  
*Herzblumlein*, I. 58.  
*Herzgespann*, I. 28.  
*Hetre*, I. 51.  
*Himbeere*, I. 93.  
*Himmelschlüssel*, I. 87.  
*Himmelstengel*, I. 55.  
*Hinnulus*, I. 34.  
*Hippocastanum*, I. 59.  
*Hippopotami Dentes*, I. 59. III. 106.  
*Hircus*, I. 59.  
*Hirondelle*, I. 59.  
*Hirsch*, I. 34.  
*Hirschbrunst*, I. 21.  
*Hirschkalb*, I. 28.  
*Hirschwurzel*, I. 55.  
*Hirudo*, I. 59.  
*Hirundinaria*, I. 59. III. 107.  
*Hirundo*, I. 59. III. 101.  
*Hispidula*, I. 17.  
*Hohlwurzel*, I. 13.  
*Holder*, I. 95.  
*Holderichwammchen*, I. 17.  
*Homme*, I. 59.  
*Homo*, I. 59.  
*Honig*, I. 71.  
*Hopfen*, I. 68.  
*Hordeum*, I. 59. III. 107.  
*Horminum*, I. 59. III. 106.  
*Houblon*, I. 68.  
*Houx petit*, I. 93.  
*Huile des Fleurs d'Oranges*, II. 42.  
     *d'Oeillers*, I. 81.  
*Hundskoth*, I. 4.  
*Hundszunge*, I. 46.  
*Hunedarm*, I. 6.  
*Hyacinthus*, I. 60.  
*Hydrargyrum*, I. 73.  
*Hydromel*, II. 95.  
*Hydropiper*, I. 83.  
*Hyoscyamus*, I. 60. III. 107.  
*Hypericum*, I. 60. III. 108.

*Hypocystidis Succus*, I. 60.  
*Hyssopus*, I. 60. III. 108.  
*Hystricis lapis*, I. 60.  
  
*Jacea*, I. 60. III. 109.  
*Jacinthe*, I. 60.  
*Jacobæa*, I. 60. III. 108.  
*Jacobszwiebel*, I. 33.  
*Jalapa*, I. 61.  
*Jalappa*, I. 61.  
*Japonica terra*, I. 32.  
*Jasminum*, I. 61. III. 100.  
*Ibisch*, I. 6.  
*Ichthyocolla*, I. 61.  
*Idropepe*, I. 83.  
*Je lienger je lieber*, I. 7.  
*Jesuitarum Cortex*, I. 36.  
*Igel*, I. 49.  
*Igher*, I. 112.  
*Immortelles jaunes*, I. 102.  
*Imperatoria*, I. 61. III. 110.  
*Indaco*, I. 61.  
*Indi folia*, I. 61.  
*Indigo*, I. 61.  
*Indivia*, I. 49.  
*Infusum amarum*, II. 95.  
     *Angelicum*, II. 95.  
     *Laxativum*, II. 95.  
     *Malti*, II. 96.  
     *Picis*, II. 96.  
     *Rhei Salinum*, II. 162.  
     *Saponaceum*, II. 30.  
*Ingber*, I. 112.  
*Ingrün*, I. 108.  
*Injectio auricularis*, II. 96.  
     *Balsamica*, II. 96.  
     *Detergens*, II. 96.  
     *Mercurialis*, II. 96.  
*Intybus*, I. 49.  
*Johannesbrod*, I. 100.  
*Johannisbeeren*, I. 91.  
*Johanniskraut*, I. 60.  
*Johannistrauben*, I. 91.  
*Joubarbe*, I. 98.  
*Ipecacuanha*, I. 61.  
*Ipequaquana*, I. 61.  
*Iperico*, I. 60.  
*Ippocastano*, I. 59.  
*Ipposelino*, I. 12.  
*Ivide spuria*, I. 3.  
     *Fiorentina*, I. 62.  
*Iris*, I. 62. III. 111.  
*Isop*, I. 60.  
*Isopo*, I. 60.  
*Iva*, I. 35.  
*Jubabæ Cortex*, I. 62.  
*Judaicum Lapis*, I. 62.  
*Judenkirschen*, I. 5.  
*Ivene*, I. 35.



Juglans Nux, I. 62. III. 109.

Jujubæ, I. 62. III. 110.

Jujubes, I. 62.

Julapium Regium, II. 96.

Julepus acidulatus, II. 96.

Rosarum, II. 96.

Violarum, II. 96.

Juniperus, I. 62. III. 112.

Juore, I. 48.

Jusquame, I. 60.

Kas, I. 30.

Kalkstein, I. 25.

Kameelhens, I. 97.

Kartendistel, I. 48.

Katze, I. 32.

Katzendapplein, I. 17.

Katzenkraut, I. 77.

Katzentrauben, I. 98.

Katzenvadel, I. 49.

Katzenwurzel, I. 84.

Kaulparsstein, I. 83.

Kaysersalat, I. 48.

Kellersesl, I. 74.

Kermes mineralis, II. 96.

Kesselbeeren, I. 81.

Keste, I. 31.

Kickererbsen, I. 37.

Kieselstein, I. 100.

Kitchenschell, I. 88.

Kikenumalol, I. 63.

Kino, I. 63.

Kuchensalz, I. 94.

Kurbis, I. 44.

Esels, P. 44.

Kirschen, I. 33.

Cornel, I. 43.

Herz, I. 33.

VVald, I. 33.

VVasser, I. 34.

VVelsche, I. 43.

Klapperosen, I. 81.

Klebkraut, I. 11.

Klee, I. 107.

Kleine Mistmelten, I. 1116.

Kletten, I. 18.

Kleyen, I. 53.

Knoblauch, I. 5.

Königsgelb, I. 14.

Körbelkraut, I. 34.

Kohl, I. 22.

Kolben, I. 34.

Komblume, I. 45.

Korck, I. 103.

Krahenaugen, I. 111.

Krahensfus, I. 43.

Kraut, I. 22.

veis, I. 99.

Krebsaugen, I. 26.

Kreide, I. 43.

Kressen, I. 77.

vulder, I. 18.

Kreutzbeerlein, I. 101.

Kreutzblume, I. 87.

Kreuzelkraut, I. 98.

Krætes, I. 23.

Stein, I. 23.

Kummel Berg, I. 45.

Matten, I. 29.

Schwarzer, I. 78.

Kunigundenkraut, I. 50.

Kupfer, I. 45.

Lablab, 63.

Lac, I. 63.

Lunæ, I. 63.

Sulphuris, II. 97.

Virginum, I. 20. II. 97.

Lacca, I. 63.

Lachenknoblauch, I. 97.

Lacerta, I. 64. III. 116.

Lacmus, I. 57.

Lacryma Job, I. 64.

Lactuca, I. 64. III. III. 113.

Virosa, I. 64.

Ladanum Gummi, I. 64.

Ladys black sticking plaister, II. 71.

Lait, I. 63.

Laitron, I. 101.

Laitné, I. 64.

Lakrizenholz, I. 55.

Lamium, I. 64.

Plinii, I. 72.

Lampione, I. 93.

Lampreda, I. 76.

Langue de Chien, I. 46.

Serpent, I. 79.

Lapathum, I. 64. III. 112.

Lapazio, I. 23. 64.

Lapidum præparatio, II. 98.

Pretiosorum fragment, I. 56.

Lapis causticus, II. 37. 97.

Divinus, II. 97.

Infernalis, II. 97.

Lyncis, I. 19.

Martialis, II. 97.

Medicamentos, Crolli, II. 97.

Geoffr. II. 98.

Ophthalmicus, II. 97.

Prunellæ, II. 98.

Lapislazzolo, I. 65.

Lappola minore, I. 111.

Latte, I. 63.

Lattuga, I. 64.

Lauch, I. 87.

Laudano, I. 64.

Laudanum liquidum, II. 98.

Opiatum, II. 98.



Lavendula, I. 65. III. 112.  
 Laureola, I. 73.  
 Laureole Semence de, I. 40.  
 Laurier, I. 65.  
 Lauro, I. 65.  
 Laurocerasus, I. 65.  
 Laurus, I. 65. III. 116.  
     Alexandrina, I. 111. III. 215.  
 Lauskraut, I. 57.  
 Laus-Saamen, I. 93.  
 Laxulus Lapis, I. 65.  
 Leberkraut, I. 58.  
 Legno santo, I. 56.  
 Lemitochorton, I. 58.  
 Lemnia terra, I. 65.  
 Lens, I. 66. III. 114.  
     Palustris, I. 66. III. 114.  
 Lente, I. 66.  
 Lentille, I. 66.  
 Lentiscus, I. 66. III. 121.  
 Lepidi, I. 66.  
 Lepidium, I. 66. III. 115.  
 Lepre, I. 66.  
 Lepus, I. 66. III. 117.  
 Lerchenschvamm, I. 4.  
 Levecne, I. 66.  
 Levisticum, I. 66. III. 116.  
 Levvat, I. 76.  
 Lezard, I. 64.  
 Lianna à Serpent, I. 24.  
 Lichen Islandicus, I. 66.  
 Licorne, I. 110.  
 Liebstöckel, I. 66.  
 Liege, I. 103.  
 Liene, I. 40.  
 Lienen, I. 40.  
 Lierre, I. 57.  
 Lievre, I. 66.  
 Lignum Sanctum, I. 56.  
 Ligustro, I. 66.  
 Ligustrum, I. 66. III. 118.  
 Lilium album, I. 66. III. 117.  
     Convallium, I. 67. III. 117.  
     Paracelsi, II. 98.  
 Limagon, I. 40.  
     Rouge, I. 67.  
 Limatura Martis, I. 51. II. 98.  
 Limax, I. 67.  
 Limon, I. 39. 67.  
 Limonada Mineralis, II. 23. 99.  
     Sicca, II. 99.  
 Limone, I. 38.  
 Lin, I. 67.  
 Linaire, I. 66.  
     des Montagnes, I. 46.  
 Linaria, I. 67. III. 115.  
     delle montagne, I. 46.  
 Linden, I. 106.  
 Lingua Avis, I. 52.

Lingua Cervina, I. 97.  
     Serpentina, I. 79.  
 Linimentum album, II. 99.  
     Alcalinum, II. 99.  
     Antipleuriticum, II. 99.  
     Cereum, II. 99.  
     Volatile, II. 99.  
 Lino, I. 67.  
 Linse, I. 66.  
 Linum, I. 67. III. 118.  
     Catharticum, I. 67. III. 118.  
 Liocorno, I. 110.  
 Liqueurs, II. 46.  
 Liquiritia, I. 55.  
     Costa alba, II. 98.  
     Citrina, II. 99.  
     Lucida, II. 89.  
     Tornata, II. 99.  
 Liquirizia, I. 55.  
 Liqueur Anodynus mineralis, II. 99.  
     Topicus, II. 100.  
     Alter, II. 100.  
     Volatilis, II. 100.  
     Antipodagricus, II. 100.  
     Aperitivus Argentorat. II. 100.  
     Hoffmanni, II. 100.  
 Cornu Cervi Succinat. II. 100.  
 Digestivus, II. 100.  
 Lithontripticus, II. 101.  
 contra Luem venereum, II. 101.  
 Meningum, II. 101.  
 Mercurialis, II. 20.  
 Nitri fixi, II. 101. 109.  
 Probatorius, II. 101.  
 Salinus Laxativus, I. 100.  
 Siphiliticus, II. 101. 106.  
 Spleneticus, II. 101.  
 Stypticus, II. 101.  
 Terræ foliatæ Tartari, II. 101.  
 Vegeto-mineralis, II. 101.  
 Lis, I. 66.  
 Lismacchia, I. 68.  
 Litargio, I. 67.  
 Litharge, I. 67.  
 Lithargyrium, I. 67.  
 Lithontripticum, II. 101.  
 Lithospermum, I. 73.  
 Lixivia Alcalina, II. 149.  
 Lixivium causticum, II. 102.  
     Saponarium, II. 102.  
     Tartari, II. 113.  
 Loch Album, II. 102.  
     ad Asthma, II. 102.  
     Balsamicum, II. 102.  
     de Farfara, II. 102.  
     Japonicum, II. 102.  
     Leniens, II. 102.  
     de Pulmone Vulpis, II. 102.  
     Sanum & expertum, II. 103.



Loch Saponatum, II. 103.  
 Löffelkraut, I. 40.  
 Lombrico terreſtre, I. 68.  
 Look Gummi, I. 67.  
 Lopezia, I. 67.  
 Lorbeer, I. 65.  
 Lott, I. 76.  
 Lotus ad Hæmorrhoides, II. 103.  
     Rheumatismus, II. 103.  
     Saponaceus, II. 103.  
     ad Tineam, II. 103.  
 Loup, I. 68.  
 Luccio, I. 68.  
 Lucertola, I. 64.  
 Lucius, I. 68.  
 de Lugos Cortex, I. 36.  
 Lumaca, I. 67.  
 Lumacon reuge, I. 67.  
 Lumbricus terreſtris, I. 68.  
 Luneire, I. 68.  
 Lunaria, I. 68. III. 119.  
 Lungenkraut, I. 75. 88.  
 Lungenmoos, I. 88.  
 Lupin, I. 68.  
 Lupino, I. 68.  
 Lupinus, I. 68. III. 119.  
 Lupo, I. 68.  
 Lupolo, I. 68.  
 Lupulus, I. 68. III. 119.  
 Lupus, I. 68.  
 Lurchel, I. 5.  
 Lycopodium, I. 68.  
 Lylimachia, I. 68. III. 120.  
 Maaslibien, I. 19.  
 Mace, I. 68.  
 Macis, I. 68.  
 Madreperla, I. 71.  
 Madri dei Garofani, I. 11.  
 Magdaleo, II. 70.  
 Maggiorana, I. 69.  
 Magiſterium Marcaſitæ, II. 103.  
     Saturni, II. 104.  
     Sulphuris, II. 104.  
 Magnes, I. 69.  
     Arſenicalis, II. 104.  
 Magnesia alba, II. 104.  
 Magnet, I. 69.  
 Magſaamen, I. 81.  
 Maikafer, I. 97.  
 Majorana, I. 69. III. 121.  
 Malabatri folia, I. 61.  
 Malacensis Lapis, I. 60.  
 Malaguette, I. 82.  
 Malaxare, II. 70.  
 Malicorium, I. 55.  
 Malta, I. 34. 69.  
 Malva, I. 69. III. 122. 123.  
     Arborea, I. 69.

Malvaticum Juniperinum, II. 66.  
 Malum Punicum, I. 56. III. 97.  
 Malwurſ, I. 104.  
 Malz, I. 69.  
 Manati Lapis, I. 69.  
 Mandeln, I. 9.  
 Mandole, I. 9.  
 Mandragora, I. 69. III. 122.  
 Mangold, I. 20.  
 Maniguette, I. 82.  
 Manna, I. 69.  
     Liquida, II. 104.  
     Tabulata, II. 104.  
     Tartariſata, II. 104.  
 Mannſtreu, I. 49.  
 Marc, I. 110.  
 Marcaſita, I. 21.  
 Marella, I. 7.  
 Margaritæ, I. 70.  
 Margherite, I. 70.  
 Margheritina maggiore, I. 19.  
     minore, I. 19.  
 Marguerite, I. 19.  
 Mariendiſtel, I. 28.  
     Magdalenen Blume, I. 101.  
 Marjolaine, I. 69.  
 Marmelada, I. 13.  
 Marmotta, I. 75.  
 Marmotte, I. 75.  
 Marrobio, I. 70.  
 Marrobio nero, I. 18.  
 Marrones, I. 59.  
 Marrons, I. 31.  
 Marrube noire, I. 18.  
 Marrubium, I. 70. III. 120.  
     Nigrum, I. 18.  
 Marum, I. 70. III. 124.  
 Maſſa ad Fornacem, II. 104.  
 Maſſoy, I. 70.  
 Maſtyx, I. 70. III. 121.  
 Mater Perlarum, I. 71. III. 126.  
 Materia Perlata, II. 8. 105.  
 Matricaire, I. 71.  
 Matricale, I. 71.  
 Matricaria, I. 71. III. 124.  
 Matrifylva, I. 53. 71.  
 Mauereſel, I. 74.  
 Maulbeere, I. 74.  
 Maulwurſ, I. 104.  
 Maurrauten, I. 93.  
 Mausdorn, I. 93.  
 Mauve, I. 69.  
 Mayenblümlein, I. 67.  
 Mayhafer, I. 97.  
 Meccæ Baſamum, I. 71.  
 Mechoacanna, I. 71.  
 Medula Saxorum, I. 71.  
 Meerbohnen, I. 110.  
 Meerſenchel, I. 43.



Meerhirze, I. 73.  
 Meerkohl, I. 101.  
 Meermoos, I. 43.  
 Meerrettich, I. 13.  
 Meertrauben, I. 82.  
 Meerzwiebel, I. 97.  
 Meisterwurzel, I. 61.  
     schwarze, I. 16.  
 Mel, I. 71.  
     Ægyptiacum, II. 168.  
     Anthosatum, II. 105.  
     Despumatum, II. 105.  
     Mercuriale, II. 105.  
     Rosarum, II. 105.  
 Melagrana, I. 56.  
 Melanteria, I. 110.  
 Melarancia, I. 16.  
 Mele, I. 71.  
 Meliloto ceruleo, I. 71.  
 Melilotus, I. 71. III. 126.  
     Cærulea, I. 72.  
 Melissa, I. 72. III. 125.  
     Canariensis, I. 72.  
     Turcica, I. 32. III. 125.  
 Melisse des Montagnes, I. 72.  
 Melissophyllum, I. 72. III. 124.  
 Melitensis Fungus, I. 72.  
 Melitochorton, I. 58.  
 Mellone, I. 39.  
 Melo, I. 72. III. 126.  
 Melon d'eau, I. 39.  
     Wasser, I. 39.  
 Melten, I. 16.  
     Hunde, I. 16.  
     Mist, I. 111.  
     Wilde, I. 16.  
 Menning, I. 74.  
 Mensch, I. 59.  
 Mentha I. 72. 73. III. 127.  
     Acquatica, I. 73.  
     Balsamina, I. 72.  
     Crispa, I. 72.  
     Longifolia, I. 73.  
     Piperitis, I. 73.  
     Rubra, I. 73.  
 Menthastrum, I. 73. III. 128.  
 Menyanthe, I. 107.  
 Meorballen, I. 84.  
 Mercin, I. 34.  
 Mercurialis, I. 73.  
 Mercurius, I. 73. III. 129.  
     Corallinus, II. 106.  
     Corrosivus, II. 106.  
     Cosmeticus, II. 106.  
     Diaphoreticus, II. 105.  
     Dulcis, II. 105.  
     Emeticus flavus, II. 167.  
     Gummosus, II. 105.  
     Liquidus, II. 105.

Mercurius Præcipitatus albus, II. 106.  
     flavus, II. 106.  
     ruber, II. 106.  
     Saccharatus, II. 106.  
     Sublimatus, II. 106.  
     Vitæ, II. 106.  
 Merde des Chiens, I. 4.  
 Meres de Giroffles, I. 11.  
 Merises, I. 33.  
 Mescicanischer, I. 93.  
 Mespeln, I. 73.  
 Mespili, I. 73. III. 130.  
 Metalista, I. 73.  
 Metram, I. 71.  
 Meule, I. 34.  
 Meum, I. 73. III. 128.  
 Meures de Renard, I. 92.  
 Meurier, I. 74.  
 Meyenblümlein, I. 67.  
 Mezeræum, I. 73. III. 128.  
 Mezzerion, I. 73.  
 Miel, I. 71.  
 Mignatta, I. 59.  
 Milch, I. 63.  
 Miliun Solis, I. 73. III. 132.  
 Millefolium, I. 74. III.  
 Millepedes, I. 74.  
 Millepertuis, I. 60.  
 Millepiedi, I. 74.  
 Milten, I. 16.  
 Milzkraut, I. 35.  
 Minium, I. 38. 74.  
 Missel, I. 109.  
 Misy, I. 110.  
 Miva Cidoniorum, II. 106.  
     Aromatica, II. 106.  
 Mixtura Asthmatica, II. 107.  
     Diatrion, II. 107.  
 Migliasche, I. 73.  
 Mixtura Mineralis, II. 101.  
     Salina volatilis, II. 107. 147.  
     Simplex, II. 107.  
     Tonico-nervina, II. 107.  
 Mähren, I. 47.  
 Mællelein, I. 13.  
 Moldavica, I. 72.  
 Momordica, I. 74.  
 Mondbeeren, I. 81.  
 Mondraute, I. 68.  
 Moosbeeren, I. 81.  
 Morelle, I. 100.  
 Morgeline, I. 6.  
 Morilli, I. 13.  
 Moringa, I. 74.  
 Moro, I. 74.  
 Morfuli, II. 107.  
     Antimoniales, II. 107.  
     Aromatici, II. 108.  
     Citri, II. 108.



*Mers du Diable*, I. 103.  
*Imperatoris*, II. 108.  
*Purgantes*, II. 108.  
*ad Scabiem*, II. 108.  
*contra Vermes*, II. 108.

*Morsus diaboli*, I. 103.

*Mortelle*, I. 76.

*Morus*, I. 74. III. 130.

*Moscata Nux*, I. 74. III. 131.

*Moschus*, I. 75.

*Most*, I. 110.

*Motthenkraut*, I. 92.

*Mouren*, I. 9.

*Mousse marine*, I. 43.

*Mont*, I. 110.

*Montarde*, I. 100.

*Moxa*, I. 14.

*Mucilagines*, II. 108.

*Muckenkraut*, I. 83.

*Mughetto*, I. 67.

*Muguet*, I. 67.

*des bois*, I. 58.

*Mumia*, I. 75.

*Mungos*, I. 75.

*Münzbalsam*, I. 72.

*Murmeltier*, I. 75.

*Mus marinus*, I. 75.

*Montanus*, I. 75. III. 132.

*Musc*, I. 75.

*Muscateublätthe*, I. 68.

*Muscateennusse*, I. 74.

*Muscerda Catechu*, II. 166.

*Muscheln*, I. 41.

*Muschio*, I. 75.

*Musculus Acaciæ*, I. 75.

*Albus Quernus*, I. 75.

*Arboreus*, I. 75. III. 133.

*Cumatilis*, I. 75.

*Erectus*, I. 75.

*Islandicus*, I. 75.

*Pyxidatus*, I. 75.

*Terrestris*, I. 76. III. 133.

*Mustela*, I. 76.

*Mustum*, I. 110.

*Muttermuscateennusse*, I. 74.

*Mutternagelein*, I. 11.

*Myrobalani*, I. 76.

*Myrrha*, I. 76.

*Myrtilli*, I. 76. III. 135.

*Myrtus*, I. 76. III. 134.

*Brabantica*, I. 76.

*Nabelstein*, I. 110.

*Nacht-Kraut*, I. 82.

*Nachtschatten*, I. 100.

*Nacre des Perles*, I. 71.

*Nægelein*, I. 30.

*gelbe*, I. 36.

*Koepfe*, I. 8.

*Tom. I.*

*Nægelein Rinde*, I. 30.

*Napel*, I. 3.

*Napello*, I. 3.

*Naphæ Flores*, I. 16. 17.

*Naphta Nitri*, II. 109. 143.

*Salis communis*, II. 109.

*Vitrioli*, II. 109.

*Napus*, I. 76. III. 38.

*Nashorn*, I. 91.

*Nastruzio*, I. 77.

*Nasturtium aquaticum*, I. 77. III. 137.

*hortense*, I. 77. III. 136.

*Indicum*, I. 77.

*Petræum*, I. 77.

*Sylvestre*, I. 77. III. 136.

*Natterwurzel*, I. 21.

*zünglein*, I. 79.

*Navau*, I. 90.

*Navet*, I. 76. 90.

*Navone*, I. 76.

*Nelke*, I. 107.

*Nenufar*, I. 78.

*Nepeta*, I. 77. III. 138.

*Nephriticum lignum*, I. 78.

*Nephriticus Lapis*, I. 77.

*Nepitella*, I. 25. 77.

*Nerprun*, I. 100.

*Nespole*, I. 73.

*Neffel*, I. 111.

*taube*, I. 54.

*Nestes*, I. 73.

*Nicotiana*, I. 78. III. 135.

*Nielle*, I. 78.

*Nierwurzel schwarze*, I. 58.

*weisse*, I. 57.

*Nigella*, I. 78. III. 139.

*Nihilum*, I. 78.

*Nil*, I. 78.

*Ninfea*, I. 78.

*Ninzin*, I. 78.

*Nitro*, I. 78.

*Nitrum*, I. 78.

*Anodynum*, II. 8.

*Antimoniatum*, II. 8.

*Depuratum*, II. 109.

*Fixum*, II. 109.

*Tabulatum*, II. 109.

*Vitriolatum*, II. 149.

*Nocciuola*, I. 16.

*Noce*, I. 62.

*Noce Moscata*, I. 74.

*Noir d'Espagne*, I. 103.

*Noisette*, I. 16.

*Noix*, I. 62.

*de Galle*, I. 54.

*Muscat*, I. 74.

*Nummularia*, I. 78. III. 137.

*Nusse*, I. 62.

*Nux Moschata*, I. 74. III. 131.

f

Nux



Nux Indica condita, I. 75.  
     Persica, I. 62.  
     Regia, I. 62.  
 Nymphaea, I. 78. III. 138.  
  
 Oca, I. 11.  
 Occhii di Gambero, I. 26.  
 Ochra, I. 78.  
 Ochs, I. 22.  
 Ochsenzunge, I. 23.  
     rothe, I. 5.  
 Oculi Cancrorum citrati, II. 109.  
     præparati, II. 109.  
 Odermenning, I. 4.  
 Oeillet, I. 107.  
 Oeuf, I. 54.  
 Offa alba, II. 109.  
 Oie, I. 11.  
 Oignon, I. 33.  
 Olampi gumma, I. 78.  
 Olea cocta, II. 109.  
     Destillata, II. 109.  
     Expressa, II. 110.  
     Infusa, II. 110.  
 Oleum Acusticum, II. 110.  
     Animale, II. 110.  
     Avellanorum, I. 16.  
     Aurantiorum corticum, II. 110.  
         Florum, II. 110.  
     Behen, I. 19.  
     Bergamottæ, I. 17.  
     Bezoardicum, II. 110.  
     Camphoræ, II. 111.  
     Camphoratum, II. 110.  
     Capparum, II. 111.  
     Carminativ. Danorum, II. 111.  
         VVurtemberg, II. 111.  
     Catellorum, II. 111.  
     Citri, II. 110.  
     Colocynthidis, II. 111.  
     Heraclinum, I. 16.  
     Hyperici, II. 112.  
     Jasminum, II. 110.  
     Lavendulæ, II. 110.  
     Laurinum, I. 65.  
     Lithuanicum, I. 20.  
     Mucaginum, II. 112.  
     Myrrhæ, II. 112.  
     Neroli, I. 17. II. 110.  
     Palmæ, I. 81.  
     Philosophorum, II. 112.  
     Rullicum, I. 20.  
     Scarabæorum, II. 112.  
     Spicæ, I. 101.  
     Stolani, II. 112.  
     Stomachicum, II. 113.  
     Tartari per deliquium, II. 113.  
     Templinum, I. 90.  
     Vitrioli, II. 113.

Olibano, I. 79.  
 Olibanum, I. 79.  
     Sylvestre, I. 79.  
 Oliva, I. 79. III. 140.  
 Olmo, I. 111.  
 Olsnitium, I. 79.  
 Ombre, I. 15.  
 Omphacium, I. 109.  
 Ononis, I. 79. III. 139.  
 Operment, I. 14.  
 Ophioglossum, I. 79. III. 142.  
 Opiata adstringens, II. 113.  
     Deterfiva, II. 114.  
     Dysenterica, II. 114.  
         Balsamica, II. 114.  
     Febrifuga purgans, II. 114.  
         simplex, II. 114.  
 Opium, I. 79.  
 Opobalsamum, I. 71.  
     siccum, I. 83.  
 Opoponax, I. 80.  
 Oppio, I. 79.  
 Or, I. 17.  
 Oranger, I. 16.  
 Orcanette, I. 5.  
 Orecchie di Giuda, I. 17.  
 Oreilles de Judas, I. 17.  
 Oreoselinum, I. 80.  
 Orge, I. 59.  
 Oriana, I. 80.  
 Origanum Creticum, I. 80.  
     Hispanicum, I. 80.  
     Vulgare, I. 80. III. 141.  
 Orleana, I. 80.  
 Orme, I. 111.  
 Oro, I. 17.  
 Orobus, I. 80. III. 142.  
 Orpiment, I. 14.  
 Orpin, I. 43. 50.  
 Orso, I. 111.  
 Ortica, I. 111.  
 Ortica bianca, I. 54.  
 Ortie, I. 111.  
     blanche, I. 54.  
 Orvale, I. 59.  
 Oryza, I. 80. III. 143.  
 Orzo, I. 59.  
 Os de Sèche, I. 99.  
 Oseille, I. 2.  
 Osmunda, I. 80.  
 Ossiocanta, I. 81.  
 Osso di Seppia, I. 99.  
 Ostecolla, I. 80.  
 Osterlucy, I. 13.  
 Ostrutium, I. 61.  
 Ova, I. 54.  
 Ours, I. 111.  
 Ovum, I. 81.  
 Oxyacantha, I. 81. III. 143.



Oxycoccus, I. 81.  
 Oxycratum, II. 114.  
 Oxymel. *Æruginis*, II. 168.  
     *Chalybeatum*, II. 114.  
     *Colchicum*, II. 114.  
     *Pectorale*, II. 114.  
     *Scilliticum*, II. 114.  
     *Simplex*, II. 114.  
 Oxyfaccharum Emeticum, II. 115.  
 Oxytartarus, II. 158.

Pain, I. 81.

*de pourceaux*, I. 45.

Palmæ Christi semen, I. 31.  
     Oleum, I. 32. 81.

*Pan porcino*, I. 45.

Panacea. *Holsatica*, II. 115.  
     *Mercurialis*, II. 115.

Panais, I. 82.

Pane, I. 81.

Panes faccharati purgantes, II. 115.

Panis, I. 81.

Pantoffelholz, I. 103.

Papaver album, I. 81.  
     *Erraticum*, I. 81. III. 146.  
     *Nigrum*, I. 81.

Papavero, I. 81.  
     *Salvatico*, I. 81.

Pappel, I. 69. 87.

Paradieskörner, I. 82.

Paradisi grana, I. 82.

Paralysis, I. 87.

Pareira brava, I. 82.

Parietaria, I. 82.

Parietarie, I. 83.

Paris, I. 82.

Pas d'ane, I. 51.

Passerage, I. 66.

Passule, I. 82.  
     *Laxativæ*, II. 115.

Pasta Alchæa, II. 115.  
     *Amygdalata Cosmetica*, II. 115.  
     *Depilatoria*, II. 116.  
     *Liquiritiæ*, II. 116.  
     *ad Nævos*, II. 116.

Pastilli Mercuriales, II. 116.  
     *Siphylitici Keyser*, II. 138.

Pastinaca, I. 82. III. 147.

Patience, I. 64.  
     *d'eau*, I. 23.

Patientia, I. 82.

Parvot, I. 81.

Peau d'ovine, II. 69.

Pece, I. 86.

Pece-Resina, I. 85.

Pech, I. 86.

Pèche, I. 83.

Pedro del Porco, I. 60.

Pensée, I. 60.

Pentafillo, I. 82.

Pentaphylum, I. 82. III. 148. 149.

Peonia, I. 81.

Percarum lapides, I. 83.

Perce-bosse, I. 68.

Percefeuille, I. 83.

Percefeuille, I. 3.

Perche, I. 34.

Perfoliata, I. 83. III. 152.

Perlen, I. 34. 70.

Perlenmutter, I. 71.

Perles, I. 70.

Perlures, I. 34.

Pero, I. 89.

Persica, I. 83. III. 145.  
     *Nux*, I. 62.

Persicaria, I. 83. III. 148.

Persico, I. 83.

Persil, I. 84.

*des Montagnes*, I. 55. 80.

Pervenche, I. 108.

Pervinca, I. 108.

Peruvianum Balsamum, I. 83.  
     *siccum*, I. 83.

Peruvianus Cortex, I. 36.

Pes Cati, I. 17.

Pestilenzwurzel, I. 83.

Pestnagel, I. 82.

Petasites, I. 83. III. 149.

Peterlein, I. 84.

Petersilien, I. 84.

Petimbrosa, I. 44.

Petroleum, I. 84.

Petrolio, I. 84.

Petroselinum, I. 84. III. 152.  
     *Macedonicum*, III. 153.

Peucedano, I. 84.

Peucedanum, I. 84. III. 144.

Pevere, I. 85. 86.

Peuplier, I. 87.

Pfassenhütlein, I. 44.

Pfassenrohrlein, I. 104.

Pfeffer, I. 85.  
     *Kraut*, I. 66.

Pfersing, I. 83.

Pflaumen, I. 88.

Pfrimmen, I. 54.

Phellandrium, I. 84. III. 149.

Phu, I. 84. III. 150.

Phytolacea, I. 84.

Pichurim, I. 84.

Piedi di Alce, I. 5.

*di Gatto*, I. 17.

*di Leone*, I. 5.

Pied d'Alouette, I. 42.

*de Char*, I. 17.

*d'Elan*, I. 5.

*de Lion*, I. 5.

*de Loup*, I. 68.



*Pierre d'Aigle*, I. 4.  
*de Perche*, I. 83.  
*de Ponce*, I. 88.  
*Pierrures*, I. 34.  
*Pietra calcaria*, I. 25.  
*d'Istrie*, I. 60.  
*Giudaica*, I. 62.  
*Pignons*, I. 85.  
*d'Inde*, I. 106.  
*Pilæ marinæ*, I. 84.  
*Pilatro*, I. 89.  
*Pillulæ Æthiopicæ*, II. 116.  
*Aluminosæ*, II. 116.  
*de Ammoniac*, II. 116.  
*Angelicæ*, II. 117.  
*Anthelminticæ*, II. 117.  
*Antimoniales*, II. 117.  
*Aperientes*, II. 117.  
*Balsamicæ*, II. 117.  
*Cæruleæ*, II. 117. 146.  
*Catarrhales*, II. 117.  
*Cephalicæ*, II. 118.  
*Cochiæ*, II. 118.  
*Communes*, III. 118.  
*de Cynogloss*, II. 118.  
*Depurantes*, II. 118.  
*Fœtidæ*, II. 118.  
*Hydragogæ*, II. 118.  
*Hydropicæ Bantii*, II. 119.  
*Richard*, II. 119.  
*Hystericæ*, II. 119.  
*Majores*, II. 119.  
*Martiales*, II. 119.  
*Mastichinæ*, II. 119.  
*Mercurial. Barbarossa*, II. 119.  
*Bellost*, II. 119.  
*contra Obstructiones*, II. 120.  
*Ophthalmicæ*, II. 120.  
*Plumeri*, II. 120.  
*Polychrestæ balsamicæ*, II. 121.  
*Starckey*, II. 120.  
*Resolventes*, II. 120.  
*Rufi*, II. 121.  
*Saponatæ*, II. 121.  
*Scilliticæ*, II. 121.  
*de Styrace*, II. 121.  
*de Succino*, II. 121.  
*Tartareæ*, II. 121.  
*de Terebinthina*, II. 121.  
*Tonicæ*, II. 122.  
*contra Variolas*, II. 122.  
*Pilosella*, I. 17. 85.  
*Piment Royal*, I. 76.  
*Pimenta*, I. 8.  
*Pimpinella*, I. 85. III. 151.  
*Pimprenelle*, I. 85.  
*Pineæ*, I. 85. III. 155. 156. 157.  
*Purgantes*, I. 106.  
*Pini Strobili*, I. 85.

*Pini Refina*, I. 83.  
*Pinien*, I. 85.  
*Piombo*, I. 86.  
*Pioppo*, I. 87.  
*Piper*, I. 85. 86. III. 162.  
*Pisse-en-lit*, I. 104.  
*Pistachio*, I. 86.  
*Pistaches*, I. 86.  
*Pistaciæ*, I. 86. III. 162.  
*Pivoine*, I. 81.  
*Pix*, I. 86.  
*Plantago*, I. 86. III. 158. 159.  
*Plantain*, I. 86.  
*Plomb*, I. 86.  
*Plumbum*, I. 86.  
*Ustum*, II. 122.  
*Pœonia*, I. 81. III. 145.  
*Poire*, I. 89.  
*Poirée*, I. 20.  
*Poire*, I. 85.  
*Aquatique*, I. 83.  
*Polx*, I. 86.  
*de Bourgogne*, I. 90.  
*Refme*, I. 85.  
*Pois chiches*, I. 37.  
*Poley*, I. 86.  
*Poligala*, I. 87.  
*Polipodio*, I. 87.  
*Polium*, I. 86. III. 154.  
*Polygala*, I. 87. III. 155.  
*Polypodium*, I. 87. III. 153.  
*Pomade en Creme*, II. 38.  
*Pomeranzen*, I. 16.  
*Pome Epineuse*, I. 102.  
*de Merveilles*, I. 74.  
*pomi*, I. 87.  
*Pomice*, I. 88.  
*Pompholyx*, I. 84.  
*Pomum*, I. 87. III. 143.  
*Hierosolymitanum*, I. 74.  
*Populus*, I. 87. III. 147.  
*Porc*, I. 87.  
*Porcellana*, I. 87.  
*Porcinus lapis*, I. 60.  
*Porco*, I. 87.  
*Porcus*, I. 87. III. 154.  
*Porreau*, I. 87.  
*Porrum*, I. 87. III. 160. 161.  
*Porst*, I. 76.  
*Portulaca*, I. 87. III. 158.  
*Posca*, II. 122.  
*Post*, I. 76.  
*Postkraut*, I. 92.  
*Potafche*, I. 38.  
*Potassa*, I. 38.  
*Potasse*, I. 38.  
*Potio adstringens*, II. 122.  
*Ammoniaca*, II. 122.  
*Antiseptica*, II. 122.



Potio ad Asthma, II. 122.  
 Confortans, II. 123.  
 Cretacea, II. 123.  
 Oleosa, II. 123.  
 Siftens, II. 123.  
 Ponle, I. 54.  
 Pourpier, I. 87.  
 Præparata, II. 123.  
 Πράσιον, I. 70.  
 Prêle, I. 49.  
 prezzemolo, I. 84.  
 primevere, I. 87.  
 Primula Veris, I. 87. III. 160.  
 Profluvii Cortex, I. 41.  
 Propolis, I. 33. 88.  
 Prugne, I. 88.  
 Prugnolino, I. 131.  
 Pruna, I. 88. III. 144.  
     Laxativa, II. 115.  
 Prunes, I. 88.  
 Brunier sauvage, I. 2.  
 Pseudacorus, I. 3.  
 Psidium, I. 55.  
 Psyllium, I. 88. III. 161.  
 Ptarmica, I. 88. III. 163.  
 Ptilana, I. 59. II. 123.  
     Acidulata, II. 123.  
     Adstringens, II. 123.  
     Communis, II. 123.  
     Nitrata, II. 124.  
     Pectoralis, II. 124.  
 puleggia, I. 88.  
 pulegium, I. 88. III. 155.  
 pulicaria, I. 88.  
 Pulior, I. 88.  
 Pulmonaire, I. 88.  
 Pulmonaria, I. 88. III. 164.  
 Pulpa Cassiæ, II. 124.  
     pro Clysteribus, II. 124.  
     Tamarindorum, II. 124.  
 Pulpæ, II. 124.  
 Pullatilla, I. 88. III. 163.  
 Pulculla de Manna, II. 124.  
     Saponacea, II. 124.  
 Pulveres, II. 124.  
 Pulvis absorbens, II. 125.  
     Algarotti, II. 106.  
     Alterans, II. 125.  
     Anodynus, II. 125.  
     Antarthrit. Mirandola, II. 126.  
         Perard, II. 125.  
         Ducis Portlandia, II. 126.  
     Anthelmintic s, II. 126.  
     Antifebrilis, II. 126.  
     Antihecticus, II. 126.  
     Antilyssus Comitiss Isenburg, II. 126.  
         Mead, II. 126.  
         Palmarii, II. 126.  
         Sylvani, II. 126.

Pulvis antilyssus *Tunquintium*, II. 127.  
 Antimonii albus, II. 8.  
 Antisepticus, II. 127.  
 Antispasmod. *Rosenst.* II. 127.  
     *Stahlii*, II. 127.  
 Ari compositus, II. 127.  
 Arthriticus amarus, II. 126.  
 Auratus, II. 127.  
 Bezoardicus *Anglicus*, II. 127.  
     *Ludovici*, II. 127.  
 Cachecticus *Quercetani*, II. 128.  
 Carminativus, II. 128.  
 Carthusianorum, II. 96. 128.  
 contra Casum, II. 128.  
 e Cerussa, II. 128.  
 Comitiss de *VVarvich*, II. 128.  
 Comitissa de *Kent*, II. 128.  
 ad Condienda intranea, II. 128.  
 ad Condiendas Carnes, II. 128.  
 ad Condiendum Cor, II. 128.  
 Content, II. 129.  
 Cordialis, II. 129.  
 Cornachini, II. 129.  
 Cosmeticus, II. 129.  
 Dentifricius, II. 130.  
 Epilepticus *Marchionis*, II. 130.  
 Erysipelatodes, II. 130.  
 Fumalis, II. 130.  
 Gasconii, II. 130.  
 de Gutteta, II. 130.  
 Haly contra Phtisin, II. 130.  
 Hepaticus, II. 131.  
 Incrassans, II. 131.  
 pro Infantibus *Roseen*, II. 131.  
 Infantum *Danorum*, II. 131.  
 Masticatorius, II. 131.  
 ad Palpitationes Cordis, II. 132.  
 Pannonicus ruber, II. 131.  
 Pectoralis, II. 132.  
 Puerorum citrinus, II. 132.  
     Evacuans, II. 132.  
 contra Quartanam, II. 132.  
 Refrigerans, II. 132.  
 Resolvens, II. 133.  
 Scillæ compositus, II. 133.  
 Sedativus, II. 133.  
 Sternutatorius *Noricor.* II. 133.  
     *Parisiens.* II. 133.  
     *Trilleri*, II. 133.  
 Stomachicus, II. 133.  
 ad strumas, II. 133.  
 Sympatheticus, I. 110.  
 Temperans *Richardi*, II. 134.  
     *Unzeri*, II. 134.  
 ad Tormina Infantum, II. 134.  
 contra Vermes, II. 134.  
     Purgans, II. 134.  
 Pumex, I. 88.  
 Purgiermoos, I. 66.



*Purgierkærner*, I. 31.  
*Pyrethrum*, I. 89. III. 165.  
*Pyrola*, I. 89. III. 153.  
*Pyrus*, I. 89. III. 164.  
  
*Quassia*, I. 89.  
*Quecksilber*, I. 73.  
*Quendel*, I. 99.  
*Quercia*, I. 89.  
*Quercus*, I. 89. III. 165.  
     *Marina*, I. 82.  
*Queue de Cheval*, I. 49.  
     *Pomrean*, I. 84.  
*Quinquina*, I. 36.  
*Quitten*, I. 45.  
  
*Rabarbaro*, I. 90.  
*Rackasira balsamum*, I. 89.  
*Radici di Mandragora*, I. 69.  
*Radis*, I. 90.  
*Rafano*, I. 90.  
*Ragno*, I. 12.  
*Raisfort*, I. 13.  
*Raiponse*, I. 90.  
*Raisina*, I. 110.  
*Raisins*, I. 82.  
*Raisins de Corinthe*, I. 82.  
*Raisins de Renard*, I. 82.  
*Rame*, I. 45.  
*Rana*, I. 89.  
*Ranæ*, I. 89. III. 174.  
*Ranarum sperma*, I. 89.  
*Ranunculo*, I. 90.  
*Ranunculus*, I. 90. III. 168. 169.  
*Rapa*, I. 90. III. 167.  
*Raperonzo*, I. 90.  
*Raphanus*, I. 90. III. 170.  
*Rapunculus*, I. 90. III. 166.  
*Rapunzel*, I. 90.  
*Ravano*, I. 13.  
*Rave*, I. 90.  
*Raute*, I. 93.  
*Realgar*, I. 14.  
*Reatrino*, I. 90.  
*Rebs*, I. 76.  
*Rebstoch*, I. 109.  
*Regenwurm*, I. 68.  
*Regia Nux*, I. 62.  
*Reglise Royale*, I. 55. II. 89.  
*Regulus*, I. 90.  
*Regulus Antimonii Martialis*, II. 134.  
     *Medicinal*, II. 134.  
     *Simplex*, II. 135.  
  
*Reiger*, I. 12.  
*Reine des Frès*, I. 18.  
*Reis*, I. 80.  
*Renard*, I. 111.  
*Renouée*, I. 33.  
*Reprise*, I. 43.

*Resina*, I. 90.  
     *Elastica*, I. 32.  
     *Jalappæ*, II. 135.  
         *præparata*, II. 135.  
     *Ligni Guajaci*, II. 135.  
     *Nigra*, I. 41.  
     *Scammonei*, II. 135.  
  
*Reterfilien*, I. 84.  
*Rettich*, I. 90.  
*Rhabarbar. vville*, I. 23.  
*Rhabarbarum*, I. 90. 91. III. 170.  
*Rhaponticum*, I. 91. III. 171.  
*Rheinblumen*, I. 102.  
*Rheinfarn*, I. 104.  
*Rheum*, I. 90.  
*Rhinoceros*, I. 91.  
*Rhodia Radix*, I. 91. III. 172.  
*Rhodium Lignum*, I. 91.  
*Rhubarbe*, I. 90.  
*Ribes*, I. 91. III. 172.  
*Riccio*, I. 49.  
*Ricini Semina*, I. 31.  
*Ringelhlumen*, I. 25.  
*Rinoceronte*, I. 91.  
*Ris*, I. 80.  
*Risigallo*, I. 14.  
*Riso*, I. 80.  
*Ritterspærlein*, I. 42.  
*Robbia*, I. 92.  
*Rocambole*, I. 5.  
*Rochetta Alexandr*, I. 100.  
*Rocou*, I. 80.  
*Rœmischer*, I. 45.  
*Rœthel*, I. 92.  
*Roggen*, I. 98.  
*Rohr*, I. 15.  
*Roitellet*, I. 90.  
*Romarin*, I. 92.  
     *de Beheme*, I. 92.  
*Rondine*, I. 59.  
*Roob*, II. 135.  
     *Morillorum*, I. 13.  
     *Mororum*, I. 74.  
     *Nucum*, II. 135.  
  
*Roquette*, I. 49.  
*Corella*, I. 91. III. 172.  
*Rosa*, I. 92. III. 172.  
*Rose*, I. 34.  
     *Tremiere*, I. 69.  
  
*Roseau*, I. 15.  
*Roshub*, I. 51.  
*Rosinlein*, I. 82.  
*Rosmarino*, I. 92.  
*Rosmarinum sylvestre*, I. 92. III. 173.  
*Rosmarinus*, I. 92. III. 173.  
*Rospo*, I. 23.  
*Ros Solis*, I. 91.  
*Rossolis ex Seminibus Carmin*, II. 41.  
     *de six grains*, II. 41.



Rotulæ, II. 135.  
 Becchicæ, II. 166.  
 e Succo & Elæosacch. Citri, II. 136.  
 Manus Christi, II. 136.  
 Menthæ, I. 73.  
 contra Vermes, II. 136.

Rubarba, I. 90.

Rube, Gelbe, I. 47.

Saamen, I. 76.

Rubia Tinctorum, I. 92. III. 174.

Rubimora, I. 92.

Rubino, I. 92.

Rubinus, I. 92.

Rubis, I. 92.

Arsenical, I. 14.

Rubrica fabrilis, I. 92.

Rubsaamen, I. 76.

Rubus Idæus, I. 93. III. 166.

Ruchetta, I. 49.

Rue, I. 93.

Rum, I. 104.

Ruffolke, I. 76.

Rus, I. 53.

Ruscus, I. 93. III. 176.

Rfusten, I. 111.

Ruta, I. 93. III. 175.

Muraria, I. 93.

Saamkraut, I. 83.

Sabadilli Semen, I. 93.

Sabina, I. 93. III. 176.

Saccharum, I. 93.

Aceris, I. 2.

Candum, II. 136.

Glycyrrhizæ, II. 89. 136.

Hordeatum, II. 136.

Lactis, II. 136.

Penidium, II. 137.

Rosatum, II. 137.

Saturni, II. 137.

Saffor, I. 29.

Saffran bâtard, I. 29. 43.

Saftegrün, I. 101.

Sagapeno, I. 94.

Sagapenum, I. 94.

Saggina, I. 51.

Sago, I. 94.

Sagu, I. 94.

Sain doux, I. 87.

Sal Aceti essentiale, II. 137.

Fixum, II. 137.

Volatile, II. 137.

Acetofellæ, II. 137.

Acidum Boracis, II. 139.

Alcali minerale, II. 137.

Seignette, II. 137.

Ammoniacum Martiale, II. 91.

Cauticum, II. 137.

Commune, I. 94.

Sal Cornu Cervi, II. 137.

Digestivum, II. 138.

de Duobus, II. 132.

Febrifugum, II. 138.

Fontanum, I. 94.

Fossile, I. 94.

Gemmæ, I. 94.

per Incinerationem, II. 138.

Marinum, I. 94.

coagulatum, II. 138.

Martis, II. 138.

Mercurial. Acetosus, I. 138.

Tartarifatus, I. 138.

Mirabile Glauberi, II. 138.

Lemery, II. 139.

Seignette, II. 139.

Panis, I. 94.

Paratus Tachenii, II. 138.

Polychrestum Glasseri, II. 139.

Prunellæ, II. 98.

Saturni, II. 137.

Sedativum Homberg, II. 139.

Mercuriale, II. 139.

Sedlizenfis, I. 98.

Seidschützenfis, I. 98.

Succini, II. 139.

Tartari, II. 140.

Essentiale, II. 140.

Volatile Anglic. ficcum, II. 140.

Oleofum, II. 140.

Salat, I. 64.

Kayser, I. 64.

Salbey, I. 95.

Salcio, I. 95.

Salep Radix, I. 94.

Salicaire, I. 95.

Salicaria, I. 95. III. 95. 177.

Salicastro, I. 95.

Salix, I. 95. III. 180.

Salmiack, I. 8.

Salpeter, I. 78.

Salvia, I. 95. III. 177.

Sambuci fungi, I. 17.

Sambuco, I. 95.

Sambucus, I. 95. III. 178.

Sanctum Lignum, I. 56.

Sandaraca Gummi, I. 63. 95.

Sandaraque, I. 14.

Sanglier, I. 11.

Sangfue, I. 59.

Sanguinalis, I. 33.

Sanguisorba, I. 85.

Sanicula, I. 95.

Sanlay, I. 95.

Santalum, I. 95.

Santolina, I. 1.

Santonico, I. 38.

Santonicum, I. 38.

Sapa, I. 110.

Sapo Chemicus, II. 140.  
 Tartareus, II. 140.  
 Medicatus, II. 140.  
 Saponaria, I. 95. III. 179.  
 Sapphirus, I. 96.  
 Sarcocolla, I. 96.  
 Sardus, I. 29.  
 Sarlette, I. 96.  
 Sarrafin, I. 51.  
 Sarfaparilla, I. 96. III. 181.  
 Sassafras, I. 96.  
 Satureja, I. 96. III. 179.  
 Satyrium, I. 96. III. 180.  
 Saubelme, I. 50.  
 Saudistel, I. 101.  
 Sauerampfer, I. 2.  
 Sauerklee, I. 2.  
 Sauge, I. 95.  
 Saule, I. 95.  
 Saurauch, I. 20.  
 Sauvervie, I. 93.  
 Saxifraga alba, I. 96. III. 182, 183.  
 Rubra, I. 51.  
 Schaafgarben, I. 74.  
 Kunz, I. 46.  
 Scabiosa, I. 96. III. 181.  
 Scammoneum, I. 96. III. 182.  
 Scarabæus Majalis, I. 97.  
 Scarafaggio, I. 97.  
 Scariola, I. 49.  
 Schalotten, I. 5.  
 Scharlackkraut, I. 59.  
 Schiarea, I. 59.  
 Schieferweiss, I. 35.  
 Schierling, I. 37.  
 Schiffdœir, I. 86.  
 Schildkrœte, I. 105.  
 Schlagkrautlein, I. 35.  
 Schlange, I. 99.  
 Schlangenholtz, I. 41.  
 Wurzel, I. 21.  
 Schlehen, I. 2.  
 Schüsselblumen, I. 87.  
 Schmirgel, I. 100.  
 Schnecke, I. 40.  
 Rothe, I. 67.  
 Schnittlauch, I. 33.  
 Schœlkraut, I. 36.  
 Schœnanthum, I. 97.  
 Schuppenwurzel, I. 47.  
 Schvvalbe, I. 59.  
 Schvvalbenwurzel, I. 59.  
 Schvamm, I. 101.  
 Schvvarwurzel, I. 103.  
 Schvvarze, I. 16.  
 Schvvarzer Andorn, I. 18.  
 Schvvesel, I. 103.  
 Schvwein, I. 87.  
 brad, I. 45.

Scilla, I. 97. III. 184.  
 Præparata, II. 141.  
 Scincus, I. 97. III. 184.  
 Sclarea, I. 97.  
 Scolopendrium, I. 97. III. 184.  
 Scordio, I. 97.  
 Scordium, I. 97. III. 185.  
 Scorpius, I. 97. III. 185.  
 Scorzonera, I. 97. III. 185.  
 Scrophularia, I. 98. III. 186.  
 Sebesten, I. 98. III. 186.  
 Sebum, I. 22.  
 Secale, I. 98. III. 186.  
 Sedo, I. 98.  
 Sedam, I. 98. III. 187.  
 Seebume, I. 78.  
 Segale, I. 98.  
 Seichblumen, I. 104.  
 Selde, I. 99.  
 Seidelbast, I. 73.  
 saamen, I. 40.  
 Seifenkraut, I. 95.  
 Seigle, I. 98.  
 Sel d'Oseille, I. 3.  
 Selce, I. 100.  
 Selenite, I. 55.  
 Selenites, I. 55.  
 Semen, I. 76.  
 Semenza di Laureola, I. 40.  
 Semole, I. 53.  
 Semprevivo, I. 98.  
 Sempervivum, I. 98. III. 188, 189.  
 Sempreviva saluatica, I. 57.  
 Senape, I. 100.  
 Senecio, I. 98. III. 187.  
 Senecka, I. 98.  
 Senecon, I. 98.  
 Senf, I. 100.  
 Senna, I. 98. III. 187.  
 Sepiæ Os, I. 99. III. 200.  
 Seraphique Gomme, I. 94.  
 Serapin Gummi, I. 94.  
 Sericum, I. 99.  
 Serpens, I. 99.  
 Serpent, I. 99.  
 Serpentaria, I. 48.  
 Serpentaria Virginiana, I. 99. III. 188.  
 Serpillo, I. 99.  
 Serpolet, I. 99.  
 Serpyllum, I. 99. III. 190, 191.  
 Serum Lactis, II. 141.  
 Chalybeatum, II. 141.  
 Dulce, I. 63.  
 Sefamum, I. 99. III. 200.  
 Sefeli, I. 99. III. 190, 191.  
 Seta, I. 99.  
 Sevenbaum, I. 93.  
 Siderite, I. 99.  
 Sideritis, I. 99. III. 192.



*Siebengezeit*, I. 72.  
*Sief album*, II. 141.  
*Siegvurzel*, I. 108.  
*Sigillum Salomonis*, I. 100.  
     III. 192.  
*Sigmundwurzel*, I. 5.  
*Silber*, I. 12.  
*Silberglatt*, I. 67.  
*Siler montanum*, I. 100.  
*Silex*, I. 100.  
*Siliqua Dulcis*, I. 100.  
     III. 197.  
*Simarouba*, I. 100.  
*Sinapi*, I. 100.  
     III. 193.  
*Sinau*, I. 5.  
*Singün*, I. 108.  
*Siri Gata Gamber*, I. 32.  
*Smaragdus*, I. 100.  
*Sméraldo*, I. 100.  
*Schmirgel*, I. 100.  
*Smitis*, I. 100.  
*Soda*, I. 100.  
     Tartarifata, II. 139.  
     Vitriolata, II. 138.  
*Solano*, I. 100.  
*Solanus*, I. 100.  
     III. 194.  
*Soldanella*, I. 101.  
     III. 192.  
*Solfo*, I. 103.  
*Solutio Mercurii*, II. 141.  
*Sommerlock*, I. 83.  
*Son*, I. 53.  
*Sonchus*, I. 101.  
     III. 195.  
*Sonnengunzel*, I. 57.  
*Sonnenthau*, I. 91.  
*Sophia Chirurgorum*, I. 101.  
*Sorbier*, I. 101.  
*Sorbus*, I. 101.  
     III. 196.  
     Aucuparia, I. 101.  
*Sory*, I. 111.  
*Sotirella parva*, II. 141.  
*Souche long*, I. 46.  
     Rond, I. 46.  
*Soucy*, I. 25.  
*Soude*, I. 100.  
*Soufre*, I. 103.  
*Soye*, I. 99.  
*Spanische Mucken*, I. 27.  
*Sparadapum*, II. 69.  
     Album, II. 141.  
     ad corpus conditum involvendum,  
     II. 142.  
     Goulard, II. 142.  
*Tom*, I.

*Spargel*, II. 15.  
*Species*, II. 142.  
     Aromaticæ Rosatæ, II. 142.  
     pro Cataplasmate Emolliente,  
     II. 142.  
     Cephalicæ, II. 142.  
     pro Decocto Antinephrit, II. 143.  
     Carminativo, II. 143.  
     vel Potu Infantum, II. 143.  
     Pectorali, II. 143.  
     Vulnerario, II. 143.  
     Diacretæ, II. 144.  
     Diaireos, II. 144.  
     Diambæ, II. 144.  
     Diatragacanthæ, II. 144.  
     Discutientes, II. 144.  
     Emollientes, II. 144.  
     pro Epithemate Cordis & Pulsuum,  
     II. 145.  
     pro Potu Aromatico, II. 145.  
     ad Colicam, II. 145.  
     Imperatoris, II. 145.  
     pro Odoramento Pot pourri, II. 145.  
     pro Potu Infantum, II. 143.  
     Resolventes, II. 146.  
     Tabaci pro fumo, II. 146.  
*Specificum Antifebrile*, II. 146.  
     Crollii, II. 146.  
     Antepilepticum, II. 146.  
     Cephalicum, II. 146.  
     Diajalappæ, II. 147.  
     Febrifugum, II. 147.  
     Jalappinum, II. 147.  
     Stomachicum, II. 33.  
*Specularis Lapis*, I. 55. 101.  
*Sperniola*, I. 90.  
*Spiauter*, I. 112.  
*Spica*, I. 65.  
     Celtica, I. 101.  
     III. 197.  
     Indica, I. 101.  
     Nardi, I. 65.  
*Spiesglas*, I. 8.  
*Spieshirsch*, I. 34.  
*Spigelia*, I. 101.  
*Spina alba*, I. 28.  
*Spina Cervina*, I. 101.  
*Spingardi*, I. 65.  
*Sptinne*, I. 12.  
*Spindel*, I. 16.  
*Spirito di Sapone*, II. 23.  
*Spiritus abstractitii*, I. 65.  
     II. 147.  
     Aceti, II. 5.  
     Æthereus Nitratus, II. 148.  
     Balsami Peruviani, II. 147.  
     Bezoardicus Buffi, II. 147.

Spiritus Carminativus *Sylvii*, II. 147.  
     de tribus, II. 147. 148.  
 Cochleariæ, II. 148.  
     compositus, II. 148.  
 Cornu Cervi, II. 148.  
 Jasmini, II. 148.  
 Lavendulæ, I. 65.  
 Mindereri, II. 148.  
 Nitri, II. 148.  
     Dulcis, II. 148.  
     Fumans, II. 149.  
 ad Perniones, II. 149.  
 Salis Ammoniaci cum Calce viva,  
     II. 149.  
     Cauticus, II. 149.  
     Succinat. II. 149.  
     Tartarifat. II. 149.  
     Vinofus, II. 149.  
 Salis communis, II. 149.  
     Fumans, II. 150.  
     Dulcis, II. 150.  
 Saponis, II. 150.  
 Succini, II. 150.  
 Sulphuris, II. 143. 150.  
     Volatilis, II. 150.  
 Tartari, II. 150.  
 de Tribus, II. 107.  
 Vini Alcalifatus, II. 150.  
     Camphoratus, II. 150.  
     Crocatus, II. 150.  
     Lotus, II. 151.  
     Phlegma, II. 151.  
     Rectificatus, II. 151.  
     Tartarifat, II. 151.  
 Vinofus Vitriolicus, II. 99.  
     Æthereus Vitriol. II. 99.  
 Vitrioli, II. 151.  
 Vitrioli dulcis, II. 151.  
 Spodium, I. 48.  
     II. 151.  
 Spongiæ, I. 101.  
     Præparatæ, II. 151.  
 Spongiarum Lapis, I. 102.  
 Springhærner, I. 32.  
 Squilla, I. 97.  
 Stabvurx, I. 11.  
 Stackelruben, I. 76.  
 Stagno, I. 102.  
 Stange, I. 34.  
 Stannum, I. 102.  
 Staphis agria, I. 102.  
     III. 197.  
 Stechpafel, I. 102.  
 Steckruben, I. 76.  
 Steinmark, I. 71.  
 Steinbeere, I. 111.  
     bresh, I. 51.

Steinbeere, kressen, I. 77.  
     leberkraut, I. 58.  
     salz, I. 94.  
 Steinoel, I. 84.  
 Stendelvurzel, I. 96.  
 Sterco dei cani, I. 4.  
 Stibium, I. 11.  
 Stier, I. 105.  
 Stincus, I. 97.  
 Stœchas, I. 102.  
     III. 198.  
 Stærche, I. 9.  
 Storckenchnabel, I. 55.  
 Storax, I. 102.  
 Stramonio, I. 102.  
 Stramonium, I. 102.  
     III. 198.  
 Strausseneyer, I. 102.  
 Struthionis Ova, I. 102.  
 Suber, I. 103.  
     III. 198. 199.  
 Subulo, I. 34.  
 Suc de Reglise des Bois, II. 116.  
 Succi expressi, II. 151.  
     Antiscorbutici, II. 151.  
 Succino, I. 103.  
 Succinum, I. 103.  
     Indiæ Occidentalis, I. 67.  
 Succisa, I. 103.  
     III. 199.  
 Succo d' Ipocistide, I. 60.  
 Sucre, I. 93.  
 Sughero, I. 103.  
 Sule, I. 53.  
 Suif, I. 22.  
 Sulphur, I. 1037.  
     Antimonii auratum, II. 151.  
     Tartarifat, II. 96.  
     Præcipitatum, II. 97.  
 Sumach, I. 103.  
 Suppositoria, II. 151.  
 Surreau, I. 95.  
 Süsholz, I. 55.  
 Susino salvatico, I. 2.  
 Symphytum, I. 103.  
     III. 199.  
 Syrop, I. 93.  
 Syrupi, II. 151.  
 Syrupus Alexandrinum, II. 96.  
     Alchææ, II. 152.  
     Ambrosii, I. 74.  
     de Ammoniaco, II. 152.  
     Amygdalinus, II. 152.  
     Antiscorbuticus, II. 152.  
     Balsami Tolutani, II. 153.  
     Balsamicus Hoffmanni, II. 153.  
     Boyleanus, II. 153.



*Sirupus Byzantinus*, II. 153.  
*Chinæ*, II. 153.  
*Cichorei cum Rhabbarbaro*, II. 153.  
*Citri Corticum*, II. 154.  
     *e toto*, II. 153.  
*Coralliorum*, II. 154.  
*Diacodii*, II. 154.  
*Domesticus*, II. 154.  
*Emeticus Brandenburg.* II. 154.  
     *Glauberi*, II. 154.  
*Emulsivus*, II. 152. 154.  
     *de Eryfimo*, II. 154.  
*Glycyrrhizæ*, II. 155.  
*Hordeatus*, II. 155.  
*Hyslopi*, II. 155.  
     *de Injubis*, II. 155.  
*Longæ Vitæ*, II. 156.  
     *de Manna*, II. 156.  
*Mercurialis*, II. 156.  
*Mororum*, I. 74.  
     *de Nicotiana*, II. 156.  
*Papaveris albi*, II. 156.  
*Prophylacticus*, II. 156.  
*Rubi Idæi*, II. 157.  
*Saccharinus*, I. 93.  
*Scelotyrbiticus*, II. 157.  
*Scilliticus*, II. 155.  
     *de Spina Cervina*, II. 154. 157.  
     *de Symphyto*, II. 157.  
*Viperarum*, II. 157.

*Tabacco*, I. 78.  
*Tabac*, I. 78.  
*Tabellæ*, I. 157.  
*Tabouret*, I. 23.  
*Tabulæ*, II. 135.  
     *Alimentariæ*, II. 157.  
     *Althææ*, II. 164.

*Tacamahaca*, I. 103.  
*Taffetas d'Angleterre*, II. 71.  
*Taffia*, I. 104.  
*Tag und Nacht Kraut*, I. 82.  
*Talcum*, I. 104.  
*Talpa*, I. 104.  
*Tamarindi*, I. 104.  
*Tamaris*, I. 104.  
*Tamarisco*, I. 104.  
*Tamariscus*, I. 104.  
     III. 204.  
*Tanaceto*, I. 104.  
*Tanacetum*, I. 104.  
     III. 203.  
*Tanais*, I. 104.

*Taraxacum*, I. 104.  
     III. 204.  
*Tarrette*, I. 57.  
*Tartari Cryfalli*, I. 105.  
*Tartaro*, I. 104.  
*Tartarus*, I. 104.  
     *Antimonialis*, II. 158.  
     *Chalybeatus*, II. 157.  
     *Emeticus*, II. 158.  
     *Martialis*, II. 94.  
     *Regeneratus*, II. 158.  
     *Solubilis*, II. 140. 158.  
     *Tartarifatus*, II. 158.  
     *Vitriolatus*, II. 158.

*Tartre*, I. 104.  
*Taschelkraut*, I. 23.  
*Tassobarbasso*, I. 87.  
*Tasso*, I. 105.  
*Taubenkropf*, I. 53.  
*Taupe*, I. 104.  
*Taureau*, I. 105.  
*Taurus*, I. 105.  
*Thausendguldenblumen*, I. 32.  
*Taxus*, I. 105.  
*Te del Paraguay*, I. 11.  
     *Mexico*, I. 22.  
*Tela Emplastica*, II. 69.  
     *Gualteri*, II. 141.  
*Telephium*, I. 43. 50.  
*Terebinthina*, I. 105.  
*Terebinthinæ Oleum*, I. 105.  
     *Spiritus*, I. 105.  
*Terra foliata Tartari*, II. 158.  
     *Merita*, I. 45.  
     *Sigillata*, I. 105.  
*Tertianaria*, I. 105.  
     III. 202.

*Testudo*, I. 105.  
*Testuggine*, I. 105.  
*Teufelsabiss*, I. 103.  
*Teufelsdreck*, I. 15.  
*Thalictrum flavum*, I. 105.  
     III. 203.  
*Thea Bohea*, I. 105.  
     *Romana*, I. 22.  
     *Silesiaca*, II. 22.  
     *Viridis*, I. 106.  
*Thée du Mexique*, I. 22.  
     *Mississipi*, I. 11.  
     *Paraguay*, I. 11.  
*Theer*, I. 86.  
*Theriaca Andromachi*, II. 158.  
     *Cœlestis Hoffmanni*, II. 158.  
     *Diatefferon*, II. 60.  
*Thlaspi*, I. 106.  
     III. 200. 201.  
*Thuris Cortex*, I. 106.

Thusl, I. 79.  
 Judæorum, I. 106.  
 Thym, I. 106.  
 Thymelæa, I. 73.  
 Thymiamatis Cortex, I. 106.  
 Thymian, I. 106.  
 Thymus, I. 106.  
 III. 203.  
 Tiglio, I. 106.  
 Tilia, I. 106.  
 III. 202, 203.  
 Tilleul, I. 106.  
 Time, I. 106.  
 Tincal, I. 22.  
 Tinctura, II. 159.  
 Alexipharmaca, II. 159.  
 Cortic. Peruv. II. 86.  
 Amara Edinburgensium, II. 67.  
 Londinensium, II. 67. 159.  
 Antimonii acris, II. 159.  
 Saponacea, II. 160.  
 Taratarifata, II. 160.  
 Antivenerea, II. 160.  
 Auri, II. 160.  
 Bezoardica, II. 160.  
 Coralliorum, II. 161.  
 Laccæ, II. 161.  
 Martis aperitiva, II. 161.  
 Glauber, II. 161.  
 Cydoniata, II. 161.  
 Helleborata, II. 162.  
 Pomata, II. 161.  
 Zwvoelfferi, II. 162.  
 Metallorum, II. 162.  
 Rhabarbari, II. 162.  
 Salina, H. 162.  
 Stomachica Danorum, II. 162.  
 VVhytt, II. 163.  
 Sulphuris, II. 163.  
 Tartari, II. 163.  
 Thebaïca, II. 98.  
 Toeschelkraut, I. 23.  
 Tolutanum Balsamum, I. 106.  
 Topasius Lapis, I. 106.  
 Toque, I. 105.  
 Tormentilla, I. 107.  
 Tortue, I. 105.  
 Tournesol, I. 57.  
 Tourquette, I. 59.  
 Toute bonne, I. 59.  
 Trabern, I. 110.  
 Tragacantha, I. 107.  
 III. 206.  
 Tragea alba, II. 163.  
 Aromatica, II. 163.  
 Granorum Actes, II. 163.  
 Ophthalmica, II. 164.

Tragopogon, I. 107.  
 Traubekraut, I. 22.  
 Trefle, I. 107.  
 musqué, I. 72.  
 Tribuli aquatici, I. 107.  
 III. 206.  
 Trichomanes, I. 4. 107.  
 Trifoglio, I. 107.  
 Trifolium, I. 107.  
 III. 204. 205.  
 Tripe Madame, I. 98.  
 Tripoli, I. 107.  
 Tripolitana terra, I. 107.  
 Trippel, I. 107.  
 Trochisci, II. 164.  
 Albi II., 164.  
 Alhandal, II. 164.  
 Aliptæ, II. 164.  
 Alkermes, II. 164.  
 Althææ, II. 164.  
 Becchici albi, II. 164.  
 Citrini, H. 164.  
 Nigri, II. 165.  
 Parisiensium, II. 166.  
 Catechu, II. 166.  
 Cypheos, II. 165.  
 Escharotici, II. 165.  
 Fumales, II. 165.  
 Hedychroi, II. 165.  
 Hermetici, II. 165.  
 de Nitro, II. 166.  
 Pectorales, II. 166.  
 Refrigerantes, II. 166.  
 de Scilla, II. 166.  
 Viperini, II. 166.  
 Troesne, I. 66.  
 Tryphera magna, II. 166.  
 Tunica, I. 107.  
 III. 206.  
 Turique Gomme, I. 12.  
 Turis Gomme, I. 12.  
 Turphetum, I. 107.  
 Minerale, II. 167.  
 Tussilago, I. 51. 107.  
 Tutia, I. 107.  
 Typhi Cervini, I. 34.



Valeriana, I. 108.  
 Valerienne grande, I. 84.  
 Vanilla, I. 108.  
 Velar, I. 50.  
 Velvotte, I. 49.  
 Vena, I. 16.  
 Verbasco, I. 108.  
 Verbascum, I. 108.  
 III. 208. 209.  
 Verbena, I. 108.  
 III. 215.  
 Verd de gris, I. 109.  
 Vessie, I. 101.  
 Ver de Terre, I. 68.  
 Verge d'or, I. 42.  
 Verjus, I. 109.  
 Veronica, I. 108.  
 III. 207.  
 Veronique, I. 108.  
 Verre, I. 110.  
 Verveine, I. 108.  
 Vescia del lupo, I. 22.  
 Vesse de Loup, I. 22.  
 Vetro, I. 110.  
 Victorialis, I. 108. III. 210.  
 Vigne, I. 109.  
 Vinacea, I. 110.  
 Vinaigre, I. 3.  
 Vinca per Vinca, I. 108.  
 III. 211.  
 Vincetoxicum, I. 59. 108.  
 Vinum, I. 108.  
 Amarum, II. 167.  
 Antimoniatum, II. 12.  
 Antiscorbuticum, II. 167.  
 Chalybeatum, II. 167.  
 per Confermentationem, II. 167.  
 Emeticum, II. 12. 168.  
 Hippocraticum, II. 168.  
 Viola, I. 60.  
 III. 212.  
 Violaria, I. 109.  
 Viole, I. 109.  
 gelbe, I. 36.  
 Violenvurzel, I. 62.  
 Violette, I. 109.  
 Vipera, I. 109.  
 III. 210.  
 Virga aurea, I. 109.  
 Viride Æris, I. 109.  
 Viscum, I. 109.  
 III. 212.  
 Vite, I. 109.  
 Vitis, I. 109.  
 III. 212.  
 Vitis Idæa, I. 110.  
 Vitriolum album, I. 110.

Vitriolum Cæruleum, I. 110.  
 de Cypro, I. 110.  
 Martis, II. 168.  
 Viride, I. 110.  
 Vulgare, I. 110.  
 Vitriuolo bianco, I. 110.  
 Vitrum, I. 110.  
 Antimonii, II. 168.  
 Ceratum, II. 168.  
 Vivola, I. 107.  
 Ulmaria, I. 18. 110.  
 Ulmus, I. 111.  
 III. 214.  
 Ultramarinum, I. 65.  
 Umbilicus marinus, I. 110.  
 III. 214.  
 Unguentum album, II. 168.  
 Camphoratum, I. 168.  
 Ægyptiacum, II. 168.  
 Althææ, II. 168.  
 ad Ambusta, II. 169.  
 Anodynum, II. 169.  
 Apostolorum, II. 169.  
 de Arthanita, II. 169.  
 Basilicum, II. 170.  
 Bernhardinum, II. 170.  
 Cæruleum, II. 173.  
 Camphoratum, II. 168.  
 contra Cancr. apertum, II. 170.  
 Cardiacum, II. 170.  
 Carminativum, II. 170.  
 Citrinum, II. 176.  
 Clysmaticum, II. 171.  
 Comitissæ, II. 171.  
 Diapempholygos, II. 175.  
 Digestivum, II. 171.  
 Dodecapharmacum, II. 171.  
 Emulatum, II. 172.  
 Fuscum, II. 172.  
 e Gummi Elemi, II. 172.  
 Hæmorrhoidale, II. 172.  
 de Linaria, II. 172.  
 de Liquiritia, II. 172.  
 de Lithargyrio, II. 172.  
 Majoranæ, II. 344.  
 Martiatum, II. 172.  
 Maturativum, II. 173.  
 Mercuriale album, II. 173.  
 de Minio, II. 173.  
 Mundificans Poterii, II. 173.  
 Stablii, II. 173.  
 Neapolitanum, II. 173.  
 Nervinum, II. 173.  
 de Nicotiana, II. 174.  
 Nihili, II. 174.  
 Nutritum, II. 172. 174.  
 Oculare Pringle, II. 174.

- Unguentum Oculare *Sloane*, II. 174.  
 Ophthalmicum, II. 174.  
 Opodeldoch, II. 30.  
 Paralyticum, II. 174.  
 Pectorale, II. 174.  
 contra Pediculos, II. 175.  
 ad Perniones, II. 175.  
 Pomatum, II. 175.  
 Populeum, II. 175.  
 Purpureum, II. 176.  
 Rosatum, II. 176.  
 Rubrum potabile, II. 176.  
 Sambucinum, II. 176.  
 ad Scabiem album, II. 173.  
     *Parifensium*, II. 176.  
 Saturninum, II. 176.  
 Simplex, II. 176.  
 Solani, II. 176.  
 Spleneticum, II. 177.  
 Stomachicum, II. 177.  
 de Styrace, II. 177.  
 Tetrapharmacum, II. 170.  
 Triapharmacum, II. 172.  
 de Uvis, II. 177.  
 contra Vermes, II. 177.  
 Viride potabile, II. 178.  
 Unicornu fossile, I. 48. 110.  
     verum, I. 110.  
 Unschlitz, I. 22.  
 Vogelbeeren, I. 101.  
 Vogelkraut, I. 6.  
 Vogelleim, I. 109.  
 Vogelneß, I. 47.  
 Volpi, I. 111.  
 Vomicæ Nuces, I. 111.  
 Vomo, I. 59.  
 Vori di Struzzo, I. 102.  
 Ursus, I. 111. III. 207.  
 Urtica, I. 111.  
     III. 213.  
     Mortua, I. 54.  
 Uva *Uelke*, I. 111.  
     *Scani*, I. 82.  
 Uva di *uslpe*, I. 82.  
 Vulpes, I. 111. III. 207.  
 Vulvaria, I. 111.  
     III. 214.  
 Uvularia, I. 111.  
     III. 214.  
 VVachholder, I. 62.  
 VVachs, I. 33.  
     Stop, I. 33.  
 VValdmeister, I. 58.  
 VValrath, I. 35.  
 VVallrasszahn, I. 59.  
 VValwurzel, I. 103.  
 VVanzelkraut, I. 92.  
 VVasserlinsen, I. 66.  
 VVassernüsse, I. 107.  
 VVasserpfeffer, I. 83.  
 VVasserschierling, I. 84.  
 VVasserschwertel, I. 3.  
 VVegdistel, I. 29.  
 VVegerich, I. 86.  
 VVegras, I. 33.  
 VVegsenf, I. 50.  
 VVegweis, I. 37.  
 VVelden, I. 95.  
 VVeiderich, I. 68. 93.  
 VVeinmus, I. 100.  
 VVeinstein, I. 104.  
 VVeisdornen, I. 81.  
 VVeiswurzel, I. 100.  
 VVermuth, I. 11.  
 VViesenkresse, I. 28.  
 VViesenraute, I. 105.  
 VVihrach, I. 79.  
 VVildschuwein, I. 11.  
 VVinteranus Cortex, I. 111.  
 VVintergrün, I. 89.  
 VVismuthum, I. 21.  
 VVohlgemuth, I. 80.  
 VVohlverley, I. 14.  
 VVolf, I. 68.  
 VVolfsbeere, I. 82.  
 VVolfsmilch, I. 50.  
 VVolkraut, I. 108.  
 VVundkraut, I. 42.  
 VVurmsaamen, I. 38.  
 Xanthium, I. 111.  
     III. 216.  
 Xylobalsamum, I. 71.  
 Teble, I. 48.  
 Yeux de Ecrivisse, I. 25.  
 Yvoire, I. 48.



*Zafferan spurio*, I. 23.  
*Zapfeinkraut*, I. 111.  
*Zahnwurzel*, I. 47.  
*Zapfenholz*, I. 52.  
*Zaunäcnig*, I. 90.  
*Zaunrube*, I. 23.  
*Zedoaria*, I. 111.  
*Zeitlosen*, I. 19.  
*Zenzero*, I. 112.  
*Zetrovario*, I. 111.  
*Zibeben*, I. 82.  
*Zibethum*, I. 111.  
     III. 215.  
*Zimmer*, I. 38.

*Zimmer Mutter*, I. 30.  
*Zinco*, I. 112.  
*Zincum*, I. 112.  
*Zingiber*, I. 112.  
*Zinn*, I. 102.  
*Zinziber*, I. 112. III. 216.  
     *Costum*, II. 178.  
*Zittwer*, I. 111.  
*Zucca*, I. 44.  
*Zucchero*, I. 93.  
*Zucker*, I. 93.  
*Zuuecken*, I. 56.  
*Zuviebel*, I. 33.  
*Zuvieschen*, I. 88.



# NOI RIFORMATORI

## DELLO STUDIO DI PADOVA.

**A** Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Gio: Tommaso Mascheroni Inquisitor General del Santo Offizio di Venezia nel Libro intitolato: *Pharmacopœa Generalis edita a D. Jacobo Reinboldo Spielmann ec. stamp.*, non vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e Buoni Costumi, concediamo Licenza a Gio: Antonio Pezzana, che possa essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 31. Luglio 1784.

{ PIERO BARBARIGO RIFORMATOR.

{ ANDREA TRON Kav. PROC. RIFORMATOR.

{ GIROLAMO ASCANIO GIUSTINIAN Kav. RIFORMATOR.

Registrato in Libro a Carte 123. al Num. 1144.

Davidde Marchesini Segr.





# M A T E R I E S P H A R M A C E U T I C A .

A B

A B

**A**BEL MOSCHI Semin. *Bamia Moschata*, *Grani di Musco*, *Grains de Musc*, *Bisamsaamen*. Fusca sunt, uniformia, leniter compressa, utrinque sinuata, odore ad Moschum accedente. Desumuntur ab Hibisco Abelmoscho L. Arbore utriusque Indiae cive. Apud nos in tepidario contra frigus defendenda. *A* quibusdam Infusis Nervinis adjicitur, aut ad Suffimigia recipitur.

ABROTANUM, *Abrotano*, *Aurone*, *Stabwurcz* illud *Maris* epitheto olim a ceteris distinguebant. Asservantur inde cauliculi herbacei, foliis setaceis obfessi, fragrante & forti odore, sapore aromatico, amaricante. *Artemisia Abrotanum* L. *Blackwell* Tab. 555. Frutex in Europa Australi & Oriente sponte crescens apud nos in hortis colitur. *Levis* inde paucissimum Olei odorati obtinuit. *Vires Aromaticas* edit; laudatur contra *Vermes*. Datur in Infuso, quod cum Spiritu Vini paratum, aquoso praestat.

ABROTANUM FOEMINA, *Santolina La Garde - obe*, *Gartencypressen*. Recipiuntur inde cauliculi teneri cum foliis angustis dentatis, albentes, odore

grato, sapore levi, aromatico & amaricante. *Santolina Chamæcyparissus* L. *Blackwell* Tab. 346. Crescit in Europa Australi, apud nos in frigidario asservanda. *Antecedentis vires*, sed debiliores habet.

ABSINTHIUM ALPINUM, *Le Genippi*. Folia sericea, angusta, pinnata, tenuiter divisa, grato aromate instructa. *Artemisia Rupestris* L. *Helvetiae*, *Sibiriae*, *Oelandiae* civis. Laudatur contra Febres intermittentes, ad Menses pellendos & Vulnera consolidanda.

ABSINTHIUM PONTICUM, *Asenzio Pontico*, *petite Absinthe*, *Ræmischer VVermuth*. Folia alba, pinnatim tenuissime laciniata, non ingrati odoris, leviter amara, evidenter aromaticâ. *Artemisia Pontica* L. *Blackwell* Tab. 527. Crescit in Europa Orientali & in Palatinatu, in nostris hortis colitur. Resolvit; Digestionem juvat; contra Vermes facit. Datur in Infuso aquoso.

ABSINTHIUM VULGARE, *Asenzio comune*, *Absynthe*, *VVermuth*. Folia pinnata, pinnis latiusculis, alba, proprii non admodum grati odoris, saporis nauseosi, amarissimi. Ar-

A

temi.



temisia Absynthium L. *Blackwell* Tab. 17. Passim in Europa obvium it. *Ban-mé* ex Foliorum libris viginti quinque, ad decem Drachmas Olei odorati non amari obtinuit. *Resolvendi, Primas* vltas roborandi, *Vermes* necandi, *Putredinem* arcendi, *Scorbutum* quoque, *Podagram*, *Hydropem* curandi causa exhibetur. Datur sub forma *Infusi Aquosi, Vinosi, Spirituosi, Conservæ, Syrupi*: Oleum destillatum rarissime intus datur, *Spiritu Vini* dissolutum aut *Saccharo* exceptum vices *Essentiæ* sustinet: *Extractum* odore caret. Pro usibus externis *Oleum* per *Infusionem* paratum prostat.

ACACIA ÆGYPTIACA. Inde prostat Succus inspissatus in placentulas coactus rotundas, ex rufo nigricantes, in ore liquecentes, sapore adstringente & austero instructus. Obtinetur ex fructibus immaturis *Mimosæ Niloticæ* *Blackwell* T. 377, Arboris in desertis *Libyæ* crescentis, apud nos in tepidario per hyemem asservandæ. *AVeteribus* multum scopo *Adstringendi* laudabatur. Hodie eviliuit.

ACACIA NOSTRAS, *Susino* salvatico, *Prunier sauvage*, *Schlehenbaum*. Inde *Corticem*, *Flores*, *Fructus* recipimus. *Cortex* gryseus & rufus, adstringens: *Flores* recentes sunt albi, odore grato, qui & exsiccatione non totus perit, sapore amaricante: *Fructus* sunt *Drupæ* rotundæ, nigræ, saporis austeri, qui vero, si pruinas aliquot expertæ fuerint, multum mitescit. *Prunus spinosa* L. *Blackwell* Tab. 494. Crescit in Europa præter maxime *Meridionalem* & *Septentrionalem*, nec non in *Pensylvania*. *Corticem a virtute Diuretica & Febrifuga* laudant, *Flores ab Eccoprotica*, quæ vero non raro tormina excitat, *Fructus autem ab Adstringente*, frigore mitigati in modum aliorum fructuum horreorum comeduntur. *Cortices & Fructus* cum aqua decoquuntur; hos quoque cum nucleis confusos *Vino* infundere solent. *Florum Manipulum unum* cum aqua aut *Sero lactis* infundunt aut in *Syrupum* cogunt. *Aqua a Floribus abstracta* suave olens ad affectus *Pectoris* commendatur. Succum ex *Baccis* frigore non mitigatis expressum & inspissatum primi *Arabes* substituerunt Succo

*Acaciæ Ægyptiacæ*, a quo etiam non nisi maiore nigredine differt; sed ne hoc ipso quidem ulterius utimur.

ACANTHUS Folia oblonga, lata, utrinque viridia, laciniata laciniis acutis & dentatis, masticata mucilaginis sensum lingue sistunt. *Acanthus mollis* L. *Blackwell* Tab. 89. *Italiæ civis*, nostram hyemem patienter fert. *Medicamentis externis Emollientibus* cum successu adicitur, inconsulte *Branca Ursina* substitui solet.

ACER, *Acero*, *Erable*, *Ahorn*. Variæ ejus species *Platanoides* L. *Europæ* potissimum *Arbor*, *Rubrum* L. & *Saccharinum* L. *Virginie & Pensylvaniæ cives*, nostri climatis patientes: dum primo vere terebra inciduntur, succum fundunt instar aque limpidum, dulcem & inodorum, qui *Sanguinis purificandi gratia* ad duas libras de die bibitur; hic succus sub perpetua agitatione inspissatus abit in massam fuscam & dulcem, quæ *Saccharum Aceris* dicitur, ipsique *Saccharo* substituitur & ad morbos *Pectoris* magnopere commendatur.

ACETOSA, *Acetosa*, *Oseille*, *Sauerampfer*. Radices, Folia & Semina in officinas recipiuntur. Radices fibrosæ ex uno capite plures fibras longas & tenues edunt; cortex ex rufo flavescens medullam albidiorum includit; sapore præditæ sunt leviter amaricante, levius adstringente. Folia sunt oblonga, sagittata, acidi saporis, qui autem exsiccatione multum imminuitur. Semina sunt spadicea, triquetra, & linguæ adstringentem sensum imprimunt. *Rumex Acetosa* L. *Blackwell* Tab. 230. Crescit per totam Europam, in hortis culta & major & succulentior redditur. Radices Adstringunt & cum Aqua coquuntur, quæ inde rubella condit, sed color ab affusis Acidis destruitur. Folia *Antiscorbutico*, *Antifebrili* & *Lithonriptico* scopo adhibentur, varius sub forma *Infusi* exhibentur, crebrius recentia *Fusculis* incoquuntur. Succus inde expressus ad octo Uncias exhibetur. Seminum usus, quæ a virtute Adstringendi commendarunt & sub forma *Pulveris* propinarunt, eviliuit.

ACETOSA ROTUNDI FOLII Folia exhibet sagittata, glauca, præcedentibus magis acida *Rumex scutatus* L. *Blackwell*



*Blackwell Tab. 326. Europæ Meridionalis civis. Folia medicato scopo vel præcedentibus merito præscribuntur.*

**ACETOSELLA**, *Acetofella*, *Alleluja*, *Sauerklee*. Folia habet, quorum tria uni petiolo insident, obcordata, firmula, levi hirsutie notata, sapore acido linguam feriunt, qui sapor autem exsiccatione vix non totus perit. *Oxalis Acetofella* L. Crescit passim per Europam, præter maxime Meridionalem, sed in agro Veronensi adhuc occurrit. *Adhibetur ad Refrigerandum, Putredinem corrigendam, Ventriculorum roborandum. Datur sub forma Infusi aquosi, Conservæ, Syrupi, Succi expressi.* Ejus *Libra una fessui Drachmam* circiter *Salis Essentialis* largitur, quod improprie fatis a Gallis *Sel d'Oseille* appellatur & rarissime a Pharmacopœis paratur, sed ex Helvetia, *Silva nigra* & *Martia* accersitur. *Conf. P. II.*

**ACETUM**, *Aceto*, *Vinaigre*, *Essig*. Liquor ex Vino denuo fermentationem suscipiente surgens, proprio non ingrato odore, qui nares evidenter irritat, sapore perinde linguam titillante & acido instructus. Aliud quam ex Vino, quod ab Uvis obtinetur, paratum adhibendum est nullo, illudque ipsum, quo fortius nares & linguam irritat, eo magis probatur; quoque generosius est Vinum, eo præstantius inde surgit Acetum. *Scopo Resolvendi, Putredini resistendi intus datur; Discutiendi & Sphacelum arcendi extus applicatur, nec non Excitandi sine Naribus admoveatur.*

**ACONITUM**, *Nappello*, *Napel*, *Eisenbutlein*. Folia sunt profunde quinquepartita, lobis cuneatis, incisis, acute, terminatis, lineatis, leviter odorata; recentia aliquanto postquam masticata fuerint, acrimoniam produnt, quæ ab exsiccatis tota abest *Aconitum Napellus* L. *Blackwell Tab. 561.* Passim in montibus crescit, apud nos in hortis colitur. *Veneri Narcotici effectus edit. Succus inspissatus sub nomine Extracti asservatur, tanquam summum remedium a Granis sex ad decem & ultra aliquoties de die Resolvendi ergo in Rheumatismis & Arthritide, nec non in Quartana laudatur. Dosis sensim sensimque ad Drachmam semis usque evectum fuisse lego.*

**ACORUS**, videatur **CALAMUS**.

**ACORUS ADULTERINUS**. *Pseudacorus*, *Iride spuria*, *Flambe bâtarde*, *Vaerschuvertel*. *Radix fibrosa, rugis distincta, extus ferruginea, intus alba, odore & sapore ad Iridem Florentinam accedens, cum quadam adstrictione. Iris Pseudacorus* L. *Blackwell Tab. 261.* Per omnem Europam occurrit. *Alvum & Urinas ducere dicitur.*

**ACMELLA** adducitur ad nos sub forma Foliorum diffractorum viridum, multis stipitibus crassiusculis, & longis commixtorum. Equidem in illis nullum saporem, nisi levissimum salini vestigium potui distinguere. An quia effœta est, quæ hodie in tabernis prostat? *Spilanthus Acmella* L. *Blackwell Tab. 518.* Crescit in Zeylona & Ternata. *Annua planta, quæ sub dio in hortis nostris coli potest. Ineunte hoc sæculo ob vires Antinephriticas & Lithontripticas multum cœpit laudari. Dabatur sub forma Infusi Theæformis, hodie fere evuluit.*

**ADAMAS**, *Diamante*, *Diamant*. Gemmarum durissima, fulgidissima & pretiosissima, igni majori exposita tota disparsens. Alumen lapidosum, pellucidissimum, solidissimum, hyalinum L. Reperitur in fodinis vel in arenis Asiæ & in Brasilia. *Nec Medicamentosas, nec Venenatas Vires habet.*

**ADIANTHUM ALBUM**, videatur  **Ruta muraria**.

**ADIANTHUM AUREUM**, *Percemousse*, *Golden Widderrhon*. Prostat sub forma cauliculi simplicium rubrorum, undique foliolis linearibus, acutis, per exsiccationem contractis, rubiginosis obsessorum, capitulo quadrato, quod calyptra villosa tectum est, coronatis, insipidis. *Polytrichum commune* L. *Blackwell Tab. 357.* Copiose per silvas Europæ crescit. *Humores attenuare dicitur. Datur sub forma Theæformi.*

**ADIANTHUM NIGRUM**. Folia pinnata, pinnis ordinatim decrepcentibus ut integrum folium triangulum referat, obtusis, inæqualiter serratis, sapore destituta. *Asplenium Adiantum nigrum* L. *Blackwell Tab. 220.* Passim in Euro-



pa crescit præterquam magis Septentrionali. Viribus cum antecedente convenit.

**ADIANTHUM RUBRUM** vel *Trichomanes*. Cauliculi rubri pinnis ovatis & crenatis obliquis, dulciculi. Asplenium *Trichomanes* L. *Blackwell* Tab. 370. Vulgatissima per Europam planta. Vires antecedentium habet.

**ADHATODA**. Folia majora ex ovatis acute terminata, superne viridia, inferne albida, validis nervis percursa, saporis proprii amaro contigui, odore plane destituta. Justicia *adhatoda* L. *Zeylonæ* civis, apud nos in frigidario ab hyeme defenditur. Utero *Purgando dicata a nonnullis dicitur*.

**ÆGAGROPILÆ**, *Gemsenkugeln*. Pilæ variæ magnitudinis & figuræ, a recrementis variarum plantarum efformatæ, involucro tenaci & sicco obductis, fuscæ vel nigræ, odoris & saporis leviter aromatici cum aliqua adstrictione. Calculi *Ægagropilæ* L. Reperiuntur in primo & secundo ventriculo *Capræ* *Ruricapræ* L. Animalis summis *Alpium* jugis immorantis. *Totæ quantæ inertes*.

**ÆS**, videatur **CUPRUM**.

**ÆTITES**, *Aetite*, *Pierre d' Aigle*, *Adlerstein*. Lapis ex Argilla indurata efformatus, in cuius cavitate alius lapis *Callimus* dictus, laxè inclusus est, coloris ut plurimum lutei plus minusve fusci, figuræ sive rotundæ sive ovatæ. *Ætites* *Aquilinus* embryone libero terrestri L. Passim in Europa reperitur. *Commenta de ejus virtute ad Partum faciente jam diu ad aniles fabulas sunt ablegata*.

**AGALLOCHUM**, videatur **ALOES LIGNUM**.

**AGARICUS**, *Agarico*, *Agaric*, *Lärchenschwamm*. Prostat sub forma substantiæ fungosæ albæ, non raro in varia tubera divisæ, spongiosæ quasi farinacæ, digitos inquinantis, diversæ magnitudinis, levis, amaricantis, acrisculæ, nauscosæ, levissime odoræ. Boletus albus *Laricis* dictus L. Antequam officinis traditur, cutis tenax & colorata inde aufertur. In Europa Meridionali obtinet & in Oriente. Optimum ex *Aleppo* adduci contendunt. *Alvum in-*

*commodè ducit*. Sub forma Pulveris, Infusi aquiosi exhibetur, aliis medicamentis admiscendus, in substantia ad Drachmam unam, in Infuso ad Unciam semis. In Trochiscos eum ope mucilaginis *Tragacanthæ* efformandi mos obsolevit.

**AGARICUS MINERALIS**, videatur **LAC LUNÆ**.

**AGARICUS PEDIS EQUINI FACIE**. Prostat sub forma lamellarum molliissimarum, quæ consistentiam coriaceam mollem habent, colorem fuscum, odorem & saporem nullum. Parantur ex Boletis igniario L. variis arboribus accrescente, cujus exterior epidermis demitur; reliqua substantia mallei ictibus in lamellas, quales descripsi, effingitur. *Ad Sanguinem sistendum partibus cruentatis imponitur*.

**AGNUS CASTUS**. Recipiuntur inde capsulæ rotundæ, tomentosæ, aliquot feminibus foetæ, levissime odoræ, saporis aromatici. *Vitex* *Agnus castus* L. *Blackwell* Tab. 139. Arbor in Europa Meridionali & Carolina spontanea, hyemis nostræ patiens. *Aromatum vires habet, consilio pessimo contra Libidinem præscribitur; Emulsionibus etiam adjicitur*.

**AGRIMONIA**, *Agrimonia*, *Aigre-moine*, *Odermenning*. Folia longa, impari pinnata, pinnis ovato oblongis, incisè ferratis, inferne alba, odore nullo, sapore leviter adstringente. *Agrimonia* *Eupatoria* L. *Blackwell* Tab. 31. Crescit in omni Europa; leves vires Adstringentes edit; datur sub forma Infusi Theaeformis. Recipitur ad Gargarismata & Decocta Vulneraria. Oleum destillatum fundere dicitur.

**ALABASTRUM**, *Alabastro*, *Alabatre*, *Alabaster*. Est Lapis durus, qui ad chalybis ictum nullas scintillas emittit, cum acâidis non effervesceat, polituram admittit & in tenuia fragmenta sectus semipellucidus apparet. Gypsum *Alabastrum* particulis impalpabilibus diaphanum L. Passim in Europa reperitur. *Omni Virtute medicata caret*.

**ALBUM GRÆCUM**, *Sterco dei Cani*, *Merde des chiens*, *Weisser Hundskoth*. Est Excrementum alvinum Canum, sic-  
cum



cum & album, quod diutius asservatum odorem omnem amittit. *Sordidum Medicamentum hodie exolevit, saltem nonnisi externe Resolvendi ergo adhibetur.*

ALCEA, *Alce, Alcée, Sigmundvurz.* Folia rotunda, profunde lobata, lobis denno profunde divisis, scabra, inodora, insipida. Malva Alcea L. Crescit passim per Europam, præterquam magis Septentrionalem. *Emollientibus adscribitur, sub forma Infusi, Cataplasmatidis, Enematis adhibetur.*

ALCESUNGULÆ, *Piedi di Alce, Pieds d'Elan, Elendsklauen* sunt magnæ, coloris grysei ad nigrum vergentis, cultro rasæ nullum fœtorem spargunt. Desumuntur a Cervo Alce L. in Europa Septentrionali, Asia & America occurrente. *Quæ de ejus virtute Antepileptica ferebantur, ad vetularum commenta merito referuntur.*

ALCHYMILLA, *Pied de Lyon, Sinan, Frauenmantel.* Folia rotunda, plicata, pubescentia, lobata lobis rotundis & serratis, adstringente sapore prædita. Alchemilla Vulgaris L. *Blackwell Tab. 75. Leniter Adstringendi causa ad Infusa Theæformia & Decocta Vulneraria recipitur.*

ALKANNA, *Ancusa, Orcanette, rothe Ochsenzunge.* Radices fibrosæ, calami anserini crassitiem æquantes, sub cortice purpureo nigricante, medullam albam includunt, insipidæ. Anchusa tinctoria L. In Gallia Meridionali spontanea, nostras hyemes fert. *Unice ad tingenda quæque Pingua nec non Spiritum Vini adhibetur.*

ALKANNA ORIENTALIS. Ex capite crasso copiosas lamellas sibi invicem incumbentes, pleniore purpura, quam radices antecedentes saturatas emittit; a Lavvsonia inerimi L. desumitur, sed rarissime in Pharmacopolia recipitur.

ALKEKENGİ, *Alcachingi, Halicabum, Coquerets, Judenkirschchen.* Baccæ rotundæ, rubræ, pulpam continentes grate vinosam, cui Semina multa ovata, compressa, acriuscula, subamarâ in hærent. Ex Calice amarissimo illas exemturus caveat, ne istius vel levissimo tactu amaritiæ inficiantur. *Phyialis Alkekengi L. Blackwell Tab.*

161. Crescit in Europa, citra magis Septentrionalem. *A vi Diuretica laudantur. Recentes ultro se offerunt comedendas, exsiccata decoquuntur aqua, vel Succus inde expressus ad Unciam unam exhibetur.*

ALLIARIA, *Alliaria, Alliaire, Lurchel.* Folia cordata, glabra, dentato serrata, odore & sapore Allium referentia. Erysimum Alliaria L. *Blackwell Tab. 372.* Passim per Europam crescit. *A vi Diuretica & Antiscorbutica laudatur; jusculis adjicitur, aut Succus inde expressus exhibetur. Folia confusa Antiseptico quoque scopo extus applicantur. Folia exsiccando fere inertia redduntur. Oleum destillatum dicitur fundere.*

ALLIUM, *Aglio, Ail, Knoblauch.* Radix bulbosa est obvelata tunica sicca & alba, multis bulbis minoribus constans, quos *Spicas vel Nucleos, Zeben* appellant, & quidem incurvis, acutis, ad margines angulatis, hinc convexis inde planis, sub cuticula leviter rufescente carnem includentibus albam, proprii nauseosi odoris & saporis acris, quæ comesta animam ad sat longum tempus suo fœtore inficit. Allium sativum L. Veterum fide ex Africa in Europam illatum hodie ubivis colitur. *Resolvendi causa ad juvandam Digestionem, curandos affectus Pectoris, Podagram & Febres intermittentes, Anthelmintico & Diuretico scopo adhibetur sive crude comedendum, sive Succus inde expressus; illud ad tres spicas, hic ad Unciam unam exhibentur. Extus Bulbi sub cineribus cocti Maturandi, aut in pulpam contriti Rubefaciendi ergo applicantur. Sex & nonaginta Unciæ largiebantur Olei citrini, in aqua subfidentis, & penetrante suo odore omnia reliqua Olea odorata superantis Drachmam unam.*

ALLIUM ASCALONICUM L. *Eschallottes, Schatotten.* Consistit ex Bulbis solitariis, sub tunica rufescente bulbillos continens convexo-concavos, priori similes, odore vero & sapore mitiores. *Palæstinæ civis, in hortis colitur; ad Condimenta maxime recipitur.*

ALLIUM SCORODOPRASUM L. *Rocamboles.* Passim in Europa Sylvestre crescit.



scit, in hortis colitur. Bulbi umbellis innixi, subglobosi, ad latera compressi; tunica, qua sunt vestiti, ad colorem violaceum accedit, cætera cum prioribus fere habent communia. Ab Allio enim vulgari sapore & odore parum, viribus nihil differunt.

ALNUS, *Enula*, *Aunée*, *Erlen*. Folia nobis largitur rotunda, crenata, inferne albida, insipida. Betula *Alnus* L. Arbor in omnibus Europæ regionibus, Sibiria, Constantinopoli crescit. Folia incisa & Mammis calida imposita multum ad Lac Discutiendum laudantur.

ALOES, Succus inspissatus, niger, qui in majoribus massis nobis offertur, odore nauseoso, sapore amaro & acrimoniæ vicino. Inde ab Arabum temporibus tres ejus species in officinis prostant puritatis gradu inter se differentes; purissima est *Succotrina*; ad rubedinem accedit & nitore gaudet, cucurbitis inclusa nobis mitti solet; hanc *Hepatica* excipit, pleniore flavedine tincta; evidenter fordida est *Caballina* nigra, siccior, odorem minus fortem spirans. Ex varia succum ex foliis Aloës perfoliatæ veræ L. *Blackwell* Tab. 229. utriusque Indiæ civis, apud nos per hyemem tepidario fovendæ, expressum inspissandi ratione variæ hæ species oriuntur; *Succotrina*, ex succo defæcato spissitudinem sponte contrahente; *Hepatica*, ex succo pariter quidem defæcato, sed calore inspissato; *Caballina*, ex succo a facibus non mundato minusque diligenter cocto surgit. Hæc postrema ex officinis rejicienda. Ob virtutes Alvum ducendi, Primas vias roborandi, Obstructiones Systematis Vene Portarum reserandi, Vermes necandi, Putredinem arcendi laudatur. Sed inde Sanguinem, Hemorrhoidalem maxime, exæstuari Veteres jam perspexerunt, & hunc effectum a principio ejus resinoso pendere est observatum, quapropter pro usu interno nonnisi Extractum aquosum est recipiendum; neque ad illud extrahendum, calor ullus, ne scilicet resinosa partes accrescant, est adhibendus; sed aqua cum Aloë frigide infusa per aliquod tempus est reponenda & depositis demum facibus, inde defusa leni calore evaporanda. Aloës

Purgandi quidem scopo ad Drachmas duas; in reliquos usus ad Scrupulum unum præscribitur. Auctores mediæ ævi Aloën Infusis Vegetabilibus aut aqua solverunt & denuo inspissarunt, unde ALOES LOTTA, INSUC-CATA, ROSATA, VIOLATA extiterunt. Datur sub forma Pilularum, Electuarii, Infusi Spirituosi, Vinosi. Extus ejus Tinctura spiritiosa vel Pulvis recipitur; additur quoque Suppositoriis, Clysmatibus, Unguentis.

ALOES LIGNUM. Hoc nomine ad nos vehuntur frusta lignorum variæ magnitudinis badio aut nigro colore tincta, striis nigricantibus variata, aut resinam nigricantem in sinibus quasi exessis vehentia; his frustis ardentibus resina, qua scatent, fusa suavem odorem spargit, quem autem subsequens ligni accensi odor mox turbat. Nihil certi de arboris genere, nec unde nobis venit, liquet. In Indiæ Orientalis montibus insidere videntur arbores, quæ perinde ac nostræ Pinus ætate resina obducuntur; istarum arborum resina fragrantia sua ceteris præstat: frusta tota resina plena *Calambuc* dicta ad nos non perveniunt; tantum minus resinosa sub Ligni Aloes, Agolochi, Aquilæ, Aspalati nomine nostras tabernas ingrediuntur, & pro varia quam foveant resinæ ratione distinguuntur. Olim Nervino scopo ad Pulveres recipiebatur necnon ad Suffimenta, hodie evuluit. Oleum destillatum consistentiæ butyracæ inde obtinebatur.

ALSINE, *Morgeline*, *Hinderdarm*, *Vogelkraut*. Folia parva, ovata, longis petiolis prædita, acute terminata, levissime hirsuta, insipida, inodora. Alsine media L. Vulgatissima per omnem Europam planta. Vires Emollientes habere dicitur.

ALTHÆA, *Altea*, *Guimauve*, *Ibisch*. Radix fibrosa sub cute leviter flavescens, qua dum exsiccatur nudari solet, medullam albam habet subdulcem proprii nec ingrati odoris. Folia sunt cordato-oblonga, acute ferrata, quinqueloba, tomentosa, insipida, inodora. Flores albi monopetali, quinquefidi, inodori & insipidi, calice duplici tomentoso cincti as-



*servantur. Semina uniformia, compressa, striata, fusca, odoris & saporis expertia. Althæa Officinalis L. Blackwell Tab. 60. Crescit in Europa præter magis Septentrionali. Demulcendi & Emolliendi scopo adhibetur, & cum hæc virtutes a mucilagine pendeant, quæ Radicibus quam reliquis partibus copiosior inhaeret, Radices ad hunc scopum frequentioris sunt usus. Datur sub forma Infusi, Decocti, Syrupi, Trochiscorum; recipitur ad Collutoria, Gargarismata, Cataplasmata.*

**ALUMEN**, *Allume, Alun, Alaun.* Est Sal in amplas massas concretus, crystallis majoribus efformatus, linguam valide adstringens, non nisi larga aquæ copia dissolvendus, Syrupi Violarum colorem non mutans, prunis superimpositus multum intumescens & pelluciditatem exuens. Dimidium ejus ponderis aqua, sextam partem Acidum Vitriolicum & quartam terra Argillæ propria efformat. Inter Europæos primi Itali illud pararunt, qui quidem cum per crystallisationem figuram lapis induere hoc Alumen ipsis videretur, ut a ceteris ejus generibus, quæ omnia hodie evilerunt, distinguerent, nomen ei a Rocca sive Rupei indiderunt. *Leibnitz Protog. 47.* hanc denominationem a Rocca Syriæ, unde Alumen parandi trecentis ultra annis in Italiam delata fuit, repetit. Obtinetur ex variis fossilibus, unde post justam pro singulorum natura, præparationem elixivationis & crystallisationis ope elicitur. Purissimum creditur *Romanum*, quod Tolsæ ad centum cellas ex quadam Selenites specie paratur & leni roseo colore gaudet. *Valide Adstringit, quem in finem partibus Sanguinem fundentibus aqua solutum & linteis exceptum applicatur, ad Dentifricia quoque recipitur. Intus ad Hæmorrhagias aut Diarrhæas sistendas octo aut decem ejus Grana pro dosi exhibentur sive sub forma Pulveris sive sub forma Pillularum.*

**AMARA DULCIS**, *Marella, Douce amere, Je længer je lieber.* Recipiuntur Stipites duriusculi, flavidi, subangulares, rugosi, tuberculis hinc inde exasperati, inodori, amari cum præcedente quadam dulcedine. *Solanum Dulcamara L. Black-*

*well Tab. 34. Sanguinis Depurandi gratia commendatur. Stipites recentes exsiccatis præferuntur, Drachmæ duæ ad tres pro dosi ex aqua decoquantur.*

**AMBRA**, *Ambra grigia, Ambre gris.* Est Bitumen, quod in variæ magnitudinis frustis ad nos adducitur, intus gryseis, extus nigricante crusta tectis, ex lamellis cum aliqua tenacitate fragilibus formatis, levibus, ad candelam facile liquefcentibus, vix non totis in auras evolantibus. Odor integræ sibi relictæ Ambra non fortis est, sed calori admotæ, aut cum aliis substantiis mixtæ & in pulverem tritæ fragrantissimus. Ipsa seorsum in pulverem cogi nequit. Ambra Ambrosiaca L. In omni mari, quod Asiam, Africam & Jamaicam alluit, reperitur, sive ipsi innatans, sive rupibus littoris accreta. Ambra Vulgatior L. & omnes ejus varietates arte sunt paratæ. Ob fragrantem, quem spirat, odorem aliis substantiis adjicitur, quarum magnum volumen exigua ejus portio gratissimo odore imbuat. *Ad vim Nervæam excitandam & augendam multum confert; cui vero scopo idoneam dosin ad triginta usque Granorum pondus extendi debere recentiora experimenta docent. Datur cum Saccharo in Pulverem trita aut Alkohole dissoluta & tunc ESSENTIA AMBRÆ dicitur. Adjicitur quoque Asperginibus cosmeticis, Balsamis, Suffimigiis.*

**AMBRA LIQUIDA.** Est Balsamum Peruviano spissius, fuscum, sapore præditum acri, aromatico, odore fragrante styracino; dicitur obtineri ex inciso cortice Liquidambar Styracisfluæ L. Arboris in Virginia, Carolina & Regno Peruviano crescentis; apud nos in frigidario asservandæ. Olim roborando Ventriculo inungebatur & gratiæ ergo medicamentis internis admiscebatur; hodie ei Styracem solent substituere.

**AMETHYSTUS.** Est gemma post Adamantem & Rubinum durissima, coloris pulchre violacei & columbini. A *Valerio.* Rubini species habetur. Ex Persia, Arabia, Armenia, India Occidentali ad nos adducitur; reperitur quoque in Gallia, Hungaria, Saxonia. In officinis ipsi sive Crystallum coloratum violaceum



*Wall.* substituunt, quæ est varietas violacea Nitri lapidosi quartzosi octodecaëdri L. *Amethytus Occidentalis* dicti, sive Fluorem spathosum violaceum *Waller.* sive Aluminis lapidosi calcareo-spathosi, diaphani, rasilis L. varietatem; passim in montibus Europæ occurrentes. *Omni virtute medicata caret.*

**AMIANTHUS**, *Amianto*, *Asbestus*, *Alumen plumosum*. In officinis synonyma Lapidem significantia ex fibris parallelis laxius inter se cohærentibus & aliquantum flexilibus constantem, grysei vel viridescantis coloris. Amianthus fragilis fibrosus, fibris separabilibus, rigidis, nitidis, fragilibus L. Passim in montibus Europæ offenditur. *Interdum, consilio non admodum laudando, Irritandi causa Cuti inspergitur.*

**AMOMUM**, *Pimenta*, *Piper Jamaicense*, *Nagelein-Kæpffe*. Fructus variæ magnitudinis, Pisis crebro majores, subrotundi, badii, rugosi, umbilico notati, biloculares, in utroque loculo continent semen fuscum, compressum, rugosum, rotundum, odorem spirant inter Caryophyllos & Cinnamomum medium, saporem acrem emittunt. *Myrtus Pimenta* L. *Blackwell* Tab. 355. Arbor Jamaica propria. Olei in Aqua subsidentis  $\frac{1}{4}$  fundere dicitur. Baccæ immaturæ decerpuntur, sole exsiccandæ. *Medias inter Antophyllos & Caryophyllos vires Aromaticas edunt.*

**AMOMI SEMEN** exiguum est, gryseum, striis eminentibus sulcatum, odoris levioris, saporis aromatici linguam ferientis, non ingrati. Sison Amomum L. *Blackwell* Tab. 442. Crescit in Anglia & Europa calida, nostras hyemes fert. *Laudabatur olim ob vires Carminativas & Diureticas.*

**AMMI**, *Creticum* & *Vulgare* prostat. **CRETICUM** sistit femina exigua, striata, ovata, convexo-plana, sapore amaricante & aromatico prædita; odorem exsiccata nullum habent. Sison Ammi L. Europæ Australis & Orientis civis, planta annua, apud nos sub dio coli potest. **VULGARE** femina exhibet exigua, fusca, striata, saporis aliquantum aromatici, odoris vero vacua. Desumun-

tur ab Ammi Majore L. Cum priori non idem tantum solum natale habet, sed eodem etiam modo apud nos colitur. Fundunt hæc semina Oleum destillatum & a virtute Carminativa & Diuretica laudantur.

**AMMONIACUM GUMMI**. Est succus concretus, qui sub majoribus massis in calore molliusculis ad nos adducitur, ex grumis flavescentibus constans, quibus ingens granorum numerus lactei coloris, Ungues sive *Amygdalas* appellant, inheret. Quo uberiori horum unguium copia G. Ammoniacum abundat, eo melioris notæ esse putatur; odor fortis non gratus, sapor amarus & acriusculus. Calore funditur; totum ex aqua, quam lacteam reddit, suspendi patitur; Spiritus Vini ejus dimidium circiter dissolvit. Plantam unde obtineatur, ignoramus; ex deserto Africae Barca Alexandriam & inde ad nos perducitur. *In Resolvendo præcipua ejus laus ponitur. Datur Menstruis Aquosis dissolutum, aut in formam Pilularum redactum ad Drachmam semis pro dosi; Syrupum quoque inde parant. Extus sub forma Cataplasmati aut Emplastris adhibetur. Si ungues recipiuntur, nulla depuratione opus est; neque Aceto squillitico dissolutum & denuo inspissatum vires edet eo efficaciores.*

**AMMOMIACUS SAL**, *Salmiack*. Adducitur ad nos ex Ægypto forma panum rotundorum, convexo-concavorum, vertice crasso & eminente instructorum, a substantia pellucida, salina efformatorum; saporem habent salinum, odorem levissimum. Paratur in Ægypto sublimationis ope ex fuligine, quam excrementa brutorum suppeditant. Paratur quoque Sal Ammoniacus in Germania, Gallia & Anglia, quin etiam nativum montes ignivomi & Calmucorum regio largiuntur; sed ex Ægypto allatus in nostris saltem officinis est usitatissimus. Constat ex Acido Salis & Alkali volatili, quod inter terendum cum Alkali fixo aut Calce inde secedit, & valide nares ferit. *Incidendi ergo sub forma Pulveris aut Aqua dissolutus ad Drachmam unam aliquoties de die, extus autem sub forma*



*Fomenti contra Gangrænam & Scabiem adhibetur.*

**AMYGDALÆ**, *Mandole, Amandes, Mandeln*. Nuclei oblongi, jam ventricosi, jam compressi, partim dulces, partim amari sub epidermide rubro-brunnea, sicca, scabra, medullam albißimam & firmam continent. *Amaræ* ut plurimum compressæ sunt epidermidis rugosæ, odoris tenuissimi. Sunt qui longas *Jordanicas*, latas *Hispanicas*, parvas *Barbaricas* appellant. Desumuntur ex Amygdalo communi L. *Blackwell* Tab. 105. In Europa temperata & Australi, Oriente & Barbaria obvia est. Ope Infusionis in aqua fervida medulla facile ab epidermide separatur. Oleum inde expressum albißimum, insipidum, non nisi Amygdalas redolet, nucleorum circiter dimidium æquat; frigore quod thermometrum Reaumurianum ad septimum infra cyphram gradum deprimit, cogitur, parcius illud amaræ largiuntur. *Amygdalæ dulces Nutriunt & Demulcent*, sive, ut sunt, comedantur, sive a coquis & cupedinariis varia ratione præparentur. Medici illas sub Emulsionis aut Morsulorum forma præscribunt. Ad medicamenta Cosmetica quoque recipiuntur. *Amaræ*, quarum amarities, multis animalium generibus pernicio-sa, Oleo inde expresso neutiquam accrescit; nonnihil acrimoniæ habent. Exigua earum quantitas prioribus non raro gratiæ ergo adjicitur. Emulsiones inde paratæ multum ad fugandas Febres intermittentes, pistilli vero ope in pastam redactæ ad delendas Vultus maculas laudantur. Residuum ab expressione Olei sub **FURFURUM** nomine abstergendis sordibus Cutis inservit.

**MYLUM**, *Amido, Amidon, Stærke*. Frusta parva, angularia, friabilia, inter digitos crepula, facillime in pulverem tenuerrimum terenda, insipida, inodora, efformata a fecula farinæ aqua macerata. Quævis farina illud largitur, sed vulgo paratur e Tritici speciebus, unde panis coquitur. Palpabili viscedine instructa cum aqua cocta in formam Gelatinæ spissæ glutinantis vertitur. *Demulcendi & Glutinandi* ergo tam extus quam intus adhibetur.

Tom. I

**ANACARDIUM OCCIDENTALE**, *Acaju, Acajou, Elephantenlaus*. Nux reniformis, glabra, fusca, convexo-plana continet sub cute densa, tenaci, quæ quidem in nucibus ad nos translatis siccißima est, nucleum album, dulcem, pellicula subfusca obductum. *Anacardium Occidentale* L. *Blackwell* Tab. 369. Arbor in utraque India crescens. In Indiis cortex rodente succo scatens rejicitur. *Nucleus Nutriendi* ergo comeditur. *Ejus* inter nos usus obsolevit.

**ANACARDIUM ORIENTALE**. Nux nigra, splendens, utrinque compressa, margine incrassato, pedunculo crasso, rugoso instructa, sub putamine denso, materie nigra, splendente intus obducto, nucleum album, dulcem includit. Arboris in Suratta crescentis character nos latet, *Ceterum quæ sub antecedente monuimus, hic quoque notanda veniunt.*

**ANAGALLIS**, *Anagallide, Mouron, Gauchkeil*. Cauliculi cum foliis asservantur, ovato oblongis, integerrimis, acris & amari saporis; *Anagallis arvensis* L. *Blackwell* Tab. 43 & 274. Crescit in omni Europa, præter magis septentrionalem. *Avi Antimelancholica* olim laudabatur, hodie *Antilysam* celebrant. Sub forma Pulveris ad Scrupulos quatuor de die datur, *Vulneri* quoque inspergitur.

**ANAS**, *Anitra, Canard, Ente*. *Anas Boschas* L. Vulgaris in cortibus Europæ avis, unde caro mensis imponitur. *Axungia* alba, insipida & inodora scopo Emolliendi per se, sive unguentis immixta, adhibetur.

**ANCHUSA** videatur **BUGLOSSUM**.

**ANETHUM**, *Aneto, Anet, Dyll*. Folia duplicato sunt pinnata, pinnis pinnatifidis, laciniis angustissimis, odore gravi, sapore aromatico: *Semina* sunt ovata, fusca, marginata, striata, compressa, una superficie levissime convexa, altera plana, odoris levioris, saporis aromatici. *Anethum Graveolens* L. *Blackwell* Tab. 545. Planta annua Europæ Meridionalis indigena, in hortis colitur. *Seminis* Unciæ sexdecim, unam Unciam Olei destillati largiuntur. Cl. *Baumé* ex Herbæ recentis nongentis & sexaginta Unciis se-

B

fqui-



fquinciam Olei odorati obtinuit. *Vi Carminativa gaudet. Recipitur ad Infusa & Decocta. Aquam inde destillatam & Oleum infusum quoque adhibent.*

**ANGELICA.** *Radices ex crasso capitulo multas fibras emittunt, dimidium circiter pedem longitudine æquantes, calamo anserino angustiores, extus ex cinereo nigricantes, intus albas, subspongiosas. Sapor aromaticus, salinus, cum quadam amaritie, odor proprius, fortis. Semina sunt ovata, obtusa, convexo-plana, tribus sulcis eminentibus exarata, marginata; odore radicibus similia, sapore mitiora. Angelica Archangelica L. Blackwell Tab. 496. Alpium civis, in nostris hortis colitur, planta biennis. Ex Radicum Libra una Cartheuser Drachmam unam Olei obtinuit. Resolvit Mucosam spissitudinem, Sudorem pellit. Olim ob vim Alexipharmacam laudabatur. Infusum Spirituosum præ aquoso præstare dicitur. Datur sub forma Infusi. Scopo Apophlegmatico. Radix masticatur. Sylvestrem in hortis cultæ multo præstantiorem asserit Linneus. Inconsulto nostræ plantæ substituitur Angelica Sylvestris L. Ubivis fere in locis humidis Europæ obvia.*

**ANGLICUM SAL CATHARTICUM Epsenense.** *Natrum fontanum L. Crystallo exiguae lineares quidem, ad figuram Parallelogrammi accedunt, in aqua facile solubiles, saporis amari, cui aliquantulum acrimoniæ accedit; in aere humescens, superiori seculo ex fonte Angliæ Epsenensi obtentum per orbem divendebatur. Hodie ex variis Fontibus foteriis, nec non ex Aqua marina, Salinam inde communem excoquendo, solet parari. Constat ex Acido Vitriolico & proprio terrarum Alcalinarum genere, quod hodie Magnesiam albam dicunt. Aliquid Salis Ammoniaci fixi ei admixtum esse videtur. Sal Epsenense, quod in Salinis Lotharingicis paratur, est verum Sal mirabile Glauberi, cujus solutio, dum in Crystallos abit, agitur ut Crystallo exiguae surgant. Datur ad Unciam semis Incidendi & Urinam dicendi scopo; ad Uncias usque duas Cathar-*

*tico sine, decuplo & ultra Aquæ dissolvitur, & solutio per cyathos exhibetur.*

**ANGUILLA,** *Anguilla, Anguille, Aal.* *Muræna Anguilla L. Hepatis & Exuviarum usus exsolevit. Illud in duos lobos, quorum sinister major est, divisum nullius saporis est. Hæ, pitulosi odoris, superiore parte ex viridibus nescunt, inferiore ex luteo albescent. Axungia oleum consistentia, odore, sapore unguinosum refert. Abstergerendi ergo adhibetur.*

**ANIME GUMMI,** *Courbaril.* *In frustis variæ magnitudinis nobis affertur. Lutescit, superficiem habet farinaceam, diffractum candem splendentem exhibet; odorem suavem spirat; sapor leviter resinofus est; sub dentibus ductile evadit & calore manus; igne funditur & gratum fumum emittit. Alcohole & Oleis dissolvitur. Olei destillati tantillam exhibere dicitur. Ex Hymenæa Courbaril L. Arbore Brasiliensi extillat. Ad Suffitus contra morbos Catarrhales recipitur.*

**ANISUM,** *Anice, Anis.* *Semina pedunculata, ovata, ventricosa, striata, albida, odore suaveolente, proprio, sapore dulci cum leviori aromate sunt prædita, Pimpinella Anisum L. Blackwell Tab. 374. In Ægypto & Syria sponte quidem provenit, sed & apud nos hodie passim in agris colitur. In Hispania collectum ab Alona denominatum reliquis magnitudine cedit; aromate præstat. Oleum destillatum citrinum, dulce, semine acrius. Ex seminibus Unciis sedecim Drachmæ circiter duæ Olei obtinentur; illud in aëre temperato in massam albam, lammellosam, splendentem cogitur. Magna copia in Thuringia paratur per Germaniam & Belgium inde divendendum. Efficacius Seminis vires a Spiritu Vini quam ab Aqua extrahuntur. Resolvente, Carminativo, Roborante scopo cibus adjicitur, sub forma Pulveris, Confectionis sicæ, Infusi, Decocti, Aquæ destillatæ, Spiritus abstracti exhibetur. Oleum destillatum in Elæosaccharum reducere, vel scopo externo Linimentis Carminativis adjicere vulgo mos est.*

**ANISUM STELLATUM,** *Anice della China, Anis de la Chine, Stern-Anis. Fructus*



bus rugosus, capsulis ad octo usque in orbem compositis, ovatis, fuscis, superne hiantibus constans. Singulæ capsulæ unum semen includunt, ovatum, sub cortice splendente, spadiceo, fragili, nucleum albidum continens; odoris proprii ad præcedens accedentis, saporis dulcis & aromatici. Oleum destillatum funderè dicitur. Illicium Anisatum L. Arbor in China & Tartaria crescens. *Vires antecedentis exsequitur. Datur sub forma Infusi, vel Spiritus abstractitii.*

ANSER, Oca, Oie, Gans. Anas Anser domesticus L. Vulgaris in cortibus avis. Saginati Hepar ad insigne volumen excrescit, ob egregiam saporis sui gratiam mensis valde acceptum. *Axungia quæ alba est, insipida, inodora Vires emollientes habet.*

ANSERINA, Bodentilla, Argentine, Genserich. Folia cum impari pinnata, pinnis ovalibus inciso-ferratis, sensum magnitudine crescentibus, subtus villosa, inodora, levissime adstringentia Potentilla Anserina L. *Blackwell Tab. 6.* Passim crescit per Europam. *Adstringentes & Diureticas vires habere dicitur. Datur sub forma infusi.*

ANTHOPHYLLI, Madri dei Garofani, Mères de Giroffles, Mutternägelein. Sunt capsulæ ovato-cylindraceæ, utroque extremo angustatæ, inferne exiguo pedunculo instructæ, umbilico quadrifido coronatæ, in cujus medio exiguus stilus eminet; sub cortice fusco & tenero hæret semen nigrum, splendens, sinu longitudinali divisum. Odorem quidem & saporem Caryophyllorum aromaticorum, sed leniorem habent. Sunt fructus Caryophylli Aromatici L. *Blackwell Tab. 338.* Sponte crescit in Nova Guinea; colitur in Amboina & Gallicis Asiæ Insulis. *Caryophyllorum vires quoque, sed multo debiliores habent.*

ANTHORA, Giftheil. Radices nigricantes albam medullam includunt, ex capite rotundo angulato, crasso, subito in caudam gracilem terminantur; sapor lenissime acris, odor nullus. Aconitum Anthora L. *Blackwell Tab. 562.* Alpium

civis, nostras hyemes impune fert. *Vis venenis resistens Arabum commento nisa evuluit, aliis innoxia, venenata esse aliis dicitur. Consultius duxerim medicamento nondum satis explorato, prorsus abstinere.*

ANTHOS, videatur ROSMARINUS.

ANTIMONIUM, Stibium, Antimonio, Antimoine, Spiesglas. Substantia fossilis, nigro-plumbei coloris, insipida, inodora, ex æquis partibus Sulphuris & proprii Metallii, quod Regulum dicunt, constans. Eruitur e terra partibus terrestribus contaminatum, & tunc Minera Antimonii dicitur. Depuratur ollæ in fundo perforatæ, & prunis cinctæ commissum, unde liquidum migrat in ollam priori suppositam, remanente in ista altera, quicquid ipsi terrestrium particularum adhæserit. *Sanguinem Depurandi gratia, ad morbos Cutaneos & Arthriticos adhibetur. Datur ad Drachmam unam pro dosi sub forma Pulveris, Pilularum, Morsulorum. Recipitur quoque ad Decocta aquosa.*

APALACHINE, Te del Paraguay o del Missipi; Thée du Paraguay ou de Missipi: hoc nomine superioribus annis afferebantur fragmenta foliorum ovatorum, flavicantium, sapore leniter acri instructorum. Decerpi hæc folia dicuntur a Cassine Peragua L. Virginie & Carolinæ frutice, apud nos per hyemem in tepidario asservando. Recentia hujus fruticis folia amarissima deprehenduntur. *Vomitum & Alvum ducere, Infusum eorum aquosum apud Americanos crebro in usu esse, ab effectibus Calculosis defendere dicuntur. Hodie eorum usus exsolevit.*

APARINE, Aparine, Grateron, Klebkraut. Asservantur cauliculi cum foliis oblongis, verticillatis, in quolibet verticillo senis & ultra; pilis rigidis obfessi, inodori & insipidi. Galium Aparine L. *Blackwell Tab. 39.* Ubivis in Europa occurrit. *Resolvendi & Aperiendi ergo olim laudabatur, hodie succum inde expressum in morbis Cutaneis debellandis efficacem se probasse compertum est.*

APER, Cinghiale, Sanglier, Wildschwein. Sus scrofa L. frequens in sylvis occurrit; Caro eximii saporis mensis relinquitur; officinæ inde Dentes caninos,



*Défenses*, *Fangzæbne* recipiunt, in arcum flexos, tribus faciebus longitudinalibus instructos, totos cavos, in animali anno-fiore flavicantes. In *Pleuritide* commendantur & sub forma *Pulveris* sive *Mixturae* medice exhibentur.

**APIUM**, *Ipposelino*, *Ache*, *Eppich*. *Radix* ex capite crassiore aliquot fibras dimittit, sub epidermide flava carnem albam includit, saporis acriusculi ad *Pastinacam* accedentis, proprium quoque odorem spirat; *Radices*, a varietate *Celeri* dicta desumptæ, cuticula nigricante tectæ, istis crassiores sunt, sapore etiam & odore gratiores. *Apium* *Graveolens* L. *Blackwell* Tab. 443. In Europa præter maxime Septentrionalem sponte crescit. Varietas *Apium dulce* *Celeri* dictum in hortis colitur. *Semina* parva sunt, cinerea, sulcata, odorem minus gratum spirantia, aromatica, amaricantia, aliquid Olei odorati fundere, & *Radices* ope Alcoholis Saccharum largiri dicuntur. *Radices* & *folia Celeri* ad usus cibarios, *Radices Apii Sylvestris* *Resolvendi*, *Aperiendi*, *Urinam* ducendi causa, ad *Decocta* & *Infusa* recipiuntur. Apud nos *Radices Celeri*, *Sylvestri* vulgo substituantur. *Seminum* idem, qui obtinuerat, usus exsolevit.

**AQUILEGIA**, *Ancoline*, *Aglei*. Flores quinque petalis planis & totidem cornutis, quæ *Nectaria* dicuntur, efformati, cœrulei, inodori, insipidi. *Semina* ovata, exigua, nigra, nitida, nonnihil medullæ albæ & dulcis includunt; torcular inde Olei viridis  $\frac{1}{4}$  circiter exprimit. *Aquilegia Vulgaris* L. *Blackwell* Tab. 409. Passim per Europam, præter Maxime Septentrionalem, occurrit. *Laudatur ob vim Resolvendi*, hodie exsolevit.

**ARABICUM GUMMI**, *Gomma Arabica*, *Gomme Senegal*. Advehitur ad nos sub forma frustorum variæ magnitudinis, extus rugosorum, plus minusve luteo vel fusco tinctorum, intus splendentium, fragilium, inodororum, insipidorum. Quo saturioris coloris est, eo habetur vilius. Quod a *Senegal* denominatur, majora & pallidiora frusta sistit, grana inde tota, alba ad certa præparata seligi solent, for-

didissima *Gummi Turique* aut *Turris* constituant. Conjecturam, quam semper fovi, non unam tantum aut alteram, sed plures *Mimosæ* L. Species hoc *Gummi* fundere, illustris *Adanson* iudicio confirmatam video. Nec Spiritu Vini, nec Oleis dissolvitur. Quadruplum Aquæ in consistentiam Syrupi densat; vires Saponis edit, *Mercurium* ex Aqua suspendit. Nutriendi viribus instructum. Relaxandi & Demulcendi ergo in frequenti usu est; ejus *Drachma dimidia* sub forma *Pulveris* vel *Linctus* exhibetur. Extus *Collyriis* admiscetur & *Ulceribus* acri humore madentibus inspergitur.

**ARANEA**, *Ragno*, *Araignée*, *Spinne*. *Aranea Domestica* L. ubivis occurrit. A quibusdam in Pulverem redacta laudatur contra Febres. Telæ partibus vulneratis imponuntur.

**ARBOR VITÆ**. Hinc recipimus *Folia* pinnata, pinnis alternis, non raro uno latere denuo pinnatis, ex squamis ad se invicem appressis efformata, cum splendore viridia, odoris evidenter resinosi ejusdemque saporis, cui pungens aroma & nonnihil amari accedit. *Thuya Occidentalis* L. *Canadæ* & *Sibiricæ* indigena in nostris hortis colitur. Ob vim *Resolvendi* sub forma *Decocti*, sive in Unguenti formam redacta folia contra Rheumatismos & Tussim laudantur.

**ARDEA**, *Airone*, *Heron*, *Reiger*. *Ardea cinerea* L. Avis passim in Europa occurrens. *Axungia* axungius quadrupedum paulo mollior, alba, nullo proprio odore distincta. *Podagricis* maxime commendatur.

**ARGENTUM**, *Argento*, *Argent*, *Silber*. Metallum album, aqua undecies gravius, inter Aurum & Regulum Antimonii, ratione caloris quo funditur, inter Aurum & Ferrum, ratione firmitatis medium locum tenet; in omnibus Acidis, præter Aquam Regis solubile, nec Nitro, nec Vitro Saturni destructibile. Nonnisi purissimum in officinas recipiendum, quod quidem vel detonatione cum Nitro vel per reductionem Lunæ cornuæ obtinetur. Vires medicatas nullas edit; olim in tenuissima folia dilatatum



et cultro in exiguas lamellas dissectum or-  
natus gratia Pulveribus addebatur, hodie  
adhuc Pilulis obducitur.

ARGENTUM VIVUM, videatur  
MERCURIUS.

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS, TE-  
NUIS. *Londin. Aristologia di Vite, Aristolo-  
che de Vigne, Osterlucy. Radices longæ,  
fibrosæ, digito minimo angustiores, ex-  
tus rufæ, intus pallidæ; Longis & Ro-  
tundis minus acres & minus amaræ. Folia sunt cordata, obtusa, angulis pos-  
ticipis rotundatis, firma, glabra, acrius-  
cula Aristolochia Clematidis L. Black-  
well Tab. 255. Crescit in Europa tem-  
perata. Radices cum Longis & Rotundis  
sint multo debiliores rarissime in usum tra-  
huntur. Folia Vino macerata tamquam Vul-  
nerarium Polychrestum a nostratibus usur-  
pantur.*

ARISTOLOCHIA FABACEA, *Höhl-  
wurzel. Bulbos five Radices exhibet sub-  
rotundos, supra & infra compressos, fu-  
scos, five vacuos, five carnem albidam  
includentes; bulbi vacui solidis majores  
sunt; odor nullus, sapor eorum amarus  
est. Fumaria bulbosa L. Blackwell Tab.  
534. Crescit per omnem Europam præ-  
ter magis Septentrionalem. Ad Lumbri-  
cos necandos & Catamenia pellenda in In-  
fuso Vinoso vel Spirituoso olim adhibebatur.*

ARISTOLOCHIA LONGA, *Aristolo-  
gia longa, Aristolochie longue, lange Osterlu-  
cey. Radix fibrosa, pollicem circiter cras-  
sitie, semipedem longitudine æquans,  
obtusa, rugosa, extus tenuiter fusca,  
intus ex luteo albens, odoris teneri, sa-  
poris amari, acriusculi, aromatici. Ari-  
stolochia longa L. Blackwell Tab. 257.  
Europæ Australis civis, apud nos per  
hyemem in frigidario asservanda. Ape-  
riendis Menses ducendi, morbos Arthriticos  
sanandi scopo datur sub forma Pulveris, vel  
Infusi Vinosi. Ulceribus sordidis inspergitur;  
ejus Decoctum Fistulis injicitur.*

ARISTOLOCHIA ROTUNDA. Ra-  
dices exhibet ex pluribus tuberibus con-  
cretas, rugosas, extus ejusdem cum præ-  
cedente, sed magis diluti coloris, intus  
rufas, sapore istis longe acriores & ama-  
riores. Aristolochia rotunda L. Black-

well Tab. 256. In eadem cum antece-  
dente patria crescit, in frigidariis quo-  
que nostris contra hyemem defendenda.  
*Cum Longa easdem, sed efficaciores vires  
habet.*

ARMENIACA, *Morilli, Albicocca, Abri-  
cots, Abricosen, Nostratibus Mœllelein. Drupæ plus minusve ovatæ, variæ magni-  
tudinis, pulpam gerentes flavam, grate  
olentem & dulcem, Nucem includen-  
tem, cui sub testa ossea Nucleus inest  
globosus, ventricosus, sub tunica fla-  
vente medullam albam, grate amaram  
continens. Prunus Armeniaca L. Black-  
well Tab. 281. In hortis nostris colitur.  
Fructus, ut ceteri horrei omnes vires sa-  
ponaceas exserunt; Rob. inde paratum.  
MARMELADA dici solet: Nuclei tam  
forma, quam sapore ad Aniygdalas  
amaras accedunt.*

ARMENIUS LAPIS. Est Minera Cu-  
pri, lapidem referens cœruleum minus  
durum, cum Acidis effervescentem Cu-  
prum Armenus L. Passim in montibus  
metallicis reperitur. *Vi Æris, quo scatet,  
Vomitum valide agit Alvumque ducit, qua-  
propter nunquam in usum trabendus. Pessi-  
mo consilio interdum Lapidem Lazuli substi-  
tuitur.*

ARMORACIA, *Ravano, Raifort, Meer-  
rettig. Radices cylindræ, in varios  
ramos diffusæ non raro brachium hu-  
manum crassitie æquant, totæ albæ; na-  
res & palatum insigni saporis acumi-  
ne vellicant, quod quidem exsiccatione  
& coctione mitigatur; comestæ spiritum  
odore alliaceo contaminant. Olei odo-  
rati in Aqua fundum petentis Grana  
quindecim ex Libra una Radicum obti-  
neri asseritur. Cochlearia Armoracia  
L. Blackwell Tab. 415. Per Europam  
passim spontanea, apud nos in agris co-  
litur. Vires Incidentes, Antiscorbuticas, An-  
tarthriticas, Diureticas Radix edit. In vi-  
cem Oleris cum carne coquitur, aut rasa  
cruda una cum ea comeditur. Datur scopo  
medicato, cum Vino vel Cerevisia infusa,  
vel cum aqua cocta, vel in Syrupum re-  
ducta, ejus Succum unum aut duo cochlearia  
propinantur. Epispastico scopo Uncia semis  
Cuti imponitur.*



**ARNICA**, *Bettonica delle Montagne, Bettoine des Montagnes, Wohlverley*. Radices fibrosæ gravi nares irritantes odore, sapore lenissime amaricante, acri instructæ, fuscæ, striatæ, calamum anserinum crassæ, intus albæ. Folia ovato-oblonga, utrinque tomentosa, sapore dulciusculo, cui nonnihil salini & levissime amari accedit. Flores asservantur e calyce evulsi, flavi, amari cum insigni acrimonia. Arnica montana L. In montibus altioribus passim per Europam crescit, difficiliter in hortis colitur. Ad Resolvendum in Sugillationibus ab injuriis externis, morbis Mucosis, Obstructionibus Viscerum Abdominalium, Paralyti &c. Herba & Flores exhibentur. Sed has Plantæ partes, & Flores quidem validius etiam quam Herbam, Nauseam, Vomitum & Cardialgiam excitasse non raro observatum est; quapropter Herbæ & Flores sub medicationis initium ad parvas partes misceri & cum tribus Unciis Aquæ non nisi unica hujus miscelæ Drachma propinari solent, ita ut sensim ratio Herbæ imminuatur, ac soli denique Flores exhibeantur eadem Dosi ternis vel quaternis horis repetenda. Radices recentissime a virtute Roborante, & perinde ac tota planta a vi Antiseptica laudari cœperunt in Diarrhæis & Dysenteris. Dantur sub forma Pulveris ad Scrupulum unum vel Drachmam semis aliquoties de die.

**ARSENICUM ALBUM**. Substantia salino-metallica, manifestum Acidum vehens, si ab omni, quod ipsi accrescere solet, heterogeneo fuerit depurata, alba evadit, iuxta vero ratione fusa in Semi-metallum nigricans abit, volatilis, prunis superimposita Allium spirat, linguæ levem saponem imprimit. Ex proprio eam Acido & Principio inflammabili constare recentissima experimenta evincere videntur. Obtinetur ex Mineris varii generis, passim in Metallis fodinis obviis. Forma alba splendens, sub qua in officinis prostat, obtinetur, dum Alkali fixo junctum sublimatur. Ejus Dosis quantumvis exigua vel ore hausta, vel extus applicata vehementissima symptomata excitasse, imo homines necasse crebrius iusto est observatum, & quanquam sunt, qui illud ad varium

morbi genus commendent, tamen cum sit Venenum deterrimum, non nisi cum circumspeditione sollicitissima a Pharmacopolis vendendum censeo.

**ARSENICUM FLAVUM**. Est Arsenicum, cui subdecuplum circiter Sulphuris mediante sublimatione junctum est; ejus facies ab antecedente, nonnisi colore differt; quod natura passim & præcipue in Hungaria largitur, **AURIPIGMENTUM**, Orpiment, Operment Pyrites Auripigmentum L. dicitur. Ceterum tam artificiale, quam Nativum, quo magis splendet, eo melius putatur. Pictores sub nomine *Königsgelb* in usu habent. Licet Arsenicum Sulphure cicurari facile largiar, nulli tamen unquam Auctor sim, ut Arsenicum Sulphuri unitum ad usus medicatos adhibeat.

**ARSENICUM RUBRUM**, *Risigallo, Realgar, Sandaracque, Rubis Arsenical*. Partim a Natura subministratur, Arsenicum Sandaraca L. passim in Metallifodinis obvium, partim arte paratur, unam Sulphuris partem cum quinque partibus Arsenici fundendo, unde massa rubra vitriformis surgit. Nec hoc ad usus medicatos recipiendum, sed Pictoribus relinquendum est.

**ARTEMISIA**, *Artemisia, Armoise, Beyfus*. Folia inde recipiuntur pinnatifida, pinnis latiusculis dentatis instructa, subtus tomentosa, aromatici & amaricantis saporis. Artemisia Vulgaris L. *Blackwell* Tab. 431. Vulgaris per Europam & Orientem planta. Laudatur maxime ad morbos Uteri. Datur sub forma Infusi aut Syrupi; ad Balnea quoque & Pediluvia recipitur. Ex summitatibus Artemisiæ exsiccatis, contusis & usque tritis, quoad cortex externus decidat, fibræ internæ lanuginosæ remaneant, quas postea carminant, Japonenses & Chineses inde substantiam tomentosam, gryseam, quæ *MOXA* dicta, ignem facillime recipit, sine flamma gliscentem, donec tota in favillam abierit. Convolvunt Moxam in bacilliformam crassitie calami anserinum, longitudine aliquot pollices æquantem, hunc bacillum membro Arthritide aut Rheumatismo laboranti imponunt & scintilla accensum relinquunt in favillam redigendum. Huic vero scopo



*scops Gossypium Moxa optime posse substitui, compertum est.*

**ARUM**, *Gichero, Aron*. Radix tuberosa, unde epiermidem solent auferre, albissima, ovi columbini magnitudinem æquans, farinosa, friabilis, qui Radici recenti inest, sapor exsiccatione multum mitigatur. Arum maculatum L. *Blackwell* Tab. 228. In Europa temperata copiose provenit. A varis gentibus tam in cibus recipitur, quam loco Saponis ad mundanda lintea adhibetur. Ejus Pulvis cum Aqua coctus in spissam mucilaginem vix acrem convertitur. A Medicis cum summo successu ad attenuandum Mucum recipitur. Datur ad Drachmam dimidiam pro dosi. Superflua est ejus sive cum Vino Preparatio & omnino Pulvis Fœculis præstat.

**ARUNDO**, *Canna, Roseau, Rohr*. Exhibet Radices prælongas, geniculatas, ex flavo albas, sapore dulci præditas. Arundo Phragmites L. Per omnem Europam obvia. A vi Demulcente & Aperiente Radices olim laudabantur; in quarum locum Radice Graminis successerunt.

**ASARUM**, *Asaro, Cabaret, Haselwurzel*. Radix ex capite, quod parvum est, aliquot fibrillas emittit, extus gryseo-brunea, intus alba, odore forti ad Valerianam accedente, sapore acri, aromatico. Folia longius petiolata sunt, reniformia, superne profunde viridia, inferne pubescentia, inodora, lenissime acria. Asarum Europæum L. *Blackwell* Tab. 383. Passim in Europa obtinet. Vomitum excitant & Radix & Folia, illa sub forma Pulveris ad Scrupulos duos, in Infuso ad Sesquidrachmam, horum sub forma Infusi Scrupulus semis exhibetur. Coctione omnem vim Emeticam destrui compertum est. Admiserunt etiam ad aliquot Grana medicamentis, Errhinis, in quibus Radicem Foliis etiam validorem esse contendunt.

**ASCIA**, *Sorta di Sermone, Ombre, Asche*. Salmo Thymallus L. Fluviiis Europæ inhabitat. Caro exquisita, mensis imponitur. Axungia, quæ consistentiam Olei unguinosi refert, colorem ex flavo rufum, odorem tenuem, saporem nullum habet. Abstergerendi scopo ad Ulcuscula Oculorum & Aurium adhibetur.

**ASPALATUM**, videatur **ALOES LIGNUM**.

**ASPARAGUS**, *Asparago, Asperge, Spargel*. Turiones in usus cibarios cedunt. Radices ex capite crassiore multas fibras longas dimittunt, cinerascens, striis longitudinalibus notatas, sub cortice paululum lutescente medullam albam includentes, dulcescente sapore præditas. Asparagus Officinalis L. *Blackwell* Tab. 332. Per omnem Europam, præter maxime Septentrionalem, sponte quidem crescit, sed nonnisi in terra multum stercoreata cultus in usum trahitur. Radices a vi Aperiente laudantur, & cum aqua decoquuntur, cui evidenter nonnihil acrimoniæ affricant.

**ASPHALTUM**, *Bitumen Judaicum*. Est Bitumen gravi odore nares feriens, sapore levissime resinoso instructum, colore nigro, Picem referente, fractura splendente. Bitumen Asphaltum L. Olim ex Judææ Mari mortuo extrahebatur, unde ei nomen mansit. Hodie passim per Orbem invenitur. Extus Vulnerario vel Discutiendi scopo sub forma Emplastri, Unguenti, Suffitus adhibetur.

**ASPHODELUS**, *Goldwurzel*. Radix flava ex multis squamis composita, odore vacua, sapore evidenter mucilaginoso. Lilium Martagon L. In omni Europa, præter maxime Septentrionalem, offenditur. Maturandi gratia Abscessibus imponitur.

**ASPLENIUM**, videatur **CETERACH**.

**ASSA DULCIS**, videatur **BENZOES**.

**ASSA FOETIDA**, *Teufelsdreck*. Succus concretus, qui ad nos pervehitur in grumis variæ magnitudinis, fuscis, flavo-dilutis, moleculis albis, aliquantum pellucidis distinctis, admodum tenacibus, cum quadam arimonia amariusculis, odorem virosum, alliaceum egregie spirantibus, in Oleis expressis ex parte, in odoratis nequaquam solvendis, ex Aqua suspendendis. Creberrime hi grumi massis resinosis nigricantibus, magnis, aridis inhærent, quæ tum massæ dicuntur *Assa foetida in sorten*. Obtinetur ex incisa Radice Ferulæ Assæ foetidæ L. Persiæ civis. Olei odorati trigesimam



secundam sui ponderis partem fundere est observata. Et *Anodynas & Resolventes vires edit*; contra *Tussim convulsivam*, morbos *Hystericos*, *Vermes*, *Tympanitidem*, *Febres inveteratas*, *Cariem* laudatur. Datur ad *Scrupulos* duos pro dosi in *Pilulas* redacta. Extus ad *Sustitus & Clysmata* nec non ad *Emplastra* adhibetur.

**ASTRANTIA**, *Autruche noire*, *Schwarz Meistervurzel*. Radix extus nigra, intus alba fibrosa levem modo acrimoniam linguæ impessit, illa certe, quæ in nostri hortis adolevit. *Astrantia* major L. *Blackwell* Tab. 470. *Alpium* civis, nostras hyemes impune fert. *Alvum* ducere dicitur; hominibus non exhibetur, *Veterinariis* interdum in usum venit.

**TRACTYLIS**, *Spindel*, *wilde Cardebenedikten*. Folia sistit ovato-oblonga, laciniis acutis in spinas terminatis, pinnatifida. *Carthamus lanatus* L. *Blackwell* Tab. 468. Planta annua Europæ Meridionalis indigena. A quibusdam olim scopo *Aperiendi* sub forma *Infusi* adibebatur.

**ATRIPLEX**, *Atreplice*, *Arroche*, *bonne ou belle Dame*, *Milten*, *Melten*. Folia triangulæria, velut farina conspersa, mollia, pro varia varietate mox rubra, mox alba. *Atriplex hortensis* L. *Blackwell* Tab. 99. Asiæ Septentrionalis civis passim in hortis colitur: apud nos mense Octobri feritur, ut in culinis, quoad folia Betæ adoleverint, horum vicem sustineat. Ob vires *Emollientes* a quibusdam laudatur.

**ATRIPLEX FOETIDA**, *Atrepice fetida*, *Arroche fœtide*, *Hundsmellen*. Folia ovata, angulata, exigua, pollice conspersa, nauseosum, pisculentum odorem spirantia, insipida. *Chenopodium Vulvaria* L. *Blackwell* Tab. 100. Passim in Europa offenditur. A nonnullis ad morbos *Uterinos* sub forma vel *Infusi* vel *Balnei* commendatur.

**ATRIPLEX SYLVESTRIS**, *Atrepice Selvaggia*, *Arroche sauvage*, *Wilde Melten*. Recipiuntur Folia ovato-oblonga, utrinque attenuata, dentata, subtus candicantia, insipida & inodora. *Chenopodium rubrum* L. Ubique in cultis Europæ provenit. A vi *Emolliente* passim laudatur.

**AVELLANA**, *Nocciuola*, *Noisette*, *Ha-*

*selnuss*. *Nuces* mox ovatæ, mox oblongæ, spadiceæ, rubræ, flavicantes, sub testa fragili umbilico notata nucleum album continent, pellicula sive alba, sive rubra tectum, suavis & proprii odoris, nec diversi saporis. *Lignum Coryli* nomine notum albidum est & leve, odoris & saporis expers. *Corylus Avellana* L. *Blackwell* Tab. 293. Passim in Europa sponte crescit, plura ejus genera in hortis colimus. *Avellanæ* sui ponderis dimidium *Olei Unguinosi* fundunt, quod ipsas redolet, cæterum *Amygdalino* simillimum est. Mensis apponuntur, & ne recentibus deficientibus prorsus destituamur *Avellanis*, nostræ tabernæ asservant *nuc*es istius generis, quod in *Abbellino* Regni *Neapolitani* agro colligitur, nobis *Ræmische Haselnüssen* dictæ, saporis gratia recentibus haud impares. Adjiciuntur *Avellanæ Emulsionibus & Morsulis* tam ob gratiam, quam propter aliquantam vim *Adstringentem*, qua præditæ virtutem *Amygdalarum Relaxantem* temperare creduntur. *Ligni* usus & *Olei Empyreumatici*, distillatione inde obtinendi, quod **OLEUM HERACLINUM** appellabatur, evuluit; illud enim omnino iners est, hoc præ aliis *Oleis Empyreumaticis* nihil proprii habet.

**AVENA**, *Vena*, *Avoine*, *Habern*. Semina strigosa, utrinque acuta, convexo-plana, cortice gryseo, nigro, flavicante, albo vestita, sulco notata, medullam albam & dulcem exhibentia. *Avena sativa* L. *Blackwell* Tab. 422. Colitur in agris. *Amyli cinerei*, benegultinantis dimidium sui ponderis & eandem rationem *Mucilaginis* albæ & pellucidæ *Avenam* largiri est observatum. *Panis* inde conficitur niger & amarus; amara quoque *Cerevisia*. *Avena* in ptisanam redacta *Grualtum* dicitur, quod ex Jure coctum suavissimum edulium, nutritiens, digestu facile *Refrigerans*; *Demulcendi*, *Refrigerandi*, *Putredinem arcendi* ergo ex *Aqua* coquitur.

**AURANTIA**, *Oranger*, *Pomeranzen*, *Melarancia* Folia ovato-oblonga, firma, petiolo cordiformi sustentata, sapore aromatico amaricante & odore fragrante prædita. Flores a voce Italica *Nanfa*, quæ



quæ Aquam fragrantem, denotat Flores Naphæ dicti, albi sunt, pentapetali, gratissimum odorem spirant, qui exsiccatione una cum albedine imminuitur; sapor amarus est, paululo aromatis mixtus. Poma magnitudine admodum inter se diversa, ut plurimum rotunda, parvo umbilico notata, in superficie lævi interdum punctis aut rugis exasperata, flava, pulpam includunt sive flavicantem, sive rubram, grate olentem, partim dulcem, partim amaram, vinosam, continentem Semina subovata, basi oblique truncata, striata, lenissime odora, amara. Cortex pomorum dulcis vel amarus, est fragrans, aromaticus. In officinis Cortices nonnisi amari exsiccati asservantur, quos substantia, quæ ipsis intus adhæret albescente & fungosa privatos Flavedinem Aurantiorum quidam etiam Cortices Curassavenses appellant. Aurantia immatura viridia sunt, maturis fragrantiora, eminentiore acrimonia distincta, a quibusdam Curassavica dicta, sed minus congruè, cum propria Malorum varietas in Americæ Insula Curassao crescat, quæ longe fragrantissima esse asseritur. Citrus Aurantium L. Blackwell Tab. 349. Asiæ indigena Arbor, hodie per Americam & Europam Australem copiose in hortis colitur, apud nos in frigidario ab injuria hyemis defendenda. Flores & Folia Destillatione, Cortices recentes Expressione Oleum largiuntur odoratum quod Quintam Essentiam dicunt; sed propria fragrantia se commendat id, quod Varietas, Bergamotta dicta, exhibet. Oleum rubrum fragrantissimum, quod ex Floribus obtinetur Oleum Neroli appellatur, cui vulgo Oleum Behen cum Floribus Naphæ infusum solent substituere. Folia exsiccata sub forma Pulveris contra Epilepsiam dantur. Flores recentes Analeptici sunt. Ope Sacchari in Confectionem siccam redacti, mensis secundis apponuntur. Syrupus inde paratus, tanquam blandimentum gustus, medicamenti adjicitur. Ad eundem scopum & insuper ad usus Cosmetichos Aqua Naphæ aque ac Oleum Neroli adhibetur. Pulpa Aurantiorum dulcium Refrigerandi ergo as-

sumitur, Scorbuticis & Febri decumbentibus egregie conducit; Pulpa Aurantiorum amarorum quibusdam cibis adjicitur. Aurantia immatura præcipue parandæ vel cum Vino Hispanico vel cum Spiritu Vini ESSENTIÆ egregie Stomachicæ & Carminatae inservit. Ad scopos eosdem recipiuntur Cortices, qui vel sub Conditis sicci forma, quod ex Italia obtinemus, tam comeduntur, quam ad Morculos recipiuntur, vel tanquam Conditum liquidum Electuaria ingrediuntur, vel Infusis vel Decoctis aquosis aque ac vinosis adjiciuntur, vel Aqua inde aut Spiritus Vini abstrahitur.

AURICULA JUDÆ, Fungi Sambuci, Orecchie di Giuda, Oreilles de Judas, Höl-derschvammchen. Fungi membranacei, sessiles, explanati, superficie superne minutissime tomentosa, inferne glabra, in sulcos elevata & in sinus his respondentes depressa, nigricante, insipidi, inodori. Peziza Auricula L. Blackwell Tab. 334. Nonnisi extus Discutiendi ergo ad morbos Faucium sub forma Gargarismatis adhibetur, aut Oculis inflammatis, aqua emollita, imponitur.

AURICULA MURIS, Pes Cati, Pilsella, Hispidula, Piede di Gatto, Pied de Chat, Katzendöplein. Folia ex angustiore origine in finem obtusum & ellipticum exeuntia, superne viridia, inferne tomentosa, odore nullo, sapore levissime adstringente instructa. Flores tubulosi, calice rotundo, sicco, roseo comprehensi, odoris & saporis expertes. Gnaphalium dioicum L. Per omnem Europam obvium. Leniter Adstringit; Infusis Pectoralibus adjicitur; Syrupus inde paratur. Flores præ Herba in frequentiori usu sunt.

AURIPIGMENTUM videatur ARSENICUM FLAVUM.

AURUM, Oro, Or, Gold. Metallum aqua vigecuplo fere gravius, medio inter Argentum & Æs gradu ignis funditur & dum fluit smaragdino colore fulget; ratione firmitatis medium inter Argentum & Ferrum gradum tenet, amplissimam distensionem patitur, nonnisi Aqua Regis & Hepate Sulphuris dissolvitur; Sulphuri, Vitro Saturni, Nitro nullæ sunt in illud vires. Reperitur Nativum sub varia figura, interdum



moleculis divisum adeo minutis, ut omnem visus aciem fugiat. Passim in Montibus & Fluviis Europæ offenditur. *Quæ respectu usus medicati de Argento dicta sunt, huc quoque pertinent.*

**AZEDARACH.** Folia pinnata, pinnis petiolatis ovato-oblongis, irregulariter dentatis, acutis inodora, amara. *Melia Azedarach* L. Europæ Meridionalis & Syriæ indigena, cum *Aqua decocta Vias Urinarias & Uterum evacuare, nec non Pediculos necare dicuntur; vulgo habetur venenata, quod vero ipso effectu nondum satis compertum videtur.*

**BALAUSTIA** videatur **GRANATUM.**

**BALLOTTA,** *Marrobio nero, Marrubium nigrum, Marrube noir, schwarzer Andorn.* Folia cordata, petiolata, albidula, minus grato odore æque ac sapore, qui levissime linguam ferit, instructa. *Ballotta nigra* L. *Blackwell* Tab. 136. *Vulgaris Europæ planta. Cum aqua infusa contra morbos Hystericos a nonnullis laudatur.*

**BALSAMITA,** *Costo, Costus hortensis, Coq, Frauenmünz.* Folia ovata, obtusa, obtuse ferrata, albidula, proprium ad *Mentham* accedentem odorem spirant, saporem amaricantem evidenter aromaticum emittunt. *Tanacetum Balsamita* L. *Blackwell* Tab. 98. *Europæ Australis civis, nostri climatis patiens. A vi Stomachica & Emenanoga laudatur.*

**BARBACAPRÆ,** *Ulmaria, Ulmaria, Reine de Prés, Geisbart.* Radix fibrosa, aliquot modo pollices longa, digitum minimum crassa, fusca, intus alba, undique fibrillas emittit, odorem, si diffringitur, proprium non ingratum spirat, sapore adstringit. Folia sunt pinnata, pinnis ovato-oblongis, inferne albicantibus, inciso-dentatis, progrediendo crescentibus, pinnis majoribus minuta interposita sunt; odore carent, sapore levissime adstringunt. *Spiræa Ulmaria* L. *Blackwell* Tab. 465. *Crescit promiscue per Europam. Radices ad decocta, Folia ad Infusa Adstringendi scopo adhibentur.*

**BARBAREA,** *Erba di S. Barbara, Herbe de St. Barbe, wilder Kressen.* Fo-

lia lyrata, laciniis denticulatis, summa magis ovata, obtusa, profunde dentata, odore levi, sapore *Nasturtino* instructa. *Erysimum Barbarea* L. *Per omnem Europam vulgaris. A quibusdam mensis imponitur. Ejus Succus expressus, aut Fuscula inde parata Antiscorbuticos edunt effectus.*

**BARDANA,** *Bardana, Glouteron, Kletten.* Radix fibrosa, fusiformis, crassa, foris nigricans, intus alba, subdulcis. Folia cordata sunt, superne obscure viridia, rugosa, subtus tomentosa, crenata, leniter adstringunt. *Arctium Lappa* L. *Blackwell* Tab. 117. *Ubivis in Europa, in America Septentrionali quoque progignitur. Radices Resolvendi ergo copiose in Decoctis usurpantur; Folia ad eundem scopum extus adhibentur, Ulceribus quoque imponuntur.*

**BASILICUM,** *Basilisco, Basilic.* Folia subsucculenta, ovata, acuta, glabra, integerrima, fragrantem odorem spirantia, grato & aromatico sapore instructa. Semina sunt exigua, oblonga, nigra, insipida & inodora. *Ocimum Basilicum* L. *Blackwell* Tab. 104. *Indiæ indigena, annua planta copiose in hortis nostris colitur. Oleum fragrans abunde fundere observatum est. Ad cibos condiendos adhibetur. Rarius Infusis Nervinis aut Pulveribus sternutatoriis adjicitur. Semina sunt inertia.*

**BDELLIUM.** Affertur ad nos sub forma massarum majuscularum ex rubro fuscarum, earum portiones selectæ, a fordibus purgatæ ferre pellucunt, interdentes friabiles sunt, eisque levissime adherent, odor tenuis, sapor evidenter amarus est. *Bdellium* igne non funditur, fumum emittit suaveolentem. Alcohol æque ac aqua ingens ejus portio dissolvitur, ab Oleis intactum relinquitur. Ex Arabia & India venit, sed plantæ genus quod ipsum fundit, ignoratur. *Resolvendi ergo tam intus quam extus adhibetur; ejus accensi fumus Hæmorrhoidibus mederi prædicatur.*

**BECCABUNGA,** *Bachbungen.* Caules teretes succulenti, foliis vestiti succulentis, ovato-oblongis, obtusis, ferratis,



tis, dilute viridibus, glabris, saporem levissime acrem cum quadam adstrictione continent. Veronica Beccabunga L. *Blackwell* Tab. 48. Passim in Europa obvia. Contra Scorbutum præcipue commendatur, recipitur ad Juscula, Succus inde expressus ad quatuor Uncias usque propinatur.

BEHEN ALBUM. Radix fibrosa, longa, albida, levi odore & sapore acriusculo prædita. Centaurea Behen L. Asiæ Septentrionalis civis. Ab Arabibus ab vires Cordiales laudata omnino exsolevit.

BEHEN NUCES, Balani Myrsifici. Nuces triquetrae, Avellanae magnitudinem æquantes, sub cortice albido & fragili Nucleum pingui, amarum, pellicula nivea & fungosa tectum includunt. Guilendina Mohringa L. *Blackwell* Tab. 386. Arbor Indiæ progenies. Vim Purgandi & Viscera subvertendi habere dicitur, quæ posterior earum usum antiquavit. Frequentius usurpatur Oleum inde expressum, sextam circiter earum ponderis partem æquans, limpidum, omnis odoris & saporis perinde expers, aëre temperato spissescit, tarde rancescit. Præcipuus ejus usus est apud Unguentarios, qui hujus virtute odores ex Vegetabilibus fragrantibus extrahunt.

BEHEN RUBRUM. Radix ad nos peregre affertur sub forma taleolarum rugosarum, profunde rubrarum, sapore adstringente, odore nullo præditarum. Statice Limonium L. *Blackwell* Tab. 481. Syriæ civis, hyemes nostras fert. A vi Adstringente laudatur; Arabibus multum celebrata exsolevit.

BELEMNITES, Lapis Lyncis, Alpschos. Lapis, qui ex basi lata, sensim in verticem acutum exit, intus aliquanta altitudine tenuis cavo conoideo exsculptus est, omnis reliqua substantia interna splendet, striis ab axi ad peripheriam porrectis efformata, color falernus magis minusve dilutus, multum etiam variat longitudine & crassitie; fricatus eorum odorem refert. Helmintholithus Belemnites L. Copiose per omnem Europam occurrit; vulgatissimum Alsatia

petresactum. Omnes quæ ipsi adscribuntur vires anilibus fabulis, Signaturæ commentis debentur.

BELLADONNA. Folia ovata, oblonga, integerrima, odoris nullius, saporis sub adstringentis, leviter acris. Atropa Belladonna L. Bacca Cerasorum speciem referentes purpureo & fatuo succo turgent. *Blackwell* Tab. 564. Copiose occurrit per Europam, præter magis Septentrionalem. Innumerae Observationes de deleterio omnium plante partium effectu exstant, quibus constat, minusculam earum dosin Sensus internos turbavisse, Convulsionibus & Sopore homines occidisse. Neque tamen defuerunt, qui baccas intus dederunt, sed harum usus hodie evuluit. Folia nostra ætate crebrius contra Cancrum usurpantur, sub forma Infusi, a paucis Granis incipiendo; sensim major eorum numerus adbibetur, minuendus tamen simulac Caput gravari inde aut Vertiginem excitari sentiat æger. Extus Mammis scirrhis imponentur.

BELLIS MAJOR, Margheritina maggiore, Bellis pratensis, Grande Marguerite, Gænsblumen. Folia oblonga, obtusa, profunde dentata, insipida. Chrysanthemum Leucanthemum L. *Blackwell* Tab. 42. Passim per Europam obvia planta. Olim a vi Diuretica & Antipthysica laudabatur; sub forma Infusi exhibenda.

BELLIS MINOR, Margheritina minore, petite Marguerite, Maaslieben, Zeitlosen. Folia parva obtusa, levissime dentata, longis petiolis instructa, levissime acris. Flores radiati, radio albo, calyce hemisphærico imbricato sustentati, odore carent, saporem habent lenissimum. Bellis minor L. *Blackwell* Tab. 200. Invenitur ubivis. Laudatur contra morbos Pectoris. Folia sub forma Acetarii exhibentur, Flores in Infuso, Conserva, Syrupo.

BENGALENSIS NUX, videatur MYROBALANI.

BENZOES, Assa dulcis, Belgivino, Benjoin. Magnæ ejus massæ ad nos perferuntur, quarum superficies texto junceo, quo involuta erant, signata est, conflatae sunt ex laminis rubro-fuscis, quibus grana variæ magnitudinis, Un-



*gues* vel *Amygdalæ* dicta, inhaerent, fragiles & friabiles; odorem gratum spirant, sapore præditæ balsamico & dulci; quo sunt massæ pellucidiores unguibusque refertiores, eo Benzoë putatur præstantior. Croton Benzoë L. Arbor Indiae indigena. Benzoë calore liquatur & gratum fumum emittit; nec Aqua, nec Oleis dissolvitur; nec si aqua inde abstrahitur, ullum Oleum destillatum fundit. In Spiritu Vini dissoluta *Tincturam Benzoës* constituit, quæ Aquæ instillata *Lac Virginum* efformat *usibus Cosmeticis inserviens*. *Rarissime intus scopo Balsamico exhibetur, extus de Suffimigia recipitur.*

BERBERIS, *Berberi, Epine Vinette, Saurau*. Radices fibrosæ ad insignem omnino magnitudinem excrescunt, sub cortice rugoso & fusco carnem croceam intense amaram includunt. *Baccæ cylindricæ, umbilicatæ, sub epidermide translucente pulpam includunt scatentem late rubro succo intense acido, qui nonnisi post aliquot pruinas, quibus circumfusæ bacca sensim sensimque rugosæ fiunt & nigriores mitescit, & palato gratus evadit, Semina rugosa sunt, subteretia, apice obtusa, styptico sapore imbuta; Berberis Vulgaris L. Blackwell Tab. 165. In omni Europa, Oriente quoque & America crescit. Radix Purgantes vires edere dicitur & ad Aperendas Hepatis Obstructiones laudatur, sub forma Decocti exhibenda. Baccæ ob vim Refrigerantem, Antiphlogisticam & Antisepticam commendantur. Succus sanis æque ac ægrotis sub forma Gelati, Conditi, Syrupi, Rotularum propinatur.*

BETA, *Bieta, Poirée, Mangold*. Folia subsucculenta, magnis & latis petiolis innexa, ovata, obtusa, ad marginem plicata, subbullata vel pallida vel rubra vel crocea, sapore subdulci instructa; Beta Vulgaris Cicla, rubra, lutea L. In Europa Occidentali & Meridionali crescit; apud nos copiose in hortis colitur; *Folia Radicalia in usum culinarum recipiuntur, Medicinæ rarissime inserviunt, imponuntur cuti, cui Epidermis fuerit ablata. Varietas, quæ est Beta rubra radice Rapæ L. Blackwell Tab. 235.*

quæque in hortis colitur, subministrat Radicem, ex crasso capite subito in caudam gracilem exeuntem, totam purpuream; exstat ejus Varietas flava, levis odoris & saporis dulcis; Extractum ista aquosum, rubrum, intense dulce, Spiritus Vini ope autem Saccharum exhibere dicitur, *Aceto condita cum Carne comeditur, Succus inde expressus scopo Errhino adhiberi solet.*

BETONICA, *Bettonica, Betoine, Betonien*. Folia cordato-oblonga, obtusa, profunde, crenata, rugosa, insipida; Flores labiati, purpurei & inodori. *Betonica Officinalis L. Blackwell Tab. 46. Copiose per Europam offenditur. Vires Cephalicæ, quas olim huc plantæ adscripserunt cum experientia non sint probatæ, usus ejus medicatus fere evilit; Errhino scopo Pulvis præscribitur.*

BETULA, *Betulla, Bouleau, Birke*. In usum trahitur Succus, qui ex trunco, primo vere ante frondescentiam terebra efforato, stillat, limpidus, leviter dulcescens. *Betula alba L. Blackwell Tab. 24. Betulæ Succum multo minus Mellaginis evaporationis ope edere, quam Succum Aceris, observatum est. Datur per aliquot continuas Septimanas ad Uncias viginti quatuor de die Sanguinem Depurandi, & Vermes expellendi causa. Oleum Empyreumaticum ex cortice paratum Lithuanicum vel Russicum dicitur, præ aliis hujus tribus Oleis nihil proprii in Medicina præstare videtur.*

BEZETTA. Hoc nomine veniunt lintea cannabina rubra seu cœrulea, quibus ad infucanda Gelata, Trochiscos &c. utuntur; priora ope Coccionellæ in Turcia parari dicuntur, posteriora in Gallia Australi tinguntur Heliotropii succo, ope Alkali volatilis ex Urina, exaltato.

BEZOAR DE COROMANDEL. Lapidēs variæ magnitudinis, partim rotundi, partim oblongi, læves, cum quodam splendore; inveniuntur, qui utrimque compressi sunt, ex albo-grysei, evidenter ex stratis efformati, inodori, insipidi. Desumi dicuntur ex Trichecho Manato L. *Eadem quæ de reliquis prædicantur, huic quoque tribuuntur vires.*



**BEZOAR OCCIDENTALIS.** Calculus Bezoar L. Dicuntur Calculi, qui sub diversissimis figuris & variante multum magnitudine occurrunt, evidenter ex squamis efformati, non splendentes, nec cum Acidis effervescentes, coloris cinerei, cui interdum aliquid nigri accedit, insipidi & inodori. Ex variis Animalibus desumuntur & ex America adduci dicuntur.

**BEZOAR ORIENTALIS.** Calculus Bezoar L. Variam tam figuram quam magnitudinem habet, & hujus quidem diversus gradus diversum etiam ipsius pretium constituit; superficiem ostendit lævem, politam, splendens, color cum virore mistus nigricat, effingitur ex stratis sibi invicem incumbentibus, quorum intimum cavitatem sistit interdum vacuam, interdum variam substantiam heterogeneam condentem; cum Acidis non effervesceat, odoris ac saporis perinde expers est. Desumitur ex Capra Bezoardica L. in Persia occurrente. Lapidem hos prorsus inertes esse ratio pariter ac experientia evincunt. Plures factitii proflare dicuntur; sed certum characterem, unde genuini ab his distinguantur, nulum habemus.

**BISMUTHUM, Wismuthum, Marcasita.** Est Semimetallum Plumbo albius, ex tessellulis majoribus efformatum, facile in pulverem terendum, præ omnibus reliquis corporibus metallicis minore igne fluens, in Acidis Vitrioli, Nitri & Salis dissolubile, igne in vitrum flavum fundendum. Sive Nativum sive sub forma Glebæ metallicæ passim per Europam reperitur. *De ejus in Corpus humanum efficacia plane nihil liquet.*

**BISTORTA, Schlangen, Natterwurzel.** Radices subcylindraceæ, incurvæ, interdum aliquoties flexæ, pollicem crassæ, extus profundius rubræ, intus pallidæ, transversim rugosæ, saporis multum adstringentis. Polygonum Bistorta L. *Blackwell* Tab. 254. Crescit in omni Europa, præter magis Septentrionalem. *Ad Decocta Adstringentia tam interna, quam externa recipitur.*

**BLATTA BYZANTINA, Operculum**

esse dicunt Muricisramosi L. qui in Sinu Persico & Jamaica obtinet, *A fragrantia laudatur. Sed ejus usus prorsus exolevit.*

**BOLETUM CERVINUS, Hirschbrunst.** Est Tuberis genus, ad magnitudinem Juglandis usque excrescens, multis figuris ludens; exsiccatum, prouti in officinis prostat, sub cute sicca, tenaci, flavicante, copiosissimum pulverem nigrum includit, saporis & odoris expers. Lycoperdon Cervinum L. Passim per Europam obvium. Nec ex liquore genitali Cervorum gignitur, nec vires Aphrodisiacas habet. *Effectus Bovistæ edit.*

**BOLUS ALBA.** Argilla bolus alba L. Est Argilla alba, quæ in nostris officinis sub forma frustorum aliquot pollices longorum minus vero latorum & crassorum prostat, manifeste admodum pinguis. Passim reperitur.

**BOLUS ARMENA.** Bolus Orientalis, Argilla Lemnia L. pallide rubrum colorem habet, tactu pinguis & glabra. Diversissimas terras hodie hoc nomine venire rectissime *Ludwig* monet. Ex variis Europæ locis adducitur.

**BOLUS RUBRA.** Sub frustis Bolo albæ similibus magis siticulis, pignibus & rubris prostat. Bolus Argilla rubra L. Ex Germania nobis affertur. *Inefficacem ad scopos medicatos omnem Argillam esse hodie satis superque compertum est.*

**BOMBAX, Cotone, Coton, Baumwolle.** Semina angulatam, ovata, tormentosa, viridescencia, sub cortice fragili nucleum album includunt, inodora, levissime dulcia. Gossypium herbaceum L. Indiæ indigenum in Europa maxime Meridionalis colitur. Apud nos semper in vaporario retinendum, siquidem fructum inde expectamus. *Emolliendi & Demulcendi ergo olim adhibebatur.*

**BONUS HENRICUS.** Folia superne, glabra, subtus glauca quasi pulvere conspersa, triangulari-hastata, inodora, insipida. Chenopodium Bonus Henricus L. Vulgatissima per Europam planta. *Interdum ad Cataplasmata Emollientia recipitur.*

**BORAX.** Sal qui ex India sub forma Crystallorum variæ magnitudinis ad nos



advehitur, virescentium, creberrime cortice albo pulverulento obduatarum tactu pinguiuscularum, saporem lixiviosum linguae imprimendum, & talis *Tincal*, *Tincar*, *Borax crudus*, *Borax Tincal* L. dicitur. Qui, cum nonnisi depuratus in usum trahatur, & olim Venetiis depuraretur, hodie adhuc *Borax Venetus* appellatur, quamvis maxima jam ejus quantitas, quæ quidem nostras officinas ingreditur, in Belgio depuretur. Formatur in Crystallum majores, multilateras, pellucas, quæ difficillime aqua dissolvuntur; prunis superimpositæ spumant, in vitrum spurium abeunt, fossilium fusionem promovent. Syrupum Violarum viridi colore tingunt, cum Acidis non effervescent. Constat ex proprio Acido & Alkali fossili. In Borace crudo Illustris Cadet Æs detexit. Incidentes & Abstergentes effectus edit, sed rarissime ad hos scopos adhibetur; ad Cosmetica quoque recipitur.

**BORAGO**, *Borraggine*, *Bourrache*, *Boretsch*. Folia, nullis petiolis sustentata, ovato-oblonga, obtusa, hirsutæ scabra, rugosa, inodora, sapore levissime salino linguam ferientia. Flores plano-patentes, cœrulei, quinquefidi, rotati, inodori, subdulces: asservantur calycibus evulsi. Borago officinalis L. *Blackwell* Tab. 36. Orientis & Europæ calidæ civis, in nostris hortis sponte disseminata luxuriat. Nitrum quod ex Foliis magni Viri obtinuerunt, ipsis non proprium est. Folia ad *Fuscula Refrigerantia* recipiuntur. Flores aspectus blandimenta tam Acetariis, quam Speciebus pro Infusis & Decoctis adjici solent.

**BOS**, *Bue*, *Bœuf*, *Ochs*. Taurus castratus. Inde recipitur *Sebum Suif*, *Unschlitt*, quod est Adeps ad renes maxime hærens, album, solidum, nauseoso odore instructum. Vires Oleorum unguinosorum exserit. Adhibent quoque in Ossibus cylindræis contentam *Medullam*, consistentia sua Sebo proximam, albam, rubore suffusam, inodoram, grati saporis. Ad Roborandum efficax habetur. Caro culinæ relinquitur.

**BOTRYS**, *Traubenkraut*, *Ambroisie*. Fo-

lla petiolata, oblonga, obtusa, profunde & irregulariter sinuata, laciniis alternis, dentatis, odore fragranti, balsamico, sapore linguam feriente, aromatico prædita. *Chenopodium Botrys* L. *Blackwell* Tab. 314. Europæ calidæ indigena, annua planta optime in nostris hortis coli potest. Oleum destillatum sebaceum fundere dicitur. Folia Resolvendi & Vermes arcendi causa sub forma Infusi exhibentur.

**BOTRYS MEXICANA**, *Te del Messico*, *Thea Silesiaca Romana*, *Thée du Mexique*. Folia lanceolata sunt, dentata, prioribus fragrantiora, fortiore etiam sapore linguam ferientia. *Chenopodium Ambrosioides* L. In Mexico & Europa calidiore crescit, planta annua in nostris hortis coli potest. Præcedente omnino præstantior, eadem ratione usurpatur.

**BOVISTA**, *Crepitus Lupi*, *Vescia del Lupo*, *Vesse de Loup*, *Bovist*. Est substantia laxa, levissima, spongiosa, ferruginea, odore nullo, sapore adstringente instructa, contenta in Lycoperdo *Bovista* L. Per omnem Europam obtinente. Ad sistendas Hemorrhagias in modum *Agarici Pedis Equini* facie adhibetur.

**BRASSICA**, *Cavoli*, *Choux*, *Kraut*, *Kohl*. Brassicæ Oleracæ L. plurimarum, quæ in hortis & campis nostris coluntur, varietatum, quæ omnes aquam quidem cum qua coquantur foetido odore insufficientes, sed dulci suo sapore palato gratæ, ideoque mensis frequentissime imponuntur, nonnisi duæ hujus loci sunt, *Alba* nimirum & *Rubra*. Folia *Albæ* obovata, glauca, pro ista unde desumuntur varietate, tam magnitudine, quam nervorum crassitie diversa, ante caulescentiam recipienda. Imponuntur Cuti, cui *Epidermidem Vesicantia* demserint: Sale condita & fermentata edulii genus inter lautitias etiam referendum, & remedium constituunt ad arcendum æque ac curandum scorbutum egregie efficax. Folia *Rubræ* petiolata sunt, subrotunda, rubra, rore cœrulescente perfusa, denticulata, sapore a vi adstringente nonnihil mutuantem. Ex Jure coquantur, aut in Syrupum rediguntur contra morbos Pectoris.



**BRANCA URSINA**, *Branche Ursine*, *Bærenklau*. Folia magna, pinnata pinnis lobatis, hirsuta, insipida & inodora. *Heracleum Sphondylium* L. *Blackwell* Tab. 540. Crescit in omni Europa. Per errorem pro *Acantho* habita, ad medicamenta Emollientia recipitur. Russi inde Spiritum ardentem parare dicuntur.

**BRITANNICA**, *wilde Rhabarber*, *Lapazio*, *Patience d'eau*. Radix fibrosa, magna, extus fusca, intus crocea, proprii, sed hebetis odoris, saporis contra acris, amari, adstringentis. *Rumex Aquaticus* L. Passim in Aquis Europæ reperitur. Resolvit, Roborat, leniter Aluum ducit, Obstructiones reserat, Sanguinem purificat. Datur ad Drachmas duas aqua decocta. Ejus Decocto quoque Ulcera scorbutica *Cacoëthea* lavant.

**BRUNELLA**, *Bonette*. Folia petiolata, ovato-oblonga, acute terminata, ferrata, exigue hirsuta, sapore subsalino instructa. *Prunella Vulgaris* L. *Blackwell* Tab. 24. Crescit ubique per Europam. Roborandi & Incidendi gratia ad Gargarismata recipitur.

**BRUSCUS**, videatur **RUSCUS**.

**BRYONIA**, *Brionia*, *Coulevrée*, *Zaunrube*. Radix fusiformis, valde crassa, extus flavicans, intus alba, striis longitudinalibus & circularibus, aspera, excidatur secta in taleolas, utraque sua superficie striis eminentibus ex medulla tanquam centro ad peripheriam ductis & variis circulis sectis distinctas, laxas, fungosas, intense nec sine quadam acrimonia amaras. *Bryonia alba* L. *Blackwell* Tab. 37. *Vulgaris Europæ* Radix valide Aluum ducit & olim, quando valida Purgantia indicari credebant, ad Drachmam semis in substantia, ad Drachmam unam in Infuso aquoso dabatur; hodie rarissime adhibetur. Radix recens comminuta & in Aqua frigida agitata in Amylum album, cum aqua concreescens, glutinans evadit; ad id accedunt *Fæculæ*, quæ bene elotæ Aluum ducendi virtute destitutæ perhibentur. Radicem recentem in taleolas sectam, tusam, cruribus ædematosi impositam, repetitis duodenis horis vicibus large aquas elicuisse, observarunt Auctores.

**BUFO**, *Rospo*, *Crapaud*, *Kræte*. *Rana Bufo* L. Vulgare per Europam Amphibium, pedes posticos minores & post oculos duplex tuberum genus habet. Non est venenatus, exsiccatus horrorem excitando Hæmorrhagias sistit; in cineres redactus aliis cineribus non præstat. A medicina omnino exsulat.

**BUFONITES**, *Batrachite*, *Crapaudines*, *Krætenstein*. Sunt Lapides rotundi, Avelanam magnitudine fere æquantes, convexo-plani, sive sub basi excavati, castanei ut plurimum coloris plus minusve diluti, insipidi, inodori. *Ichtyolithus Bufonites* L. Est Dens molaris cujusdam piscis marini, qui *Anarhichas* L. esse creditur. Reperitur per terram dispersus. Iners lapis ab usu medicato remotus.

**BUGLOSSUM**, *Ochsenzunge*. Folia oblonga, angusta, in acutum mucronem exeuntia, hirsuta, insipida, inodora; Flores infundibuliformes, quinquesidi, cœrulei, insipidi & inodori. *Anchusa officinalis* L. *Blackwell* Tab. 500. Passim in Europa obvia. Vires *Boraginis* ipsi adscribuntur.

**BUGULA**, *Consolida media*, *Bugola*, *Bugle*, *Golden Gynsel*. Folia ovato-oblonga, petiolata, obtusa, dentata, amara, aliquantulum hirsuta. *Ajuga reptans* L. *Blackwell* Tab. 64. Offenditur per omnem Europam, præter magis Septentrionalem. Recipitur interdum ad Gargarismata Roborantia.

**BURSA PASTORIS**, *le Tabouret*, *Tæschelkraut*. Folia ovato-obtusa, integra, dentata, pinnatifida, lyrata, glabra, vix umbram acrimoniæ referentia, inodora. *Thlaspi Bursa Pastoris* L. *Blackwell* Tab. 5. Refrigerandi & Adstringendi scopo olim laudata hodie eviliuit.

**BUTYRUM**, *Butirro*, *Beurre*, *Butter*. Est Lactis pinguedinis strenue agitatae coagulum; consistentiam habet spissioris Unguenti, colorem flavicantem, odorem proprium, saponem mitem. Coctio- ne non a partibus solum Lactis cascosis & serosis adhærescentibus purgatur, sed flavius, etiam spissius & grumosum, proprii præterea odoris & saporis efficitur. Butyrum integrum creberrime mensis im-  
impo-



imponitur. In morbis medendis vices Oleorum unguinosorum sustinet, extus æque ac intus adhibetur. Coctione nonnihil acrimoniae & Abstergentes vires induit.

**BUXUS**, *Bosso, Buis, Buchs*. Lignum solidum, duriusculum, pallide flavum, cortice cinereo, rugoso vestitum, inodorum, adstringens. *Buxus Sempervirens* L. *Blackwell* Tab. 196. Europæ Meridionalis indigena arbor sine negotio in nostris hortis colitur. Recipiebatur ad Decocta Sudorifera.

**CAAPEBA**, *Liane à Serpent*. Radix digitum crassa, fibrosa paululum intorta, striata, valde dura, exiguis tuberculis obsessa, intus quam extus nigrior, saporis subaromatici, salinum referentis, cum aliquali amaritie. *Cissampelos Caapeba* L. Frutex Americæ Meridionalis & Brasiliæ proprius. Aqua decocta contra morsus Serpentum & morbos malignos a quibusdam commendatur.

**CABBAGE BARCK**. Hoc nomine Angli asservant Cortices aliquot pollices plus minusve longos, convolutos, non crassos, colore extus cinamomeo, intus cinereo tinctos, interdum extus epidermide ex nigro cinerea instructos, inodoros, levissime linguam adstringentes. *Geoffræa inermis* L. *Wright* Phil. Trans. LXVII. p. 507. Jamaicae arbor. Maxime contra Vermes laudatur, quibus se viribus etiam in Europa probavit. Datur ejus Decoctum ad Uncias duas, Extractum ad Grana tria, Pulvis ad Semidrachmam. Dosis excedens modus Nauseam & Vomitus excitat.

**CACAO**. Nuclei ovato-oblongi, Amygdalarum fere magnitudinis, sub cuticula rufescente, non raro punctis albis distinctæ, includunt medullam ficcam, pinguem, in plures lobos divisam, extus fulvam, odore proprio, leni, sapore, grato, subacerbo, aliquantulum etiam amaro; optimi nuclei ex Nicuragua, Mexicani regni regione, ad nos transeunt, magnitudine & miculis albis cuticulæ inspersis, suaviore etiam sapore & largiore sua pinguedine præstantiores. *Theobroma Cacao* L. *Blackwell* Tab. 373. Americæ Meridionalis

indigena arbor. Nutritii nucleï, quorum usus circa medium seculi superioris in Europa innotuit, nunquam ut sunt, seorsum præscribuntur. Scite tostæ & calido prelo expressæ Olei albißimi, grate olentis, spissi tertiam fere sui ponderis partem largiuntur, quod *Butyrum* dicitur.

**CAFFE**. Semina ovalia, variæ magnitudinis, utrinque obtusa, convexo-plana, in facie plana sulco longitudinali notata, glabra, colore inter album & flavum medio, viriditatis etiam subinde nonnihil admittente, odoris exigui, saporis subadstringentis, leniter acerbi. *Coffea Arabica* L. *Blackwell* Tab. 337. Arabiæ felicitis propria arbor, hodie in Asiam, Americam Meridionalem, & Insulas Africae Meridionales translata, in his regionibus quoque uberrime provenit, apud nos semper in caldario asservanda. Semina in Arabia lecta reliquis omnibus præstant, sed Americana in ipsam Arabiam vehi & Arabicis immisceri Itineratores testantur, in Arabia lecta parvitate sua & albidior, eminentiore viriditate misto, colore distinguuntur; Arabicis proxima sunt, quæ Borbonica, Africae Insula largitur. Hi nucleï, quorum usus medio fere superioris seculi in Europa invaluit, nullum Oleum unguinosum largiuntur, nec nisi tosti in usum trahuntur, eorum saporis suavitas maxime a justo testionis in vasis clausis instituendæ & usque dum brunei evaserint, continuandæ modo pendet; Tostorum & comminutorum Uncia semis cum aquæ Unciis duabus unica modo ebullitione coquenda, & decoctum per filtrum trajiciendum est, quod quidem brunum, grato omnino odore & sapore amaricante exquisitissimo instructum, hauritur ut plurimum Saccharo edulcoratum. Neutiquam Sanguinem spissat, egregie Digestionem promovet, & noxas ab ea turbata oriundas præcavet & corrigit; incommoda, quæ inde nata observasse sibi nonnulli visi sunt, abusui aut idiosyncrasie debentur. Succedanea, quæ ipsi substituire conabantur, nulla votis responderunt.



**CAJEPUT OLEUM.** Est tenerum, album, cum quodam viroris vestigio, odore proprio perquam fragrante, sapore multum aromatico, momento contactus linguae frigoris sensum imprimentem præditum. Dicitur esse Oleum odoratum foliorum Melaleucæ Leucodendræ L. Indiæ Arboris, simillimum huic Oleum ex Cardamomo majore, Destillationis cum aqua ope, obtinetur. *Multum ob virtutem vehementiores Nervorum motus sistentem laudatur; ejus Gutta sex aut octo frusto Sacchari Canariensis instillata pro Dosi dantur.*

**CALAMINARIS LAPIS,** Giallamina, Calaminaire, Galmey. Est lapis variæ duritiei, ad Calybis ictum scintillas emittens, varii quoque coloris, creberrime flavicantis, Æs secum fuscum, aureo colore tingens. Zincum Calaminaris L. Passim ex collibus Europæ eruitur. *In pulverem redactus ad Aspergines aut Unguenta Exsiccanti recipitur aut ad Collyria.*

**CALAMUS AROMATICUS,** Acorus verus, Calmus. Radix cylindrica compressa, geniculata, lineis longitudinalibus & transversis notata, extus ex flavo rubens, intus alba, fungosa, odore grato, aromatico, sapore amaro, linguam feriente prædita. Acorus L. *Blackwell Tab. 466.* Passim in Europa, præter maxime Septentrionalem & calidam obviat. Olei destillati paululum largiri dicitur.

**ACORUS INDICUS** vel **ASLATICUS.** Acorus Calamus verus L. Indiæ civis, nostras hyemes facillime fert; ejus in nostro horto culti Radices prioribus magnitudine minores, uno latere convexa, colore gryseæ, carne solidiores, odore fortiores sunt. *Resolvendi & Ventriculū Roborandi ergo ad Infusa recipitur, Confectio ejus ad aliquot Drachmas pro dosi comeditur.*

**CALAMINTHA,** Nepitella, Calament, Bergmünze. Folia petiolata, ex ovatis oblonga, hirsuta, crenata, paulum odorata & aromatica. Melissa Calamintha L. *Blackwell Tab. 166.* Angliæ, Helvetiæ, Europæ Meridionalis civis, nostras hyemes fert. Præstat hac Melissa Nepeta L. cujus folia prioribus minora, Tom I.

magis ovata, emittente odore & sapore instructa. Iisdem cum priore locis vegetat. *Calamintha usum Melissa & Mentha suppresserunt.*

**CALCARIUS,** Pietra Calcaria, Calcaire, Kalkstein. Est Lapis, durus quidem, sed ex Chalybe nullas scintillas eliciens, varie coloratus, in Acidis cum effervescentia dissolubilis, igne duritiem exuens, causticus evadens, cum aqua multum incallescens, in aëre dilabens, cum aqua & sabulo in durissimum camentum crescens; igne causticus redditus Calx viva, Calce viva, Chaux vive, ungelæschter Kalk, & hac dilapsa, Calx extincta dicitur. Marmorude L. Copiosissimus ejus est proventus; integros montes & montium catenas efformans. Calcarius ad usum medicatos non recipitur; Calx viva intus si adhiberetur Veneni effectus ederet; extus Depilatorio scopo adhibetur.

**CALCITRAPPA,** Chauffe Trappe. Radices cylindroidæ, digitum crassæ, sub cortice gryseo substantiam albam includunt, odoris vacuum, saporis levissimi, Centaurea Calcitrappa L. Europæ calidæ & temperatæ civis. Corticis Drachmam Vino infusam, & per plures menses sumtam egregie Nephriticis opitulari asserebatur.

**CALENDULA.** Fiorrancio, Soucy, Ringelblumen. Flores asservantur ex calice evulsi, lutei, ligulati, exsiccatione omnem odorem & saporem amittentes, aquam, cui infunduntur, amaram reddentes. Calendula officinalis L. Europæ Meridionalis indigena, in nostris hortis colitur. Cum hi Flores exsiccatione omni odore priventur, hinc frustra inde Vires Alexiteriæ expectantur. *Aperiendi scopo cum aqua infunduntur.*

**CAMPECHIANUM LIGNUM.** Adducitur ad nos in magnis frustis, sub quorum superficie cærulescente, color sanguineus, odor nullus, sapor adstringens est. Hæmatoxylum Campechianum L. *Blackwell Tab. 493.* Americæ Meridionalis indigena arbor, apud nos semper in caldario asservanda, Arti tinctoriæ præcipue inservit. Extractum aquosum inde paratum ad Drachmam semis, Decoctum cum aqua ad Unciam semis exhibetur.



**CAMPHORA.** Sub forma placentarum majorum, rotundarum, convexo planarum, superne foratarum, crySTALLINA albedine conspicuarum, leviter flexibilium, fragiliuscularum prostat; odorem habet proprium, Cerebrum obnubilantem, saporem linguam afficientem, levissime amarum, evidentissimo frigoris sensu; aquæ immersa odorem & saporem suum impertit; supra aquam ardet, in Alcohole æque ac in Oleis dissolvitur, flammam capit & in Flores albos vertitur. Obtinetur ratione, quam in *Institutionibus Chemiæ* dixi, ex Camphora cruda, sub forma granulorum flavicantium ex Lauri Camphoræ L. *Blackwell Tab. 347.* Japoniæ arboris, apud nos in tepidario per hyemem asservandæ, foliis & ramis ex aqua coctis surgentium, stramineo lebetis operculo accrescentium. Camphoræ ex aliis Vegetabilibus obtinendæ vix officinas Pharmaceuticas ingrediuntur. *Intus Sopiendi ergo ad Drachmam semis, Antiseptico sine ad Scrupulum unum; in morbis Inflammatoriis ad Grana tria pro dosi, saponi cuidam juncta, sub forma Pulveris, Pilularum, Emulsionis, Julapii exhibetur; extus Fomentationibus, Epithematibus siccis, Cataplasmatibus &c. immiscetur.*

**CAMPHORATA.** Caules albidi, fasciculis foliorum minimorum, albidorum, aciculas referentium, obfessi, quorum ego in nostris quidem hortis neque odorem, neque saporem nullum detegere potui. Camphorosma Monspeliaca L. Europæ Meridionalis & Tartariæ indigena, apud nos in frigidario ab hyeme defenditur. *Resolvendi gratia ex aqua coquitur, Asthmaticis nec non Hydropicis a nonnullis exhibetur.*

**CANADENSE BALSAMUM.** Spissum est, adeo ut in aëre temperato non diffuat, tenax, in modum vitri pellucens nonnihil flavedinis subostendens, odore levi, resinoso, sapore amaricante, acriusculo instructum. Obtinetur ex Pinu Balsamea L. Canadæ arbore, nostræ hyemis patientissima. *Scopo Abstergendi & Consolidandi, nec non ad fines Antinephriticos ejus Drachma semis saponem soluta, sive in Pilulas recepta exhibetur.*

**CANCRO RUM CHELÆ.** Varia earum magnitudo est, basis quadrangula, eburnea quasi, cujus unum latus in tres quasi appendices diductum, contrahitur in modum coni leviter incurvati, inferne flavicantis, superne nigri; ad latus externum occurrunt tubercula exoleta; intus chelæ penitus cavæ, albæ, inodoræ & insipidæ sunt. Desumuntur a Cancro Pagiuro L. Oceani cive. *Virtutes Alexipharmacæ olim illis ad Drachmam semis sub forma Pulveris exhibendis adscriptas, recentior ætas abrogavit.*

**CANCRO RUM OCULI** sive **LAPIDES**, Occhi di Gambero, Yeux d' Ecrevisse, Krebsaugen. Calculi Oculi Cancris L. Substantiæ rotundæ, convexo-concavæ, recens quidem natæ cœruleæcentes, deinde albæ, ex lamellis sibi arcte incumbentibus compositæ, hærent inter utramque Ventriculi tunicam Cancris Astaci L. vulgarissimi aquarum dulcium infecti, Augusto mense, quo novum sibi thoracem struit, proprio odore & sapore instructi. Copiosissimi in Russia ad confinia Tartariæ ex infectis pistillo contusis colliguntur. *Vires præter Absorbentes nullas habent, in modum aliorum terreorum usurpantur. Caro Cancris Astaci evidenter quidem nutrit, sed nonnihil acrimoniæ, quod ipsi inest, non modo faucibus interdum molestum, sed quandoque etiam varios morbos excitasse observatum est. Nunquam nisi cocta in usum recipitur. Medici illam Jurebus Nutrientibus & Demulcentibus incoquant.*

**CANELLA ALBA.** Cortex crassiusculus, in tubum convolutus, fragilis, extus striis transversis notatus, flavicans, intus albus, aromatico odore, sapore acriusculo, amaricante instructus. VVinterania Canella L. *Blackwell Tab. 206.* Oleum odoratum fundere dicitur. *Scopo Roborandi & Resolvendi datur.*

**CANELLÆ CLAVELLI** videatur **CINAMOMUM.**

**CANIS**, Canes, Chien. Hund. Canis Familiaris L. Vulgarissimum animal. Stercus quod nobis exhibet, vide sub **ALBUM GRÆCUM.** Axungia alba, Unguenti tenuioris consistentia pollens Pe-



*floralibus ascribitur, intus & extus adhibetur. Catelli ob vires Nervinas, quas vero nemo adhuc satis firmis rationibus superavit, cum Oleo Olivarum coquantur. Hepar Canis rabidi contra Rabiem caninam suspectum mihi medicamentum esse videtur.*

**CANNABIS**, *Canapa, Chanvre, Hanf.* Fila in quæ Cortex scite preparatus ducitur, sive Emolliendi scopo, sive vehiculi loco extus adhibentur. *Semina* ovata, utrinque levissime compressa, uno margine acutiore, sub cortice levi, nitente, cinereo, spadiceo, fragili, album & dulcem nucleum includunt, tenera membrana involutum. *Cannabis sativa* L. *Blackwell* Tab. 322. Indiv. indigena, hodie per omnem Europam colitur. Semen tertiam circiter sui ponderis partem Olei viridis decimo quarto demum grada sub cyphra consistentis, largitur. Exsiccatione odorem Cerebrum inebriantem perdit, vires Emollientes edit, ad Emulsionem olim recipiebatur.

**CANTHARIDES**, *Cantarelle, Spanische Mücken oder Fliegen.* Insecta corpore oblongo, toto viridi, aureo, elytris viridibus, flexilibus, multis striis distinctis & alis fuscis, tria circiter grana pondere æquant, tenuis eorum & nauseosus odor est. *Meloë Vesicatorius* L. per omnem Europam, præter maxime Septentrionalem, occurrit. Hæc insecta ab arboribus, quibus insident, decussa exsiccata nostras officinas intrant. Ad usum Diureticos intus exhibendi a multis & gravibus Auctoribus fuerunt laudati. Forum dosi ultra octo Grana non extendendi, & caute ita dividenda, ut quoties quadrihorio unum modo Granum exhibeatur; dosi enim, si vel tantillum excedit gravissimos in viis Urinariis Spasmos excitat; justo major contra quantitas omnes effectus Veneni rodentis edit; extus scopo Vesicas excitandi in frequentissimo usu sunt; optime in Emplastrum recepta adhibentur, in quo dosi non ultra dimidium Drachmam extendenda.

**CAPILLUS VENERIS**, *Capelvenere, Capillaire, Frauenhaar.* Monspeliensem & Canadensem asservamus; *Monspeliensis* habet cauliculos nigricantes, glabros, uridos, ramosos, vestitos foliis alter-

nis, petiolatis, cuneiformibus, incilis, apice crenatis, in margine reflexo maculis notatis, inodoros, saporis dulciusculi, leviter adstringentis; *Adiantum Capillus Veneris* L. *Blackwell* Tab. 367. *Gallie Meridionalis, Helvetie, Anglie civis. Canadensis* a priori cauliculis magis rufescentibus, lucidioribus, foliis latioribus, trapezoideis, margine inferiore integerrimo, superiore crenis majoribus crenato & sapore magis grato differt. *Adiantum pedatum* L. Crescit in Canada & Virginia. scopo Pectorali ad Infusa recipitur; sub forma Sympi exhibetur.

**CAPO**, *Cappone, Chapon, Capaum.* *Galus gallinaceus castratus*, exquisitus cibibus mensis imponitur, ad Jussula Nutrientia recipitur. *Axungia alba* est, Unguenti formam habet. Emolliendi scopo extus adhibetur.

**CAPPARIS**, *Cappero, Caprier, Capres.* *Gemmae Florum*, Aceto condite ad usus cibarios, Cortex Radicis ad medicatos usus adhibetur. *Gemmae virides* sunt, pedunculo instructæ, angulares, variae magnitudinis, constant ex aliquot petalis, quæ rudimenta Anthearum includunt: *Cubebis* non majores, late virides & pedunculis instructæ reliquis præferuntur: sapore proprio, leviter amari-cante, dignoscuntur. Cortices variae longitudinis & crassitie advehuntur, striis longitudinalibus & transversalibus notati, cinereo-flavicantes, inodori, leviter amari, aliquantulum etiam acres. *Caparis spinosa* L. *Blackwell* Tab. 417. Asia, Africa, Europæ Australis indigena, Tolosæ colitur, apud nos per hyemem in frigidario asservanda. *Gemmae* condimenti loco carni adiciuntur; *Radices* Decoctis Aperientibus.

**CAPRIFOLIUM**, *Carifoglio, Chèvre-feuille, Hahnenfislein.* Folia glauca, longe ovata, obtuse acuminata, subadstringentia; Flores tubo longo in duo lobia dividuntur, quorum superius latum, reflexum, quadrifidum, inferius angustius & simplex est, gratissimus recentium odor exsiccatione perit, albi cum admixta rubedine, stipites teretes sunt,



epidermide cinerea flavedine suffusa, vestiti, sapore imbuti dulciusculo cum quadam amaritie eo evidentiore, quo stipites sunt crassiores Lonicera Periclymenum L. *Blackwell* Tab. 25. Ubivis nascitur. Folia a vi Roborante & Abstergente, a quibusdam laudantur, & ad Gargarismata recipiuntur. Flores & stipites a nonnullis Sanguinem Depurandi & Urinam sciendi causa sub forma Infusi exhibentur.

**CARANNAE GUMMI.** Advehitur ad nos ex America Meridionali, in magnis massis ex viridi nigricantibus, quibus extus residua adherent involucri juncei, quo, dum adhuc molles erant, involuebantur massa; sapore subresinosæ sunt, odorem spirant admodum tenuem, accensæ fumum emittunt haud ingratis olemtem, igne funduntur, copiosius eas Alcohol, quam aqua dissolvit, ab Oleis, quoad partem modo: Oleum destillatum fundit. Olim externo scopo Resolvendi & Roborandi adhibebatur. Plantæ, unde Caranna obtinetur, character ignoratur.

**CARDAMINE,** *Crescione, Cresson des prés, Wiesenkresse.* Florum petala obtusa, oblongo-ovata, angustis unguibus terminata, mox alba, mox venis purpureis picta, inodora, levissime acria. Cardamine pratensis L. *Blackwell* Tab. 227. Communis per Europam planta. Laudantur contra morbos Convulsivos ad Drachmam unam aliquoties de die data.

**CARDAMOMUM,** Est Folliculus siccus, ventricosus, trifido septo distinctus, seminibus angulatis. Plures ejus species in tabernis servantur. Hic modo eas, quæ sub majoris, mediæ & minoris nominibus hodie prostant recensere. *Majus Blackwell* Tab. 385. & 584. distinguunt Folliculi aliquot pollices longi, turbinati, superne apertura lacera hiantes, cinereo-rufi, striati, Semina includentes Coriandro vix cedentia, sub cute cinereo-ferruginea medullam albam continentia, sapore acri Camphoræ affini instructa. Ex Asia & Africa nobis adducitur, plantam unde colligitur, ignoramus. Edit  $\frac{1}{3}$  circiter Olei destillati, quod Oleo Cajeput substituitur. Medium,

quod Zeylanicum quoque appellant, sistit Folliculos triquetros, unciales, gryscos-fuscos, apice acuto instructos & seminibus badiis, rugosis, angulosis, odoris suavis, saporis amariusculi, minus quam in reliquis aromatici, largitur  $\frac{1}{2}$  Olei odorati, spissiusculi, dulciusculi. Ex Ægypto, India, Persia & Java ad nos transfertur. Hujus quoque fructus plantam perinde nescimus. Minus sive Malabaricum Folliculos semiunciales circiter habet, triangulares, subflavos, levissime striatos, in apice papilla coronatos; semina sunt rugosa, subrufa, sapor & odor Camphoræ propinquus; est fructus Amomi Cardamomi L. *Blackwell* Tab. 584. & 585. Indiæ civis, Olei odorati pelliculi  $\frac{1}{2}$  fundit. Extracta aquosa ex duobus posterioribus parata plane inertia sunt. Ad Ventriculorum Roborandum Infusis Vinosis aut Spirituosis immiscantur, recipiuntur quoque in Trageas, Morsulos, &c. Extus Epithematibus Roborantibus adjiciuntur.

**CARDIACA,** *Agricome, Herzgespann.* Folia cuneiformia, tribus lobis angustis & inæqualibus terminata, rugosa, petiolata, inodora, amara. Leonurus Cardiacæ L. *Blackwell* Tab. 171. Passim per Europam & Virginiam crescit. Visceribus Abdominalibus obstructis medetur. Vulgo sub forma Unguenti adhibetur.

**CARDUUS BENEDICTUS,** *Cardosanto, Chardon benit, Cardenbenedicten.* Folia oblonga, magnis sinubus runcinata, hispido-scabra, rigide ciliata, intense amara; Semina majuscula, ventricosa, striata, flavescentia, pappo rigido coronata, medullam albam & dulcem includentia. Centaurea Carduus benedictus L. *Blackwell* Tab. 476. Europæ calidæ & Orientis propria, copiose apud nos etiam in agris colitur. Folia sub forma Infusi Aquosi aut Vinosi vel Extracti Aquosi Ventriculi Roborandi & Aperientium Viscerum gratia exhibentur. Semina præ aliis Seminibus dulcibus nil proprii habent.

**CARDUUS MARIE,** *Spina alba, Chardon Marie, Mariendistel.* Folia ovali-lanceolata, magna & lata, profundis & magnis sinubus laciniata, margine ciliato, spinoso, reti albo picta, sapore



salino, cui levissima amarities accedit, instructa. *Semina* cylindroidea, obtusa, utrinque paululum compressa, sub cortice fusco & splendente medullam albam includunt. *Carduus Marianus* L. *Blackwell* Tab. 79. Europæ temperatæ civis. Eodem modo; quo antecedens olim in usu erat.

**CARDUUS TOMENTOSUS**, *Cardo salvatico*, *Chardon sauvage*, *berite Wedd.* *Gaulis* erectus, altus, crassus, tomentosus, alatus, *Folii* decurrentibus, ovato-oblongis, dentatis, dentibus spinas emittentibus, tomentosis vestitus. *Onopordum Acanthium* L. Passim per Europam obvium. Succus inde expressi externus usus multum ad *Ulcerâ cancrôsâ* sananda laudatur.

**CARICÆ**, *Fichi*, *Figues*, *Feigen*. Sunt *Ficus* exsiccata, variæ magnitudinis, partim rotundæ, partim turbinatæ, umbilicata, in pulpa cute tecta flavicante, abscondunt grana, quæ Flores potius & *Semina* esse Recentiores docuerunt; melleam dulcedinem habent. *Caricæ* magnæ & rotundæ a *Smyrna* denominantur, magnæ & turbinatæ a *Genua*, parvæ rotundæ, utrinque compressæ a *Masilia*; ultimæ dulcedine sua priores vincunt, sed illis citius corrumpuntur. *Caricæ* sicciore pulverem albo obsessæ, nigricantes, acidæ aut austere rejiciendæ sunt. *Ficus Carica* L. *Blackwell* Tab. 125. Europæ Australis indigena arbor, apud nos per hyemem stramine a frigoris injuria defenditur. Comeduntur crudæ *Nutrienti* loco, coquuntur ex aqua in *Pectoris medelam*; sive inversæ sive sub cineribus coctæ *Abscessibus* aperiendis imponuntur.

**CARLINA**, **CARDOPATIUM**, *Ebertswurzel*. *Radix* fibrosa, aliquot pollices longa, extus fusca, intus ex albo-flava, odore proprio, nauseoso, sapore acris, valde amaro gaudet. *Carlina Aconalis* L. *Blackwell* Tab. 532. Crescit in Europa temperata. Oleum destillatum fundere dicitur. Olim a virtute *Alexipharmaca* laudata, hodie *Mulo-Medicis* relinquitur.

**CARNEOLUS**, *Sardus*, *Cornalina*, *Cornaline*, *Carneol*. Est *Silex* variæ magni-

tudinis, semipellucidus, colore rubro, plus minusve diluto splendens, qui vero igni admotus, perit. *Silex Carneolus* L. Passim in Europa occurrit sub terra dispersus. *Iners lapis hodie exsolevit*.

**CARPATICUM BALSAMUM** vid. **TEREBINTHINA**.

**CARPIO**, *Carpione*, *Carpe*. *Cyprinus Carpio* C. *Piscis* apud nos admodum frequens culinis relinquitur. *Lapides Carpinum* sunt cartilaginee consistentia & colore cornua referentes, facies earum altera linea longitudinali divisa est & duabus facieculis distinguitur; sitæ sunt inter palatum & primam vertebram. *Proprias a quibusdam istis adscriptas vires experientia non confirmavit*.

**CARTHAMUS**, *Zafferano spurio*, *Safran bâtard*, *Saflor*. Flores ex calice desumpti asservantur, tubulosi, rufi, limbo profunde quinquefido, odorem nullum, saporem levissime salinum habent. *Semina* alba, quatuor angulis notata, oblonga, altero extremo crassiora, nitida, includunt nucleum dulcem, nec nauscosum, nec acrem. *Carthamus Tinctorius* L. *Planta* annua, *Ægypti* & *Indiæ* indigena, passim per Europam colitur. Flores usibus tinctoriis inserviunt, *Semina* Purgantibus a Veteribus erant adscripta, & ad *Unciam unam* sub forma *Emulsionis* data; infidum medicamentum evulsit.

**CARVI**, *Mattenkümmel*. *Semina* incurva, convexo-concava, oblonga, striata, subnigricantia, odore & sapore aromatico, grato instructa. *Carum Carvi* L. *Blackwell* Tab. 529. Crescit per omnem Europam. Fundit Olei odorati flavicantis, acris  $\frac{1}{64}$ . A virtute Carminativa maxime laudatur, cibus Infusis, Fuscis, Glysmatibus adjicitur. Disentiendi scopo Epithematibus quoque immiscetur.

**CARYOPHYLLATA**, *Erba benedetta*, *Benoite*, *Benedictenwurzel*. *Radix* ex capite crassiusculo fibras emittit capillares, extus rufas, intus albas, *Caryophyllos* redolentes, sapore adstringente palatum afficientes. *Geum Urbanum* L. *Blackwell* Tab. 253. Provenit per omnem Europam. Oleum destillatum, album, spissum, fragrans largiri dicitur. Ad



*Decocta Adstringentia adhibetur, recentissime contra Febres laudata.*

**CARYOPHYLLI**, *Chiovi di Garofano, Gloux de Girofle, Nagelein*. Sunt Germina immatura Antophyllorum, aliquot pollices longa, leviter angularia, inferne obtusa, superne in quatuor lacinias æquales, quibus creberrime globus ex quatuor petalis constans, floris elementum insidet, divisa, rugosa, rubiginoso colore tincta, odor illis proprius, fragrans est, sapor evidenter linguam urens. Varietas angulis extantioribus distincta *Caryophyllorum Regionum* nomine venit. Carpuntur hæc germina mensibus Octobri & Novembri, per aliquot dies fumo exponuntur & dein Sole exsiccantur; Olei limpidissimi ipsis Caryophyllis minus acris, in aqua fundum petentis  $\frac{1}{2}$  circiter fundunt. *Cibis, Trageis, Morfulis, Infusis Digestionem promovendi ergo adjiciuntur, sed cum Humores valde commoveant, exigue modo eorum doses recipi debent. Recipiuntur quoque ad Epithemata Roborantia. Oleum gratiæ ergo Medicamentis immiscetur, nec non scopo Nervino Balsamam ingreditur. Ossibus quoque cariosis, cum successu applicatur.*

**CASCARILLA**, *Castarila, Chacrilæ, Cortices* in semitubum convoluti, aliquot pollices longi, lineam crassi, extus rugosi, cinerei, intus nigri, odore proprio aromatico, sapore amaricante, acriusculo, aromatico instructi, accensum fumum naribus non ingratum emittentes. Croton Cascarilla L. *Blackwell Tab. 578. America Meridionalis & Virginiae arbor. Cortices Olei destillati  $\frac{7}{8}$  circiter fundunt. Vires Roborantes edit; sub forma Pulveris, Infusi, Extracti exhibetur; Extractum spirituosum aquoso prestare videtur.*

**CASSAVA** videatur MANIHOT.

**CASEUS**, *Cacio, Fromage, Käs*. Pars Lactis tenax, proprio odore & sapore salino instructa, animali natura gaudens. Ex integro lacte paratus, butyro scatet, unde pinguis est, ex lacte ebutyrato, qui surgit, macer est. Differt quoque pro vario lacte & pro vario animali ex cuius lacte secessit; Vaccinus Ovillio minus, Asinino & Caprillo magis tenax

est. Digestu difficilis, extus Resolvendi & Glutinandi ergo adhibetur.

**CASSIA CARYOPHYLLATA**, *Cannella garofonata, Camelle giroflée, Nagelein-Rinde*. Cortices aliquot pollices longi, tenues, semiconvoluti, intus fere nigri, extus dilutiores, creberrime Lichen obfessi, odore & sapore Caryophyllis referentes, utroque tamen remissiore. Myrtus Caryophyllata L. Arbor Indiae indigena. Oleum destillatum fundere, obfervata est. *Caryophyllorum vires, sed debiliores edit.*

**CASSIA FISTULA**, *Cassia fistola, Casse en bâtons*. Legumina cylindroidea pendenti & ultra longitudine, crassitie pollicem æquantia, mox rectissima, mox incurvata, tubere subrotundo terminata, lignosa, fragilia, ex spadiceo nigra, futura longitudinali, circulis non eminentibus distincta, quibus intus respondent septa transversalia, rigidiuscula, inter quæ pulpa nigra, dulcis obtinet, seminibus subrotundis, duris, fulvis, nitidis foeta. Rejiciuntur legumina evidentioribus rugis obfessa, quorum pulpa alienum sorem habet, aut adeo parca est, ut semina, concussio legumine, sonum edant. Cassia Fistula L. *Blackwell Tab. 381. Ex India Orientali & aliis Asiae calidioris regionibus in America Insulas, Martinicam, Dominicam &c. translata & ibi culta præstantiora, quam in patrio solo legumina largitur. In nostris hortis perpetuo in vaporario asservanda. Legumina recentia, in conclavi clauso in acervum collecta, adpersa aqua sudare cogunt, inde illis nigredo surgit. Pulpæ  $\frac{1}{2}$  continere dicuntur. Eccoprotico & Diuretico scopo exhibentur. Leguminum Unciæ quatuor interdum ex aqua coquantur & Album Ducendi scopo dantur, sed consilio minus laudando; optimum est Pulpam cultro ligneo, ipso usus tempore inde separatam, ad Unciam dimidiam pro Albo ducenda, ad Sesquinciā vel duas Uncias purgandi fine exhibere. Neutiquam Urina eorum, qui eam assumpserunt, inde tingitur, ut vulgo solent perhibere.*

**CASSIA LIGNEA**, *Mutterzimmet*.  
Cor-



*Cortices* pollicem circiter latitudine, lineam crassitie æquant, mox plani, mox in semitubos convoluti, colore obscuriore Cinnamomeo, simili etiam odore & sapore, vero Cinnamomo multum inferioribus instructi, masticati evidente viscedinis sensu linguam afficiunt. Varii adhuc alii Cortices colore, odore, sapore ad Cinnamomum accedentes hoc nomine veniunt. Laurum Cassiam Indicæ arborem Linnaeus adducit. Laurum Malabattram Burmann. Cl. Bergius. Laurus Indica L. Virginicæ arbor, apud nos in tepidario per hyemem asservanda, odore & sapore hanc Cassiam refert. Cortices variarum Lauri specierum ad Cinnamomum accedentes Cassiæ lignæ substitui videntur. Substituuntur, sed minus bene, Cinnamomo.

CASSUMINAR, *Casuminar*, Dicitur Radix, quæ in taleolas longitudinales & transversas secta ex India Orientali advehitur, extus annulis eminentibus notata, gryseo-fusca, intus flava, dura & tenax, odore & sapore ad Zedoariam accedens, qua tamen evidentiorē amaritiem linguae imprimit.  $\frac{1}{8}$  Olei odorati fundere dicitur. Nervino & stomatico scopo in Anglia primis huius Seculi lustris usurpari cepit. Dabatur sub forma Pulveris ad Grana quindecim, in Infuso autem ad Drachmam unam. Evilesceere videtur. Zedoaria ei substitui potest.

CASTANEA, *Castagna*, *Chatgigue*, *Castanie*, *Keste*. Nux ovata, plus minusve triangularis, convexo-plana, umbilico notata, inferne in exiguum mucronem tomentosum producta, badia, splendens, sub cortice tenaci, intus tomentoso includit Nucleum, cuticula striata & fulva tectum, album, longitudinalibus sulcis striatum, odore proprio, levi, non ingrato, & sapore dulci instructum. Fagus Castanea L. Blackwell Tab. 330. Crescit in Europa temperata. Inoculatione Sativa reddita Nuces majores & suaviore, Marones dictas largitur. Flavulenta insuetis, torculari pressæ nullum Oleum, sed Liquorem fundunt, qui Fermentationem vinosam subit. Aqua coctæ vel assatæ in cibum recipiuntur.

CASTOREI AXUNGIA. Improperie ita denominatum est Sebum, quod consistentiam Unguenti habet, flavum, odorem Castorei, sed minus fortem spirans; desumitur ex Glandulis conglomeratis, sub Folliculis statim dicendis, ad utrumque Urethræ latus hærentibus. Castoris Fibri L. Quadrupedis in Europa & America Septentrionali occurrentis. Recipitur ad Unguenta Nervina.

CASTOREUM, *Castoreo*, *Bibergeyl*. Duo Folliculi inferne contigui, dein divergentes, progrediendo magis ventricosi, efformati e membrana coriacea, includentes substantiam nigricantem, tenacem, proprio, Cerebrum gravante, odore & sapore amaricante præditam, inflammabilem, multis cellulis membranaceis distinctam. Folliculi majores, ventricosi, substantiam siccam quidem, sed non aridam continentes, fortissimum odorem spirantes, reliquis præferendi; denominantur isti a Russia, Borussia, aut Dantisco. Canadense, quod etiam Anglicum appellant, folliculis minoribus substantiam aridam includens & minus odorem, rejiciendum. Ad usus medicatos substantia nonnisi seorsum a folliculis separata recipienda est. Oleum destillatum fundere dicitur. Hi Folliculi ad utrumque Urethræ animalis modo dicti latus prope Præputium hærent & proprio orificio in illam patent. Ex animali exenti infumatione contra corruptionem defenduntur. Contra morbos Spasmodicos, sub forma Pulveris aut Pilularum intus ad Scrupulum semis & ultra datur. Extus Unguentis, Epithematibus, Clysmatibus admiscetur; admovetur quoque tamquam Odoramentum Hystericarum naribus.

CATAGAMBAR, videatur CATECHU.

CATAPUTIA MAJOR, *Palma Christi*, *Ricini Semina*, *Semence de Chasse-taupe*, *Purgiræorner*. Sunt Semina ovata, utrinque compressa, hilo prominente terminata, sub cortice fragili, sicco, nitido, nigro, lineis albis pulchre variegato, sapore acerrimo, continent nucleum album, mitiorem. Ricinus communis L. Blackwell Tab. 148. Planta annua utriusque Indicæ propria, in nostris hortis colitur,



litur. *Validioribus Drastrictis hæc Semina omnino sunt annumeranda, eorum dosis ad Grana sex extendi solet, ast vel tantilla nimia est; consultius medicamentum acerrimum nunquam datur. Oleum unguinosum, flaviusculum, vix acre, ex nucleis, demto prius cortice, prorsus expressum, Oleum Palmæ appellatur; in Colica, Nephritide, Volvulo, Vermibus ad unum Cochlear singulis horis exhiberi solet, usque dum Alvum ducere cæperit; infantibus ad unam vel duas Drachmas propinatur.*

**CATAPUTIA MINOR**, *Cataputza*, *Grain de l'Epurge*, *Springkærner*. *Semina parva, ovata, sub cortice sicco, lituris rufis variegato, nucleum continent antecedentibus etiam acriorem, Euphorbia Lathyris L. Brackwell Tab. 123. Planta biennis Europæ Australis propria, nostræ hyemis patiens sparsis sponte feminibus in nostris hortis ipsa semet propagat. Ex officinis releganda sunt.*

**CATECHU** sive **JAPONICA TERRA**, *Caccin*, *Cachou*. Substantia sicca, dura, extus rufo-nigricans, intus ex rubro-fusca, duriuscula, sapore adstringens, sensu primum dulci, deinde amaro instructa. Rejicimus frustra arena aut aliis fordibus inquinata, nec non ea quæ ore detenta non tota liquefunt. Est Succus aut potius Extractum aquosum ex variis Mimosa L. speciebus, quibus forsân alia Vegetabilia adjiciunt, paratum. Rationes, cur non ex Areca Catechu L. parari credam alio loco exposui. Ex India nobis affertur. *Roborandi & Adstringendi ergo Pulveribus, Elevariis &c. admiscetur; adjicitur quoque Dentifriciis. Adduntur ipsi varia suaveolentia & in variæ figuræ Trochiscos formantur, ad conciliandam animæ gratiam, ore detinendos. Ex Indiis allati Siri Gata Gamber appellantur, apud nos parati Trochiscorum, Muscardarum Cachou nomine veniunt. Hoc medicamentum olim cum Argilla miscebant, aqua affusa Solis calore exposebant; oriebatur inde fermentatio; spumam liquori fermentanti supernatantem colligebant & in modulis orbicularibus exsiccabant; oriebantur ita placentulæ variæ magni-*

tudinis, aliquos pollices lata, extus flavius flava, intus pallidiores, sapore amariuscule, subastringente præditæ, quas Catagamber appellabant; & ad eandem cum terra Catechu usus adhibebant.

**CATUS**, *Gatto*, *Chat*, *Katze*. *Felis Catus L. Quadrupes per omnem Europam frequentissimum; largitur Axungiam insipidam, inodoram, albam, quæ Unguenti consistentiam habet & a reliquis hujus generis pinguedinibus vix differre videtur.*

**CAOUTCHOU**, *Resina Elastica*. *Resina, quæ sub varia figura globorum, lagenarum &c. variis figuris exsculptorum ad nos adducitur, insipida, inodora, fusca, interdum nigra, igne cum elasticitatis jactura liquabilis, accensa minus gratum fumum emittens. Est Succus arboris copiose in America Meridionali crescentis, cujus genus quamvis Monœcin adscribatur, determinatum tamen adhucdum non est; Succum lacteum incisione ex arbore elicatum singulatim per strata, quorum quodlibet prius fumi ope exsiccandum est, antequam novum quodque applicatur, inducunt modulis ex Argilla confectis: si resina istam quam ipsi dare volunt, crassitiem habet, tunc aquæ ope Argillam inde eluunt, sive si Argilla cocta fuerit, diffingunt & frustra e cavo auferunt. Ob insignem suam elasticitatem ad Americanis ad syringes, lagenas, calceos, ocreas &c. adhibetur. Tanta ejus tenacitas est, ut frustum 12 lineas longum, 5  $\frac{1}{2}$  latum &  $\frac{3}{4}$  crassum, in longitudinem 37  $\frac{1}{2}$  linearum extendi possit. Nec in Aqua, nec in Spiritu Vini solubile est, in Oleis si dissolvitur, suam elasticitatem perdit, dum autem Æthere Vitrioli dissolvitur, potest in modum Americanis usitatum modulis ex cera obduci, quæ juxta crassitie adepta calore aque ebullientis inde eliquanda est, & ita inde possunt tubi formari ad usus Chirurgicos apprime facientes.*

**CENTAURIUM MINUS**, *Centaurea minore*, *petite Centauree*, *Tausendguldenblumen*. *Floris rubri, infundibuliformes, quinquefidi, calycibus & extremitatibus*



sustentati asservantur, inodori, amarissimi. *Gentiana Centaureum* L. *Blackwell* Tab. 452. Per omnem Europam reperitur. Dantur sub forma *Infusi Aquosi*, *Vinosi*, *Spirituosi*, *Extracti Aquosi*, *Conserve* vel *Syrupi* ad roborandum *Ventriculum* & referendas *Obstructiones Viscerum Abdominalium*. Aqua inde destillata nauseosum & satis evidentem odorem spirat, acri sapore linguam afficit.

**CENTUMNODIA**, *Sanguinalis*, *Renouée*, *Fraicasse*, *Weggras*. *Gauliculi* geniculati, teretes, scabri, instructi *Foliolis* utrinque acuminatis, glabris, integerrimis, subadstringentibus. *Polygonum* L. *Blackwell* Tab. 315. Per omnem Europam vulgare. *Adstringendi scopo* olim tam extus quam intus adhibebatur.

**CEPA**, *Gipolla*, *Oignon*, *Zwiebel*. *Radix* bulbosa, mox sphaeroidea, mox utrinque compressa, sive alba, sive rubra, sub aliquot tunicis siccis & striatis carnem albam, quæ linguam, nares & oculos valide afficit, includens. Albæ minorem quam rubræ acrimoniam habent. *Folia* viridia sunt, fistulosa, in medio ventricosa, odorem & saporem *Radicum* habent, sed mitiorem. *Allium Cepa* L. Copiose in agris & hortis colitur. Aqua inde destillata olida est. *Radices* & *Folia* in cibum non tam nutriendi, quam potius condiendi causa recipiuntur. Albæ *Radices* scopo potissimum *Pectorali Fuscis* incoquantur. *Cepæ* sub cineribus asatæ *Hypogastrio* imponuntur pro pellenda *Urina*. Adhibentur quoque *Abscessibus* maturandis.

**CEPA OBLONGA**, *Gipolla bislunga*, *Giboule*, *Jacobszwiebel*. *Bulbus* ovali-oblongus, hinc planus, inde convexus, tunicis albis vestitus, carne alba efformatus, antecedentis odorem & saporem habet, sed mitiorem. *Allium fistulosum* L. iisdem cum antecedente locis colitur. *Culinis* duntaxat relinquitur.

**CEPA SECTILIS**, *Schnittlauch*. *Folia* fistulosa, tubulata, acuta, striata, odore & sapore proprio antecedentibus vicino instructa. *Allium Schœnoprasum* L. Alpibus proprium copiosissime in hortis colitur. *Ufibus cibariis* inservit.

**CERA**, *Cera*, *Cire*, *Wachs*, *Substantia*

*solida*, *tenax*, calore liquefcens, colore citrino, & proprio odore non ingrato instructa, ab *Ape Mellefica* L. ex antheris florum collecta, deglutita & e corpore denuo emissa, pro exstruendis favis & claudendis cellulis adhibita. Obtinetur ex favis, melle privatis, dum cum aqua coquantur, calore liquefacta *Cera* aquæ supernatat; quodque a coctione de favis remanet, torculari committitur, & reliqua *Cera* inde *Cera* inde exprimitur, inhærentes fordes eadem liquefacta ad fundum secedunt & cultri ope a refrigerata auferuntur. Soliditas, color citrinus & odor *Ceram* commendant. *Durius Cerae* genus, magisque rufum, plus minus fuscum, proprio nec ingrato odore instructum, ab *Apibus* ex corticibus variarum arborum desumptum, hæc animacula ad *Alvearium* fissuras claudendas & suspendendos favos adhibent. *Propolis*, *Stopwachs*, *Bienenwachs* dicitur *Cera* humectata, Solique subjecta colore & odore privatur, majorem firmitatem acquirit & *Cera alba* appellatur. *Cera Resinarum effectus* edit, nec *Humores* commovet, & intus quoque cum successu exhibetur. Longe plurima *Unguenta* & *Emplastra* ingreditur, eisque justam spissitudinem conciliat. Adjectione *Theribinthinæ* emollita & vario pigmento tincta, variam *Ceram sigillatam* efformat. *Oleum* inde destillatum admodum olidum & acre est. Laudatur contra *Perniones*, fissam *Epidermidem* &c.

**CERASA**, *Girige*, *Cerises*, *Kirschen*, Sunt fructus variæ magnitudinis, variæ figuræ, varii coloris, parvi *Merises*, *Waldkirschen*: cordiformes, lateribus compressis, *Bigarreaux*, *Herzkirschen* dicuntur, ad basin concavi, in apice obtuso-rotundati; pulpam plus minusve firmam, varie coloratam, sive dulcem, sive acidam, rarissime amaricantem præbent. *Officulum* includunt magis aut minus rotundum, glabrum, in quo hæret *Nucleus* albus, ovatus, acutus, dulcis. *Prunus Cerasus* L. *Blackwell* Tab. 449. In omni Europa vulgaris; plurimæ varietates in hortis coluntur. Fructus plerarumque varietatum mensis imponun-



tur. Officina Ceraia austera L. *Amarel-  
len* recipiunt, in vicis nostratibus co-  
piofa. Eadem Refrigerandi causa vel ex-  
siccata cum aqua coquuntur, vel sub forma  
Gelati aut Syrupi exhibentur; ex his Ce-  
rafis Fermentationis & Destillationis ope  
paratur Spiritus gratissimus *Kirschenwasser*.  
Aqua Nucleis abstracta grate sapit &  
olet. Nucleis vires Diureticae adscribuntur.

**CERASUS RACEMOSA**, *Ciriesia a  
grappolo*, *Cerisier à grappe*, *Elsenbaum*.  
Fructus vix Piso majores, glabri, nigri,  
ad basin quam minime excavati, pulpa  
pauca, nigro-fusca, saporis aciduli, sub-  
adstringentis. Prunus Padus L. Passim  
in Europa crescit. In tanta gratorum  
Cerasorum quantitate vix in usum re-  
cipitur. Lignum suaveolens tornatorum  
in usum inigrat.

**CERASORUM GUMMI**. Est Gummi  
ex variis nostratibus Pruni speciebus ex-  
sudans, in massas variae magnitudinis  
concretum, plus minus fuscum, insipi-  
dum, inodorum; ob sordes, si quas ha-  
bet, in aqua dissolvitur, per linteum  
dejicitur, & denuo inspissatur. Gummi  
*Arabici vires habet, sed debiliores.*

**CEREFOLIUM**, *Cerfoglio*, *Cerfeuil*,  
*Karbakrant*. Folia late viridia, duplica-  
to-pinnata, pinnis parvis integris & in-  
cisis, exigua spinula terminatis, nervis  
hinc inde pubescentibus, sustentata pe-  
tiolis convexo-planis, sulco notatis, odo-  
ris & saporis proprii, grati & aromati-  
ci. Scandix Cerefolium L. *Blackswell*  
Tab. 236. Planta annua Europe Austr-  
alis propria ubique colitur & sponte dis-  
persis Seminibus perpetuatur, nec hyeme  
laeditur. Oleum destillatum fundere di-  
citur. Succus inspissatus, evidenter sali-  
nus, non levem odoris jacturam facit.  
*Ad omnis generis Obstructiones referandas,  
Humores spissos attenuandos, Tussis pertinaces,  
vitia Cutanea sananda, sive Jusculis incoctum,  
sive Succus inde expressus exhibetur;  
Succi inspissati Uncia una de de-  
dari solet; Extus cum successu Tumoribus  
induratis, partibus Sugillatis imponitur; Aqua  
inde abstracta efficax, Oleum coctum iners est.*

**CEREVISIA**, *Birra*, *Bierre*, *Bier*. Est  
liquor vinosus ex Infuso Granorum Ce-

realium, germinascere coactorum, quae  
*Malte* nomine veniunt, decoctione &  
subsequente fermentatione vinosa confe-  
ctus; consistentia, colore, sapore, vi  
inebriandi pro varietate Ceralis unde  
paratur, exsiccationis Malte, modi fer-  
mentationis, reliquorum praeterea addi-  
tamentorum multum variat. Omnis Ce-  
revisia Aquam, Alcohol, partes gum-  
mosas & resinosas continet. Diluendi,  
Roborandi, Urinam pellendi ergo a Medi-  
cis praescribitur, ita tamen, ut Cerevisiam  
tenuem saturate nunquam non preferant.

**CERVUS**, *Cervo*, *Cers*, *Hirsch*. Cervus  
Elaphus L. Quadrupes copiose per Asiam  
& Europam occurrit; *Himuli*, *Faon*,  
*Hirschkalb* aliquot mensibus non majoris,  
& anniculi *Subulonis*, *Daguet*, *Spieshirsch*,  
Caro in cibum recipitur. Cornua bina  
basi *Mercin*, *Gerweib* unita, corpora *Per-  
che*, *Stange* formantur, cujus amplitudo  
progrediendo crescit & varios ramos  
*Andouillers*, *Inde* emittit, quorum basis  
tumida *Menle*, *Rose* dicitur; negricantia  
sunt, tuberculis, *Pierrures*, *Perlures*, *Per-  
len* obsessa. Radula comminuta molecu-  
las referunt ex albo nigricante. Cornu  
Cervi Raspatum, sive Rasura Cornu Cer-  
vi, interdum etiam rejectio cortice ni-  
gricante, quae huic subest portio alba in  
tenuia secamina alba tornari solet Cor-  
nu Cervi Tornatum, quod cum parte me-  
dullari careat, antecedente minus ad sco-  
pos medicatos aptum est. Decoctis De-  
mulcentibus adjicitur, sed diuturnam coctio-  
nem requirit, Gelatina, cujus siccae  $\frac{1}{2}$  circi-  
ter largitur, inde parata Jusculis Hectico-  
rum & Febre lenta laborantium adjicitur;  
eadem ad siccitatem usque evaporatur Gela-  
tina Cornu Cervi sicca, ad Pulveros demul-  
centes recipitur. Typhi, Criles, Kolben.  
Cornua tenella, cylindroidea, apice cras-  
so, rotundato instructa, sub cute cras-  
siore, extus tomento & pilis obsessa,  
substantiam osseam, sanguinolentam,  
spongiosam includunt; Nutrimentum mi-  
nus bonum largiuntur. Aqua inde abstra-  
cta iners est. Medulla linimenti consi-  
stentiam habet, sanguinolenta, pra aliis  
pinguedinibus vix aliquid proprii habe-  
re videtur. Os de Corde Cervi planum,



album, figura sua irregulare, insipidum est, portio Cordis ad ortum utriusque orificii arteriosæ indurata, omnino iners. Sebum solidum & album ad fines medicatos relatum ab aliis sebis non differre videtur.

CERUSSA, *Cerussa*, *Blanc de Plomb*, *Bleyweiß*. Est Plumbum, vapore Aceti in calcem albam versum, sapore adstringens, sub forma tam lamellarum friabiliū *Schieferweiß* quæ est sincerissima, quam panum conoideorum charta involutorum, prostat; hæc vel *Venetæ* vel *Belgica* dicitur, posterior in majores panes coacta, majore terræ inertis copia adulterata est. Ad Exsiccandum Impetigini, Erysipelati autem Discutiendi ergo inspergitur. Creberrime sub forma Emplastri aut Unguenti adhibetur.

CETERACH, *Milzkraut*. Folia parva, pinnatifida, pinnis ovatis, obtusis, integris, alternis, confluentibus, tota pagina inferior, maculis ferrugineis obsesa est, insipida, inodora. Asplenium Ceterach L. *Blackwell* Tab. 216. Europæ Meridionalis civis. Leniter Adstringit, ejus Infusio aquosa multum ad pellen- dum Sabulum laudatur.

CETI, *Sperma ceti*, *Baleine*, *Wallfisch*. SPERMA, *Blanc de Baleine*, *Wallrath*. Substantia alba, pinguis, proprio odore & sapore instructa, e lamellis siccis & splendentibus composita, est Pinguedo in propriis Encephali variorum Ceti generum receptaculi hærens, quæ si- ve inde desumpta, si ve ex animalibus putredine resolutis effluxa, frigore deinde in floccos albos densata Marique innatans collecta, lotionem a sanguine, expressionem per torcular, & Alkali ope a peregrino, quod ipsi adhæret, Oleo purgatur, in frusta dissecatur, Sole & Aëre exsiccatur. Sperma Ceti, quod vel levissimum flavedinis si ve rancoris vestigium habet, rejiciendum est. Veram pinguedinem cum Alkali Saponem quoque efformare, recentissima experimen- ta docuerunt. Vires Demulcentes & Antispasmodicas edit. Datur cum aliquo sapone junctum ad Drachmam unam pro dosi sub forma si ve Pulveris si ve Linctus; extus Un-

guentis si ve Emplastris ad Fissuras labiorum sanandas aut Lac in Mammis stagnans diluendum admiscetur.

CHAMÆDRYS, *Camedrio*, *German- drée*, *Gamanderlein*. Folia parva, ovata, inciso-crenata, nitida, brevibus petiolis instructa, inodora, amara. Teucrium Chamædrys L. *Blackwell* Tab. 80. Ob- tinet in Europa temperata & in Oriente. A vi Resolvente & Aperiente laudatur; Arthriticis maxime commendatur & Febre Intermittente laborantibus. Recipitur ad Infusa. Extractum cum aqua parandum est.

CHAMÆPITYS, *Iva*, *Ivette*, *Schlagk- rautelein*. Folia hirsuta, oblonga, trifida, odore levissimo, sapore amaro & suba- romatico instructa. Teucrium Chamæpi- tys L. *Blackwell* Tab. 528. in iisdem ac præcedens locis, in Asia præterea Afri- ca & America crescit, ad similes quoque usus adhibetur.

CHAMOMILLA ROMANA, *Camomilla Romana*, *Camomille Romaine*, *Rœ- mische Camillen*. Flores compositi, calice hæmisphærico, imbricato, tomentoso comprehensi, radiati, ligulatis radiorum floribus albis, linearibus; discus efforma- tur tubulosis floribus flavis, quinquefidis, paleis distinctis, odorem proprium, non ingratum spirantibus, sapore amaricante, leviter aromatico, linguam afficientibus. Anthemis nobilis L. *Blackwell* Tab. 526. Passim crescit in Europa. In Germania Va- rietas floribus plenis recipitur, quæ ve- ro quo minus odorata & sapida, eo minus etiam efficax est. Cl. Baumé inde Olei cærulei (mihi flavum exhibuerunt)  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{3}$   $\frac{1}{5}$  obtinuit. Viribus cum sequente equi- pollens ad internos potissimum usus adhibetur.

CHAMOMILLA VULGARIS, *Camomilla*, *Camomille*, *Camillen*. Flores ab an- tecedentibus, nonnisi disco conoideo, radio deflexo, receptaculo nudo, odore minus grato differunt. Matricaria Chamomilla L. *Blackwell* Tab. 298. Co- piofa per omnem Europam. Olei pul- cherrime cærulei  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{5}$   $\frac{1}{5}$  largiuntur. Ad præcipua Antispasmodica referuntur, intus cum aqua Infusi si ve in Pulverem redacti exhibentur. Extus Discutiendi insuper scopo ad Epithemata, Cataplasmata, Balnea, Gly-



*smata recipiuntur. Oleum destillatum ad paucas Guttas intus datur. Oleum coctum Abdomini illinitur, ad Clysmata recipitur; consultius duxerim illud Infusionis ope parare. Utraque Chamomilla Flores Cotulae Foetidae, quos Anthemis Cotula L. largitur, ex officinis exclusit, nonnisi a Pharmacopœis ignaris interdum Chamomillae Vulgari substitui solitos.*

**CHEIRI**, *Viola, Giroffle, gelbe Viole oder Negelein. Flores* petala ex calice exeunt, obovata, obtusa, lutea, quae gratum, quem recentes spargunt odorem exsiccata amittunt, sapore amaricante nonnihil etiam salino instructi sunt. *Cheiranthus Cheiri* L. *Blackwell* Tab. 179. *Europae Australis* proprius, apud nos omnino perennat, nec hyeme laeditur. *Ob virtutem suam Emenagogam partim ad Infusa Aquosa* recipiebatur, *partim Succus eorum expressus* exhibebatur.

**CHELIDONIUM MAJUS**, *Celidonia maggiore, Chelidoine, Schœllkraut. Radix* fibrosa, recens tota crocea, succum etiam croceum fundit, exsiccata vero fusca est, saporis acris, odoris nauseosi, medulla grysea, inodora, sapore minime fortis. *Folia* pinnata, pinnis in aliquot lobos ovatos, obtusos discedentibus, supra glauca, infra hirsuta, recentia minus grate olent, succo croceo acriusculo scaerent. *Chelidonium majus* L. *Blackwell* Tab. 91. *Per omnem Europam* vulgare. *Aperiendi scopo Radix recens ad Fuscula* recipitur, *exsiccatae Pulvis ad Drachmam unam* pro dosi datur; *eundem in finem Succum ex Foliis expressum ad aliquot Drachmas* aliquoties de die propinant.

**CHELIDONIUM MINUS**, *Celidonia minore, petite Eclairé, Feigwartzwurzel. Radix* ex bulbulis cylindroideis, extus gryseis, intus albis, acriusculis efformata. *Folia* longis petiolis sustentata, reniformia, glaberrima, dentata, levi Nasturtino sapore linguam afficientia. *Ranunculus Ficaria* L. *Blackwell* Tab. 51. *Vulgaris per Europam. Radices recentes Vesicantem virtutem habere dicuntur. Folia recentia ad Fuscula Aperiencia* recipiuntur; *sum Axungia frixa Hemorrhoidibus* applicantur.

**CHERMES GRANA**. *Folliculi pisorum* magnitudinis, rotundi, unde portio inferior resecta fuisse videtur, ex rubro fusci, splendentes, intus grana minima, sive sanguinei, sive flavescentis coloris, pulverem referentia continent, sapore amaricante & leviter flavescente, odore tenui non ingrato imbuti sunt; exuviae femellarum *Cocci Illicis* L. in *Quercu Coccigera* L. *Blackwell* Tab. 186. *Europae Meridionalis & Archipelagi* indigena, apud nos in frigidario contra hyemem defendenda, habitantis, super sua ova exsiccaturum, Aceto conspersa, ne ova, a quibus pigmentum inde parandum pendet, excludantur; *Reborandi & leviter Adstringendi* ergo ad *Semidrachmam sub forma Pulveris* exhibentur; sed majoris omnino efficaciae est *Succus*, qui ex Folliculis recentibus in *Aquitania* expressus, addita pari *Sacchari* quantitate a corruptione defensus, sub nomine *Succi Chermes* per obem divenditur, pulcherrimo colore purpureo nitens, admodum suavi odore æque ac sapore praeditus. *Ad Unciam semis sive seorsum sive Julapiis, Elecluariis &c. admistus* exhibetur.

**CHINÆ CORTEX**, *Cortecia Peruviana, Cortex Peruvianus, Quinquina. Frusta* ad dimidium vel ultra etiam convoluta, vix digiti longitudinem excedentia, extus scabra, bruneo-fusca, intus ferruginea, saepe Lichene obfessa, odore proprio aromatico, cui aliquid mucidi accedit, sapore aromatico, amaricante, levissime subadstringente. *Cinchona officinalis* L. *Arbor* procera, in regni Peruviani praefecturae *Quito* montibus copiosa, tractum ultra 50 millia-ria extensum occupans. *Cortices* inde a Septembri ad Novembrem usque mensem deglubuntur in libero aëre, saepius agitati, exsiccandi. *Rejiciendi* sunt *Cortices* multum amari, aliquid styptici aut visceri, linguae imprimentes, integram lineam crassi, laeves, non convoluti, & si franguntur filamentosi. *Remedium Comiti Cinchon* detectum, primum *Cardinalis de Lugos* missum, dein a *Jesuitis* medio seculi superioris dispensatum, inde quoque denominatur. *Extracti aquo-*



fi,  $\frac{3}{4}$  Resinosi  $\frac{1}{2}$  inde obtinui. *Princeps remedium contra morbos Periodicos, Gangrenam, Putredinem, Obstructiones Viscerum, Spinam Ventosam. Datur sub forma Pulveris quam subtilissimi. Sunt qui contendunt, Pulverem ad priores pistilli ictus surgentem minus efficacem esse, sed oculus sane minimam modo differentiam inter portionem pulveris, quæ prima surgit & eam sequentes detegit, nec pulverem a Magnete trahi observare potui. Dosis est ad Drachmam semis; exhibetur porro Aqua aut Vino Infusus, nec non ejus Decoctum vel Extractum, Pulvis etiam, ope aquæ in Cataplasma redactus, Ventreque impositus, quo scopo duæ Unciæ Infantibus, quinque autem adultis tribui solent; quin & Balneis admixtus, receptusve in Clysmata, salubritatem suam probavit. Nutricibus exhibitus lactantes curat.*

**CHINÆ RADIX.** Geniculata, nodosa, multis tuberculis obsessa, ponderosa, insipida, inodora, sub cuticula ex bruneo rufescente, medullam includit albam, nonnihil etiam rufam, solidiusculam. Rejicimus Radices leviores, quæque rariorem aut spongiosam medullam habent, nec non illas, quæ ex America trajiciuntur, sive nigricantes, sive evidentius rufas; Smilax China L. Blackwell Tab. 433. Chinæ, Japoniæ, Persiæ indigena. Aqua cum Radice cocta rubra evadit. Decoctum ad varii generis Acrimoniam Humorū corrigendam adhibetur.

**CHRYSOLITHUS.** Veteribus Topasium hoc nomine venisse contenditur. Hodie ita appellatur Gemma ceteris omnibus mollior, ex viridi subflava, in igne colorem amittens, & in vitrum abiens. Borax Gemma nobilis Viridis Chrysolithus L. In India Occidentali, Bohemia, Silesia deprehenditur. Usus ejus in Medicina evuluit.

**CICERA,** Ceci, Pois Chiches, Kickererhsen. Semina rotunda, Pisis majora, rufa, inferne in acumen producta, hinc inde levissime compressa, sub cortice rufo-fusco absconditam medullam flavicantem, insipidam continent. Cicer Arietinum L. Blackwell Tab. 557. Planta annua, Europæ Meridionalis & Sy-

riæ indigena, apud nos in hortis colitur. In regionibus calidioribus, coque culturæ Pisorum minus amicis, id genus copiose colitur & in ciborum numero habetur. Ad Decocta Diuretica recipiuntur. Farina eorum extus ad Epithemata & Cataplasmata Resolventia & Abstergentia adhibetur.

**CICRORIUM,** Cicoria, Chicorée, Wegweis. Radices fusiformes, sub cuticula levissime fusca, una cum carne dulci medullam albam & amaram abscondunt. Folia petiolis latis sustentata, ex fine angusto dilatantur, laciniis latis progrediendo crescentibus dentata, viridia, utrinque aliquantulum hirsuta, amara. Cichorium Intybus L. Blackwell Tab. 177. & 183. Vulgaris per Europam planta; quæ in hortis colitur per omnes partes major, foliorum etiam laciniæ minus profundæ evadunt, & non raro purpuram æque ac radix admittunt. Folia plantæ in hortis cultæ, terra obruuntur, ut alba fiant & amarietiem deponant, quo facto in Acetaria recipiuntur. Radices & Folia Humores resolvunt, unde Aperientes & Refrigerantes ipsis adscribuntur vires; illarum frequentior, quam horum usus est. Recentes vel Fuscis adjiciuntur, vel Saccharo condiuntur; exsiccatae ad Decocta recipiuntur, Extractum earum aquosum efficax est.

**CICUTA,** Cicuta, Ciguë, Schierling. Folia triplicato-pinnata, glabra, saturate viridia, odore foetido, sapore leni instructa. Conium maculatum L. Blackwell Tab. 451. Crescit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem. Destillata per se planta Spiritum Ammoniacalem fundit. Succus in formam Extracti inspissatus  $\frac{7}{8}$  perdit, foetidus est, falsus, nauseosus, humiditatem ex Aëre attrahit, quocirca ad servandam ejus justam consistentiam herba in pulverem redacta temperandus est. Folia largiore quantitate comesta Veneni Narcotici effectus edidisse Observatores docent; Succum inspissatum, qui sub Extracti nomine aservatur, validissimum medicamentum Resolvens esse & desperatissimos morbos curare maximi Viri experti testantur. A medi-



tationis initio quatuor aut sex Grana Extracti bis de die dantur, augetur inde sensim dosis; ad Unciam usque unam unius diei dosin citra ullum incommodum auctam fuisse, relatum lego; dantur quoque Folia sub forma Infusi aquosi. Eadem extus, sub forma Cataplasmatidis, cum successu Partibus Induratis imponuntur.

**CICUTA AQUATICA**, *Wasserschierling*. Radix magna, crassa, flavescent vel virescens, geniculis, quibus intus prominentes circuli respondent, distincta, odore vel sapore Apio propinqua. Folia magna, bipinnata pinnis linearibus, ferratis, glabris, minus quam Radix odora, sapore etiam inferiora. Cicuta virofa L. *Blackwell* Tab. 574. a b c. Crescit passim per Europam. Præcedente virulentiorē esse asserunt Observatores; exsiccatione fere effectam reddi perhibent. Non inepte pro Emplastro de Cicuta hæc recipi jubetur. Succum in modum antecedentis ad Drachmas tres usque datum, & Decocti saturati largam quantitatem absque ullo sive bono sive malo effectu fuisse ingestam, a magni nominis Observatore notatum lego.

**CINA**, *Santonicum*, *Santonico*, *Semenæ Contra*, *Wurmsaamen*. Semina, quæ ex Orientalibus regionibus advehuntur, oblonga, exigua, plus minus flava, intermixtis stipitibus immunda, sapore amaro & nonnihil acri, odore proprio, forti, nauseoso imbuta. Ex *Aleppo* allata optima sunt, hæc excipiunt *Orientalia*, quæ rursus *Indica* post se relinquunt, quibus exigui flosculi non aperti intermixti esse videntur, *Barbara* seu *Africana*, ex cauliculis maxime efformata, sunt vilissima. *Artemisia Contra* L. Persiæ ac *Mogolis* regno propria. Vermibus potissimum infesta feruntur. Datur sub forma Pulveris; nauseosi medicamenti vix ultra *Scrupulum unum* ægroti deglutire solent, quapropter hæc dosis aliquoties de die est repetenda; Infantibus sub forma Confectionis siccae exhibetur.

**CINERES CLAVELLATI**, *Potassa*, *Cendres gravellées*, *Potasse*, *Potasche*. Sal in massas variæ magnitudinis inspissatus, ex albo ac cæruleo bicolor, odoris expers, saporis lixiviosi, in Aere

diffluens & si quidem purus est, omnibus Alkali vegetabilis qualitatibus præditus. Paratur ex cineribus arborum maxime atque fruticum, ex quibus aquæ ope extrahitur; aqua eo imprægnata, *Lixivium* dicta, evaporatur ad siccitatem; Sal hac ratione obtentus in fornace reverberatoria calcinatur, neque prius inde, quam penitus ignitus fuerit, defumitur. Cineres clavellati nunquam non Tartaro Vitriolato, Sale communi, fordibus etiam polluti sunt; ab his solutione in aqua frigida purgantur; qui Salem communem habent ad usus Chemicos saltem inepti sunt. Cineres Clavellati depurati omnes Alkali fixi vegetabilis vires habent.

**CINNABARIS**, *Minium Veterum*. Est minera pulcherrimo rubro colore splendens, ponderosa, variæ magnitudinis massa efformans. Hydrargyrum Cinnabaris L. In Palatinatu, Hungaria, Idria, Japonia &c. ex montibus effoditur. Rarissime ad usus medicatos, nec nisi a fordibus, quæ ipsi fere adhærent, sublimatione purgata recipitur. Cinnabaris factitia, cum multo minoris vengeat, neque tamen viribus inferior sit, commode substituitur.

**CINNAMOMUM**, *Cannella*, *Canelle*, *Zimmet*. Cortices convoluti, prælongi, teneri, ex variis laminis tenera charta non crassioribus constantes, glaberrimi, odore proprio, fragrantissimo, sapore aromatico, linguam feriente, quadantenus dulci instructi. *Laurus Cinnamomum* L. *Blackwell* Tab. 354. In *Zeylona* crescit; Cortex ejus intermedius nostrum aroma constituit. Eadem arbor in *Martinica* crescens exhibet Cortices a *Zeilonis* minore longitudine, crassitie majore linea tamen minore, superficie rugosa, sapore acriore, odore paulo minus fragrante differentes, quibus nomen *Cinnamomi Indici* dederunt. Prostant præterea ab aliquot retro lustris germina fusca, colore *Caryophyllorum* aromaticorum profundiore tincta, pedunculo concolori, oblongo, sensim crassiori, gracili, striato infidentia, rotunda, calice sexfido, laciniiis



niis striatis ad germen adeo reflexis, ut ejus nonnisi apex brevissimo stylo infusus prosteret, odore perfusa & sapore ad Cinnamomum Zeylonicum accedente, utroque vero paulo remissiore; dicuntur improprie *Flores Cassiæ*, nec non *Clavelli Canellæ* ab exactissima figura cum claviculis capitulo rotundatis similitudine, *Grains du Canellier*. Interdum quoque occurrunt *Nuces Cinnamomi*, fructus Olivæformes ad Baccas Lauri accedentes, glabri, quasi levigati; sub cortice fragili, inodoro, primum dulciculo, Cinnamomum fere resipiente, dein adstringente, nucleum abscondunt superne compressum, sub cuticula ferruginea medullam albissimam, inodoram & inspidam continentem. Olei destillati exiguum modo quantitatem fundit, magna quippe ejus parte ab aqua non secedente.  $\frac{1}{11} \frac{2}{20}$  inde obtentum fuisse lego: idem ex Zeylona advehitur dilute aureo colore insignitum, suavitatis, virium quoque Cinnamomi egregie confors. Claviculi Oleum fundunt Oleo Cinnamomi haud absimile, quanquam pauxilla est, quæ inde obtinetur, portio. Aqua Cinnamomi substantiæ, unde destillavit, viribus præ reliquis id genus quibuscunque imprægnata est; Oleo prægnans omnino lacteum colorem habet. *Suavissimum Aroma Nervino & Stomachico scopo ad Infusa, Morsulos, Pulveres &c. recipitur. Elæosaccharum frequenti in usu est. Oleum Mixturis contractis immiscetur. Dentibus quoque cariosis Gossypio instillatum immittitur.*

**CITREUM MALUM**, *Medicum Malum, Limone, Limon, Citron*. Pomum ovato-oblongum, variæ magnitudinis, variæ figuræ, creberrime superne in papillam eductum, inferne calice notatum, rugosum, sub *Cortice* extus flavo, fragrante, aromatico, levissime amaro, intus coriaceo, albo, vix sapido, qui interna substantia demta, *Flavedo* dicitur, *Pulpam* includit, in officinis *Carnem* dicunt, in plures loculos distinctam, tenuem spargentem odorem, *Succo* turgentem flavicante, varii, pro varietate fructus, saporis, *Semina* insuper con-

continentem subflavida, ovato-gibba, striata, amara, vix odora. Ad usus autem medicatos nonnisi acida recipiuntur poma. *Citrus Medica* L. *Blackwell* Tab. 361. Eadem ejus ac Aurantii patria, eadem colendi ratio est, frigoris duntaxat non perinde patiens. *Suavissimi Olei*, quod etiam *Quintam Essentiam* nominare solent, ex centum malorum Corticibus Unciam unam exprimi observatum est. In *Succo*, quem seorsum asservamus, limpidus, odore, acido, leve modo relinquitur flavedinis vestigium. *Cortices* Saccharo in condituram siccam redacti sub nomine *Citronade* per orbem divelhi solent. In Corticibus *Vires agunt Nervinæ & Stomachicæ. Infusis* adjiciuntur; conditi seorsum comeduntur. *Electuariis, Morsulis &c. admiscuntur, cibis adduntur; Pulpa Corticibus juncta condimenti loco culinæ inservit. Refrigerandi, sitim Sedandi & Antiscorbutico scopo cum aqua decoquitur. Succus ad eosdem usus Mixturis, Julapiis &c. immisceri, vel in Rotulas aut Syrupum cogi solet. Oleum voluptatis gratia extus æque ac intus usurpatur.*

**CITRULLUS**, *Anguria, Mellone, Melon d'eau, Wassermelon*. Poma rotunda, non raro caput humanum amplitudine excedentia, viridia, lineis nigris mox latioribus, mox angustioribus distincta, duplici pulpa referta, exteriori altera solidiore, pallida, palato minus grata, altera interiore fere diffuente, sanguinei coloris, dulcissimi saporis, sola in cibum recipienda, odoris Cucumerini; in intima pulpa nidulantur *Semina* mediocris magnitudinis, oblongo-ovata, inferne contracta & marginata, utrinque compressa, sub cortice nigro, fragili, nucleum album, inferne acutissime terminatum, inodorum, dulciculum continentia. *Cucurbita Citrullus* L. *Blackwell* Tab. 157. In Oriente, Italia Meridionali sponte crescere dicitur; Semina ex Astracan missa reliquis, si planta propter fructum colitur, præferuntur; apud nos nonnisi in fimetis sub campanis adulescunt; multoque difficilins, quam Melones, ad justam maturitatem perveniunt. *Dulcissima pulpa ad Edulia Refrigeranda*



*rantia refertur; Semina inter quatuor frigida majora locum tenent.*

**CLEMATIS**, *Liene, Flammula Jovis, Llenen*. Folia aliquot pinnarum paribus pinnata, pinnæ majusculæ, petiolatæ, ovato-oblongæ, inter masticandum acrimonia quidem, sed modice linguam afficiunt; exsiccatu omnem fere acrimoniam exuunt. Clematis Recta L. In Europa Meridionali & Orientali, nec non in Asia Septentrionali habitat, nostras hyemes patientissime fert. Folia recentia, Cuti imposita Rubefacientes imo Vesicantes effectus edere jam a longo retro tempore experimenta docuerunt. Sanguinis Depurandi causa foliorum exsiccatorem semuncia cum duodecim Libris aquæ infunditur & partitis vicibus quotidie hauritur; Pulvis Ulceribus sordidis & Carni fungosæ inspersus salubritatem suam probavit expertis.

**COBALTUM**. Hoc nomine minime proprio passim in Pharmacopoliis prostat Minera Arsenici arida, striata, nigra. Arsenicum porosum L. haud infrequenter in montibus delitescens. Ad necandas muscas inconsulto adhibetur. Ab usu omnino arcendum.

**COCCIONELLA**, *Cocciniglia, Cochenille*. Insecta duas circiter lineas longa, utrinque rugosa, coloris intus punicei, extus atro-rufi, odoris vacua, saporis leniter adstringentis, nonnihil etiam nauseosi, & empyreuma resipientis. Coccus Cacti L. In regno Mexicano, Carolina & Georgia patriam sedem habet, ad Antequara Provinciæ Guaratæ urbem super variis Opuntiae speciebus colitur; insecta, sive aqua ebulliente, sive calentibus laminis ferreis, enecata nobis mittuntur. Colore purpureo perfusa, qui Acido affuso exaltatur, Alkali profundior redditur, Coccionella Tinctoribus potissimum inservit, Urinam propellere dicitur; præcipue ad infucanda medicamenta adhibetur.

**COCCOGNIDIUM** nequaquam Granum Cnidium Veterum. *Semenza di Laureola, Semence de Laureole, Seidelbastsaamen*. Semina rotunda, Pisi magnitudinem fere æquant, in brevem apicem exeuntia; sub cortice fusco, fragili,

striato, nucleum oleosum, acerrimum includunt. *Daphne Mezereum* L. *Blackwell* Tab. 582. Frutex per omnem Europam præter maxime Meridionalem obvius. Horum Granorum dosin admodum exigua primas Vias vehementer irritasse, imo excitata Inflammatione mortem intulisse referunt Experti; quocirca ab eorum usu abstinent cauti.

**COCCULI**. Nuces subrotundæ, magnitudine Pisi majora referentes, gryseæ, rugosæ, non raro pedunculo sustentatæ, sub Cortice tenaci nucleum reniformem, amarissimum & fervido sapore linguam afficientem includunt. *Menispermum Cocculus* L. *Blackwell* Tab. 389. Frutex in India Orientali crescens. Ad usus internos nunquam adhibetur, inescandis piscibus inserpiunt, qui inde vertigine corripiti adeo, ut aquæ supernatantes manibus capi possint, dicuntur; Pulvis locis Pediculosis inspargitur.

**COCHLEARIA**, *Coclearia, Herbe aux Guillerées, Læffelkraut*. Folia magnis petiolis innixa, subrotunda, cordata, angulata, facie prona, leviter depressa, odorem, nisi manibus conterantur, admodum tenuem, exsiccatione una cum sapore amittunt, relicta aliquanta amaritie. Crescit ad littora Maris; in Corsica quoque obvia, apud nos in hortis culta per totum annum recens carpi potest. Spiritus Vini quam aqua ipsi accommodatior esse, Oleumque destillatum inde obtineri dicitur. Laudatur ad aperienda Viscera Abdominalia; Antiscorbuticorum princeps habetur. Ad varios usus medicatos partim recentia folia Fusculis infunduntur, partim Succus inde exprimitur, qui etiam ad Gingivas fricandas adhiberi solet.

**COCHLEA**, *Lumaca, Limacon, Schnecke*. Ex numerosa gente inter nos recipitur *Helix Pomatia* L. cujus testa subovata est, prior anfractus reliquis multo major, decolor, umbilicata, conoidea. In Europa temperata vulgaris, nimia etiam sui frequentia nostrorum hortorum pestis, mucro privata crebro in cibum recipitur. Demulcendi, ergo ex Jure coquantur Cochlearum ad decem usque cum Unciis duodecim menstrui aquosi. Testa



neque id genus neque ceteræ ullas præter Absorbentes vires habent, vel rarissime in usum trahuntur.

**CODAGAPALA**, *Cropal*, *Profluvii Cortex*, *Canessi Rinde*. In tubulos, aliquot lineas crassos, convolutus adduci, niger, superficie nigra Lichene tecta, saporis amari & austeri esse dicitur. Nerium Antidysentericum L. Humilis arbor in Malabaria & Zeylona crescens. A Britannis potissimum ad sistendam Diarrhæam laudabatur, a Lichene purgatus & in Pulverem redactus ad Drachmam semis dabatur aliquoties de die. Hoc medicamento, cum plura alia ad eundem scopum facientia habeamus, carere facile possumus.

**COLCHICUM**, *Faule Fuden*, *Radix bulbosa*, subrotunda, uno latere gibba, squamis inde rejiciendis tecta, sub cuticula flava carnem albam includit, odore minus grato nares, & si verno tempore effoditur sapore acri quidem, sed nec rodente, nec inflammante linguam afficit. Colchicum Autumnale L. *Blackwell Tab. 566*. Crescit in Europa temperata. Ventriculis justo vehementius irritamentum esse, imo lethales inde effectus excitatos fuisse Observatores docent. Hodie scopo Diuretico Oxymelli immiscetur.

**COLOCYNTHIS**. *Coloquintida*, *Coloquint*. Pulpa cortice nudata, variæ magnitudinis, subrotunda, sicca, candida, fungosa, levis, sex loculis distincta, Semina concludens, ovata, compressa, flavicantia, modice amara, saporem habet amarissimum, acrem, odorem nauseosum. Cucumis Colocynthis L. *Blackwell Tab. 441*. In Archipelago & Oriente crescit; apud nos instar Citrullorum colenda; copiosa mucilagine turgēt. Pertinet ad validiora Drastica, gravissima Tormina inde excitata, imo ipsum Sanguinem ex vasis Intestinalibus extortum fuisse, memoriæ proditum est. Hanc virulentiam Veteres ope Mucilaginis Tragacanthæ corrigere tentarunt & Trochiscos inde, Alhandal nominatos, formarunt; sed hæc corrigendi ratio, cum effectu fere prorsus fraudarit Observatores, hodie transit hoc nomen ad Pulpam in tenerrimum pulverem redactam. Pulpa hoc modo parata interne sola datur,

sed ad pauca modo Grana Pilulis Stimuli loco adjicitur. Semina aqua probe lota Emulsionem præbere, nec amaram, nec purgantem lego. Pulpa scopo Anthelmintico Umbilico imponitur; ad tres Drachmas usque Clysmatibus irritantibus adjicitur, Extractum aquosum Pulpa multo mitius esse, ejusque ad Grana sex usque dosim augeri posse, resinofum vero valde torminosum esse, asseritur.

**COLOMBO RADIX**. Taleolæ pollicares, irregulariter rotundæ sive longitudinaliter sectæ; sub cortice rugoso & bruneo medullam flavicantem levissime striatam, laxiusculam concludunt, odoris fere expertes, gustu amaræ; recenter allatas Cuminum redolere lego. Ex urbe Colombo Insulæ Zeylon advehitur. Laudatur a vi Antiseptica, & Roborandi ergo in Cholera, Vomitu, Diarrhæa, Dysenteria ad Drachmam unam singulis triboriis exhibetur.

**COLOPHONIUM**, *Colosonia*, *Resina nigra*, *Bray sec*, *Geigenharz*. Resina solida, splendens, fusco rufescens, fragilis, fractura plana, nitente, vix odora, insipida. Est residuum a Terebinthina destillationi per se subjecta. In modum Resinæ Vulgaris in Emplastra recipitur, suffusus ejus Prolapsibus medetur.

**COLUBRINUM LIGNUM**, *Bois Couleuvrée*, *Schlangenholz*. Frusta dimidium circiter pedem crassa solida, ponderosa, alba, quadantenus etiam lutescentia, cortice tecta castaneo, rugoso, tuberculis aspero, inodora, intense amara. Strychnos Colubrina L. *Blackwell Tab. 403*. Crescit in India. Sunt, qui inde effectus Narcoticos surrexisse dicant, alii contra Febres & Vermes laudant. Anticeps medicamentum merito exsolevit.

**CONCHÆ**, *Conchiglie*, *Coquilles*, *Muscheln*. Sunt domunculæ Testaceorum, quæ aqua penitus ablutæ ad usus medicatos adhibentur, saporis & odoris expertes, Calcarei qualitibus instructæ; ex omni Vermium testaceorum genere desumi possunt. Apud nos vulgo a Mya Pictorum L. copiosissime fluviis inhabitante desumuntur. Earum Pulvis quippe a Crollio tanquam specificum ad Febres intermittentes enixe commendatus, SPECIFICUM AN-



**TIFEBRILE** Crollii cognominatur. *Præter Absorbentes nullas vires habent.*

**CONSOLIDA MAJOR** videatur **SYM-  
PHYTUM**.

**CONSOLIDA MEDIA** videatur **BU-  
GULA**.

**CONSOLIDA MINOR** videatur **BRU-  
NELLA**.

**CONSOLIDA REGALIS**, *Calcatrippa*, *Pied d'Alouette*, *Rittersparlein*. Corolla pentapetala, irregularis, patens, acuta, nectatio antice bifido, hispido, in calcar educto instructa, inodora, amara. *Delphinium Consolida* L. *Blackwell* Tab. 29. *Præter vires cum omnibus amaris communes, nullas proprias habet.*

**CONSOLIDA SARACENICA**, *Erba giudaica*, *Verge d'or*, *Heidnisch Wundkraut*. Folia ex ovatis oblonga, argute ferrata, acute terminata, leviter aspera, pallidius viridia, gusto leviter adstringentia, nonnihil amara. *Solidago Virgaurea* L. Ubique in Europa crescit. *Tam intus, quam extus Traumatico scopo assumitur; Infusum ejus vires Antinephriticas edere animadversum est.*

**CONTRAJERVA**. Est Radix fibrosa, plurimis fibrillis instructa, rugosa, extus fusca, intus pallida, tenui odore, sapore subadstringente, levissime aromatico instructa. *Dorstenia Contrajerva* L. *Blackwell* Tab. 578. seq. In America Australi crescit. Spiritus Vini magis quam Aqua ad ejus vires recipiendas idoneus est. *Contra morbos Malignos olim magnopere commendabatur.*

**CONYZA CÆRULEA**, *Blau Dürrewurz*, *Berufkraut*. Folia lanceolata, hirsuta, integerrima utrinque villosa, acriscula, inodora. *Erigeron Acre* L. Passim per Europam invenitur. Olim in Germania maxime Incidendi scopo ad Infusa Pectoralia recipiebatur.

**CONYZA MEDIA**, *Dürrewurz*. Folia sagittata, cordato-ovata, levissime ferrata, rugosa, tomentosa, levi odore, sapore acrisculo instructa. *Inula Dysenterica* L. Passim per Europam obvia. Inepte olim Arnica substituta, interdum contra Dysenteriam dabatur.

**CONYZA VULGARIS**, *Grosse Dür-*

*wurz*. Folia majora, ovato-lanceolata, paulum acuta, hirsuta, utrinque tomentosa, levissime ferrata, non admodum odora, gustu subaromatica. *Conyza squarrosa* L. *Vulgaris Europæ planta.* Ob virtutem Emenagogam a quibusdam laudatur.

**COPAIBA BALSAMUM**. Limpidissimum est, spissitudinem habet inter *Terebinthinam* & *Olea unguinosa mediam*, colorem pallide citrinum, odorem proprium non prorsus ingratum, saporem amarum punctim acutum & linguæ diu inhærentem. *Copaivera* L. *Brasiliæ, Cajennæ, Carthagenæ civis, ex trunco arboris sauciato Balsamum effluit.* Olei odorati non colorati  $\frac{1}{2}$  inde obtinui. Circa medicamentum hujus, quippe multum calidi usum internum cautissime versandum est. *Abstergendi & Consolidandi causa ad Guttas decem in vehiculo saponaceo datur. Solutio ejus in Spiritu Vini Tartarificato sub titulo TINCTURÆ BALSAMI PERUVIANI ALBI* prostat; multum exæstuans medicamentum.

**COPAL GUMMI**. Frusta variæ magnitudinis, pugnum interdum æquant, pallide lutea, pellucida, dura, inodora insipida. Color dilutius citrinus, durities, pelluciditas, indissolubilitas in Spiritu Vini sunt indicia bonitatis. Ex regno Mexicano advehitur, origo ejus adhucdum ignoratur. Igne funditur, fusumque Oleis dissolvitur unguinosus, quibus alias nullæ sunt ipsam vires. Oleis *Rorismarini, Lavendule, Benzoës, Balsamo Capaibæ, Terebinthinæ* dissolvi dicitur, nec non Alcohole, siquidem cum Camphora fuerit tritum. Dissolvitur Alcohole, quod sub digestionem *Tincturæ Tartari* destillat. Unice ad Vernices adhibetur.

**CORALLIA ALBA**, *Coralli bianchi, Corailles blancs, weisse Corallen*. Fragmenta prostant in officinis parva, lapidea, subinde ramosa, copiosissimis foraminibus, stellæ figuram referentibus ex sculpta, alba, insipida, inodora. *Madrepora Oculata* L. *Blackwell* Tab. 342. & 343. Magna ejus copia colligitur in Oceano Indico. Vires præter Absorbentes nullas habet.



**CORALLIA RUBRA**, *Coralli rossi*, *Corailles rouges*, *rothe Corallen*. In officinas recipiuntur fragmenta exigua, gracilia, lapidea, creberrime ramosa, integerrima, rubra, odoris æque ac saporis vacua. Isis nobilis L. Maris Mediterranei propria. *Vires cum præcedentibus pares, Roborantes nullas habet.*

**CORALLINA**, *Corallina*, *Mousse marine*, *Corallen* oder *Meermoss*. Fragmenta articulata articulis ovato-subcuneiformibus, pinnatis, duriuscula, friabilia, odore nauseoso, marino, sapore salino instructa. *Corallina officinalis* L. In Mari Anglico & Mediterraneo obtinetur. *Pulveribus Anthelminticis adjicitur.*

**CORIANDRUM**, *Coriandro*, *Coriander*. Semina rotunda, umbilicata, striata, cava, flavicantia; recentia Cimices redolent; exsiccata proprium & gratum odorem spirant, sapor etiam gratus est & aromaticus. *Coriandrum Sativum* L. *Blackwell* Tab. 176. Italiæ & Palestinæ indigenum, apud nos in agris colitur. Olei destillati  $\frac{4}{77}$  fundere dicitur. Ad eliciendas ejus vires Spiritus Vini aptior quam aqua est. *Formidine mali liberrimum, cum successu scopo Carminativo usurpatur.*

**CORNA**. *Corniole*, *Cornouilles*, *Cornel* oder *vvelsche Kirschen*. Fructus umbilicati, figura Olivas referentes, magnitudine Cerasa, rubri, sub tenui cuticula carnem continent dulcem, paululum etiam adstringentem, in qua reconditum durissimum ossiculum, drupam fere æquat, duosque nucleos exiguos concludit. *Cornus Mas* L. *Blackwell* Tab. 121. Copiosa arbor in Europa temperata. *Vires ei fructibus horæ communes sunt, aliquatenus etiam Adstringentes. Rob inde paratum proflare solet.*

**CORONOPUS**, *Coronopo*, *Corne de Cerf*, *Krabensfus*. Folia nervo lato crenata, pinnatifida, pinnis cuneiformibus, progrediendo majoribus, jam integris, jam incis, gustu acriuscula. *Cochlearia Coronopus* L. *Blackwell* Tab. 120. Europæ haud infrequens planta. Huic potius, quam insipide *Plantaginis* speciei *Vires Diureticae adscribendæ sunt.*

**COSTUS**. Radicis Cortex aliquot pol-

lices longus, interdum etiam sesquipedalis, dimidium circiter pollicem crassus, extus flavicans, medulla laxa profundius tincta fartus, convolutus, Violas redolens, sapore evidenter amarus & acer. *Costus Arabicus* L. *Blackwell* Tab. 394. Crescit in utraque India. *Stomachicis, Becchicis, Diureticis adscribitur Infusum Spirituosum aquoso efficacius est.* Costi in amarum & dulcem distinctio nulla est.

**CRANIUM HUMANUM**. Medicamentum nonnisi anilibus fabulis & absurdissima superstitione nixum jure evuluit. Asservabantur hoc nomine Ossa Parietalia.

**CRASSULA**, *Telephium*, *Favagello*, *Orpin*, *Reprise*, *fette Henne*. Folia sessilia, ovata, obtusa, plana, crassa, dentata, glauco-viridia, subdulcia. *Sedum Telephium album* L. Passim in Europa occurrit. *Succus inde expressus Refrigerandi & Demulcendi scopo ad aliquot Uncias pro doli datur.*

**CRETA**, *Creta*, *Craie*. *Kreide*. Massæ variæ magnitudinis, partim molliores, partim duriores, siticulosa, cum Acidis effervescentes, digitos maculantes, adducendas lineas aptæ, igne in calcem abeuntes. *Calx Creta* L. Maximam ejus copiam Europa suppeditat, sive per strata collocatam, sive dispersam. *Ab Absorbendum intus valet; ad Exsiccandum extus Impetigini inspergitur.*

**CREPITUS LUPI** videatur **BOVISTA**.

**CRITHMUM**, *Erbacali*, *Bacile*, *Fenoil de Mer*, *Meersfenchel*. Folia, pinnis pinnata integris, trifidis, oblongis, crassiusculis, subacria. *Crithmum maritimum* L. Ad Maris littora crescit, apud nos in frigidario ab injuria hyemis defenditur. *Ad excitandam esuriem sub forma Acetarii comeditur; propter vires etiam Aperientes celebratur.*

**CROCUS**, *Saffran*. Stigmata fulva, filiformia, inferne angustata, odore proprio, forti, Cerebrum gravante, sapore aromatico, amaro instructa, aliquantum etiam tenacia. Rejiciuntur, quæ digitos pressa non polluant, levem admodum aut peregrinum odorem spirant, quæque filamentis albis aut luteis



intermixtis distincta sunt. *Crocus sativus officinalis* L. Crescit in Europa calida, nostræ hyemis patientissima. Passim per Europam colitur. Optimus est ab *Oriente* sive *Austria* denominatus, cui tamen *Vastiniensis* neutiquam cedit; *Maglianensis* in Pulverem redactus præ reliquis uberius tingit. Olei destillati paucillum fundere dicitur. *Humores valide attenuat*, ad remedia *Becchica* & *Emenagoga* recipitur; *Putredini resistit*; largius sumtus *Affectus soporosos excitat*. Datur ad Grana decem sub forma Pulveris in quem ut possit conteri, clibano prius exsiccandus est. Extus *Resolvendi* & *Sopiendi causa* ad *Cataplasmata*, *Epithemata* &c. recipitur. Miror de medicamento parva dosi efficaci *Extractum* parari.

**CRUCIATA**, *Pettimbrosa*, *Croisette*, gelb. *Kreutzkraut*. Folia ovata, sessilia, acutiuscula, hirsuta, cauli tetragono, hirsuto insidentia, sapore quam minime amaricantia. *Valantia Cruciata* L. *Blackwell* Tab. 76. Olim ejus tam internus, quam externus contra *Hernias* usus erat.

**CRYSTALLUS MONTANA**. Prostant in officinis Fragmenta pellucida, alba, durissima, angulata, limæ vim omnem repellentia, nec aqua, nec acidis, nec igne fundenda, insipida, inodora. *Nitrum Crystallus montana* L. Reperitur in montibus. Omnis virtutis medicinalis expers est.

**CUBEÆ**. Capsulæ rotundæ, pedunculatæ, *Piperi* circiter figura & magnitudine assimiles, rugosæ, granum extrinsecus nigrum, intus album, odore proprio fragrans, sapore acre, aromaticum continent. Majores, nucleo ventricoso factæ, ceteris præferuntur. Planta unde colliguntur in *Pharmatopœa Suecica* farmentosa esse dicitur & *Piperis caudati* nomine venit. In Asia Meridionali provenit. Exiguam quantitatem. Olei Essentialis mitis fundere dicuntur. Ratione virium mitiores, ceterum *Piperi* rotundo æquiparabiles sunt. Utrum Aquâ an Spiritu Vini extrahantur, nihil interest.

**CUCUMIS**, *Cocomero*, *Concombre*, *Cucumer*. Fructus, antequam ad plenam maturitatem pervenerit, recipitur oblon-

gus, plus minus cylindraceus, frequenter incurvus, imparibus tuberculis obfessus, colore in tempore viridis, quo vero propius ad maturitatem accedit, eo magis pro plantæ, unde desumitur, varietate vel flavescit, vel albescit. Pulpa quam maxime succosa proprio odore, dulciculo sapore prædita, Semina complectitur parva, compressa, utroque apice obtusa, alterutro tamen emarginata, sub cortice flavicante medullam albam & dulcem includentia. *Cucumis Sativus* L. *Blackwell* Tab. 4. *Constantinopoli* & *Ægypto* spontaneus, apud nos sub diu per plures varietates colitur; *Citrullis* viribus par, præcipue sub forma *Acetarii* assumitur, cui scopo, qui succum inde ante exprimunt, incongrue agunt. In vi Aperiente laus ejus ponitur egregia. Fructus tenelli Aceto & Sale conditi **CORNICHONS** cum carne comeduntur, ex condimentis maxime dijudicandi. Semina quatuor frigidis majoribus adjiciuntur.

**CUCUMIS ASININUS**, *Cocomero salvatico*, *Concombre sauvage*, *Eselskürbis*. Radix crassa, fibrosa, alba, inodora, insigniter amara. *Momordica Elaterium*. L. *Blackwell* Tab. 108. Europæ Australis civis, in hortis nostris sponte sparsis feminibus propagatur. Medicamentum a Veteribus pro valde Drastico habitum ad Scrupulum usque datum, extus quoque Discutiendi scopo in usum tractum, nostro ævo ab usu medicato summo jure fere removetur.

**CUCURBITA**, *Zucca*, *Courge*, *Kürbis*, *Pfaffenbüttelein*. Fructus variæ magnitudinis, subrotundus, apice depressus, tuberculis notatus, flavus, Pulpam præbet siccescentem, flavescientem, fere insipidam, Semina continentem majora, utrinque plana, ovata, margine tumido cincta, conclusus Nucleus dulcis est & albus. *Cucurbita Melopepo* L. Apud nos in agris colitur. Ab infima plebe in cibum recipitur. Semina quatuor frigidis majoribus adduntur.

**CULILAVVAN CORTEX**. Frusta lineam circiter crassa, sesquipollicem lata, plana, interdum concava, colore cinnamomeo perfusa, tenera & rugosa, epidermide tecta, texturâ laxioris, odor-



re fragranti, Caryophyllos referente, simili sapore, sed mitiore prædita. Laurus Culilaban L. Arbor Indiæ Orientalis. Exiguam portionem Olei limpidi, quod L. Sassafras & Caryophyllos sapit, fundere dicitur. *Medias inter Casiam ligneam & Caryophyllatam vires possidere videtur.*

CUMINUM, Römischer Kümmel. Hodiernum evidenter ab eo, quo Veteres utebantur, differt. Semina majuscula, ovato-oblonga, striata, ex gryseo-flavescentia, odore & sapore aromatica, non admodum grata. Cuminum Cyminum L. Ægypti & Palæstinæ indigenum, in Sicilia & Melito colitur. Olei odorati  $\frac{1}{32}$  largiri dicitur. *Rarius intus scopo Carminativo datur; Extus ad Discutiendum sub forma Epithematis adhibetur.*

CUPRESSUS, Cipressò, Cyprès. Lignum sub cortice ferrugineo ex albo flavicat, absque ullo odore, saporem levissimum habet; Folia sunt pinnata pinnis imbricatis, virida, gustu adstringentia, odoratu resinosa; Nuces, Veteribus Galbuli, sunt Coni subrotundi, dimissis seminibus, ex squamis constantes clavos referentes, uni communi axi affixis, superne gryseis, inferne rufis sapore sunt adstringentes, nec non aliquatenus resinosi & salini. Cupressus sempervirens L. Græciæ & Asiæ indigena arbor, nostræ hyemis patiens est. Omnes Cupressi partes, & præceteris Nuces, vires Adstringentes habent; hæc ad Drachmam dimidiam intus olim dabantur.

CUPRUM, Æs, Rame, Cuivre, Kupfer. Metallum rubrum, odore proprio, sapore nauseoso instructum, post Ferrum difficillime funditur & fluens pulcherrimis micat coloribus, tardius exurit, quam cetera, quæ ignobilia dicuntur, metalla, mediæ inter Aurum & Ferrum firmitatis, malleabilitate Argento superpar, novies fere aqua gravius est. Sive Nativum, sive sub forma variarum Minerarum Natura subministrat; menstruis quibuscumque solubile, aëre in viridem calcem vertitur. *Tam extus quam intus effectus Rodentes edit, quapropter ab usu ejus medicato usquequaque abstinendum, quin &*

instrumenta inde parata, cum fere nunquam satis cautus eorum sit usus, a culinis æque ac pharmacopoliis, me quidem judice, tutius prohibentur.

CURCUMA, Terra merita. Radix tuberosa, geniculata geniculis cylindræis vel subrotundis, rugosis, extus pallidioribus, intus splendentibus, rufo-croceis, odoris levissimi, saporis aromatici. Curcuma longa L. *Blackwell* Tab. 396. Crescit & colitur in omni Indiâ aquosa; apud nos semper in vaporario asservanda. Olei odorati aliquantulum fundere dicitur. *Primas vias Roborat, Obstructiones Abdominales tollit. Datur ad Scrupulos duos sub forma Pulveris, ad Drachmas duas cum aqua infusa.*

CUSCUTA, Epithymum, Epitimo, Flachseide, Goutte de lin. Filamenta longa, tenerrima, multis tuberculis obsessa, sapore vix dum acriusculo prædita. Cuscuta Europæa L. Parasitica planta, variis Vegetabilibus, apud nos præcipue Euphorbiis, innascitur. *Olim Purgantibus adscripta hodie usu fere destituta.*

CYANUS, Fioraliso, Bluet, Kornblume. Flores asservantur e calyce evulsi, tubulosi, profunde quinquefidi & ultra, cærulei, inodori, insipidi quidem, aquam vero, qua cum infunduntur, amaram reddentes. Centaurea Cyanus L. *Blackwell* Tab. 270. Crescit per totam Europam. *Olim Resolvente & Diuretico scopo ad Infusiones adhibebantur. Aqua inde destillata utique iners ad Collyria recipitur.*

CYCLAMEN, Artanita, Pan porcino, Pain de pourceau, Schweinbrod. Radix tuberosa, leviter depressa, subrotunda, forinsecus nigricans, intus candida, inodora, sapore recens quidem acris, subacerba, exsiccata vero fere penitus insipida est. Cyclamen Europæum L. *Blackwell* Tab. 147. Europæ Orientalis & Meridionalis solum natale habet, nostras hyemes innoxias experitur. *Viribus Purgans vulgo habetur, olim ad Drachmam unam sub forma Pulveris, ad Unciam semis in Infuso exhibebatur.*

CYDONIA, Cotogni, Coinges, Quitten. Poma variæ magnitudinis, qua rotunda a Malis, qua turbinata a Pyris denomi-



nata, umbilico eminenter angulato insignita, epidermide aurea, tomento obfessa, carnem complectuntur firmam, lutescentem, quinquelocularem, fragrantem, evidenter adstringentem, acidam, *Semina* continentem ovata, mucro obducta, corticis spadicei, medullæ albæ, saporis fatui. *Pyrus Cydonia* L. *Blackwell* Tab. 137. Arbor ex Creta in Italiam advena, passim in Europa & sponte & cultura provenit. Pomum recens nimis acerbum varia ratione conditur Saccharo, in taleolas dissectum & exsiccatum mitescit & ad Decocta adhibetur; *Roborantes & Adstringentes vires edit. Semina in aqua contusa in Mucilaginem formantur, quæ intus quidem ad Os, Fauces, Ventriculum &c. Refrigerandi & Demulcendi ergo extus vero ad Ambusta, Fissuras; Ophthalmiam sanandam conducit. Drachma una Seminum, sex aquæ Uncias ad consistentiam Mucilaginis expissat,*

**CYMBALARIA**, *Linaria delle Montagne, Linairé des Montagnes, Cymbelkraut.* Folia reniformia, longius petiolata, succulenta, superne atro-viridia, inferne interdum purpurascentia, inodora, levissime falsa. Antirrhinum *Cymbalaria* L. Vulgatissima per Europam temperatam planta. In Aperiendo vis ejus hinc & inde laudatur, tam cum Jusculis recens coquitur, quam Succus ejus expressus exhibetur.

**CYNOGLOSSUM**, *Cinoglossa, Langue de Chien, Hundszunge.* Radix oblonga, crassiuscula, extus ex atro-rubens, intus alba, odoris, recens minus grati, exsiccata prorsus vacua, gustu fatua. Folia sunt oblonga, acuminata, utrinque alba, nec odora, nec sapida. *Cynoglossum officinale* L. *Blanckwell* Tab. 249. Crescit, quia late patet Europa. Planta ab omni retro tempore innoxia habita, superiori demum seculo, incerta observationum auctoritate in suspicionem adducta, experientia tandem magnorum Virorum noxæ omnino exempta est. A vi Relaxante laudatur, hodie rarius usurpatur.

**CYNOSBATUS**, *Cini, Gratte-cul, Hagenbutte, Butte.* Fructus ovalis, coronatus calycis laciniis, lævis, nitidus, ruber, intus flavescens, tenui odore, sa-

pore grato paulum vinoso instructus, Semina subovata, pilis rigidiusculis inhaerentia continet; asservatur in longitudinem dissectus, a pilis æque ac semine penitus purgatus. *Rosa Canina* L. *Blackwell* Tab. 8. Non modo per totam Europam, sed etiam in Asia & America offenditur *Comeduntur hi fructus in Rob redacti, adhibentur cum aqua decocti, Scopio Roborandi & Urinam pellendi.*

**CYNOSBATI FUNGUS**, *Bedeguar, Schafkumz.* Est excresecientia Rosæ fruticis, quæ variam magnitudinem habet, subrotunda, rubra, spongiosa, fibrispulchre & varie flexis cincta, intus cava, odoris nullius, saporis leniter adstringentis; formatur a Cynipe Rosæ L. *Adstringentes vires habere dicitur, alias etiam Fungus ipsi affingit.*

**CYPERUS LONGUS**, *Cipero longo, Souchet long.* Radix duriuscula calamo anserino crassior, geniculata, circulis & nodulis notata, extus rufa, intus pellucidior, suaviter odora, gustu aromatica. *Cyperus longus* L. Galliae Meridionalis & Italiae civis, nostras hyemes fert. Propter vim Roborantem & Diureticam olim celebrabatur.

**CYPERUS ROTUNDUS**, *Cippero rotondo, Souchet rond.* Radices tuberosæ, ovatae, Olivarum magnitudinis, extus pallide rusæ, odorem præcedentibus debiliorem, saporem aromaticum eminentiorem habet. *Cyperus rotundus* L. Crescit in India, Syria, Ægypto. Hanc præcipue Veteres in usum trahebant; Eadem ipsi, ac præcedenti adscribuntur vires.

**DACLYTI**, *Datteri, Dattes, Datteln.* Fructus cylindroides, pollicares, superne pulvinati, umbilico cartilagineo notati, rufi, rugosi; Pulpa cuticula tenerima obducta, viscidula, ex rufo-flavescens, sapore dulcissima, lenissime etiam adstringens est; sub tunica alba, splendente, ex pluribus lamellis constante, officulum absconditum est convexo-planum, oblongum, albidum, in facie plana sulco notatum, intus plumbeo-violaceum, adstringens. Rejiciuntur Dactyli profundius sulcati, albi, mol-



molliores, nec non aridi, flaccidi, quique concussu sonant. Phoenix Dactilifera L. *Blackwell* Tab. 202. In Asia, Africa & America sponte, in Hispania, Lusitania & Italia Meridionali cultura crescit; fructus in his regionibus etiam ematurescunt, Orientalibus autem utique postponuntur; apud nos semper in caldario asservari debet. *Mensis secundis apponi solent; Decoctis Pectoralibus adjiciuntur, ceterorum Demulcentium relaxationis nimiae temperamentum.*

DAUCUS CRETICUS, Semina cylindracea, villosa, aliquantulum odora, sapore aromatica. Athamanta Cretenfis L. *Blackwell* Tab. 471. Helvetiæ, Galliæ Meridionalis, Austriæ progenies. Aliquantum Olei odorati fundere dicitur. *Recipitur ad Infusa Carminativa & Diuretica.*

DAUCUS VULGARIS, Carota, Carottes, Vogelneß, Mæhren, gelbe Ruben. Radices fusiformes, pro hortensi, unde desumuntur, varietate luteæ, albæ, rubræ, proprium aromaticum odorem, saporem habent admodum dulcem. Semina ovalia, convexo-plana, altera facie striis pilisque rigidis obsessa, aromatici saporis sunt, aliquantum etiam amari. Daucus Carota L. Crescit quæ patet Europa. Copiose in hortis colitur. Radices a varietate sativa, Semina a Sylvestri desumuntur. Radices tanquam olus, in culinas recipiuntur, recentes rasas vel cum aqua in Cataplasma coctas, egregie contra Ulcera Cancrosa facere Recentiorum Observationes adstruunt. *Seminum vis medica cum præcedentibus equiparatur.*

DENTALIA. Sunt Conchylia profundius striata, quæ canales cylindroides referunt, alba, insipida, inodora, utrinque aperta, leviter arcuata. Dentalium Elephantinum L. In Oceano Indico & Europeo occurrit. *Intus Adstringendi, extus Exsiccandi ergo olim adhibebantur.*

DENTARIA MAJOR, Schuppenwurzel. Est Radix longa, squamis sibi invicem incumbentibus efformata, ferruginea. Lathræa squamaria L. *Blackwell* Tab. 130. Vix ultra Alsatiâ in regio-

nes calidiores ascendit. *A paucis & quidem sine ulla observatione contra Epilepsiam est laudata.*

DENTARIA MINOR, Zahnwurzel. Radix cylindroidea, ad angulos rectos ramosa, alba, e squamis geniculata, saporis acris, minus grati. Dentaria Pentaphylla L. In altioribus montibus Europæ temperatæ occurrit. *Pulverata tanquam Roborans, ad Vulnera interna & Hernias sanandas dabatur, non admodum, ut mihi quidem videtur, congruenter.*

DENTELLARIA, Bleywurzel. Radix cylindracea, ramosa, saporis fervidi. Folia lanceolata, amplexicaulia, scabra, acerrima. Plumbago Europæa L. Crescit in Europa calida. *Apopplegmatisandi ergo quidam Radicibus in locum Radicis Pyrethri usi sunt. Folia Cutim exulcerare observata sunt. Oleo cum eis infuso partes Cancrosas extirpatas esse, lego.*

DICTAMNUS ALBUS. Radices albæ, oblongæ, fere calamum crassæ, intus spongiosi quid, odorem nullum habent; aquam, cum qua infunduntur, amaram reddunt. Dictamnus albus L. *Blackwell* Tab. 75. Europæ temperatæ civis; *Pulveris Drachma semis Anthelmintico & Emenagogo scopo commendatur.*

DICTAMNUS CRETICUS. Folia orbiculata, utrimque multo tomento obsessa, odorem jam in recentibus levem, saporem aromaticum, neque vero acrem habent. Origanum Dictamnus L. *Blackwell* Tab. 462. Suffrutex Europæ magis Meridionali proprius, hyeme apud nos in frigidario asservatur. Oleum destillatum fundere dicitur. *Maxime ad morbos Uterinos olim commendabatur.*

DIGITALIS, Doitier, Fingerbut. Folia ovato-oblonga, rugosa, crenata, leniter pubescentia, amara cum levi acrimonia. Digitalis purpurea L. *Blackwell* Tab. 16. Crescit in Europa temperata, non ultra Hassiam videtur ascendere. *Emetica est & Hydropicis laudatur. Foliorum recentium Unciæ quatuor in triginta & duabus Unciis aquæ ad sedecim residuas Unciis coquantur & Decocti aliquot Cochlearia exhibentur. Butyro recepta contra Scrophulas extus adhibetur.*



**DIPSACUS**, *Carolo*, *Chardon à Fonlon*, *Karten oder Bubendistel*. Radix fibrosa, alba, valde amara. *Dipsacus Fullonum* L. *Blackwell* Tab. 50. Crescit in Europa temperata. Nonnullos eam contra *Obstructiones Abdominales* Decoctis admississe lego.

**DORONICUM**, *Gemsenwurz*. Radicis tuberosa, articulata, articuli prostant, rotundi, in angustum finem terminati, extus flavicantes, intus albi, inodori, sapore dulciusculi, subaromatici. *Doronicum Pardalianches* L. *Blackwell* Tab. 239. Altiorum montium civis. Nec venenata esse, nec proprias vires medicatas habere observata est.

**DRACONIS SANGUIS**. Resina, quæ in variæ magnitudinis massis ad nos pervehitur, nigro-rubicunda, moleculis, quandoque splendidis distincta, fragilis, fractura mox nitida, mox contra; quæ ad nos perveniunt massulæ foliis arundinaceis obvolutæ, plurimam partem concatenatæ, nec non majores etiam solitariae exquisiti coloris melioris notæ esse judicantur; prostant vero etiam, quanquam rarius frustra Cinnabarino colore conspicua. Varium Arborum genus hanc resinam largitur, illa obducti sunt Calami Rotang L. Indiæ Orientalis fruticis fructus; exsudat ex truncis Dracænæ Draconis L. *Blackwell* Tab. 358. cum priori contreraneæ & Pterocarpi Draconis L. Americæ Meridionalis civis. Sanguis Draconis nulum odorem spirat, sapor levissime resinosis est; flamma quam concipit, non ingratum fumum emittit; liquationem admittit. Ab Adstringente virtute laudatur. Adhibetur ad Dentifricia.

**DRACUNCULUS**, *Serpentaria*, *Estragon*, *Dragun*, *Kayfersalat*. Folia integerima, angusta, lanceolata, atro-viridia, odoratu pergrata, gustu aromatica, leniter linguam pungentia. *Artemisia Dracunculus* L. *Blackwell* Tab. 116. Asiæ Septentrionalis civis, apud nos copiose in hortis colitur. Tam in Palati gratiam, quam ad juvandam Digestionem Embamatibus & Acetariis adjicitur. Multo in usu est Acetum cum his foliis infusum.

**DULCAMARA** videatur **AMARA DULCIS**.

**EBENUM LIGNUM**. Est ponderosum, nigrum, splendens, saporis acrisculi. Ex India advehitur, ex medullio trunci desumi dicitur Arboris cujus character nos adhucdum latet. Usus præcipuus Mechanicus est. Vires Ligni Guajaci olim ei tribuebantur.

**EBULUS**, *Ebulo*, *Teble*, *Attich*. Radix est alba, fibrosa, amaricans, nauseosa. Folia magna, pinnata cum impari, ferrata, minus grate odora, amara, nauseosa, Flores assumuntur corymbis insidentes pentapetali; odor eorum Floribus Sambuci finitimus, sed minus gratus est; Baccæ rotundæ sunt, umbilicatæ, saporis dulciusculi, nonnihil amaricantis. *Sambucus Ebulus* L. *Blackwell* Tab. 488. Crescit per totam Europam. Radicibus vix Emetica & Hydragoga a quibusdam tribuitur. Unciæ duæ pro dosi aqua infunduntur, sive Succus inde expressi. Unciæ una exhibetur. Folia OEdeematibus aut Erysipelati imponuntur. Floribus his Sambuci flores præferuntur, ex Baccis ROB paratur, quod scopo Resolvendi, Sudorem aut Urinam pellendi ad Unciam semis exhibetur.

**EBUR**, *Avorio*, *Ivoire*, *Elffenbein*. Dentes laniarii, variæ magnitudinis, quinque pedes & ultra longi, albissimi, senio lutescentes, resini, basi latissimi & cavitate conoidea non raro pedali excavati & striati. Elephas maximus L. Africam & Asiam Meridionalem inhabitat. Rasura frustulis mollioribus & Cornu Cervi albidioribus efformatur,  $\frac{1}{2}$  Gelatinæ sicca largitur, ut plurimum Rasura Cornu Cervi adjicitur ad augendam Gelatinæ albedinem. Ebur ustum, quod perperam Spodium dicitur, album quidem vires Cornu Cerviusti exserit; nigrum vero artibus Mechanicis materiam subministrat.

**EBUR FOSSILE** L. improprie Unicornu fossile, Zoolithus Ebur fossile L. Occurrunt non raro integri dentes, plerumque eorum frusta majora vel minora, ut plurimum extus nigro aut gryseo cortice obducta, substantia fragili, albissima, cum Acidis effervescente effor-



formata, in quam Os aëre, aqua &c. fuit redactum. Cum Ebore isto collatum nihil proprii habet.

ELATINE, *Elatina*; *Velvotte*, *Ehrenpreisweiblein*. Folia brevissime petiolata, orbiculata, ovata, acutiuscula, pubescentia, subadstringentia, amarican-tia. Antirrhinum spurium L. Crescit in Europa temperata. Succus inde expressus Ulceribus sordidis & cancris salubris perhibetur.

ELEMI GUMMI. Resina quæ in magnis frustis flavis, suffuso vestigio viro-ris, inter digitos lentescens, odore proprio ad Fœniculum accedente, sa-pore amaricante instructis ad nos trans-vehitur; præter ficiorem foliis arundi-naceis involutam, qualis vulgo affere-batur, prostat & mollior, quæ in cistis missa hodie priori præferri solet. Amy-ris Elemifera L. Americæ Meridionalis Arbor. Igne liquefit. Oleis ejus ali-quantula tantum pars dissolvitur.  $\frac{1}{4}$  Olei odorati fundere dicitur. Adhibetur ad consolidanda Vulnera.

ENTALIA. Conchylia recta, lævia, penitus cava, utrinque pervia, albissi-ma. Dentalium Entalis L. Eandem cum Dentaliis patriam habent & ad eosdem scopos adhibentur.

ENDIVIA, *Indivia*, *Intybus*, *Scariola*, *Chicorée*, *Endivien*. Folia inferne angu-stata, pro varietatum discrimine mox lata & sinuata, mox angusta, laciniis acutis laciniata, lacteo succo turgent, amara; Semina cylindracea flavicant, angulis quatuor eminentibus notata, paucissimam medullam levissime sali-nam includunt. Cichorium Endivia L. *Blackwell* Tab. 378. In Palæstina sponte crescere dicitur, copiose apud nos in hortis colitur. Vires Cichorii exæquat. Fo-lia, cum sint succosiora, efficaciora etiam esse videntur; colligata aut terra tecta cum vi-röre amaritiem deponunt & in usus calina-res recipiuntur. Seminum, quatuor frigidis minoribus adscriptorum, usus abolevit.

ENULA, *Helenium*, *Enula*, *Aunée*, *Alant*. Radix crassa, multifida, extus fusca, exsiccata grysea, intus alba, odore haud ingrata, sapore acris, ama-

ricans. *Inula Helenium* L. *Blackwell* Tab. 437. Crescit in Europa tempera-ta. Pauxillum Olei odorati spissi funde-re dicitur. Humores attenuat, Solida ad Excretionem stimulat. Datur cum Aqua in-fusa. Extus contra Scabiem laudatur.

EPITHYMUM videatur CUSCUTA.

EQUISETUM, *Coda cavallina*, *Prêle*, *Queve de Cheval*, *Katzenvadel*. Cauli-culi virides, nodis distincti, ex quibus prodeunt setæ prælongæ, fragiles, me-diocriter adstringentes & leviter salini. Equisetum arvense L. *Blackwell* Tab. 217. Crescit per totam Europam. Viri-bus Adstringendi & Urinam pellendi præ-dita olim credebatur.

ERICA, *Erica*, *Bruyere*, *Heide*. Can-liculi dense obsiti Foliolis sagittatis, cras-siusculis, subulatis, læte viridibus, & Floribus alaribus, quadrifidis, partim rubris, partim albis, sapore evidenter adstringente. Erica vulgaris L. Obtinet per totam Europam. Cum aqua infusæ quidam Calculi conterendi propellendique vir-tutem tribuerunt.

ERINACEUS, *Riccio*, *Herison*, *Igel*. Animal quadrupes, toto corpore, præ-ter ventrem pilosum pedesque, aculeis ex fusco & albido variegatis obsessum. Erinaceus Europæus L. Totam Europam, citra maxime Septentrionalem inhabi-tat. Combustus satis absurde lectum com-mingentibus exhibetur.

ERUCA, *Ruchetta*, *Roquette*, *weisser Sens*. Semina minuta, rotunda, leviter flavicantia, proprio odore, acriore sa-pore instructa. Sinapi alba L. In Italia, Gallia, Anglia & Belgio sponte crescit. Seminis Sinapeos vim exferit, sed mitiorem.

ERYNGIUM, *Eringe*, *Gardon roland*, *Mannstreu*. Radix fibrosa, pollicem cir-citer crassa, extus nigra, intus alba, striis transversalibus notata, dulcicula. Eryngium Campestre L. *Blackwell* Tab. 297. Crescit in omni Europa. In vasa Renalia & Spermatica agere creditur; quinque Aperientibus minoribus adscri-bitur. Saccharo quoque condita prostat. Maritimi L. ad littora Maris crescentis & nostrorum hyemum patientis Radices cum præcedentibus conveniunt.



**ERYSIMUM**, *Erisamo*, *Velar*, *Wegsens*. Folia longa, laciniato-pinnata, lacinia terminali majore trifida, omnibus dentatis, scabra, odoris expers, sapore nasturtino non acri instructa. Erysimum Officinale L. *Blackwell* Tab. 28. Frequens Europæ planta. Sub forma Infusi Aquosi sumtum viarum Aërearum Mucum dissolvere credebatur.

**ESULA**, *Wolfsmilch*. Radices fusiformes, albæ; Folia pro varietate Specierum varie formata; Succum lacti colore & spissitudine similem vehunt acerrimum; Euphorbiæ L. species nonnisi ab Empyricis adhibentur; noxas eas ingessisse gravissimas Observatores fide digni adstruunt; a medicamento sane quam acerrimo, primas vias facillime inflammatorio prorsus abstinendum est. Radices & Folia exsiccata ad Grana quadraginta sine incommodo dari posse, nuper traditum est.

**EUPATORIUM**, *Eupatorio*, *Eupatoire*, *Kunigundenkraut*. Folia, cum Floribus recipi solita, oblonga sunt, acuminata, dentata, ferrata, odora, amara, Flores tubulosi, rufescentes, parvi, Semini papposo insident. Eupatorium Canabinum L. *Blackwell* Tab. 110. Crescit per totam Europam. Viscera aperire & Urinam ducere dicitur. Sumitur ejus Infusum aquosum. Extus partibus OEdematosis imponitur.

**EUPHORBIIUM**. Gummi Resina formam refert granorum variæ magnitudinis, subrotundorum, angularium, rufo-flavescentium, sapore acerrimorum; hæc grana accensa non ingratum odorem spargunt. Est lacruma Euphorbiæ Officinarum L. *Blackwell* Tab. 340. Africæ civis; apud nos per hyemem in caldario asservandæ. Gummosum & Resinosum principium æquabiliter vehere & in Resinoso maxime virulentia hærrere dicitur. Cum gravissima mala inde excitata fuisse Observatores testentur, nunquam intus dandum, licet a quibusdam ad Granorum trium dosin commendetur. Extus cum successu Ossibus cariosis inspergitur; Rubefacientibus aut Sternutatoriis inconsulto adjicitur.

**EUPHRASIA**, *Eufraise*, *Augentrost*. Asservantur Cauliculi pubescentes, amaricantes, subadstringentes, obfessi, Foliis ovatis, obtusis, ferratis, dentatis, viridibus, rugosis; Floribus axillaribus, personatis, albis, ex luteo & cæruleo variegatis. Euphrasia Officinalis L. *Blackwell* Tab. 427. Vulgaris per Europam. Infusum aquosum ad referendas Obstructiones Abdominales laudatur. Cum Musto fermentata aut Pani incocta, aut Succus ejus expressus, Oculis instillatus, multum olim ad roborandum Visum commendabatur.

**FABA**, *Fava*, *Fève des Marais*, *Welfsche Bohne*, *Saubohne*. Flores papilionacei, vexillo longiore, albo striis rubris picto, alis macula nigra notatis instructi, odorem recentes fortem spirant, eumque suavissimum, exsiccati nullum. Semina pro Varietatis diversitate diversæ magnitudinis, reniformia, ovata, jam utrinque compressa, jam ventricosa, alba, flava, gilva, medullam albam includunt subdulcem. Vicia Faba L. *Blackwell* Tab. 19. Ægypti indigena, apud nos copiosissime in agris feritur. Cortice privata Semina tenella frequentius, quam matura & exsiccata, mensis apponuntur; Farina, in quatuor Farinarum Resolventium numero hadita, ad Epithemata necnon ad usus Cosméticos recipitur. Flores exsiccati omnino inertes sunt, perinde ac Aqua inde destillata.

**FABA CRASSA**, *Sempreviva salvatica*, *Telephium*, *Orpin*, *fette Henne*. Folia carnosa, sessilia, plana, ovata, irregulariter ferrata, inodora, insipida. Sedum Telephium album L. Admodum frequens Europæ planta. Nonnisi recens adhibenda. Tanquam refrigerans & Antiscorbuticum remedium intus datur; extus Clavis pedum imponitur.

**FABA SANCTI IGNATII**. Semen Avellana majus, angulatum, durissimum quasi corneum, extus gryseum, intus splendens, amarissimum. Pharmacopœa Suecica ut & Celeb. Bergius, nescio qua auctoritate nixi, a quadam Strychni specie, Insularum Philippinarum Arbore, Semen hoc suppeditari asserunt. In Febribus intermittentibus ad



*Grana duodecim pro dosi data laudatur, interim tamen Vomitus, Convulsiones, Tremores inde excitatos esse observatum est, quapropter ejus exsolevit usus.*

**FAGOPYRUM**, *Saggina, Bled noir ou Sarrafin, Buchweizen, Heidenkorn*. Semina ovata, trigona, glabra, sub cortice trigono, albissimam & insipidam farinam includentia, Polygonum Fagopyrum L. Orientis indigenum, hodie passim in Europa colitur. Hordei loco in cibum recipitur; apud nos epulis excluditur, a quibusdam saginandis avibus adhibetur.

**FAGUS**, *Faggio, Hêtre, Buchen*. Fructus sub tegmine echinato Nuces includit, ex rotundo triquetras, quæ sub cortice badio coriaceo nucleum album compactum, cum aliquanta adstrictione dulcem includunt. Fagus Castanea L. Per Europam, præter maxime Septentrionalem, frequentissima arbor. Nuces interdum in cibum recipiuntur, at largius comestas Cerebrum turbare, imo Hydrophobiam excitare, sunt qui affirmant. Oleum inde expressum in cibum recipitur, annotinum minus quam recens Ventericulum gravare perhibetur.

**FARFARA**, *Farfaro, Tussilago, Pas d'ane, Roshub*. Radices tenues, fibrosæ, albidæ, inodoræ; Folia subrotundo-cordata, magna, petiolata, angulata, dentata, superne viridia, inferne tomentosa, saporis leviter adstringentis; Flores tubulosi, lutei, calice multifido comprehensi, leviter odori, subdulces. Tussilago Farfara L. *Blackwell* Tab. 204. Ubique in Europa invenitur. A vi Emolliente & Relaxante laudatur. Radices rarius, Flores creberrime ad Infusa Pectoralia recipiuntur. Folia a quibusdam eodem modo usurpantur, interdum quoque extus applicantur.

**FEL VITRI**, *Fiele del Vetro, Anatron, Fiel de Verre, Glasgall*. Panes seu massæ sunt coloris albi aut grysei & saporis salini; insignis earum durities est; in aëre humescunt, Syrupum Violarum viridi colore tingunt, fusionem Metallorum & Terrarum juvant. Formantur ex spuma quæ apud Vitriarios Frittae fluenti supernatat & inde auferitur; con-

stant ex Sale Alkali & Terra vitrescente, aliisque præterea, quæ ad Frittam recipi solent, Salibus: unde patet, pro varia Officina vitraria, unde desumitur omnino diversum esse. Incidendi quidem & Aluum ducendi causa a quibusdam laudabatur; sed quis est, qui medicamento tam dubio uti velit?

**FERRUM**, *Ferro, Fer, Eisen*. Metallum ignobile, aqua octuplo gravius, reliquis difficiliter fundendum, magis etiam elasticum, mediæ inter Aurum & Cuprum firmitatis, scite cusum malleabile evadit & in tenerrima fila extendi potest, ignitum scintillas vomit & in scoriam nigram abit, ope Salis cujusunque, ipsius etiam Aquæ solubile, quapropter in aëre rubiginem contrahit, attrahitur a Magnete, cum liquoribus adstringentibus nigrescit, majori principii inflammabilis ratione ditatum in Calybem vertitur. Uberius, quam cetera omnia metalla, Natura hoc sub forma diversissimarum glebarum progignit Tonicorum Princeps; ejus Limatura, ope Magnetis ab omni heterogeneo accuratissime segregata, sub forma Alcoholis ad Grana viginti usque exhibetur; cum Vino quoque infunditur.

**FILIPENDULA**, *Saxifraga rubra, rother Steinbrech*. Radix fibrosa, plures fibrillas emittens, quarum extremitatibus noduli sive tubera adhærescunt ovata, magnitudine imparia, ex rubro nigra, intus albâ, odoratu grata, gustu leviter aromatica & amaricantia; Autumno effodienda est. Spiræa Filipendula L. *Blackwell* Tab. 467. Crescit in Europa. Recipiebatur ad Decocta Roborantia & Diuretica.

**FILIX**, *Felce, Fougere, Farren*. Radices fibrosæ, crassæ, flavæ, amaricantes, mucosæ, nauscosæ. Pteris Aquilina L. *Blackwell* Tab. 325. Copiosa per Europam. Ab omni tempore tanquam egregium Tæniæ remedium laudatæ; Drachmæ earum tres vel quatuor cum Melle dabantur. Non raro recipiuntur Radices Polypodii Filicis Maris L. *Blackwell* Tab. 323. quæ fibrosæ sunt extus nigre, intus rufæ, sapore adstringentes.



**FOENICULUM**, *Finocchio Fenouil*, *Fenchel*. Radix fusiformis, alba, cum aromate dulcis, odorem spargit proprium, fragrantem. Folia longa, multiplicato-pinnata, laciniis filiformibus, odore & sapore Seminum, debiliora duntaxat. Semina oblonga, convexo-plana, striata, odoratu fragrantia, gustu aromatica, dulcicula. Anethum Foeniculum L. *Blackwell* Tab. 288. In Europa calida nec non in Anglia sponte crescit. Copiose in nostris regionibus colitur. Semina Olei odorati, quod in aere temperato coagulat,  $\frac{1}{2}$  largiuntur. Radices ad Infusa Diuretica recipiuntur. Folia ad usus culinaris multo frequentius, quam ad medicatos recipiuntur. Semina intus scopo Carminativo, in Decoctis potissimum, rarius sub forma Pulveris exhibentur. Extus Discutiendi causa Oculis applicantur. Eosdem in fines Aqua destillata efficax ad Potiones Pectorales recipitur.

**FOENICULUM DULCE**, *Italicum*. Semina prioribus majora & crassiora, omnino dulciora, albida. Planta, unde desumuntur, Varietas prioris esse dicitur; sed in nostro horto constanter habitum minorem servat, & Semina, qualia dixi, producit. Precedenti cum suavitate multo anteeccellat, merito preferendum videtur.

**FOENUGRÆCUM**. Semina oblonga, irregulariter quadrata, glabra, flava, sulco obliquo in margine notata, odoris nauseosi, saporis amari. Trigonella Foenugracum L. *Blackwell* Tab. 384. Galliae Meridionalis domestica planta apud nos copiose in agris colitur. Mucilaginis fere  $\frac{1}{2}$  vehit. Internus ejus usus nullus est, extus tanquam Resolvens & Maturans ad Epithemata & Cataplasmata recipitur.

**FORMICA**, *Formica*, *Fourmi*, *Ameise*. Insectum parvum, oblongum, fenipes, totum exiguis pilis obfessum, acidulum odorem spirat, cui fere sapor respondet; ejus larva cylindroidea, alba, vulgo Ovum dicitur. Formica rufa L. reliquis praestantior, in Europae sylvis frequentissime occurrit. Oleum tam unguinosum, quam odoratum inde obti-

netur. Acervi Formicarum sive sub forma Epithematis, sive ex Aqua cocti ad Irritandum membris Paralyticis admoventur; Spiritus Vini a Formicis abstractus Rheumatismis applicatur.

**FRAGARIA**, *Fragole*, *Fraisier*, *Erdbeerenkraut*. Radices tenues, repentes, plures fibrillas capillares emittentes, sub cortice fusco-rufescente substantiam albam includunt, evidenter adstringentes. Folia longius petiolata, ternata, ex ovatis oblonga, ferrata, hirsuta, adstringentia. Baccæ, *Fraises*, *Erdbeeren* sive ovatae, sive ovato-rotundae, diversae pro Varietate, unde desumuntur, magnitudinis, coloris innox albi, innox rubri & in rubro rursus varii; sunt receptacula carnosae, extus tota foveolis exsculpta, singulatim semen continentibus, intus albida, odorem proprium, gratum, saporem dulcem habent ac vinosum. Fragaria vesca L. *Blackwell* Tab. 77. Vulgaris per Europam, Americae quoque Indigena. Ghibloensis quoque nostras hyemes citra noxam fert. Aquam Radices rubedine, Folia quoque, sed levius inficiunt. Aperiendi & Adstringendi scopo utraque cum Aqua infusa aut decocta adhibentur; Folia Ulceribus Pedum salubriter applicari experimentis compertum est. Fraga ad Refrigerandum, Viscera abdominalia aperienda, Renes depurandos comeduntur. Aqua inde destillata & sapida & odora evadit.

**FRANGULA**, *Bourgène*, *Zapfenholz*, *Faulbaum*. Cortices mediani, sive libri tenaces, flavicantes, leviter austeri, aliquantillum etiam amari. Rhamnus Frangula L. *Blackwell* Tab. 152. In Europa ubique locorum obvia. Cortices recentes ad duas Drachmas cum aqua Infusi Vomitus & Seccessus Alvinos excitare dicuntur; exsiccatorum laus in Resolvendo & ducenda Urina ponitur; accipiuntur quoque ad Balnea & Unguenta contra Scabiem.

**FRAXINUS**, *Frassino*, *Frêne*, *Eichenbaum*. Cortex grysei, cum fusco mixti coloris, punctis conspersus pallidioribus, amarus, subadstringens. Semen, quod etiam Lingua Avis dicitur, oblongum est, compressum, fuscum, tenax, cor-



cortice obvolutum longiore, sicco, dilutius fusco; progrediendo dilatato & obtuse terminato; sapor nonnihil acris adstringit. Fraxinus excelsior L. *Blackwell Tab. 328.* Obtinet in omni Europa. Cortices sunt, qui ad Viscera Abdominalia aperienda & Sanguinem depurandum commendent. Semen olim Diureticis, Lithonriptis, Aphrodisiacis annumerabatur.

**FULIGO**, *Fuligine, Suie, Rus.* Substantia sicca, nigra, ex substantiis vegetabilibus & animalibus accensis sublimata & ad solidos, quibus accrescunt, parietes collecta. *Splendens; Ofen* vel *Spiegelrus* obtinetur ex caminis, qui fumum omnis generis lignorum suscipiunt, cujus partes oleosæ, salinæ & terrestres refrigeratæ camino se agglutinant, & in frusta excrescunt fragilia, splendentia, nigerrima, empyreuma olentia, gustu amara & acriuscula. Pro substantiarum sub caminis combustarum diversitate diversas quidem admittit formas, constanter tamen Salem Ammoniaca-lem, Oleum adustum, partes terrestres, gummosas & resinosas vehit. *Hæc fuligo ad usus medicatos recepta ob virtutem Resolventem, Sudoriferam datur ad Drachmam semis pro dosi. Fuligo Tædæ, Noir de Fumée, Kienrus* pulveris tenerrimi, levissimi, nigerrimi speciem præbet, cujus odor levis minus ingratus est, quam splendentis, sapor paululum salinus; obtinetur ex ramentorum Pineorum sive rejectamentorum depuratæ Resinæ Vulgaris fumo in peculiare conclave corripato, ubi a sacco linteo, cui accrescit, fuligo decussa asservatur; hanc ad tinctorios potissimum usus adhibent.

**FUMARIA**, *Fummosterno, Fume-terre, Taubenkröpf.* Cauliculi succulenti, teneri, ramosi, quadrangulares, quibus insident tam Folia longis petiolis innixa, glauca, duplicato-pinnata, lobato-incisa, lobis cuneiformibus, quam Flores irregulariter quadrifidi, oblongi, calcarati, rubri; utraque una cum cauliculis evidenter amara. *Fumaria officinalis* L. *Blackwell Tab. 237.* Crescit qua late patet Europa. Ad referenda Viscera Abdominalia, curandum Scorbutum, depu-

randum Sanguinem vel unus ejus Manipulus cum jusculis incoquitur, vel Succus ejus expressus ad Uncias quatuor propinatur. Aqua inde destillata tam iners est, quam efficax Extractum.

**FURFURES**, *Semole, Sons, Kleyen.* Pelliculæ badiæ, siccæ, tactu asperiusculæ, proprio odore, sapore adstringente præditæ, sunt granorum Cereali-um cuticulæ, a substantia, quam continent, farinacea molarium tritura avulsæ & comminutæ, unde ipsis residuum quid nunquam non adhæret. Furfures Tritici substantiam glutinosam continent, utpote qua hoc Cereale ab omnibus reliquis discriminatur. *Decoctum Furfurum Abstergerendi* scopo intus datur, extus ad Clysmata recipitur.

**GALANGA MAJOR.** Radices intortæ, variis ramis & tuberculis notatæ, circulis eminentibus undique cinctæ, extus rusæ, intus pallidiores, aliquot pollices longæ, unum circiter crassæ, odoris aromatici, Camphoræ vicini, saporis pariter aromatici. **MINOR** a magnitudine & crassitie ita cognominata, saporis tamen aromate Majore superior est. *Maranta Galanga* L. Major Indiæ indigena; Minor ex China in Indiam transplantata ibidem colitur. Pauxillum Olei odorati largiri dicitur. *Ventriculi Roborandi* scopo ad Infusa recipitur.

**GALBANUM.** Lacruma quæ nobis mittitur sub forma Granorum magnitudine impari, Avellanam fere æquantium; saporem habent amaricantem, acriusculum, odorem proprium, gravem. Prostat etiam *Galbanum in massis, en Pains*, frustis magnis, tenacibus, minoris quam prius pretii; plures ejus varietates Sepalsarii vendunt, ejus præstantia ex pluribus numero lacrumis sive Unguibus, coloreque minus fusco dijudicatur. *Galbanum liquidum ex Persia*, multa sæce nigricante sordidatum, spissitudinem habet Terebinthinæ, odorem Resinæ, nequaquam Galbani. *Bubon Galbanum* L. Africae indigenum, apud nos per hyemem in tepidario asservandum. Igne illiquabile; ex aqua suspenditur; Spiritu Vini utique, Oleis neutrquam dissolvi, ali-



aliquantulum Olei odorati fundere fertur. *Adversus Obstructiones Abdominales intus adhibetur; extus tanquam validissimum Resolvens Tumoribus induratis impo- nitur.*

**GALDA GUMMI.** Sub forma frustorum majorum, durorum, extus nigricantium, intus alborum ex India veniebat, odore & sapore leviter ad Gummi Elemi accedit, inter dentes lente- scit, flamma admotum fluit & ardens odorem haud ingratum emittit. Vera Resina ob vim Roborandi ad Emplastra & Unguenta recipiebatur.

**GALEGA**, *Geisrauten*. Folia foliolis oblongis pinnata, angusta, saporis odorisque vacua. Galega officinalis L. *Blackwell* Tab. 92. Europæ calidæ civis, nostras hyemes experitur innocuas. Ab effectu salubri, quem Londinensibus Peste laborantibus præstitisse memoriæ proditum est, virtus illi Alexipharmaca tribuebatur. Aqua inde destillata plane iners est.

**GALEOPSIS**, *Urtica mortua*, *Ortica bianca*, *Ortie blanche*, *taube Nessel*. Flores labiati, labio superiore villosi, albi, inodori, insipidi, Folia ex ovatis acute- serrata, rugosa, scabra, odore levi, minus grato imbuta, sapore cassâ. Lamium album L. *Blackwell* Tab. 33. Vulgaris per Europam. Ob virtutes Diureticas, *Emenagogas* & *Lochia* promoturas sub forma Infusi exhibentur.

**GALLE**, *Ghiande*, *Noix de Galle*, *Gallæpfel*. Excrescentiæ rotundæ, tuberculis obessæ, ut plurimum foratæ, extus pro diversa varietate diverse coloratæ, flavus color præstantiæ indicium est; a gryseo ad nigrum declinantes *Cæruleæ* dicuntur, intus substantiam densam, solidam, fuscâ vel nigram includunt, sapore adstringentem & acerbam. Sunt excrescentiæ variarum *Quercus* L. specierum, ex vulnere a Cynipe *Quercus* L. illato natæ; Orientales, Aleppenses præsertim & Turcicæ, reliquis præferuntur. Intus nunquam dantur, extus interdum *Decoctis Stypticis* admiscuntur.

**GALLINA**, *Gallina*, *Poule*, *Henne*. Avis notissima Phasiani Galli L. Femella. Caro diversimode in culinâ paratur.

*Axungia alba*, inodora, insipida reliquarum *Axungiarum vires habet*. *Ovorum Albumen*, *Blanc d'œuf*, *Eyerweiss* consistentiam tenuioris Gelatinæ habet, certo caloris gradu, nec non Spiritus Vini aut Acidorum affusione, in substantiam ficcâ & tremulam vertitur; ad varios labores pharmaceuticos recipitur; intus ad *Demulcendum*, *Relaxandum*, *Lubricandum* datur. *Testæ*, *Coques d'œuf*, *Eyerschaalen* Absorbendi scopo exhibentur, in tenerrimum pollinem contritæ a quibusdam *Alcali de Rocou* dicuntur; *Vitellus* tenue & viscidum oleum refert, flavus, proprio odore & sapore oleoso instructus, calore indurefcens, multo oleo unguinoso turgens, quod quidem spissum est & flavum; *Vitellus* verus sâpo est & hoc scopo pro Resinosi ex aqua suspendendis creberrime usurpatur, aqua dissolutus *Eau de Poule*, *Bläselovasser* egregium contra *Tussim* medicamentum. *Ventriculi*, *Gosiers Hünernaglein*, quo nomine insigniuntur membranæ interiores *Ventriculi* hujus gentis, rugosæ, exsiccatione fragiles, albescentes, fere insipidæ, levi acido factæ, quo Lac coire cogunt; ad primas vias Roborandas infantibus dantur.

**GALLIUM**, *Gaglio*, *Caille de lait*, *Bettstrob*. Caules tenues, tetragoni, infestis Follis verticillatis, angustis, linearibus, viridibus, modice splendentibus, terminati panicula Florum luteorum, quadrifidorum, exiguorum. Odor recentium admodum fragrans, sub exsiccatione non parum minuitur, sapor herbaceus est. *Gallium* verum L. Magna copia per Europam exstat. *Remedium Roborans* & *Adstringens* habitum ad *Infusa Vulneraria* recipiebatur.

**GENISTA**, *Ginestra*, *Genêt*, *Pfrimmen*, Flores papilionacei, lutei, evidenter amari, & cum exsiccati fuerint, inodori sunt, *Semina* cylindroidea, splendentia, flava, medullam continent dulcem, concolorem. *Spartium Scoparia* L. *Blackwell* Tab. 244. Per longe maximam Europæ partem crescit. Sunt qui Flores majores & fragrantiores a *Spartio Juncea* L. Europæ calidæ proprio, nostrarum hyemum patiente desumant, alii eosdem



a Genista Tinctoria L. per universam Europam vulgari, minores & ne recentes quidem ullum odorem spargentes petunt. Flores Diuretico scopo cum aqua infunduntur. Semina Emetica putantur, nescio an recte. Cinis & Sal aliis prestare minime videntur.

GENTIANA ALBA, Genziana bianca, Cervaria alba, grosse vveisse Hirschwurzel. Radix magna, crassa, fibrosa, albicans, intus alba, rugis circularibus distincta, resinosa, odorifera, aromatica, amaricans. Laserpitium latifolium L. Altiorum montium progenies, passim per Europam occurrit. Stomachico & Alexipharmaco scopo a rusticis ad Infusa recipitur. Veterinariis maxime in usu est.

GENTIANA LUTEA. Genziana fosca, Gentienne, Enzian. Radix fibrosa, magna, rugosa, fungosa, in plures fibras digitum crassas secedens, extus fusca, intus flava, amarissima. Gentiana lutea L. Passim in montibus Europæ obvia. Tanquam Roborans, Obstructiones Abdominales reserans, tam in Infusis, quam sub forma Extracti exhibetur. Extus ad dilanda Vulnera & Ulcera adhibetur.

GENTIANA NIGRA, Genziana nera, Cervaria nigra, Persil des Montagnes, schwarze Hirschwurzel. Radix crassa, prælonga, extus fusca, annulis distincta, intus alba, resinosa, odoris grati & fortis, saporis acris, aromatici, Athamanta Cervaria L. Passim in montibus Europæ crescit. A quibusdam adversus Febres Intermitteutes, Podagram &c. commendatur. Veterinariorum etiam usibus servit.

GENTIANA RUBRA. Radix a Radice Gentianæ luteæ nisi colore magis pallido fere nihil differt, quocirca etiam sibi invicem substituantur. Gentiana purpurea L. Passim in montibus Europæ crescit. In eodem numero habendæ Radices Gentianæ Cruciatae L. vulgaris per Europam plantæ, minores quidem, angustiores, pallidiores, cetera prioribus pares.

GENTIANELLA, hoher Himmelstengel. Folia sessilia, ovata, acuminata, integerrima, longitudinaliter tribus nervis notata, amarissima. Gentiana Amarella

L. Per omnem Europam occurrit. Compar ejus cum modo dictis Radicibus usus est.

GERANIUM, Geranio, Bec de Gruë, Storchenschnabel. Amplissimi generis plures species a vi Adstringente laudantur. Intus Folia sub forma Infusi exhibent, extus sub forma Epithematis applicant, ut Cicutarium L. Columbinum L. Sanguineum L. præstantissimum omnium Robertianum L. habetur, cujus Folia tripartitim divisa, pinnis pinnatim laciniatis, petiolis teretibus insident, utrinque pilis obsessa, creberrime rubedine tincta, foetentem cornu ambusti odorem spirantia, leviter adstringentia.

GINSENG. Radices digitum circiter crassæ, vix incurvæ, albæ, lineis longitudinalibus & transversis rugosæ, inferne bifidæ, intus albæ & spongiosæ, sapore acriusculo, leviter dulcescente & aromatico instructæ. Panax quinquefolium L. Blackwell Tab. 513. Americæ Septentrionalis civis. Easdem cum Radicibus Nisi vires habere dicuntur & cum minoris veneant ad Drachmam dimidiam Pulveribus Analepticiis adjici sueverunt.

GLACIES MARIÆ. Selenite, Selenites, Lapis Specularis, Fraueneis. Est Species Gypsi pellucens, in lamellas divisibilis, quæ rhomboidalem figuram constanter servant. Natrum Selenites L. In montibus passim offenditur. Absorbentibus & contra Strumas facientibus medicamentis, substantia omnino iners, inconsulto adscripta fuit.

GLYCYRRHIZA, Liquirizia, Liquiritia, Reglisse, Süßholz, Lakrizenholz. Radices oblongæ, farmentosæ, ad pollicarem usque crassitiem excrescunt, extra ferrugineæ, intra brunæ, leviter odoratæ, sapore dulces, cum quadam amaritudine; Hispanica, quæ nobis exsiccata mittuntur, extus gryseæ, intus spissius luteæ, ob eminentem dulcedinem ceteris præferuntur. Succus optimus ex Hispania petitur, in Catalonia præcipue paratur; verum Extractum, quod ex Radicibus exsiccatis, aqua coctis, expressis & ad consistentiam mollem Extracti excoctis paratur, prostat sub forma massarum oblongarum, quæ sex circiter pollices lon-



longæ, unum crassæ, una facie planæ, altera convexæ, ubi diffractæ fuerint, splendentes, nigræ, multum dulces, foliis Laurinis obvolutæ nobis mittuntur: massa aridæ, quæque non totæ in ore liquefunt, rejiciendæ. Glycyrrhiza glabra L. *Blackwell* Tab. 495. Europæ Meridionalis propria, nostras hyemes citra noxam fert. In Anglia, Germania & Lotharingia copiose colitur. *Sitim Sedandi, Demulcendi, Resolvendi ergo Decoctis* adjicitur; sed adhibenda cautio est, ne vel paululo ulterius quam oportet continuata coctione amarescat, extus Erysipelati Pulvis ejus inspergitur. Succus sive per se, sive Aqua solutus, sive in Trochiscos formatus scopo Becchico exhibetur.

GOSSYPIUM videatur BOMBAX.

GRAMEN, Gramina, Chlendent, Zövecken. Radices prælongæ, geniculatæ, teretes, flavescentes, leviter odoratæ, dulces. Triticum repens L. Nimis frequens agrorum pestis. Resolvi ergo immiscetur Decoctis; Vulgatissimum apud nos ingrediens Decoctorum pro Potu communi.

GRANATUM, Melagrana, Malum Punicum. Pomum variæ magnitudinis, rotundum, umbilico quinquefido coronatum, sub Cortice coriaceo, firmo, crasso, leviter rugoso, suffusa rubedine flavicante Pulpam complectitur rubram, multilocularem, fragrantem, gustatu dulcem & vinosam, Semina continentem oblonga, acuminata, propria membrana Cico obvoluta, sub cortice duro medullam albam, amaricantem includentia. Cortex Psidium vel Malicorium denominatus, exsiccatus, extus purpureus est, intus luteus, rugosus, linguam valide adstringens. Flores, qui Balaustiorum nomine veniunt, nec nisi pleni in officinis asservantur, in calice quinquefido, coriaceo, plura petala congesta, ruberrima, inodora, sapore adstringente prædita includunt. Punica Granatum L. *Blackwell* Tab. 97. Europæ calidæ & Orientis arbor, apud nos hyeme in frigida-rio asservanda. Pulpa Refrigerans & Roborans vel comeditur, vel in Syrupum convertitur. Flores tam intus, quam extus Adstringendi gratia exhibentur. Cortices nonnisi

extus, ubi valida Adstrictione opus est, applicantur.

GRANATUS, Granato. Lapis pellucens, CrySTALLUM polyedram referens, colore profundius rubro tinctus, limæ cedens, cultro resistens, igne in vitrum fundendus. Borax Granatus L. In Oriente & in Europa offenditur; in montibus etiam lapidibus aliis innatus reperitur; Ferrum alia quoque non raro metalla vehit; eidem præter Siliceam, Calcaream quoque & Aluminosam terram inherere observatum est. Iners Lapis Gemmaris relinquendus.

GRATIOLA, Gottesgnaden-Kräutlein. Folia glabra, sessilia, lanceolata, versus apicem ferrata, insigniter amara. Gratiola Officinalis L. *Blackwell* Tab. 411. Crescit in Europa temperata. Communi Auctorum consensu Purgantibus Dra-strictis adscripta recentissime ad Drachmas tres in Infuso, ad Drachmam semis in Substantia celebrari cæpit. Extus cum successu Resolvendi ergo exhibitam fuisse lego.

GUAJACUM, Legno santo, Lignum sanctum, Franzosenholz. Lignum ponderosum, valde durum, ex viridi nigricans, alburno flavicante tectum, obductum Cortice, in varias squamas diviso, coloris buxi, odoris levissimi, saporis amariusculi, evidenter acris. Gummi in majoribus frustis ad nos pervenit, efformatum ex granis flavo-fuscis, interdentes tenacibus, ad ignem liquefcentibus, odorem insuavem emittentibus, sapore amaricante instructis, variis sordibus inquinatis. Guaiacum officinale L. *Blackwell* Tab. 35. Americæ Meridionalis civis. E ligno Extracti aquosi odore & sapore Balsamum Peruvianum referentis  $\frac{1}{8}$  obtinui. Gummi improprie ita appellatur, cum sit vera Resina; ejus solutionis in Spiritu Vini aliquid instillatur Spiritui Nitri, unde si color cæruleus surgit, Resinam sinceram esse concludunt; cum aqua diu coctum Lignum una cum Cortice Sanguinem Depurantes & Balsamicas vires exserit, quibus haud absimiles Gummi quoque adscribuntur, quod quidem hodie Arthriticis magnopere commendatur.

GUTTÆ GUMMI. Est Succus conc-



cretus, cujus magnæ advehuntur massæ nitidæ, fragiles, croceo-rubræ, inodoræ, sapore leviter resinosa & dentium judicio aliquantum etiam tenaces. Cambogia Gutta L. *Blackwell* Tab. 392. Arbor Indiæ indigena. Neutiquam igne funditur, tam in Aqua, quam in Spiritu Vini suspendi se patitur; ab Oleis unguinosis non dissolvi traditur. *Ad Grana decem-exhibitum sursum aque ac deorsum enixe Purgat, minori dosi datum valide Humores Resolvit & scopo Diuretico exhibetur; contra Tæniam quoque laudatur.*

**HÆMATITES**, *Amatita, Blausstein, Glas-kopf*. Est Minera Ferri ponderosa, ad lapidis similitudinem figurata, colore, inde a rubro per gradus ad nigricantem usque descendens, varie etiam figurata, textura ut plurimum convergentibus striis striata, sapore adstringens. Ferrum Hæmatites L. Passim per Europam in montibus occurrit. *Adstringendi ergo ad Scrupulum unum præscribitur.*

**HEDERA ARBOREA**, *Edera, Lierre, Ephra*. Folia petiolata sunt, coriacea, pro varia ætate sive integra, sive lobata, supra lucida, infra pallidiora, sapore adstringente prædita; Baccæ nigrae, rotundæ, umbilicatæ, stylum ex medio umbilico exferentia, gustu statim quidem fatua, subsequente dein amaricante & acri sapore. Gummi prostat sub forma frustorum majorum, viridescens, fragilium, ex granis semipellucidis Granatis fere concoloribus formatorum, variis fordibus intermixtis pollutorum, odoris leviter resinosi, saporis subaromatici: possideo frustra quæ quinque librarum pondus æquant. Hedera Helix L. *Blackwell* Tab. 188. Offenditur ubique. Europæ calidæ Frutices subinde Gummi fundunt, cujus longe maximam quantitatem ex Oriente accipimus, Oleis non solubile, ejusque potissimam partem Resinam esse asserunt Observatores. Folia ad Deligandos præcipue Fonticulos adhibentur, Pulvis eorum contra Atrophiam Infantum laudatur; de Baccarum virtute, quam Catharticam esse nonnulli putant, plane nihil certi constant; Gummi medicamentorum

*Resolventium numero habetur, extus applicato virtus Depilatoria tribuitur.*

**HEDERA TERRESTRIS**, *Ellera terrestre, Tarrette, Gundelreb*. Folia petiolata, reniformia, crenata, rugosa, levissime hirsuta, exsiccata inodora, saporem proprium leniter aromaticum exhibent. Glechoma hederacea L. *Blackwell* Tab. 225. Vulgaris per Europam planta. *Ad Infusa Roborantia & Resolventia recipitur.*

**HELIANTHEMUM**, *Sonnengunsel*. Folia lineari-lanceolata, margine ut plurimum reflexo, obtusiuscula, hirsuta, gustatu paululum adstringentia. Cistus Helianthemum L. Frequentissime per Europam obvia.

**HELIOTROPIUM**, *Girasole, Tournesol, Lacmus*. Massulae pollicares, tetragonæ, sicca, insigniter violaceæ, odoris, dum recentes sunt, Violæ, annosiorum mucorem referentis, saporis acris. Confici dicitur ex Lichene Parella L. Rupibus Maris Mediterranei adhærescente, sive ex Lichene Roccella L. Archipelagi & Insularum Canariensium cive, Calce viva cum Urina per aliquot septimanas scite digesta, Succoque deinceps, quem Croton Tinctorium L. largitur, affuso. Cum colorem sistat minime constantem ad artem baphicam minus apte adhibetur; aqua inde tincta levissimo quoque affuso Acido rubescit, Alkali contra non mutat colorem. *Curandis morbis non adhibetur.*

**HELLEBORUS ALBUS**, *Elleboro bianco, vveise Nieszwurzel*. Radices fibrosæ, cylindroidæ, tuberculis obsestæ, reliquiis fibrarum, quas recentes emiserant, extus gryseæ, intus albissimæ, sapore salino, acri, nonnihil amaro, odore levi, ingrato insignitæ. Veratrum album L. *Blackwell* Tab. 74. Crescit in altioribus Europæ montibus. *Vehementissimum Drastrictum quam maxime lugubres effectus edidisse Observatores fide digni testantur; ad Drachmam dimidiam in Infuso datum, sunt qui commendent, attamen hominibus intus nequaquam dandum censeo, nec tuto ad Pulveres sternutatorios recipitur.*

**HELLEBORUS FOETIDUS**, *Elleboro fetido, Hellebore bêtard, Gross Lauskraut*.



*Radices* fibrosæ, fusæ, digiti circiter crassæ, intus albæ, inodoræ, dulciusculæ; *Folia* in novem ut plurimum lacinias profunde oblongas, irregulariter dentatas divisa, foetida, amara. *Helleborus foetidus* L. *Blackwell* Tab. 57. Crescit in Europa temperata. Helleboro nigro fuerunt, qui eum substituerent, quam violentius eum agere vulgo contendunt. *Folia ad Drachmam unam pro dosi adhibentur.*

**HELLEBORUS NIGER**, *Elleboro negro*, *schwarze Nieswurzel*. *Radices* inodoræ, subacerbi saporis, ex crasso capitulo innumeras fibrillas emittunt, aliquot pollices longas, extus nigræ, intus albæ. *Helleborus niger* L. *Blackwell* Tab. 506. *Alpium* calidioris Europæ. Nostras hyemes facillime fert. Aqua inde destillata acris perhibetur & purgans; Extracti Aquosi sicci quartam sui ponderis partem largitur. Has *Radices* quo calidior sub cœlo adoleverint eo esse efficaciores observarunt Autores. *Stimuli instar Purgantibus aut Resolventibus adjiciuntur*; *Dosis earum qua Infusi ad Drachmas tres, qua Extracti, Purgandi scopo, ad Drachmam semis præscribi solet.* In Germania Septentrionali loco harum *Radices Adonidis Vernalis* L. recipi dicuntur.

**HELENÆ S. RADIX**. *Radices* rotundæ, leviter angulatæ, gryseo-nigricantes, striatæ, Avellanam majorem æquant, duræ, intus lutescentes, Cardamomum fere olent ac sapiunt, in medio perforatæ & filo appensæ ad nos transmittuntur ex Florida. *Ad Ventriculum Roborandum & Urinam pellendum efficaces feruntur*; a quadam *Cyperì* specie suppeditari dicuntur.

**HELMINTHOCHORTON**, *Lemithochorton*, *Melitocortum*, *Corallina di Corsica o di Malta*, *Coralline de Corse ou de Malte*. Substantia ex valde tenuibus fibris sibi invicem intextis constans, rufa, odoris marini nauseosi, saporis salini, inter dentes non stridula, sed lentescens. In Mari quod Corsicam alluit colligitur; *Conservæ* species esse videtur, a Botanicis, quibus ejus in ipso natali loco exa-

minandi potestas est, determinanda. In hærescentibus sordibus aqua elutis depuratum cum Acidis non effervesceat, aqua infusum rubedinem exuit & cito putrescit, multum mucilaginis aquæ, in qua agitur, impertit, paucillum admodum Resinæ vehit & fere tantundem Salis communis, Salis mirabilis Glauberi, Selenitis atque Alcalis fossilis. *Usus ejus pluribus adhuc seculis in Corsica scopo Anthelmintico celebratus, paucis demum retro annis in Gallia etiam comprobatus invaluit.* *Datur ad Drachmam unam pro dosi in substantia, cum Aqua etiam tam Infusum, quam Decoctum efficaciam servat.*

**HEPATICA ALBA**, *Epatica bianca*, *Herzblümlein*. *Folia* cordata, obtusa, crassiuscula, leviter amaricantia. *Parnassia palustris* L. *Vulgaris per Europam planta.* *Sunt, qui vim ei Substringentem tribuant.*

**HEPATICA FONTANA**, *Epatica fontana*, *Hepatique d'eau*, *Steinleberkraut*. *Folia* subrotunda, lobata, superne ex obscuro viridia, splendentia, areolis distincta, inferne fusca, radículas emittentia, insipida & inodora. *Marchantia Polymorpha* L. *Universa Europæ.* *Aperiendi scopo sub Infusi forma quandoque recipitur.*

**HEPATICA NOBILIS**, *Epatica nobile*, *Leberkraut*. *Folia* petiolata, in tres lobos obtusos divisa, cum petiolo pilosa, insipida, inodora. *Anemone Hepatica* L. *Blackwell* Tab. 207. *Vulgaris per Europam.* *Aperiens esse putatur.*

**HEPATICA STELLATA**, *Lichene stellato*, *Matrisylva*, *Muguet des Bois*, *Waldmeister*. *Folia* oblonga, angusta, ciliata, obtusa, leviter salina, grate olentia. *Asperula odorata* L. *Blackwell* Tab. 60. In Europa, præter maxime Septentrionalem, ubique obvia. *Aperiendi ergo Vino infundi subinde solet.*

**HERMODACTYLI**. *Radices* ad figuram triangularem accedentes, ad margines contractæ, una facie plana & sulco longitudinali notata, altera convexa, extus flavicantes, intus albæ, friabiles, odoris & saporis expertes. *Colchicum Illyricum* Gronov. *Syriæ.* *Alvi ducenda gra-*



gratia olim ad aliquot Drachmas in substantia, ad Drachmas sex in Infuso adhibebantur.

**HERNIARIA**, *Erniaria*, *Toutquette*, *Herniole*, *Bruch-vel Harnkraut*. Cauliculi teretes, Foliolis ovato-acuminatis & glomerulis Florum lateralium obfessi, inodori, levissimo salino sapore imbuti. *Herniaria hirsuta & glabra* L. *Blackwell* Tab. 320. Per omnem Europam obtinet. *Herniosis & Calculosis conducere fertur*.

**HIPPOCASTANUM**, *Ippocastano*, *Maronnier*, *Wilder vel Rosskastanienbaum*. Cortex ex gryseo-nigricans, intus ferrugineus, sapore admodum adstringens & amarus. *Æsculus Hippocastanum* L. *Asiæ Septentrionalis arbor*, hodie copiosissime per omnem Europam colitur. *Fuerunt qui eum Cortici Chinæ substituerent*.

**HIPPOPOTAMI DENS**, *Dente di Caval marino*, *Dent du Cheval marin*, *Vallrosszahn*. A basi ad apicem usque incurvus, magis magisque angustatus, lineis longitudinalibus parallelis, quas ad basin fecant circulares, insignis, apex albissimus conum vertice aduncum refert. Est *Laniarius Hippopotami Amphibii* L. Ad fluvios *Africæ & Asiæ degentis quadrupedis*. *Ad sistendos Spasmos & Hæmorrhagias celebrabatur*.

**HIRCUS**, *Capro*, *Bouc*, *Bock*. *Capra Hircus* L. Notissimum per Europam animal. *Sanguis inspissatus nigricat*, *empyreuma olet & sapit*, olim sub forma *Pulveris in Casu ab alto*, nec non *Sudorem excitandi ergo exhibebatur*. *Sevum ad colorem cærulescentem vergens*, *Bovino mollius est; in effectu medicato haud differt*.

**HIRUNDINARIA**, *Vincetoxicum*, *Dompté-Venin*, *Schwalbennurzel*. Radices albæ, odoris proprii, eminentis, saporis acriusculi, subamari, ex uno capite crassiusculæ, dimittunt fibras longas, multum flexiles & varie tortas. *Asclepias Vincetoxicum* L. Crescit in omni Europa, præter magis Septentrionalem, Angliam & Belgium. *Interdum sub forma Pulveris exhibetur; celeberrime Decoctis tanquam Resolvens Excretionisque aquosas promovens additur*.

**HIRUNDO**, *Rondine*, *Hirondelle*, *Schwalbe*. *Hirundo Rustica* L. *Avis migra-*

*toria*, *Martis mense advenire*, *Augusto discedere solita*. *A nostratibus mensis non admittitur*. *Pulli in olla testæ in Pulverem nigrum combusti olim contra Epilepsiam laudabantur; Nidus ex luto præcipue structus sub forma Cataplasmati contra Anginam laudatur*.

**HIRUDO**, *Mignatta*, *Sangsuë*, *Blutigel vel Egel*. *Hirudo medicinalis* L. Vermis oblongus, planus, ex viridi-nigricans, superne lineis transversis nigricantibus distinctus, inferne flavus. Verno & æstivo tempore colligitur, in aqua aservatur. *Chirurgicæ arti servitura*.

**HOMO**, *Uomo*, *Homme*, *Mensch*. De Cranio supra jam egi. Reliquæ partes, quarum usum absurdissimæ hypotheses sustentarant, hodie evilerunt, neque plurimorum quadrupedum Axungiiis Humana, quamvis mollior & flavior, anteferenda videtur.

**HORDEUM**, *Orzo*, *Orge*, *Gerste*. Semina ovali-oblonga, utrinque acute angulata, facie convexa sulco notata, sub cuticula pallide flava, farinacea, alba, dulcia sunt. *Hordeum vulgare* L. *Blackwell* Tab. 423. *Hexastychum* L. & *Distychum* L. promiscue apud nos coluntur. *Hordeum cuticula privatum*, *Veterum Ptisana*, hodie *Decorticatedum*, integrum contra *Crudum* appellatur: *Farina Hordei*  $\frac{3}{4}$  *Mucilaginis largitur*. *Præter vires Nutrientes, Refrigerantes quoque, Demulcentes, Resolventes habet*. *Panis ejus coctus albus est, diu discedinis tenax, sed gravis*.

**HORMINUM**, *Schiarea*, *Gallitricum*, *Orvale*, *Toutebonne*, *Scharlachkraut*. Folia magna, cordato-oblonga, rugosa, villosa, ferrata, forti nec ingrato odore, sapore amaricante, linguam pungente prædita. *Salvia Sclarea* L. *Planta bien-nis Europæ calidæ & Asiæ, nostræ hyemis admodum patiens*. *Scopo Roborandi & Spasmos sistendi subinde adhibetur*. *Hæc herba ad suavem Cerevisiæ & Vini conciliandum odorem vulgo utuntur; sed sunt Auctores, qui inde Incbriandi Capitisque dolores excitandi vi id genus poculenta infici contendunt*. *Certe ejusmodi effectus ab inerti Salvia pratensi* L.



metuere, ineptius videtur. Quin *Salviam Sclaream*, etiam *Salviae Hormino* L. evidenter quippe debiliori præferendam esse puto.

**HYACINTHUS**, *Giacinto*, *Jacinte*. Est Gemma limæ pariter ac igni resistens; colore rubro, submixta flavedine, distincta & hic *Orientalis* dicitur; qui in Officinas recipitur *Occidentalis* colore quidem priori proximus, sed & aliquanto levior & mollior est; Igne etiam funditur. Nitrum fluor purpureo-fulvum L. passim in Europæ montibus occurrit. Ex Terra Silicea, Calcarea, Aluminosa & Croco Martis compositus esse fertur. Olim in *Roborantium* numero habebatur.

**HYOSCYAMUS**, *Jusquiamo*, *Jusquiamæ*, *Bilsam*. Folia amplexicaulia, magnis sinibus excisa, tomentosa, odore narcotica, sapore fatua; Semina parva, rotunda, cinerea, inodora. *Hyoscyamus niger* L. *Blackwell* Tab. 550. Ubique locorum in Europa progignitur. Semina Olei unguinosi  $\frac{1}{2}$  circiter fundunt. *Hyoscyamum* per omnes sui partes, vel exigua dosi, tristissimos effectus Narcoticos edidisse Observatores monent. Folia extus feliciter Tumoribus induratis, sub forma Cataplasmatibus, applicantur. Succus inspissatus nomine Extracti datur ad sopiendos motus Nervorum excedentes; a Grano uno fuisse, qui, sensim augendo dosin, ad Drachmam semis usque processerint, relatum lego.

**HYPERICUM**, *Iperico*, *Millepertuis*, *Johannis-Kraut*. Summitates ramis angulatis, glabris, punctis nigricantibus passim distinctis. Folia gerunt sessilia, ovata, obtusa, integerrima, punctis pellucetibus insignita, junctosque his Flores quinquepetalos, flavos, fasciculatim positos, calycibus glabris sustentatos, odore & sapore exiguis. *Hypericum perforatum* L. *Blackwell* Tab. 15. Vulgaris Europæ planta. Scite quoque *Hypericum quadrangulum* L. in usus medicatos recipitur magis resinosum. Omnibus menstruis colorem rubrum *Hypericum* affricat. Scopo Balsamico olim Summitates ad Infusa interna recipiebantur; hodie Oleum cum eis infusum extus applicatur.

**HYPOCYSTIDIS SUCCUS**, *Succo d'*

*Ipocistide*. Massa nigra, solida, difficulter diffringenda, saporis aciduli & acerbissimi; exprimitur ex Baccis Cytini *Hypocistidis* L. Europæ calidæ progeniei. Sole inspissatur. In Aqua æque ac Spiritu Vini solubilis est. Olim ad eosdem ac *Succus Acaciæ* usus adhibebatur.

**HYSSOPUS**, *Isopo*, *Isop*. Folia oblonga, acuta, viridia, proprio & fragranter odore similique sapore, amaricante præterea & aromatico prædita. *Hyssopus officinalis* L. *Blackwell* Tab. 296. In Europa calida sponte crescit, nostrarum hyemum patiens est. Olei odorati  $\frac{1}{2}$  fundere dicitur. Datur sub forma Infusi, vel Syrupi, vel Aquæ destillatæ Muci Pulmonalis Incidendi causa. Extus Sugillatis sub forma Epithematis aut Fotus applicatur.

**HYSTRICIS LAPIS**, *Pietra d' Istrice*, *Porcinus*, *Pedro del Porco*. *Malacensis* & *Zeylanicus* exstat, prior etiam simpliciter *Lapis Malacensis* dictus, posteriore multo majoris venit; Ovi columbini circiter magnitudinem habet, utrinque compressus, cornei suffusa rubedine coloris, lævis, splendens, aquam affricu suo, Saponis instar, viscidulam reddit. *Zeylanicus* nigricans Ovi gallinacei magnitudinem fere æquat, formamque Succii inspissati refert. Uterque amarissimus aquam etiam, cui immergitur suo sapore imbuit. Erinacei *Malacensi* L. Asiæ Meridionalis Quadrupedis Calculi fellei esse dicuntur. Celebratam virium hujus Lapidis in morbos Malignos efficaciam, cujus famam enorme, quo venduntur, pretium secundaverat, experientia non confirmavit.

**JACEA**, *Viola*, *Pensée*, *Dreyfaltigkeit*. Folia petiolata, ovato-lanceolata, profundioribus dentibus notata, inodora sunt, sapore glutinoso palatum afficiunt. *Viola tricolor* L. *Blackwell* Tab. 44. Occurrit per omnem Europam. Foliorum recentium Infuso Catharticæ vires inesse dicuntur, quem in finem Unciæ quatuor pro dosi præscribi solent. Folia exsiccata gratum Fæni odorem spirantia, cum Lactæ cocta & per aliquot septimanas infantibus exhibita Crustam lacteam curare Observationes testantur.

**JACOBÆA**. Folia amplexicaulia, ovato-oblonga, ad nervum usque pinnis de-



nno pinnatis pinnatifida, late viridia, subadstringentia. Senecio Jacobæa L. Vulgaris per Europam. Roborandi scopo interne, Traumatico externe, hinc & inde olim commendabatur.

**JALAPPA.** *Jalapa*. Taleolæ mox rotundæ, mox oblongæ, cortice nigricante, rugoso, substantiam cingunt gryseam, nigris striis variegatam; odorem habent proprium, nauseosum, similemque saporem eminentis insuper acrimoniæ. Quo sunt graviores, quoque pluribus striis nigris interstrictæ, eo habentur meliores. Ab aliquod retro annis integræ mistuntur radices, pugnum æquantes, rotundæ, superne leviter compressæ, inferne tubere, tanquam pedunculo, suffultæ. Non a Mirabili L. sed a Convolvulo Jalappa L. planta Mexicana, apud nos per hyemem in cældario asservanda, desumitur. *Ad Scrupulos duos sub forma Pulveris data, non sine irritatione Alvum ducit, quem vero effectum cum unice vi Resinæ edat, cujus in quibusque taleolis non eadem ratio obtinet, consultius omnino est, Resinam quam Radices exhibere.*

**JASMINUM.** *Gelsomino*. Flores ex longo tubo quinquefidi, albi, interdum roseo-variegati, fragrantissimi, insipidi. Jasminum officinale L. Indie proprium, copiose in hortis Europæis colitur; a nostra hyeme in frigidario tuetur. *Flores recentes Fragrantium effectus edunt. Oleum destillatum dare recusant, Oleum Behen cum eis infusum Olei Jasmini nomine in officinis prostat, ad usus Cosméticos obgratum, quem large spargit, odorem aptatum.*

**ICHTHYOCOLLA,** *Colla di pesce, Colle des poissons, Hausblase*. Massæ cylindroidæ, in spiras convolutæ, manifeste ex laminis efformatæ, digitum circiter crassæ, insigniter tenaces, inodoræ & insipidæ. Quo magis flavæ aut brunæ, eo sunt deteriores. Paratur ex Vesicis quarumvis Acipenseris L. specierum, unde tunicæ internæ desumuntur argenteo splendore nitentes, quarum plures preliope una comprimuntur, convolvuntur, & filis suspensæ exsiccantur; Aqua penitus dissolvitur, quam quidem viscedi-

ne imprægnant, adeo ut ad glutinanda vitrea & porcellanea vasa adhiberi possit, Vina etiam turbida clarificat, nec non ad alias artes adhibetur. *Cum Aqua in Gelatinam redacta Demulcendi & Relaxandi scopo jusculis immittitur, Clysmatibus adjicitur.*

**IMPERATORIA**, *Ostrutium, Meisterwurzel*. Radix aliquot pollices longa, compressa, rugosa, annulis transversis velut in articulos distincta, extus cinereo-fusca, intus alba, odoris proprii ad Angelicam accedentis, saporis acris, amari, aromatici. Imperatoria Ostrutium L. *Blackwell Tab. 279.* Montana Europæ planta, sed in hortis etiam cultu facilis. *Valide tam humores Resolvit, quam solida Stimulat, ad Infusa quandoque recipitur.*

**INDI FOLIA** seu *Malabatri*. Magna sunt, petiolata, ovato-lanceolata, tribus nervis ad basin coeuntibus intersecta, ex viridi flavescencia, odorem spirantia levem, sapore subaromatico Caryophyllos referentia; mucilaginoso. *Laurus Cassia. Arbor Indiæ. Rarissime hodie usurpantur.*

**INDIGO.** *Indaco*. Massæ pulcherrimæ, variæ tam figuræ quam magnitudinis, cæruleæ, insipidæ & inodoræ, diffractæ Cupri rubedinem splendore referunt. Est Fæcula variarum Indigoferæ maxime Tinctoriæ L. specierum, quæ ex Asia in Americam translata, ibidem jam copiosissime coluntur; optimus a *Quatimalo* adducitur, quem *Dominicensis* sequitur, *Carolinensem* post se relinquens. Pulchritudo Fæculæ a justo putredinis gradu pendet. Color cæruleus neque Acidis additis rubescit, neque Alcalinis viridescit. *In arte baphicæ creberrimus ejus usus, in Pharmacopolis vero propter colorem rarissimus; cetera nullus est.*

**IPECACUANHA,** *Ipecaquana*. Radix aliquot pollices longa, vix linea crassior, varie flexa, rugis circularibus eminentibus distincta, extus ex nigricante gryseâ, intus albissima, odore tenuis, nauseosa, sapore subsalina. An ex quadam Violæ L. Euphorbiæ L. Lonicæræ L. specie desumatur, in dubio adhuc



relinquitur. Mittitur nobis ex Braſilia. Emetico ſcopo ad *Scrupulum unum* datur; minores etiam doſes efficaciam præſtant; ad tertiam Grani partem ſingulis triboriis data Hemorrhagias Uteri curat. Specificis Antidysentericis adſcribitur. Gryſea, quæ & major & craſſior & mitior eſſe & ex regno Peruviano mitti dicitur & Alba Cayennæ, plane iners, apud nos ſaltem non adhibentur.

**IRIS FLORENTINA**, *Iride Fiorentina*, *Violenwurzel*. Radices varia craſſitie & longitudine, cuticula externa ablata, albæ ſunt, intus leviter flavæſcentes, parum compreſſæ, hic inde tuberculis notatæ, odore fragrantæ, Violas referentes, ſapore acres, amaricantes. Iris Florentina L. *Blackwell* Tab. 414. Crescit in Italia; noſtras hyemes innocua fert. Radices longiores & rectæ ſub nomine LONGARUM ſeorſim aſſervari ſolent; ad morbos a Muco oriundos cum ſucceſſu adhibentur. Extus ad Dentifricia, Epithemata Reſolventia, uſus Coſmeticos, tornatos quoque inde globulos Fonticulis inferunt. Longæ infantibus dentientibus admordendæ præbentur.

**IRIS NOSTRAS**. Radix fibroſa, craſſa, rugoſa flavicans, intus alba, leviter amara, ſubſequenti ſapore Violas referente. Iris Germanica L. *Blackwell* Tab. 69. Europæ temperatæ; Vires Purgantes & Diureticas habere dicitur. Quod Cl. *Montet* animadvertit, eam cuticula ſcilicet externa ablata, & calore ſatis valido exſiccata prior ſimillimam evaſiſſe, ego quoque obſervavi, ſed odor elapſis demum aliquot annis omnem ſuavitatem aſſequitur.

**JUBABÆ CORTEX**. In fruſtis aliquot pollices longis, impariter craſſis, una facie concavis ad nos ex India tranſvehēbatur, ſulcis longitudinalibus rugoſus, ferrugineus, intus pallidior, odore & ſapore Vanigliæ proximus, ſed debilior, leviffime amaricans. A virtute Nervina laudabatur & Vanigliæ ſubſtituebatur.

**JUDAICUS LAPIS**. *Pietra Giudaica*, Olivaformis eſt, albus, totus ſtriis longitudinalibus notatus, petiolo inſtructus,

intus ex lamellis ſubpellucidis eſſormatus, inodorus, inſpidus, in Acidis cum efferveſcentia penitus diſſolubilis. Helminthus Judaicus L. Aculeus Echinorum in lapidem converſus, paſſim per Europam occurrit. Calculum comminere quondam putabatur.

**JUGLANS NUX**, *Nux Perſica* vel *Regia*, *Noce*, *Noix*, *Noſſe*. Putamen ſubrotundum, apice prominente inſtructum, viride, tenax, digitos nigro colore inſiciens, odorem, non admodum gratum, ſaporem habet adſtringentem, amarum; Officulum durum eſt, albicans, rugoſum; Nucleus albus, quadrilobus, lobis anfractuosis, gibboſis, dulcibus, ſepto interſtinctus, cuticula teſtus flava, adſtringente, nonnihil etiam acri. Juglans Regia L. *Blackwell* Tab. 247. Syriæ & Perſiæ. Copioſiſſimus ejus per Europam temperatam proventus eſt. Exſiccata Noces Juglandes dimidium ſui ponderis Olei fundunt flavicantis, dulcis, ſuaviſſimi, frigore non ſpiſſeſcentis, ad uſus pictorios aptiſſimi. Putamen Saccharo conditum Stomachico ſcopo, ejuſdem Extraſtūm aquoſum Anthelmintico laudatur. Nuclei in cibum reſipiuntur & contra *Termeſ* commendantur.

**JUJUBÆ**, *Giuggole*, *Jujubes*, *Brustbeeren*. Drupe ventricofæ, cylindroidæ, utrinque pulvinatæ, ſub cuticula ſicca, præ laxitate rugoſa, rubra. Pulpam vehunt flavam, dulcem, ſpongioſam, Nucem complectentem utrinque acutiſſimam, & ſub hujus officulo ventricoſo Nucleum qui ſub cuticula rubra, medullam albam continet Rhamnus Ziziphus L. *Blackwell* Tab. 569. Copioſa in Europa Meridionali, in noſtris regionibus a rigore hyemis in frigidario deſcendenda. Recipiuntur Drupe ad Decoſta Pectoralia.

**JUNIPERUS**, *Ginepro*, *Genêvre*, *Wachholder*. Lignum proſtat in minora fruſta ſectum, album, cortice teſtum extus gryſeo, intus ferregineo; odorem ſpargit aromaticum & fragrantem, ſimilem etiam accenſum emittit ſumum; ſapor leviter aromaticus eſt, Bacce, quæ nonniſi biennes colliguantur & Piſa tam magni-



gnitudine quam figura æquant, nigro-cæruleæ sunt, superne exiguo umbilico notatæ, pulpa earum dulcis, viscida, ferruginea, aromatica, grate odorata, tria semina concludit. *Gummi*, quod etiam *Sandaracæ Gummi* appellant, Mastiches grana tam figura, quam colore refert, inodorum, dentibusque submissum minime tenax, sed friabile deprehenditur. *Juniperus communis* L. *Blackwell* Tab. 187. *Vulgaris* per Europam *Arbuscula*. *Baccæ Olei* odorati  $\frac{1}{2}$  fundunt, multum calidi, quapropter internus ejus usus rarissimus est. *Extus Roborandi & Resolvendi ergo adhibetur*. In Europa Meridionali species, modo dicta, *Gummi* fundit, quod in Africa quoque aliæ, *Juniperi* species faciunt, igne mollescit, sed fundi recusat, in Spiritu utique Vini, in Aqua nequaquam solubile est, in Oleis etiam dissolvi negant Observatores. *Lignum aqua decoctum Sanguinem egregie Depurare, Excretionesque aquosas promovere Observatores testantur; Suffitum ejus ad purificandum aërem aque ac discutiendos Rheumatismos & OEdemata adhibent. Baccæ laudantur ad aperienda Viscera Abdominalia & augendas Excretiones aquosas, adhibentur vel sub forma Decocti, vel cum aqua ad consistentiam usque Mellis coctæ, sub titulo ROB. Extus ad Suffitus & Frontalia recipiuntur. Gummi vel potius Resina Suffitibus Discutientibus adjicitur, ad Vernices maxime adhibetur.*

**KIKEKUNEMALO GUMMI**. Frustra variæ magnitudinis flavicantia, semipelucida, extus tenuissima, nigricante crusta obducta, odorem gratum spirantia, simili sapore resinoso prædita, inter dentes lentescantia, calore liquabilia, inflammabilia, accensaque fumum emittentia suave & fortiter olentem. *Olei odorati albicanti, leniter acris  $\frac{1}{2}$  fundere dicuntur. Suffitus eorum laudabatur contra Rheumatismos & Erysipelas. Alcohol dissolutum Kikekunemalo egregium Vernicem constituit.*

**KINO**. *Gummi rubrum, adstringens Gambiense. Prostat in frustis variæ magnitudinis, ad Juglandis usque volumen sese extendentibus, splendentibus, ex*

*rufo-nigricantibus, extus nubecula ferruginei coloris obductis, odore vacuis, sapore fortiter adstringentibus, forma exsiccatas inspissatione massas referentibus, in aqua pene omnino diffluentibus. Ex regione Africa, fluvio Gambiæ adjacentē, quatuor abhinc lustris ad nos perveni cœpit. Laus ejus in Diarrhæa Chronica, Fluore albo, nimio Mensium fluxu &c. sanando ponitur.*

**LABLAB**. Est Semen ovatum, nigrum, hilo albo eminente, semilunari notatum, odore, sapore, viribus cum *Phaseolo vulgaris* convenit. Desumitur a Dolicho *Lablab* L. *Ægypti* progenie, passim in nostratibus quoque hortis adolescente.

**LAC, Latte, Lait, Milch**. Liquor ex mammis animalium emulsus, vix odoratus, dulcis sapore, spissiusculus, albus, sponte in *Cremorem, Serum & Caseum* secedens, qui secessu calore adjectisque Salibus acceleratur, Saccharo contra aut bullitu cavetur. Differt inter semet *Lac* pro vario animalis, unde desumitur, genere; *Vaccinum* ego vidi ubertate feri vincere *Humanum & Caprinum*, cedere *Cremoris & Casei* copia *Ovillo* ac *Caprino*; *Ovillum* vero superare reliqua omnia *Cremoris* abundantia. Sed in eodem etiam genere *Lac* pro singulorum Animalium ætate, vitæ genere, pabulo, distantia a partu, tempore, quo emulgentur, &c. differt. *Lac* leni calore in pulverem redactum *Franchipane* dicitur, cui, si aquam sperfuderis, obtinebis *Serum Lactis dulce* Hoffmanni. *Nutriendi, Demulcendi, Relaxandi ergo adhibetur. Lac* quod cærulescit aut flavescit, alienum odorem aut saporem prodit, cujusque gutta ungui instillata diffluit, rejiciendum est.

**LAC LUNÆ, Agaricus mineralis**. Terra calcarea, alba tenera, spongiosa digitos fœdans, in qua agitatur aqua, diutius suspensa hærens, lacteo eam colore inficiens, inodora, insipida. *Calx Gur* L. *Fissuris montium* crebro in modum spongiæ adhærescit. *Absurde satis Lac augere credebatur.*

**LACCA**. *Lacca, Resina ex ramulis sub forma granulorum suspensa, dense rubra,*  
non



non sine flavedinis vestigio, manifeste ex cellulis sibi invicem agglutinatīs efformata, inodora, sapore levissime amara, a quodam Insecto efficta, quod Formicis vulgo adnumerant & ramuli Croton lacciferi L. Indiæ Orientali. Bengalæ & Pegu Arboris; & hæc quidem *Lacca* in baculis appellatur: inter dentes lentescit, flammæ concipit, inflammataque suavem odorem spargit, aquam tingit, qua tamen non dissolvitur, nec Oleis dissolubilis esse dicitur. *Lacca* in granis ab ista in baculis eo tantum differere dicitur, quod hæc de baculis abrafa, aqua calida digesta, & denuo exsiccata est; irregularis figuræ & læte rubra, fusioni resistit; *Lacca* in tabulis in frustis variæ magnitudinis, minus quam antecedentes rubris prostat; ex *Lacca* in baculis parari dicitur, postquam ea ad usus baphicos fuerit adhibita, fusa. *Rarissime* intus scopo *Adstringendi* datur; *extus* ad *Dentifricia* adhibetur. *Lacca* in tabulis unice ad *Ceram sigillatoriam* recipitur.

**LACERTA.** *Lucertola*, *Lezard*, *Eidexe*. *Lacerta Agilis* L. Per omnem Europam occurrit, Amphibium quadrupes, caudatum, squamosum, olivaceo colore nitens. *Vulnerariæ vires* ei vulgo tribuuntur. *Adhibetur Oleum unguinosum cum ea infusum*.

**LACRYMA JOB.** Semen nitidum, inverse turbinatum, sub cortice duriore, cinerascens includit nucleum membrana tectum, rotundum, rufescentem, insipidum, inodorum. *Coix Lacryma Job* L. Indiæ planta, apud nos non perennat. *A quibusdam ob virtutem Diureticam commendabatur*.

**LACTUCA,** *Lattuga*, *Laituë*, *Salat*. *Folia* tenella, colore, magnitudine, figura, crassitie &c. multum inter se diversa, ad usus cibarios ante plantæ caluescentiam recipienda. *Semina* oblonga sunt, utrinque acuta, sub cuticula leviter flavescens seu nigricans, paululum medullam albam & dulcem includunt. *Lactuca fativa* L. *Blackwell* Tab. 88. Innumera varietates in hortis coluntur, quæ in duo genera discedunt; unum earum, quarum folia interna,

exterioribus teneriora in caput rotundum coeunt, *Latiuë pommée*, *Kopfsalat*, alterum foliorum in medutullio arctius compactorum, *Chicon*, *Ræmischer* vel *völscher Salat*. *Folia* recentia inter cibaria referuntur, scopo medicato ad *Decocta Aperientia* recipiuntur. *Semen* quatuor frigidis minoribus olim adnumeratum exsolevit.

**LACTUCA VIROSA,** *Sylvestris*. *Folia* hastata, laciniis ferratis sinuato-lacinata, duriuscula, glauca, costa dorsali aculeata, odorem virosum, acrem amarumque exhibentia *Lactuca Scariola* & *Lactuca virosa* L. *Vulgares* per Europam plantæ. *Succus lacteus*, quem fundunt plantæ, exsiccatus *Opio* simillimus habetur; eundem ante inspissationem probe clarificatum ad aliquot *Drachmas* per diem partita dosi datum *Hydropicorum* aquas evacuisse, quin imo ipsum morbum curasse recentissime narratur.

**LADANUM GUMMI.** *Laudano*, *Resina nigra*, leviter odora, insipida, friabilis, manuum fotu emollitur, igne non funditur, accensa fumum proprii non ingrati odoris emittit. Quod vulgo in officinis prostat ex *Creta* advectum, in placentulas tortum, multa arena nigra inquinatum, *en Tortis* dicitur; *Canadense Liquidum* dictum, massis in modum Extracti mollibus constat; *Hispanicum* sub forma bacillorum *Succi Liquiritiæ* similium accipimus; *Barbaricum* massas sistit *Hispanico* & *Cretico* molliores; recensetur præterea adhuc *Cretica* species, quæ in majoribus massis Emplastri fere mollitiem, colorem ex rufo-nigricantem, odorem ceteris fere fragrantiores habentibus, vesicis involuta nobis transmitti & *Ladanum en masses* appellari dicitur. *Creticum* *Cistus Cretica* L. exsudat, *Archipelagi* indigena, apud nos per hyemem in frigidario asservanda. Nec in Aqua, nec in Olei dissolubile fertur. *Oleum* odoratum fundere dicitur. *Hodie vix ad alios usus, quam ad Suffitus* recipitur.

**LAMIUM** videatur **GALEOPSIS**.

**LAPATHUM,** *Lapazio*, *Patience*, *Grindwurz*. *Radices* fibrosæ pollicem circiter crassæ, extus nigrae, intus lutescentes, ino-



doræ, gustu acriusculæ: paululum etiam adstringentes, subamaræ. *Semina* sunt triquetra, valvulis dentatis, singulis graniferis, rufescentia, austera. *Rumex acutus* L. Vulgaris per Europam planta. *Radices* *Aperiendi*, nec non *Sanguinem Depurandi* gratia in *Decocta* recipiuntur. *Extus* ad *Lotiones* & *Balnea* contra *Scabiem* adhibentur. *Semina* olim ob *Adstringentem* & *Alexipharmacam* virtutem a nonnullis laudabantur.

**LAVENDULA**, *Spingardi*, *Spica*, *Spica Nardi*. *Folia* solidiuscula, obtusa, incana, pergrati odoris, saporis aromatici. *Flores* asservantur calice irregulariter quadrifido, tomentoso inclusi, cærulei, bilabiati, parvi, suavissime odorati & aromatici. *Lavendula Spica* L. *Blackwell* Tab. 294. Europæ calidæ; nostras hyemes innoxias fert. Ex nostratibus floribus  $\frac{1}{2}$  Olei odorati obtinui. *Oleum* fragrantissimum & optimus *Spiritus abstractitus* ex Gallia Meridionali sub nomine *Eau de Lavande* nobis mititur. *Oleum spicæ*, quo ad *Encausticam* & *Vernices* utuntur, est *Oleum Terebinthinæ*, cui pauxillum Olei *Lavendulæ* adjectum est. *Lavendula* extus *Nervino* scopo nec non ad *Discutiendum* adhibetur.

**LAUROCERASUS**. *Folia* breviter petiolata, firma, ovali-oblonga utrinque viridia, superne lucida, inodora, amaricantia, sapore *Nucleos Persicorum* referentia. *Prunus Laurocerasus* L. Ex Trapezunte in Europam translata, frequenter in hortis colitur, nobis per hyemem in frigidario asservanda. *Oleum* odoratum fundere hæc folia dicuntur: menstrua aquosa æque ac spirituosæ cum eis infusa gratissimo, quem a *Nucleis* denominant, sapore inde imbuuntur. *Aquam* inde destillatam tam brutis, quam hominibus venenatam esse, testant *Observatores*; eandem ad *Guttas* sexaginta aliquoties de die datam potentissimum *Viscidi tenacis* resolvendi remedium esse; *Foliorum Infusum* in *Obstructionibus Hepatis*; eadem cum farina in *Cataplasma* redacta in *Tumoribus* *Scirrhis* egregios effectus edere *Recentioris Medici Angli* observatio est.

**LAURUS**, *Lavro*, *Laurier*. *Lorber*. *Fo-*  
Tom. I.

*lia* petiolata, ovato-lanceolata, acuta, firma, multis nervis notata proprium odorem gratum spirantia, simili sapore multum aromatico, amaricante prædita. *Baccæ* ovatæ, nigrae, exiguo acumine notatæ, levissime rugosæ, sub cuticula tenera & fragili nucleum continent colore Castaneis fere similem, bipartitum, odore laurino, non admodum grato, sapore acri, aromatico, amaro, nauseoso imbutum. *Laurus Nobilis* L. *Blackwell* Tab. 175. Europæ calidæ propria arbor, nobis in frigidario a nostræ hyemis rigore defendenda. *Folia* *Oleum* stillatitium exhibere dicuntur: ex *Baccis Olei* unguinosi, viridis, nauseosi, amari consistentiam *Unguenti* odoremque *baccarum* habentis  $\frac{1}{8}$  obtinui. *Foliorum* hodie crebrior in culinis, quam in *Medicina* usus est. *Baccæ* *Roborant* & in *Renes* aque ac *Uterum* agere dicuntur, sed *Sanguinem* nimis exastuantes nunquam intus dandæ, ne vendendæ quidem promiscue sunt a *Pharmacopolis*, ob vehementem, qua in *Uterum* agunt, virtutem. *Externus* earum usus in *Abstergendo* versatur. *Oleum* earundem unguinosum ex Italia nobis mitti solet, a vi *Resolvente* potissimum commendabile.

**LAZULUS**. *Lapis lazulo*, *Lapis pulcherrime cæruleus*, polituram admittit, ad *Chalybis ictus* nullas scintillas emit, fortiore igne funditur, maculis interdum *Pyritaceis* conspersus est, *Spiritibus acidis* in gelatinam liquatur; colorem a *Ferro*, quod vehit, habet. *Cuprum Lazulus* L. Absurdissima denominatio, cum in eo ne vestigium quidem *Æris* exstet. *Zcolithis* adscribendus. Venit ex Oriente. In officinis, more quam maxime reprehendendo *Lapis Armenus* ipsi non raro substituitur. *Gordiales* habere vires olim putabatur. In tenerrimum pollen tritus *Ultramarinum* constituit.

**LEMNIA TERRA**, *Lemnia Terra*. *Argilla* in bacillos efformata, cum admixta rubedine flavicans, insipida, inodora, superficies pulverulenta digitos tingit, dorso per inæqualia intervalla varia signa impressa sunt. Aliæ quoque *Argillæ* hodie sub hoc nomine prostant.



Argilla Lemnia L. Ex Turcia venire dicitur. *Mirandum profecto est, inertem hanc terram, quæ adscriptas sibi virtutes soli superstitioni debebat, Veterum tamen auctoritate per tot Secula in celebritate versari potuisse.*

LENS, *Lente, Lentille, Linse*. Semen rotundum, utrinque convexum, margine acuto cinctum, cineracei coloris, qui vero coctione, cum medulla exigui odoris, leguminosi saporis, fuscus evadit. Ervum Lens L. Europæ Meridionalis proprium, passim in agris colitur. Extracti  $\frac{1}{4}$  largitur. *Recipiuntur Lentes in cibum. Olim earum Decoctum Variolis laborantibus salubre ferebatur.*

LENS PALUSTRIS, *Lente Pallustre, VVasserlinsen*. Folia parva, ovata, in cæspites coherentia, succulenta, insipida, inodora, singula inferne filamentum emittunt. Lemna minor L. *Blackwell* Tab. 380. Passim per Europam occurrit. *Refrigerandis partibus Inflammatis sive per se, sive ex Lacte cocta imponitur.*

LENTISCUS videatur MASTYX.

LEPIDIUM, *Lepidi, Passerage, Pfefferkraut*. Folia ovato-lanceolata, serrata, Nasturtini tam odoris, quam saporis, & hujus quidem satis evidenter linguam ferientis. Lepidium latifolium L. Galliæ & Angliæ indigena, hortisque nostris, in quos recepta est, improbo suo reptatu incommoda planta. Condimenti loco cum Carne comeditur; a quibusdam contra Scorbutum, Sanguinis impuritates &c. commendatur.

LEPUS, *Lepre, Lievre, Haas*. Lepus timidus L. Notissimum per universam Europam & justo frequentius Quadrupes; nondum anniculus, & in locis præsertim montanis degens, ad cibum optimus est. Astragali, *Talons, Haasensprung*, qui *Talorum* nomine veniunt, sunt ossa oblonga, albida, uno extremo ginglymoideo, altero obtuso, corpore inter utrumque contracto. Laudabantur ob vires Diureticas; Axungia Linimenti consistentiam, odorem habet injucundum. In Resolvendo laudatur. Pili bruni & molles olim ad Unguenta Hemorrhagias sistencia recipiebantur. Lepus in olla tecta

in carbonem conversus, sive *Ustus*, *Lithontriptico* scopo exhibebatur.

LEVISTICUM, *Levêche, Liebstockel*. Radices fibrosæ, flavæ, intus albæ, sapore proprio, non ingrato, acri, aromatico, dulciculo etiam, odore fragrante, non nauseoso, aromatico instructæ. Folia petiolata, duplicato-ternata, foliolis majusculis, cuneiformibus lobatis, superne incisfis, odorem & saporem Radicum, utrumque tamen remissiores habent. *Semina ovalia, majuscula, tuberculo pyramidaliter terminata, alata, flava, tam sapore quam odore Radices & Folia superant. Ligusticum Levisticum L. Blackwell* Tab. 275. In alpebus Italiæ sponte, in hortis nostris culta crescit. Oleum odoratum fundere fertur. *Angelicæ vires, sed mitiores habet; contra Uteri morbos maximopere commendatur.*

LICHEN ISLANDICUS, *Purgiërmoos*. Ex foliis efformatur subrectis, coriaceis, flexilibus, versus basin latioribus, intus fuscis, extus albis, laciniatis laciniis latiusculis, denuo laciniatis, ciliatis, exiguis lacunis adspersis, inodoris, amaricantibus. Lichen Islandicus L. Passim Europæ faxis accrescit. Cum aqua Gelatinam rubicundam formare, exsiccatus, in pulverem redactus & Lacte, elixatus in alimentorum locum subire; lenissime Album ducere Aqua cum eo decocta, aut pulmentum cum Lacte inde paratum Phthysicis conducere fertur.

LIGUSTRUM, *Ligustro, Trœsne, Hartriegel, Dintenbeerlein*. Folia ovato-lanceolata, integerrima, superne læte, inferne pallide viridia, leviter adstringentia & amaricantia. Flores infundibuliformes, recentes albi & fragrantissimi, exsiccati vero flavo, inodori. Ligustrum Vulgare L. *Blackwell* Tab. 140. Ubicumque Europæ, citra maxime Septentrionalem, domestica planta. Tam Folia quam Flores ad Gargarismata interdum recipiuntur. Iners omnino est Aqua inde destillata.

LILIUM ALBUM, *Giglio bianco, Lis, Lilie*. Radicum exsiccatarum squamæ, inter se separatæ, plus minus flexæ, duriusculæ, fragiles, carneo colore, insipidæ, inodore. *Florum petala asservan-*  
tur



tur alba, membranacea, saporis & odoris vacua, odor enim & sapor una cum pulpa exsiccatione perit. Liliū candidum L. *Blackwell* Tab. 11. Orientis progenies, copiose in hortis nostris colitur. Radices creberrime extus scopo Emolliendi & Suppurandi adhibentur; Flores recentes fragrantium effectus edunt, exsiccati plane inertes sunt; neque proprii quid habent Aqua inde destillata, vel Oleum cum eis infusum.

LILIUM CONVALLIUM, *Mughetto*, *Muguet*, *Mayenblümlein*. Flores campanulati, sexfidi, albi, amaricantes, dumque recentes sunt, suavissime olentes, exsiccati inodori. Baccæ rotundæ, rubræ, pulpa rubro-flava, plura semina vehemente refertæ, inodoræ, amaræ. Convallaria Majalis L. *Blackwell* Tab. 70. Crescit qua patet Europa. Flores recentes fragrantia sua Resocillant, exsiccati ad Pulveres Sternutatorios recipitur; Baccas in Pulverem redactas Epilepticis salubriter datas fuisse relatum legimus. Aqua inde destillata & Spiritus abstractitius inertes sunt.

LIMAX, *Lumaca*, *Lumacon rouge*, *rothe Schnecke*. Est Vermis nudus, oblongus, crassiusculus, tentaculis instructus. Limax subrufus L. Frequens per Europam. Visceribus exemptis ad Fuscula Antibæctica recipitur.

LIMON videatur CITRUS.

LINARIA, *Linaria*, *Linaire*, *Harnkraut*. Folia angusta, oblonga, acuta, exigue amara, post exsiccationem inodora. Antirrhinum Linaria L. *Blackwell* Tab. 115. Vulgaris per Europam. Hæmorrhoidibus applicatur sive ex Lacte cocta, sive in Unguentum recepta.

LINUM, *Lino*, *Lin*, *Flachs*. Semina ovato-oblonga sunt, compressa, uno extremo acuta, cortice lævia, splendentia, ex fulvo-albicantia, nucleum album & dulcem comprehendunt. Linum Usitatissimum L. *Blackwell* Tab. 160. Europæ Australis domesticum, passim per agros cultum. Semen Olei unguinosi circiter  $\frac{1}{2}$ , Mucilaginis ultra  $\frac{1}{6}$  largitur; & ad hanc quidem extrahendam cum Aqua fervida Semen infundendum est. Cum fervida infusum adversus Renum Dolores intus; ad Clysmata & Cataplasmata

sopientia extus adhibetur. Olei inde expressi, flavi, insuavis internus usus contra Volvulum, Pleuritidem, Colicam præscribitur; sub forma Clysmatis injectum principem inter Medicamenta Anticolica & obstructam Alvum referantia locum tenet.

LINUM CATHARTICUM. Caules filiformes, teretes, foliis ovatis, parvis, subacutis oblesfi, inodori, amaricantes, levissime falsi. Linum Catharticum L. *Blackwell* Tab. 368. Vulgaris per Europam planta. Cum aqua infusum aut sub forma Pulveris haustum Alvum ducere fertur.

LITHARGYRIUM, *Lithargirio*, *Litharge*, *Silberglatte*. Substantia friabilis, ex squamis plus minus rufescentibus aut flavicantibus, non raro splendentibus composita, sapore adstringens. Oritur ex Plumbo, Metalla nobilia in cineritio majore depurante; itaque vitrum Saturni est, Ære aliisve metallis ignobilioribus contemperatum. In Lithargyrium Auri & Argenti distinctio abscondita est. Ad Unguenta & Emplastra recipitur.

LOOK GUMMI. Succinum Indiarum Occidentalis. In frustis permagnis nobis mittitur flavicantibus, pellucidis, tenuē sed suaveolentibus, inter dentes lentescētib; ad flammam fluentibus, flammam concipientibus, olidum fumum emittentibus, in Alcohole non dissolubilibus. Advehitur ex Africa. Instar aliarum Resinarum adversus Odontalgiam & Cephalalgiam Temporibus imponebantur. Non raro isti, quod Gummi Gopal nomine venit, substituitur.

LOPEZIA. Radix cujus variæ crassitie frusta in Europam mittuntur, quale ego possideo B. Gaubii amicitia debitum, sesqui pollicem fere crassum, leve, album, solidum, cortice flavicante, rugoso, laxo; tactu fere tomentoso tectum. Radix nec odora, nec sapida, Cortex tenuiter amarus est. Redi Experiment. circa varias Res Natural. Amstel. 1681. p. 138. Radicis, a Johanne Lopet in littore Africæ repertæ, & ab eodem denominatæ, mentionem facit; diu neglectam Gaubius denuo in usum traxit & cam sive in Decocto sive sub forma Pulve-



ris ad Drachmam semis aliquoties de die datam in vario Alvi fluxus genere, Diarrhœa maxime colliquativa egregia conducere tam sua quam aliorum experientia confirmavit. Enorme, quo Amstelodami venditur, pretium inhibuisse videtur ulteriora ejus tentamenta. Venit nobis ex Goa.

LUCIUS, Luccio, Brochet, Hecht. Aquas dulces inhabitans Piscis. Efox Lucius L. digestu facilis. Axungia Asciae Axungiae fati similis. Fel Humor liquidus, ex flavo viridis, amarissimi saporis, contra Corneæ vitia Abstergendi ergo usurpatur. Mandibula inferior, antice sursum flexa, dentibus anterioribus parvis, posterioribus majoribus instructa, flavicans, insipida, inodora, olim Pleuriticis commendabatur.

LUMBRICUS TERRESTRIS, Lombito terrestre, Ver de Terre, Regenwurm. Vermis calami anserini fere crassitie, coloris dilute rubicundi, odoris tenuis, ad mucidum vergentis, saporis expers. Lumbricus terrestris L. Ubivis obvius. Gelatinæ siccae  $\frac{1}{2}$  inde obtinui. Contra Arthritidem Succo expressi Uncia una pro dosi, aut exsiccatorum Pulveris Drachma semis exhibetur.

LUNARIA RACEMOSA, Lunaria, Lunaire, kleine Mondraute. Folia crassiuscula, pinnis lunatis pinnatifida, inodora, sapore adstringente prædita. Osmunda Lunaria L. Blackwell Tab. 420. Passim per Europam invenitur. Plurimæ de ea circumferuntur fabellæ. Adstringendi scopo subinde adhibebatur.

LUPINUS, Lupino, Lupin, Feigbohne. Semen compressum, rotundum, margine leviter angulato, sub cortice albo medullam albam & amaram includit. Lupinus albus L. Blackwell Tab. 282. In hortis colitur. Crebris in Aqua lotionibus amaritie demta, per Europam Meridionalem in cibum recipitur; apud nos Farina ejus Resolvendi & Abstergendi scopo extus adhibetur.

LUPULUS, Lupolo, Houblon, Hopfen. Turiones sunt parvi, graciles, angulosi, exiguis nodulis distincti, extus subrusi, intus albi, gustu subamari, evidenter aromatici, Strobili seu Flores feminini

sunt Amenta e squamis ovatis, siccis; flavicantibus, laxis, extus leviter pubescentibus, intus glabris, uni communi axi affixis efformati; odorem aromaticum spirant, similemque produnt saporem amaritie submistum. Humulus Lupulus L. Blackwell Tab. 536. Per omnem Europam crescit; cultura strobilorum non magnitudo modo, sed sapor etiam & odor augentur. Turiones Extracti aquosi saporis salini  $\frac{1}{2}$  largiuntur; Decoctum eorum rubrum est. Primo vere exquisitum Olus præbent & ad Juscula aperientia recipiuntur, Strobilorum præcipuus ad Cerevisiam usus est. Laudantur ob vim Roborantem, Aperientem & Diureticam.

LUPUS, Lupo, Loup, Wolf. Animal quadrupes Cani simillimum, a quo sola vita sylvestri differre videtur. Canis Lupus L. Per omnem Europam occurrit; ejus Hepar minus densum & rubrum Vino coctum, exsiccatum & in Pulverem reductum contra Hydropem & Hydrophobiam commendantur; Axungia nihil proprii habet.

LYCOPodium, Pied de Loup, Barlapp. Semen Pollen Antherarum, tenuitate sua tactum fere fugiens, flavum, inodorum, linguam leviter adstringens, candelæ luminis incussum fulguris instar accenditur. Destillatione principia Cerae edere dicitur. Lycopodium Clavatum L. Blackwell Tab. 535. Passim per Europam crescit. Internum ejus usum scopo Diuretico sunt qui laudent; extus Intertrigini aspergitur.

LYSIMACHIA, Lisimacchia, Corneille, Perce-bosse, gelber Weiderich. Folia ovato-lanceolata, margine ferrata, utrinque molliuscula, viridia, sapore linguam adstringentia. Lysimachia vulgaris L. Blackwell Tab. 278. Totius Europæ. Tanquam Adstringens & Vulnerarium olim laudatur, ad Gargarismata quoque recipiebatur.

MACIS, Mace, Fleur de Muscade, Muscatenblüthe. Substantia membranaceo-pulposa, pinguiuscula, ex laminis angustioribus retis instar flexis efformata, coloris, dum recens est, chermesini, exsiccata lutescentis, incumbit Nuci Moschatæ. Aqua marina conspersa, saccisque, aëre excluso atque prohibito, arctissime in-



Inclusa mittitur nobis ex Insulis Moluccis. Olei unguinosi, bruni, spissi, odoratissimi  $\frac{1}{3}$ ; Olei destillati  $\frac{1}{4}$  largitur. *Primarum viarum Roborandarum gratia tam cibis quam medicamentis adhibetur. Anodynæ inde sperantur vires.*

MAGNES, Calamita, Aimant, Magnet. Est Lapis grysei plus minus lutescentis coloris, Ferrum dum funditur dimittit, integer illud attrahit & ad Polos Mundi vim suam dirigit. Ferrum Magnes L. Passim in Ferrifodinis Europæ offenditur. Olim satis absurde ad extrahendum e Vulneribus Ferrum adhibebatur; hodie adversus Odontalgiam & effectus Spasmodicos extus applicatus laudatur.

MAJORANA, Maggiorana, Marjolaine. Folia crassiuscula, ovata, albida, obtusa, proprio fragrante odore & sapore aromatico subamaricante instructa. Origanum Majorana L. Blackwell Tab. 319. Europæ calidioris domestica, in nostris hortis copiose colitur. Olei odorati  $\frac{1}{4}$  largitur. Interdum ad condiendos cibos adhibetur. Extus ad Medicamenta Nervina, Discutientia & Sternutatoria recipitur.

MALACENSIS LAPIS videatur LAPIS HYSTRICIS.

MALTA, Drêche, Malz. Est Hordeum aqua madefactum, ad germinandum in acervos congestum & deinceps solerter exsiccatum; colore ad brunum aecedit, odorem non admodum gratum, saporem dulcem habet. In aquæ ebullientis triplo per aliquot horas maceratum omnium saluberrimum Scorbüticis, nec non Sanguinis acrimonia laborantibus remedium esse asseritur, quem in finem tres ad quatuor usque libræ Infusi agrotis quotidie propinantur.

MALVA, Malva, Mauve, Pappel. Radices fibrosæ, albæ, digito non crassiores, dulces. Folia cordata, orbiculata, petiolata, pubescentia, lobata, insipida, inodora. Flores asservantur duplici calyce, exteriori trifido, interiori quinquefido sustentati, pallide rubri, odoris pariter ac saporis expertes. Semina parva sunt, reniformia, grysea, sapore mucilaginoso. Malva Rotundifolia L. Blackwell Tab. 22. Vulgaris per omnem Europam.

In Emollientium numero habetur; vulgo Althæam ei præferunt,

MALVA ARBOREA, Rose tremiere, Erndtrose. Flores profunde quinquefidi, creberrime pleni, nigricantes, duplici calyce tomentoso sustentati, odore vacui, sapore adstringentes. Alcea Rosca L. Blackwell Tab. 54. Orientis indigena, copiose in hortis Europæis colitur. Recipitur maxime ad Gargarismata Roborantia.

MANATI LAPIS. Varia magnitudine ad nos pervehitur. Est Dens oblongus, latus, utrinque convexus, superne variis rugis & tuberculis insignitus; minores autem prorsus læves sunt, lævi & longitudinali sinu distinctus, inferne cavitate magna conspicuus, uno latere inferne introrsum flexo, crassissimo, altero admodum tenui, in duo minora tubera distincto; majores lutei, minores albi, intus promiscue albissimi, omnes insipidi sunt. Est Dens molaris Trichechi Manati L. in Oceano Africam & Americam alluente degentis. Iners omnino os olim ad cohibendas Hæmorrhagias efficax ferebatur.

MANDRAGORÆ RADICES, Radici di mandragola, Alraun. Asservantur Cortices Radicum tenaces, extus grysei, intus pallidiores, striati, inodori, levissimo sapore salino imbuti. Atropa Mandragora L. Blackwell Tab. 346. Europæ calidioris planta nostras hyemes innocua fert. Mitius agere Cortex videtur, quam Radix; huic vel ad pauca Grana absorptæ vires Narcoticæ tribuuntur; extus sub forma Cataplasmatidis Glandulis induratis imponitur.

MANNA. Succus inspissatus ex albo levissime lutescens; proprio, admodum dulci sapore, exiguo odore, in frustis variæ figuræ & magnitudinis ad nos transmittitur. Ex variis Fraxini L. generibus, in Italia crescentibus, summa æstate exsudatur; Sole exsiccatu inde deraeditur. Canellata longa Paris. frustis purissimis efformatur, aliquot pollices longis, unum circiter latis, una facie concavis; obtinetur frustis a cortice trunci excisis, loca vulnerata succo redintegrante. Manna vulgaris Granulata Paris. tam figura,



ra, quam magnitudine variat; truncus eam sponte æque, ac vulneratus exsudat; frustra inde majora quæque, albidiora & sicciora Seplosiarii seligunt & *Electæ* nomine vendunt. Manna, pro foli natalis diversitate; diversi sunt bonitatis gradus. Optima habetur, quæ ad Giraci, Calabriae ulterioris urbem, colligitur; hanc sequitur, quæ nobis ex Sicilia urbe Capachi venit, in commercio *Siciliensis* dicta; quæ rursus, quam *Calabrinam* vulgo nominant, antecellit, reliquæ apud nos in usu non sunt. *Manna Crassa, Spissa & Sordida* Paris. multum colorata, humida, sordibus inquinata, creberrime adulterata, omnino ex Pharmacopoliis eliminanda. Solvitur Manna in Aqua æque ac Spiritu Vini, neutiquam in Oleis. Frigida ejus solutio nauseam minus movet, quam quæ calida exhibetur. *Aptissimum ad Alvi ductionem, quippe omni ætati convenientissimum & in omnibus morbis tutissimum medicamentum; recto quoque consilio Enematibus immiscetur. Dosis est ad Uncias duas & ultra.*

**MARGARITÆ**, *Margherite, Perles, Perlen*. Calculi Margaritæ L. Sunt corpuscula plus minus rotunda, candicantia ex squamis sibi invicem incumbentibus efformata; diaphana & hæc quidem *Margaritæ Orientales* dicuntur, quarum nonnisi minime *Textiles, Saat-vel Lothperlen, Perles à l'once, Semence des Perles* nominatæ, in Pharmacopolia recipiuntur. *Occidentales* minus splendent, colorem lacteum, superficiemque ut plurimum in tubercula erectam habent. Priores capiuntur ex Mytilo Margaritifero L. Sinus Persici & Maris Australis Conchylio. Posteriores Mya Margaritifera L. potissimum largitur, variorum Europe fluviorum alumna. Quod Oculi Cancrorum, id Margaritæ in conchis, ædemque ab utrisque expectanda sunt vires.

**MARRUBIUM**, *Marrobio, Ardorn, Πάριον*. Folia subrotunda, crenata, rugosa, pubescentia, levissime odora, sapore amaro, cui aliquid salini accedit imbuta. Marrubium vulgare L. *Blackwell* Tab. 479. Crescit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem. Eius iati-

sum Sanguinem e Vena emissum & rubicundiorum & fluidiorum reddidisse lego. *Resolvendi ergo usurpatur.*

**MARUM**. Folia parva, acuta, crassiuscula, leviter pubescentia, odore proprio aromatico, sapore imbuta amaricante, evidenter linguam feriente. Teucrium Marum L. Europe calidioris indigenum, nobis per hyemem in frigidario asservandum, semper a felibus defendendum. Oleum destillatum valde pungens fundere dicitur. *Intus, sub forma Pulveris, Viribus Cephalicis efficax perhibetur; extus Pulveribus Sternutatoriis admiscetur.*

**MASOY CORTEX**. Tenuis est, fere planus, coloris Cinnamomei obscurioris, cortice gryseo, striato tectus, suaveolens, saporem habens dulcem, grato aromate Cinnamomum referente suffusus. Ex India olim advectus *Roborantibus annumerabatur.*

**MASTYX**. Refina ad nos pervehitur sub forma granorum majusculorum, maximo tamen Avellanæ magnitudinem nunquam æquante, fragilis, ex fractura splendens & lævis, inter dentes tenax, instar Cerae flexilis, odore proprio, grato, similique sapore, nonnihil adstringente perfusa. Massæ ex his granis, mediante alia quadam Refina conglutinatis ortæ, albide *Mastyx in sorten* dicuntur. Profluit Mastyx ex Pistacia Lentisco L. *Blackwell* Tab. 195. Europe Meridionalis, Archipelagi & Syriæ arbore, apud nos in frigidario per hyemem asservanda, quæ in tractu meridionali Insulæ Chio Augusto & Septembri mensibus hunc in finem incidi solet. Eiusdem arboris *Lignum* quoque sub nomine *Lentiscini* occurrit ponderosum, ex pallido-flavescens, cortice paululum rugoso, levissime rufescente tectum, odoris & saporis expers. Mastyches grana aliquantulum Olei odorati fundere dicuntur, & in expressis Oleis indissolubilia habentur, Aqua dissolvuntur, igne liquantur, accensa jucunde olent. *Intus ad Scrupulum unum pro dosi roborandis Primis vis adhibentur. Extus firmandis Dentibus conducunt Dentifriciis admixta. Suffitus eorum,*  
tan-



*tanquam Roborans, in Catarrhis & Prolapsibus Ani laudatur. Ligno quoque Lentisci olim ad Roborandum utebantur.*

**MATER PERLARUM**, *Madreperla, Nacre des Perles, Perlenmutter*. Est Testa Conchæ, variæ magnitudinis, orbicularis, lamellis dentatis imbricata, extus grysea ad flavedinem vergens, intus argenteo candore splendens; Margaritas Orientales nobis exhibet. *Ceteris Testis viribus medicatis non præstat.*

**MATRICARIA**, *Matricale, Matricaire, Metram*. Folia petiolata, pinnis ovatis, inciso-ferratis, albidis pinnatifida, odorem exsiccata nullum, saporem leviter amarum habent. *Matricaria Parthenium* L. *Blackwell* Tab. 192. In Europa, citra magis Septentrionalem, ubi vis indigena. Oleum destillatum fundere dicunt. *Morbis Uteri dicata.*

**MATRISYLVA**, videatur **HEPATICA STELLATA**.

**MECCÆ BALSAMUM**, *Opobalsamum*. Resina liquida, Terebinthina quidem fluentior, ceteris vero Balsamis liquidis spissior, coloris citrini, ad rubrum vergentis, odoris fragrantis, Citro proximi, saporis amaricantis, leniter linguam pungentis. Amyris Gileadensis e *Pharmacopœa Suecica* adducitur. Amyris Opobalsamum L. Arbor Arabiæ Petrææ. In Alcohole & Oleis dissolubile deprehensum est. Nullum certum extare genuinitatis ejus indicium alibi notavi. *Mæne vires, quas de eodem in vulgus sparsit rumor, fide sunt destitutæ, quo minus, quam reliqua Balsama exotica, humores exæstuat, eo ad consolidanda Ulcera interna aptius merito habetur.* Ejusdem arboris exigua etiam virgula **XYLOBALSAMI** nomine servantur, cortice rugoso, cinereo obductæ, insipidæ, inodoræ, gratum vero odorem, simulac accenduntur, spirantes. **CARPOBALSAMUM** ejusdem arboris fructus exsiccati sunt, capsulæ subrotundæ, Pisis minores, rugosæ, quatuor lineis eminentibus insignitæ, superne exiguo stylo notatæ, ex cinereo-rufescentes, inodoræ, levi sapore balsamico suffusæ, nucleum album includentes. Utrorumque usus medicatus exolevit.

**MECHOACANNA**. Talcolæ forma Jalappæis similes, ambitu majores, inodoræ, dulciculi saporis, sub gryseo cortice substantiam recondunt albam, solidam, friabilem, non fungosam, circulis distinctam. *Convolvulus Mechoacanna* L. *Blackwell* Tab. 571. Americæ Meridionalis civis. Resinæ aliquantillum vehere dicitur. *Vires quidem Catharticas, sed valde debiles edit. Ad aliquot Drachmas ejus Dosis extendi potest.*

**MEDULLA SAXORUM**, *Steinmark*. Argilla mollis, contactu saponis instar lubrica, cum aqua agitata exspumans, linguæ leviter adhærens, grysea, flava, rufescens. Talcum Lithomarga L. In rimis montium delitescit. *Adstringendi ergo olim usurpabatur.*

**MEL**, *Mele, Miel, Honig*. Substantia mollis, spissa, alias alba, alias ex badio-flavescens, dulcis, odoris proprii, plantarum subinde, unde haustum erat, participis. Ab Ape Mellifica L. ex nectariis florum conquiritur, deglutitur, evomitur, in favorum cellulas reconditur; unde favis diffractis, quod ad lenem calorem defluit *Virgineum* dicitur; pertinacius cellulis inherens, quod torculari deinde exprimitur, bonitate inferius est. Quo pallidius est atque granosius, eo melius judicatur. Narbonense ad vicum, Narbonæ proximum, *Courbiere* collectum albißimum, granosissimum, Rosmarinum olens, omnium princeps habetur. *Resolvendi, Aperiendi, Demulcendi viribus intus pollet, extus ad aperiendos Abscessus, abstergendæ Ulcera, aperiendam Alvum adhibetur.* Aqua inde destillata vix proprii quid habere videtur.

**MELILOTUS**. Summitates angulares Foliis obsessæ ternatis, ovali-oblongis, truncatis, ferratis & racemis *Florum* papilionaceorum, exiguo calyce sustentatorum, flavorum, odoris fortis, injucundi, saporis amaricantis. *Trifolium Melilotus officinalis* L. *Blackwell* Tab. 80. Ubique locorum per Europam crescit. *Discutiendi Doloresque sedandi scopo extus adhibentur.*

**MELILOTUS CÆRULEA**, *Meliloto*



ceruleo, *Trefle musqué*, *Beaumier*, *Siebenzeit*. Flores papilionacei, parvi, calyce sustentati, pallide cerulei, odoratu valde balsamici. Trifolium Melilotus cerulea L. *Blackwell* Tab. 284. Patria incerta, annua planta in hortis colitur. Vires Diureticas, Emenagogas imo Alexipharmacas habere fertur. Adhibetur ad Caseum rasilem Glaronensium.

MELISSA. Folia petiolata, cordata, rugosa, leviter hirsuta, odorem gratum Citri, similemque saporem habent. Melissa officinalis L. *Blackwell* Tab. 27. Europæ Meridionalis herba, in nostris hortis colitur. Oleum odoratum fundere; contra affectus Capitis pollere dicitur; extus ad Epithemata Roborantia & Discutientia recipitur.

MELISSA CANARIENSIS. Folia ternata, duobus inferioribus minoribus, oblonga, acuta, ferrata, rugosa, hirsuta, Camphoram redolentia, gustu aromatica, leviter amaricantia. Dracocephalum Canariense L. In Insulis Canariis & in America sponte crescere dicunt, a nostratis hyemis rigore in frigidario tuetur. Efficax omnino esse videtur, sed nullæ de ejus effectibus observationes exstant.

MELISSA TURCICA, *Moldavica*. Folia oblonga, obtusa, dentata, angusta, proprio odore & sapore forti, sed prioribus minus grato. Dracocephalum Moldavica L. *Blackwell* Tab. 551. Moldaviæ domestica, annua planta in nostris hortis colitur. Sunt, qui eam Melissæ officinali substituant.

MELISSOPHYLLUM, *Melissa di Montagna*, *Lamium Plinti male*, *Melisse de Montagnes*, *Grieskraut*. Folia petiolata, ex ovatis acuta, hirsuta, odore proprio aromatico, non ingrato, similique sapore. Melitis Melissophyllum L. Ubique locorum Europæ, præter maxime Septentrionalem, obvia, Viribus a reliquis plantis aromaticis minime differt; ad purgandos a muco & sabulo Renes, nec non ad pellendos Menses salubriter adhibetur.

MELITENSIS FUNGUS. Scapus exsiccatus, varie flexus, radicis speciem præ se fert, profunde striatus, extus ni-

gricans, intus ex luteo-rufescentis, odoris vacuus, saporis falsi, levissime adstringentis. Cynomorium Coccineum L. Parasitica planta radicibus variarum arborum Italiæ, Mauritaniæ &c. innascens, Ad sistendas Hemorrhagias ad Drachmam unam pro dosi commendatur. Cruentatis Gingivis sub forma Dentrifricii atteritur.

MELO. Fructus variæ magnitudinis, interdum vix pugnum, interdum majores etiam Cucurbitas æquans, viridis, mox oblongus, alias glaber, alias fibris albis eminentibus in modum retis obductus, tuberculis etiam quandoque, obfessus quod ubi accidit, a *Cantaloupa* denominatur; sub cortice nunc crassiore, nunc teneriore pulpam includit, sive viridem, sive rubram, sive flavescentem, plus minus suaveolentem, subinde aromaticam, semper vinosam & dulcem, cui Semina inhærent minora, ovata, compressa; ex albo-flavicantia, inferne marginata & angustata, sub cortice duriusculo nucleum album continentia. Cucumis Melo L. *Blackwell* Tab. 320. Ex Oriente ad nos transmissa copiose colitur; nostratibus finetorum calore maturatio fructus acceleranda est. Pulpa Refrigerandi ergo comeditur. Semina quatuor Frigidis majoribus accensentur.

MENTHA BALSAMINA, *Münzbal-sam*. Folia ovata, acutiuscula, petiolata, ferrata, glabra, odore Mentharum proprio, jucundiore aromate suffuso, similique sapore. Mentha Gentilis L. Europæ Australis planta, nostræ hyemis facile patiens. Olei odorati paucillum fundere lego. Omnes Menthæ promiscue viribus Stomachicis eximie pollent & Vomitus sistunt. Hæc nostra Species commode sub forma Infusi dari potest.

MENTHA CRISPA. Folia cordata, rugosa, subtus leviter pubescentia, marginem dentata & plicata, odore mentha-ceo gravi, minus grato, sapore aromatico, amaro. Mentha Crispa L. *Blackwell* Tab. 290. 2. Sibiria indigena, in hortis nostris colitur. Olei odorati  $\frac{1}{2}$  largitur. Aqua inde abstracta intus datur; ipsa per se sub forma Epithematis Carminativo & Antemetico scopo Abdomini, Mam-



*Alammis vero ad Lac discutendum impo-*  
*nitur.*

**MENTHA PIPERITIS.** Folia ovato-oblonga, acuta, viridia, ferrata, odore & sapore Piperi supparia. Mentha Piperitis L. *Blackwell* Tab. 291. Angliæ propria, optime in nostris hortis vegetat. Oleum inde destillatum, quod ex foliis exsiccatis melius, quam ex recentibus paratur, fervidissimo sapore linguam non sine sensu frigoris ferit. Huius Olei & Aquæ stillatitiæ ope *Rotulæ* parantur gratissimæ. Hæc Species omnes reliquas efficacia vincere videtur.

**MENTHA RUBRA vel AQUATICA.** Folia ex ovatis acuminata, glabra, majuscula, ferrata, odori & saporis evidens gratum aroma suffundunt. Mentha Aquatica L. *Blackwell* Tab. 32. Copiose per Europam crescit. *Ad Balsaminæ vires accedit.*

**MENTHASTRUM**, *Mentha longifolia*. Folia lanceolata, acuta, tomentosa, acute ferrata, saporem & odorem *Crispæ* referunt, suavitate etiam superant. Mentha sylvestris L. *Blackwell* Tab. 290. 1. Europæ temperatæ planta. *Rarissime in officinas admittitur.*

**MERCURIALIS**, *Bingelkraut*. Folia ovata, acuta, petiolata, ferrata, insipida, inodora. Mercurialis annua L. *Blackwell* Tab. 162. Vulgaris per Europam temperatam. *Emollientibus quondam adnumerabatur.*

**MERCURIUS**, *Argentum vivum*, *Hydrargyrum*, *Quecksilber*. Est Substantia fluida, quindecies aqua gravior, calore minore etiam quam quæ aqua ebullit, volatilis, frigore valde intenso in massam solidam, solo calore in pulverem rubrum convertitur, plurima corpora metallica dissolvit, vi omnium fere menstruorum dissolvenda. Invenitur sive natus, *Mercurius Virgineus*, sive Sulphure in Cinnabarim versus, in quem ubi vertitur, pro variis, quibus inhæret terris, varias *Mineras* efformat. Reperitur in variis Europæ montibus. Cuticula tectus, aut cujus globuli filum quasi trahunt, pejoris notæ judicatur. Depurandi ratio, quæ Destillatione fit, optima est.

Trituratione cum solidis vel unguinosis globularem formam deponit, & substantiis, cum quibus teritur, colorem nigrum affricat. *Potentissimum Resolvens, certissimumque morborum Venereorum remedium, utpote quod vel minutissimis vasculis, quæ cetera medicamenta adire non possunt, sese insinuat. Tam intus quam extus adhibetur.*

**MESPILI**, *Nespole*, *Nestes*, *Mespeln*. Fructus turbinato-rotundi, colore rubiginoso tincti, umbilico quinquefido coronati, villo obfessi, recentes quidem quam maxime austeri, ab arbore decerpti lento gradu mitescentes, & saporem nanciscentes vinosum, gratum, evidenter adstringentem. Exsiccati fuscissimi, valide etiam adstringentes. *Mespilus Germanica* L. *Blackwell* Tab. 154. Europæ temperatæ propria. *Exsiccati fructus subinde ad medicamenta Adstringentia accipiuntur.*

**METALISTÆ RADIX.** Prostat sub forma frustorum variæ magnitudinis ac figuræ, mox rotundis taleolis *Mechoacannæ* similia, mox secundum longitudinem secta; sectio transversalis circulos, longitudinalis fibras refert; extus striis crassiusculis notata, grysea, intus pallidior est; odoris expers, saporis levissime falsi. Ex America advehebatur, & *Mechoacannæ* analoga esse credebatur.

**MEUM**, *Barvurzel*. Radix fusiformis, aliquot pollices longa, calamus crassa, rugosa, extus ex gryseo-fusca, intus alba, odore proprio, sapore aromatico, protinus dulci, postmodum falso. *Æthusa Meum* L. *Blackwell* Tab. 525. Europæ temperatæ. *Virtutis Diuretici, Emenagogæ & Resolventis laudem habet.*

**MEZEREUM**, *Thymelæa*, *Laureola*, *Mezzereon*, *Bois gentil*, *Bois de Garou*, *Saint bois*, *Seidelbast*. Cortex mollis, tenax, rufescens, inodorus, saporis acerrimi. Desumitur a Frutice *Grana Coccognidii* exhibente. *Validissimum Drastrictum nunquam intus dandum; extus applicatur ut Fonticuli vices expleat.*

**MILIUM SOLIS**, *Lithospermum*, *Migliasole*, *Gremil*, *Herbe aux Perles*, *Meerbirse*. Semina rotunda, inferne contra-



sta, alba, nitida, sub cortice duriusculo medullam includunt fuscā, odoris & saporis expertem, cum Acidis effervescentem. Lithospermum officinale L. Vulgare per Europam. Olim scopo Lithontriptico adhibebatur. Syrupus inde paratus ab Ambrosio denominabatur & Dysenteriae mederi putabatur.

MILLEFOLIUM, Schaafgarben. Folia longa, leviter pubescentia, pinnata, pinnulis obovatis denuo aliquoties pinnatis, tenuis aromatici odoris, saporis amaricantis, levissime falsi. Achillea Millefolium L. Blackwell Tab. 18. Per omnem Europam obvium. Oleum inde destillatum semper, ego flavum, nunquam caeruleum obtinui. Commendabatur ad reserandas Obstructiones Abdominales, extus Vulnerario scopo adhibetur. Achillea Nobilis L. Camphoram redolens, eminentius aromatica utique praefenda videtur.

MILLEPEDES, Mille piedi, Cloportes, Maueresel, Kelleresel. Insecta superne ex cineritio-nigricantia, inferne albida, corpore ex circellis composito, & cute duriuscula tecto, sapore leniter falso; nigri, majores, corpus in globulum contrahentes reliquis praefendi. Oniscus Asellus L. Per omnem Europam occurrit, in regionibus calidioribus major est & nigricantior. Exsiccati Gelatinae multum nauseosae  $\frac{1}{6}$  largiuntur. Aperiendi, Sanguinem Depurandi, Urinam expellendi causa centum & ultra pro dosi recentium contritorum cum iusculo mistus Succus propinatur. Conservam inde parandi labor, cum recentes per totum annum haberi possint, superfluus est.

MINIUM. Menning. neutiquam Veterum, Calx Plumbi est in peculiaribus Angliæ, Belgii & Germaniæ officinis in colorem læte rubrum calcinata. Recipitur ad Unguenta & Emplastra.

MOMORDICA, Pomum Hierosolymitanum, Momordica, Pomme de Merocilles, Balsampfel. Pomum in medio ventricosum, utrinque contractum, pulchra rubedine tinctum, pluribus tuberculis notatum, multis seminibus turgens, insipidum, inodorum. Momordica Balsa-

mina L. Blackwell Tab. 522. Indiæ indigena annua planta, apud nos in hortis colitur. Oleum unguinosum cum his fructibus infusum ad usus Vulnerarios quondam commendabatur.

MORINGA. Radix semipedem circiter longa, pollicem crassa, sub cortice crasso striis longitudinalibus notato, ex gryseo-lutescente, substantiam includit lignosam, pallidiorem, tenuissime extus striatam, valde duram, intus non sine splendore lævem, inodoram, sapore falso magis quam aromatico linguam ferientem. Num est Radix Arboris Noces Behen praebentis? Ex India Orientali olim advecta contra Venena, Vermes & morbos Cutaneos efficacia ejus laudabatur.

MORUS, Moro, Meurier, Maulbeere. Radices habet fibrosas, flavas, inodoras, sapore dulci potius, quam amaro praeditas; Baccas lucidiusculas, sanguineo-nigricantes, ex acinis obovatis compositas, saporis proprii, vinosi. Morus nigra L. Blackwell Tab. 126. Italiæ indigena esse dicitur, copiose in nostratibus hortis colitur. Radicum Decoctum egregiæ contra Tæniam efficaciæ esse fertur. Baccae Refrigerandi gratia comeduntur. Rob & Syrupus inde parati ad morbos Faucium adhiberi solent.

MOSCATA NUX, Noce moscata, Noix Muscat, Muscatennusse. Nuces olivares, oblongas Mares, una vero facie planas Muttermuscatnusse vulgo appellant, extus gryseæ sunt, fulcis in retis speciem flexis insignitæ, duriusculæ, fragiles, fractura fuscae & nitidæ, intus lineis rubris variegatæ, odoris proprii, grati saporis aromatici, pinguiusculi potius, quam acuti. Arboris Moluccarum Bandæ maxime cultæ character nondum omnino determinatus est. Olei unguinosi  $\frac{1}{3}$ , Olei odorati  $\frac{1}{6}$  fundunt Nuces Sole siccantur, fumo & aqua Calcis vivæ a corruptione defenduntur. Vi Roborante & Anodyna pollent. Oleum expressum Sebi consistentiam, colorem flavum, Nucum odorem, saporem etiam pinguiorem habet, & ad eosdem ac Nuces usus, sed minori dosi, adhibetur, frequentius quoque



*extus applicatur*; quod sub forma paral-  
lelipipedorum in commercio prostat man-  
gonii suspectum est. Integræ Drupæ in  
India conditæ nobis sub *Nucum Indica-  
rum conditarum* nomine mittuntur, & si-  
ve per se, siue in *Electuaria* vel *Morsulos*  
*receptæ* Roborandi ergo exhibentur.

MOSCHUS, *Muschio*, *Musc*, *Bisam*.  
Pulveris speciem refert ex parvis gra-  
nulis constantem, ferruginei coloris &  
inflammabilis est, sapore amaro, odo-  
re proprio & quidem fortissimo; sub-  
stantiis, quas perpetrat, pertinacissime  
inhærente, Vesiculis inclusus ad nos per-  
vehitur, pilis rigidis obsessis, albæ a *Rus-  
sia*, badix a *China* & *Tunquin* denomi-  
nantur Moschus est substantia sebacea  
ex sacco desumpta, Umbilico Moschi  
Moschiferi L. in Tartaria, Sibiria &  
China degentis adhærente. *Contra Con-  
vulsiones, Deliria, Hydrophobiam* vel ultra  
*Scrupulum* pro dosi datus multum laudatur.  
Minima ejus quantitas ingens aliarum  
substantiarum volumen suo odore im-  
buit. Feminae hystericæ, nec non Hy-  
pochondriaci inde læduntur.

MUMIÆ. Prostant hoc nomine ho-  
die in officinis partes humanæ, Bitumi-  
ne conditæ & exsiccatae, nigrae, bitu-  
men sapientes & redolentes; sordido nau-  
seoso imo suspecto medicamento quod Balsa-  
mico & Adstringente scopo nonnulli adhi-  
bent, merito abstinetur.

MUNGOS. Radices sunt parvæ, mi-  
nimum digitum circiter crassæ, varie  
inflexæ, striatæ, extus lutescentes, in-  
tus albæ, sapore statim leviter falso,  
dein amaro. *Ophiorrhiza Mungos* L.  
Indiæ indigena. *Contra morsus Anima-  
lium venenatorum* & morbos *Malignos* lau-  
datur ejus efficacia.

MUS MARINUS. Folliculus compres-  
sus, cujus duo parietes parum a se in-  
vicem distant, ovato-oblongus, rectan-  
gulus, utroque margine crassiore & lon-  
gius producto, unde ad utrumque ex-  
tremum duo quasi cornua angusta, le-  
viter compressa prominent, extus ni-  
ger, intus flavicans, insipidus, inodo-  
rus; Ova esse creduntur *Rajæ* piscis,  
quæ exclusis pullis e Mari ad Littus pro-

jici & in Belgio maxime reperiri dicun-  
tur. *Eorum suffitu Hemorrhoides cæcæ do-  
lentes leniri credebantur.*

MUS MONTANUS, *Marmotta*, *Mar-  
motte*, *Murmeltier*. Animal quadrupes,  
gryscum, pedibus flavescentibus, cau-  
da abbreviata. Mus *Marmotta* L. Alpes  
Europæ Meridionalis inhabitat; officinis  
*Axungiam* subministrat, consistentia, co-  
lore, *virtute reliquis equiparandum.*

MUSCUS ALBUS QUERNUS. Effor-  
matur filis aphyllis, ramosis, varie  
contortis, gryseis & per fenium crusta  
alba obductis. Lichen plicatus L. Ab ar-  
boribus pendere solet. *Adstringentes ei  
vires tribuuntur; Tussi laborantibus præci-  
pue commendatur.*

MUSCUS ARBOREUS, *Muscus Aca-  
ciæ*, *veisses Lungenkraut*. Folia refert in  
multas lacinias secta, superne e cine-  
reo-glaucæ, inferne lanuginosa, inodo-  
ra, insipida. Lichen *Prunattri* L. Arbo-  
ribus accrescit, maxime *Pruno sylve-  
stri*. *Ad eosdem ac antecedens usus recipitur.*

MUSCUS CUMATILIS. Foliis sibi in-  
vicem incumbentibus latioribus efforma-  
tur, minus coriaceis, superne glabris,  
læte viridibus, inferne villosis, ex fusco-  
nigricantibus. Teter & mephiticus esse  
dicitur. Lichen *Aphtosus* L. Muscis in-  
nascitur, rarius observatus. In *Suecia*  
*contra Aphtas infantum* usurpatur; ejus *De-  
coctum Vermes per Vomitus* expulisse obser-  
vatum est.

MUSCUS ERECTUS. Caules vix spita-  
mæi, foliolis lineari-lanceolatis, acutis,  
glabris, patentibus imbricati, ex luteo-  
virentes, insipidi, inodori *Lycopodium*  
*Selago* L. Passim per Europam occurrit.  
*Valide Alvum ducere* & *Menses pellere* di-  
citur.

MUSCUS ISLANDICUS, videatur LI-  
CHEN.

MUSCUS PYXIDATUS. Folia parva,  
irregulariter laciniata, tubulos emittunt  
varia magnitudinis, conoideos, mar-  
gine superiore dilatato plus minus ex-  
cavato, mox simplices, mox ramosos,  
varie coloratos. Lichen *pyxidatus* L.  
*Terræ*, *faxis* & *truncis arborum* accre-  
scit; *Tussientibus* laudatur.



**MUSCUS TERRESTRIS.** Effingitur foliis coriaceis, latiusculis, sinuato-lacinatis, marginibus deorsum flexis, cinereo-glaucis, interdum obscure virentibus, inferne incanis, odore mucido, sapore nauseoso fatuo imbutis. Lichen Caninus L. In terra muscis instratus occurrit. *Ob virtutem Antilyssam commendatur.*

**MUSTELLA PISCIS.** Lampreda, Lott, Adraupe, Ruffolke. Gadus Lotta L. Vulgaris Europæ piscis; ejus Spina omni carne nudata, exsiccata & in pulverem redacta Epilepticis salutaris fertur.

**MYROBALANI.** Fructus carnosii, exsiccati, nucem includentes, inodori, sapore adstringentes. Quinque eorum genera in officinis prostant; *Citrina Blackwell Tab. 401. f. 3.* turbinatæ sunt, pollice longiores, ad colorem nigricantem vergentes, utrinque obtusæ, striatæ, tenaces, amaræ, austeræ, sub officulo scabro, anguloso, obtuso nucleum corneum includunt; *Chebulæ Blackwell Tab. 401. f. 2.* prioribus similes, majores tamen & magis fuscæ; *Belliricæ Blackwell Tab. 401. f. 1.* Nucem Moschatam referunt, pedunculo instructæ, prioribus pallidiores; *Indæ Blackwell Tab. 401. f. 4.* ex ovatis oblongæ sunt, rugosæ, non striatæ, foris nigrae, intus substantia quasi picea refertæ; *Emblicæ* tribus prioribus minores, proximis majores, sphaericæ figuræ, in sex angulos diductæ, nigricantes. Quatuor priores arboris cujus character nos adhucdum latet, fructus pro cujusque maturitatis diversitate inter se differre contendunt; postremas subministrat Phillanthus Emblica L. Javæ, Malaccæ, Macassar civis. *Adstringentibus viribus pollent, olim Purgantibus Corrigendi scopo adjiciebantur.*

**MYRRHA.** Succus concretus, quem in frustis variæ magnitudinis, Juglandi interdum proximæ, accipimus. Grana sunt subdiaphana, rufa, diffracta maculas produnt albas, quas Ungues dicunt, proprii, gravis odoris, saporis subacris, aromatici, amarissimi. Rejicienda in sortem dicta frusta, quæ arida, fordida sunt & ad nigredinem vergunt. Ex

Abyssinia & Arabia nobis venit, ex fauciatâ arbore, cujus characterem ignoramus, obtinetur. Calore non funditur, ex aqua se suspendi patitur, Alcohol eam ex parte dissolvit; Oleis vero indissolubilis est. Ex sedecim ejus Unciis Aquam stillatitiam obtinui, per odoram, perinde sapidam, cum aliquot Olei butyracei guttis, aquæ innantibus. *Resolvit, Abstergit, Roborat, Putredini resistit. Partem ejus resinosam humores multum exastuare testantur Observatores. Datur intus Pilularum forma ad Scrupulum unum. Extus Abstergens, Putredinem arcens, Dentes mundans & firmans est.*

**MYRTILLI,** Mortelle, Airelles, Heidelbeeren. Baccæ globosæ, cæruleo-nigricantes, labia atque palatum colore suo insufficientes, umbilicatæ, polyspermæ, dulces, subadstringentes. Vaccinium Myrtillus L. *Blackwell Tab. 463.* Crescit per omnem Europam. *Refrigerandi aque ac Adstringendi gratia comeduntur.*

**MYRTUS.** Folia ovato-acuta, firma, late viridia, proprii, aromatici, gratissimi odoris, saporis perinde aromatici, suffusa acrimonia evidenter etiam adstringentis; Baccæ oblongo-ovatae sunt, umbilico stiloque ex ejus medio eminente notatæ, nigrae, inodora, leviter adstringentes. Myrtus communis L. *Blackwell Tab. 114.* Europæ calidæ & Asiæ progenies, nobis per hyemem in frigidario asservanda. Baccæ ob Roborantem, Folia ob Aromaticam insuper virtutem celebrantur.

**MYRTUS BRABANTICA,** Piment Royal, Post, Porst. Folia ovato-oblonga, inferne contracta, integerrima sapore adstringente. Myrica Gale L. Europæ frigida & Canadæ indigena. *Admisce-tur subinde Unguentis contra Scabiem.*

**NAPUS,** Navone, Navet, Steck-vel Stuckelruben. Radices alias fusiformes, alias cylindræ, variæ magnitudinis, sub cuticula vel flavescente, vel nigricante, carnem albam, Rapas olentem, dulcem cum quodam acredinis vestigo continent. Semen, Colsat, Rabsaamen, Rebs, Levvat, rotundum, sub cortice modo fusco, modo rufo, nucleum album



abcondit, multo oleo turgidum, inodorum, insipidum. *Brassica Napus* L. *Blackwell* Tab. 224. & 410. ad littora Maris Europæ minus calidæ indigena. Radices a varietatibus hortensibus desunt mensis opponuntur & *Juribus* *Petalibus* adjiciuntur. Semen vero a *Naposylvestri* in nostratibus argis copiosissime culto desumitur; olim contra *Venena* commendabatur; hodie neglecto fere ejus usu medicato Oleum inde exprimitur, lucernis præcipue inserviturum.

**NASTURTIUM AQUATICUM**, *Nasturzio acquatico*, *Cresson d'eau*, *Brunnkressen*. Cauliculi cavi, sulcati, succulenti, quibus adhærent *Folia* impari pinnata, pinnis rotundis, leviter incis; sapor acris, amaricans, odor proprius est. *Sisymbrium Nasturtium aquaticum* L. *Blackwell* Tab. 260. Crescit per omnem Europam. Tanquam condimentum cibis adjicitur; *Resolvens* & *Antiscorbuticum* remedium semper recens adhibendum. In Suecia sunt, qui *Cardaminem pratensem* loco *Nasturtii aquatici* in usum trahant.

**NASTURTIUM HORTENSE**, *Nasturzio ortense*, *Cresson*, *Kressen*. *Folia* angusta, pinnatim laciniata, laciniis dentatis, pallide viridia, saporem habent acriusculum, nonnihil etiam amarum, odorem proprium, nares irritantem. *Semina* ovata sunt, glabra, rufa, sapore oleoso leviter acris. *Lepidium sativum* L. *Blackwell* Tab. 23. Ad *VVolgam* sponte crescere fertur: annua planta copiose in nostris hortis colitur. Ad *Acetaria* recipitur, contra *Scorbutum* & *Sanguinis impuritates* efficax habetur. Semen olim ad *Excretiones aquosas* promovendas usurpari solebat.

**NASTURTIUM INDICUM**, *Nasturzio d'India*, *Capucine*, *Capucinerlein*. *Gemmæ* florum rotundæ sunt, virides, sapore leviter aromaticæ, odore fructus *Rubi Idæi* referentes. *Flores* ex fundo conoideo in cornu porrecto, cuculli similitudinem efformant, in quinque petala exeunt, ciliata, obtusa rotundata, colorem aurantium, odorem proprium fortem, saporem habent acriusculum. *Tropæolum majus* L. *Americæ Meridionalis* indigenum. An-

nua planta, copiose in nostris hortis colitur. *Gemmæ* *Aceto* condiuntur & cum carne comeduntur. *Capparide* omnino gratiores; *Flores* ad *Acetaria* recipiuntur. Ad *Sanguinem* *Depurandum* commendantur.

**NASTURTIUM PETRÆUM**, *Nasturzio di Rocca*, *Cresson de Roche*, *Steinkressen*. Cauliculi succulenti, superne divisi, teneri, *Foliis* obessi reniformibus, hirsutis, exiguis petiolis suffultis, sapor leviter acris & subadstringens est. *Chrysosplenium alternifolium* L. Crescit per omnem Europam. Destillatione principia inde Alcalina eliciuntur. Salem quoque emittit *Essentialem*. *Resolvendi* scopo celebratum, haud ita pridem nostrates *Asthmaticis* & *Tussientibus* exhibere solebant.

**NASTURTIUM SYLVESTRE**, *Nasturzio Salvatico*, *Cresson sauvage*, *Feldkressen*. *Folia* longa, laciniis angustis pinnata, ejusdem fere ac præcedens saporis. *Cochlearia Coronopus* L. *Blackwell* Tab. 120. Vulgaris per Europam. *Præcedentis vires* habere videtur; olim ad *Acetaria* recipiebatur.

**NEPETA**, *Nepitella*, *Herbe aux Chats*, *Katzenkraut*. *Folia* cordata, tomento obsessa, profundius crenata, proprio odore minus grato, sapore aromatico imbuta. *Nepeta Cataria* L. *Blackwell* Tab. 455. Crescit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem. Aliquantulum Olei odorati fundere dicitur. Commendabatur olim contra morbos *Uterinos*.

**NEPHRITICUS LAPIS**. Est Lapis viridescens, durus, ad Chalybis ictum scintillans, tactu pinguis, substantiæ granulose speciem referens, subdiaphanus. *Jaspis Lapis Nephriticus* *Waller*. Species obscure viridescens, ex America allata *Lapis Amazonum* dicitur & in Amuleti vicem gestatus *Epileptici* salutaris fertur. In Officinis ut plurimum prostat, Lapis magnus, squamis ex nigro-virescentibus, subdiaphanis constans, nonnullo pinguedinis sensu contrectantem afficiens, torum admittens. Talcum *Nephriticus* L. Passim in Europa offenditur. Ferri & Cupri vestigia vehere, *Magnesium* continere, Salem *Ammoniacalem* & Oleum



emphyreumaticum fundere dicitur *Usus*,  
eius exsolevit.

**NEPHRITICUM LIGNUM.** In maioribus frustis ad nos transvehitur, compactum, durum, ponderosum, extus dilute fuscum, in medullino spadiceo-fuscum, odoris expers, sapore leviter adstringens. Ab arbore unde *Nuces Beben* obtinentur, subministrari dicitur; nobis ex America mittitur. Ejus Tinctura aquosa opalini coloris luci exposita aurea, sub umbra cærulea est. Olim a virtute Antinephritica laudem habebat.

**NICOTIANA, Tabacco, Tabac.** Folia magna peculiari exsiccationis modo penitus flavescentia, ovali lanceolata, proprii odoris, solerti exsiccatione multo etiam acutioris, saporis admodum acris. *Nicotiana Tabacum* L. *Blackwell* Tab. 164. Americæ Meridionalis domestica, annua planta, uberrima hodie ejus per Europam cultura est, quæ Sec. XVI. ad finem vergente, ibidem invalescere cepit. Principia fundit Alcalina Valide Resolvit & Stimulat, adeo ut Vomitus etiam excitet. Tanquam Apophlegmatizans creberrimi usus est; Clysmatibus quoque adjicitur. Sympus inde paratus Asthmaticis laudatur.

**NIGELLA, Nielle, schwarzer Kümmel.** Semina parva, angulata, acuta, nigra, scabriuscula intus viridescencia, odorem aromaticum spirant, sapore linguam pungunt. *Nigella fativa* L. *Blackwell* Tab. 558. Europæ Meridionalis & Orientis indigena planta, in hortis colitur. Oleum unguinosum & destillatum largiri dicuntur. Ad condiendos cibos Aromaticum loco recipitur; Aqua cum eis agitata scopo Errhino adhibetur.

**NIL, Nihilum, Pompholyx.** Lewis, vix coherens substantia, alba, insipida, inodora, fornacibus, in quibus Aurichalcum vel paratur, vel funditur, adhærescens. Est verus Flos Zinci, creberrime Marga quadam aut Gypso adulterari solet; recipitur maxime ad medicamenta Ophthalmica externa.

**NINZIN.** Radix calamo angustior, inferne bifurcata, leviter rugosa, cornu tam colore, quam pelluciditate referens, inodora, subdulcicula. Sium

*Ninfi* L. *Blackwell* Tab. 514. In China Septentrionali & Japan crescit. Ob similitudinem, quam cum hominis figura habere dicebatur, medicamentorum Analepticorum princeps esse credebatur & maximi vendebatur; sed pro merito suo exsolevit.

**NITRUM, Nitro, Salpeter.** Sal in crystallos prismaticas excrescens, cum substantiis inflammabilibus detonans, dum aqua solvitur frigus gignes, frigidi pariter ac amari sensu linguam afficiens. Nitrum nativum L. Magna ejus copia nobis ex Oriente venit; in Europa ex propriis terris peculiari ratione excoquitur: terræ sub forma Stalactitæ adhærens *Aphonitrum* dicitur; ubi vero tanquam tomentum efflorescit *Halonitrum*, *Salpetre de Houffage* appellatur; ubi denique solo sapore & detonatione sui præsentiam declarat *Nitri Embryonati* nomine venit. Constat ex proprio Acido & Alkali Vegetabili. Nonnisi Depuratum ad usus medicatos recipiendum. Sanguinis Aestum temperat, Spissitudinem phlogisticam Resolvit, Putredinem arcet.

**NUMULLARIA.** Folia ovato-orbiculata, petiolata, inodora, leniter adstringentia. *Lysimachia Nummularia* L. Ubivis locorum per Europam obvia. Ob vim Adstringentem laudata tam intus quam extus usurpabatur.

**NYMPHÆA, Ninfæa, Nenufar, Seeblume.** Radices brachium & ultra crassæ, fungosæ, extus fuscae, tomentosæ, mammillis, infessæ, intus albæ, leviter amaræ. Flores exhibent petala alba, oblonga, insipida, inodora. *Nymphæa alba* L. *Blackwell* Tab. 498. & 499. Passim per Europam usquequaque obvia. Radices Demulcent & Adstringunt. Flores exsiccati inertes sunt.

**OCHRA.** Terra est pulverem five luteum, five rufum sistens; color calcinatione intenditur. Ochra Ferri & Martis L. Subsidit in Aquis Martialibus, verus Crocus Martis. Creberrime Picloribus inservit. A Medicis interdum ob vim Roborandi tam intus quam extus adhibetur.

**OLAMPI GUMMI.** Prostat in frustis minoribus, extus gryscis, intus splendidis,



dis, subdiaphanis, fuscis, friabile est, tritum dentium non lentescit, insipidum, inodorum, aqua non solubile, calore non liquandum, flammæ admodum ardet, suavemque odorem resinofum spirat. Ex America advehi fama est. *Incongrue Gummi Arabico equiparatur.*

**OLIBANUM**, Olibano, *Thus, Encens, Vibrauch*. Advehitur in granis variae magnitudinis, maximis Nucem Juglandem fere æquantibus, submixta rubedine flavicantibus, subdiaphanis, fragilibus; odor eorum proprius, accensorum etiam quam maxime fragrans, sapore tenuis est; Succum esse concretum quadam *Juniperi* specie exsudentem, veri quam simillimum videtur; istius vero *Juniperi*, unde obtinetur, adhucdum incerta species est. In Arabia collectum, Meccam vectum, Cairum inde deferitur. Ex aqua se suspendi patitur, Spiritum Vini subit; Oleis nequaquam solubile fertur. Igne non funditur. *Olim Roborandi ergo intus dabatur, hodie ad Emplastra Resolventia & ad Suffitus Discutientes adhibetur.*

**OLIBANUM SYLVESTRE**, videatur **PINI RESINA**.

**OLIVA**. *Drupa ovata*, variae magnitudinis, carnosa, viridis, saporis proprii, adstringentis, amaricantis; imaturis propria, insignis amarities Lixivio cinerum adimitur, qua adempta aqua falsa & aromatibus condiri solent. Includit officulum oblongum, durissimum, rugosum, cinerascens, nucleum continens parvum, dulcem. Olea Europæa L. *Blackwell* Tab. 199. Europæ calidæ indigena, apud nos in frigidario ab hyeme defendenda. *Olivæ conditæ, ut sunt, comeduntur, Embannatibusque Roborandi & Appetitum excitandi gratia adjiciuntur.* Oleum inde expressum colore sese prodit subflavo, odore levissimo, sapore mitissimo, & quod thermometro paulum infra gradum æeris temperatidescendente protinus spissescat. Optimum est, quod nobis ex Gallo Provincia venit. *Viribus Oleorum unguinosorum pollet.*

**OLSNITIUM**. Radix fibrosa, albescentis, saporis acris, subjuncta amaritie

aromatici, odoris proprii, aromatici. *Selinum Sylvestre* L. *Blackwell* Tab. 556. Europæ temperatæ. *Incidens, Resolvens, Alexipharmaca virtus ei hinc inde tribuitur.*

**ONONIS**, *Anonide, Arrêt de bœuf, Hauchecheh*. Radix longa, calamum circiter crassa, extus fusca, intus alba, tenax, saporis acrisculi. *Ononis spinosa* L. *Blackwell* Tab. 301. Crescit per omnem Europam. *Ad scopos Diureticos adhibetur; nuperrime sub forma Pulveris bis interdiu sumtam Sarcocelen curasse observatum est.*

**OPHIOGLOSSUM**, *Lingua Serpentina, Langue de Serpent, Natterzünglein*. Cauliculus ad aliquam altitudinem surrectus, folium ovato-oblongum, subcarnosum, spicam inde angustiores emittit, pectinatam, rubentem; sapor subadstringens, glutinosus est. *Ophioglossum Vulgatum* L. *Blackwell* Tab. 416. Passim per Europam obvia planta. *Olim intus æque ac extus tam Adstringendi quam Consolidandi gratia in usu erat.*

**OPIUM**. Succus inspissatus in panes coactus, ambitu pugnum circiter æquant, superficie variis quicquiliis inquinata nobis ex Natolia, Persia & Ægypto venit, extus fuscus, intus nigricans, odore viroso, Papaveraceo, sapore acri & amaricante. Paratur ex inspissato Decocto Capitem Papaveris Somniferi L. *Blackwell* Tab. 284. & 483. Orientis indigenæ annuæ plantæ, hodie passim per Europam cultæ. Aquam & Spiritum Vini aliquantulam ejus partem intactam relinquere, odore & sapore ejus eadem liquida inde abstrahenda imbui, ejus vim coctione & coctione multum debilitari, Extractum ejus spirituosum fortius quam aquosum agere, Sanguinem denique eo attenuari Observatores sunt experti. *Sensus Opio obtundi, motumque Muscularem imminui abunde compertum est. Quocirca, quamvis recta ratione & justa dosi datum, pro Anodynorum & Antispasmodicum principe merito habeatur; ab ejus tamen usu caute abstinebunt, quorumcunque vel motus Sanguinis præter modum auctus, vel debilia Solida sunt, vel quibus evidens stimulus Spasmos aut Dolores excitat. Nostratibus ejus*



*Dosin vix ultra unum Granum extendere licet. Externum Opii usum nunquam periculo carere, egregius Auctor evicit.*

**OPOPANAX.** Succus concretus in granis nobis mittitur magnitudine vix Nucem Juglandem æquantibus; extus ex rufo-lutescentibus, intus albidis, odoris balsamici, non ingrati, saporis amari, proprii, nauseosi; massæ majores, quarum grana substantia quadam granulosa & variis sordibus inquinata conglutinantur, deterioris notæ sunt. Affertur ex Asia. Ex Pastinacæ Opopanacis L. Europæ calidæ plantæ, nostræ hyemis vim citra noxam sustinentis, vulnerato caule effluere dicitur. Ex aqua se patitur suspendi, Oleis insolubile fertur. *Resolvendi gratia tam extus quam intus adhibetur.*

**OREOSELINUM,** *Appio di montagna, Persil des Montâgnes, Grundheil.* Radix fibrosa, longa, crassa, rugis transversalibus notata, flavicans, intus alba, validum odorem aromaticum spirans, sapore linguam evidenter pungens. Athamanta Oroselinum L. Per montes Europæ usquequaque obvia. *Virtutis Resolventis, Sudoriferæ, Diuretici nomine a nonnullis laudatur.*

**ORIGANUM CRETICUM.** Spicæ imbricatæ, prismaticæ, luteæ, bracteis longis, cuneiformibus distinctæ, admodum aromatici odoris & grato sapore linguam ferientes. Origanum Creticum L. Orientis & Europæ Australis indigenum. Oleum sanguinei coloris, acutissimi saporis fundere fertur. In quibusdam regionibus condimenti loco cibis adjicitur. *Rarissime intus, extus Discutiendi & Roborandi causa adhibetur.*

**ORIGANUM HISPANICUM.** Spicæ vel potius Capitula ovata, acuta, hirsuta, & sapore & odore Saturejam referentia. Origanum Marum L. Archipelagi. *Rarissime usurpatur.*

**ORIGANUM VULGARE,** *Wohlgemuth.* Summitates quadrangulæ, ramosæ, *Foliis* obseßæ sessilibus, ovatis, integerrimis, subtus levissime pubescentibus & *Spicis* paniculatis terminatæ, subrotundis, bracteis cuneiformibus, acu-

tiusculis, purpureis distinctis, inter quas Flores labiati ex albido purpurascens herent; odor proprius, fragrans, sapor aromaticus. Origanum Vulgare L. *Blackwell Tab. 280.* Crescit per omnem Europam. Olei odorati exiguum partem fundit. *Priorum viribus pollet.*

**ORLEANA,** *Oriana, Rocou.* Venit nobis in massis majoribus, foliis longis, latis, nervosis involutis, quarum substantia mollis, humida est, digitis adhærescens, sanguineo colore nitens, odorem spirans admodum foetidum, submucidum, sapore leviter falso imbuta. Est Fæcula succi Seminum Bixæ Orellanæ L. Americæ calidioris fruticis, ubi in *Refrigerantium & Adstringentium numero habetur; apud nos ad Tinctorios usus recipitur.*

**OROBUS,** *Ervum.* Semina rotunda, levissime compressa, sub cortice fusco medullam albam, insipidam, inodoram continent. Eryum Ervilia L. Europæ Meridionalis & Orientis annua planta, nostræ quoque regionis culturam admittit. *Farina quatuor Resolventibus adnumeratur; Internum ejus usum sunt, qui non hominibus solum, sed equis, quin & Gallinacæ damnosum esse contendunt.*

**ORYZA,** *Riso, Ris, Reis.* Semina decorticata, oblonga, ventricosa, utrinque compressa, concava, subdiaphana, albißima, striis distincta, friabilia, insipida, inodora. Oryza sativa L. Asiæ & Americæ indigena, in America, Italia & Hispania copiose colitur. Annua planta apud nos, seminum ad maturitatem promovendorum causa, in vaporario servanda. *Hispanica rubet, Carolinensis Europæam albedine, magnitudine, pelluciditate vincit. Mucilaginis siccæ  $\frac{1}{2}$  largitur. Vulgatissimus Orientis cibus, nostris quoque mensis copiose apponitur. Demulcendi ergo agrotis datur, contra Alvi fluxus efficax celebratur.*

**OSMUNDA,** videatur LUNARIA.

**OSTEOCOLLA.** Concrementa calcarica, alba, figura oblonga, superficie aspera. Sunt vel Stalactites vulgari ratione orti & tales ut plurimum in Officinis prostrant, vel stipites arborum ca-



rie exesi, terra calcarea & sabulo farti, vel incrustationes Vegetabilium calcarea, destructo Vegetabili superstites. Passim per Europam reperitur. *Ossa consolidandi vires eis adscriptæ dudum explosæ sunt.*

**OSTRUTIMUM**, videatur **IMPERATORIA**.

**OVUM**, videatur **GALLINA**.

**OXYACANTHA**, *Ossiacanta*, *Epine blanche*, *WWeisdornen*. Flores albi, pentapetali, petalis rotundis, leviter ferratis, fragrantibus. *Fructus* bacca sunt ex elliptico subrotundæ, umbilicatæ, singulæ ad quaterna usque semina fertiles, rubræ, insipidæ, inodoræ. *Cratægus Oxycantha* L. *Blackwell* Tab. 149. Copiosus ejus per Europam proventus est. Flores Floribus *Acaciæ*, quamvis gratia inferiores, substitui solent. *Fructus*, *Acaciis* utique inertiores, leviter adstringunt.

**OXYCOCCUS**, *Canneberge*, *Moosbeeren*, *Kesselbeeren*. Bacca rubræ, globosæ, umbilicatæ, succo rubro turgentes, inodoræ, gustu, si quidem glacie adustæ fuerint, acidulæ. *Vaccinium Oxycoccus* L. *Europæ* temperatæ & frigidæ planta, in hortis coli ægre patitur. *Fructus* Refrigerandi scopo ægrotantibus præbentur; *Scorbuto* quoque adversari dicuntur. *Succus* baccarum aquis partibus cum *Melle* mixtus in *Suecia* officinalis est & *Febricitantibus* laudatur.

**PANIS**, *Pane*, *Pain*, *Brod*. Sub crusta varii coloris, odoris, saporis, duriuscula, friabili continet substantiam mollem, multis furaminibus hiulcam, pro *Farinæ*, unde conficitur, varietate, varia albedine instructam, quæ *Mica* dicitur. Albedine, levitate, numero foraminum probatur. Est *Farina* iusta Fermentatione viscido exuta, unde *Pani* præter farinam ex vario tam fermentationis, quam coctionis, quam expertus est modo, novæ nascuntur diversitates. *Crusta* scopo *Roborandi* ex *Jure* coquitur. *Mica* vires *Emollientes* edit.

**PÆONIA**, *Peonia*, *Pivoine*, *Gichtrose*. *Radix* tuberosa, sub cuticula ferruginei coloris, qua *Radix* ad usus medicatos recipienda nudari debet, candida est,

Tom. I.

odoris gravis, saporis leviter adstringentis, nauseosi. *Florum* petala asservantur profunde rubra, odorem exsiccata exiguum, saporem nullum habent. *Semina* sunt ovata, nigra, medullam habent duriusculam, albam, dulcem. *Peonia officinalis* L. *Blackwell* Tab. 65. & 245. In *Europa* calidiore sponte crescit, nostras hyemes optime fert. *Vires Antispasmodicas* edere dicitur.

**PALMÆ OLEUM**. Albissimum est, inodorum, insipidum, in nostro aëre semper spissioris Unguenti consistentiam habet. Recens aurantium colorem habere, suavissimum Iridis odorem spirare, obtineri coctione fructus *Palmarum* fertur, in *America* calidiore crescentium, quarum vero genus, quale sit, adhuc in dubio ponitur. Cl. *Mutis* in *Supplemento Linnaeano* *Cocos Butyraceæ* descriptionem profert. *Præ* reliquis *Oleis* unguinosi nihil eximii præstare videtur.

**PAPAVER ALBUM** vel **NIGRUM**, *Papavero*, *Pavot*, *Magsaamen*. *Capsula* seu *Capita* majuscula sunt, rotunda, operculo rotundo, striato tecta, sub quo orificium capsulæ hiat, odorem recentes valde virosum, exsiccata exiguum spirant. *Semina* minuta sunt, rotunda, dulcia, sive albissima, sive nigra, vel potius cærulescentia. *Capita* largiuntur *Opium* suo loco dictum. *Capita* exsiccata aliquantum *Sopientium* edunt effectum, quo scopo unum *Caput* pro dosi ex aqua coquitur, sive *Syrupus* ex eorum *Decocto* paratus exhibetur. *Semina* plane nihil præ aliis seminibus oleosis proprii habet. *Oleum* inde expressum *Gallorum Huile d' Oeillet*, ne acerrimo quidem nostræ regionis frigore densatur. *Pictoribus* frequentissimus ejus usus est; ad lucernarum lumina nutrienda adhibetur, frigide expressum non raro ad *Acetaria* quoque recipitur.

**PAPAVER RHOEAS** vel **ERRATICUM**, *Papavero salvatico*, *Coquelicot*, *Klapperosen*. Flores ex calycæ evulsi, petala rubra sunt, rotundata, odore levi, non admodum grato, sapore dulciusculo perfusa. *Papaver Rhoeas* L. *Blackwell* Tab. 2. Vel nimis frequenter in agris per Europam offenditur. *Aquam*

L

hi



hi flores, diutius immerſi, mucilaginofam reddunt. *Demulcendi & Relaxandi ſine ſub forma ſive Infuſi, ſive Syrupi exhibentur. Extractum e Capitibus aquoſum quidam a Grani ſex ad octodecim uſque Sapiendi ergo adhibent & Opio præferunt.*

**PARADISIGRANA**, *Cardamomo, Malaguette, Maniguette, Paradieskærner. Semina parva, angulata, badia, intus alba, odore aromatico, minus forti, ſapore fervido imbuta. Amomum Grana Paradifi L. Copioſe in Africa Occidentali occurrit. Pauxillum Olei odorati, ſuaveolentis fundunt. Efficacia virium ad Piper accedunt.*

**PAREIRA BRAVA**. Radix magna, brachium interdum & ultra craſſa, ſub cortice rugoſo, dilute fulco ſubſtantiam lignoſam, luteſcentem, inodoram & amaram condit. *Ciſſampelos Pareira L. In America calida creſcit. Anno 1688. Pariſios allata in uſum trahi cœpit. Reſolventibus & Diureticis viribus pollet. Drachma ejus una cum octo Unciis Aquæ ad remanentes ſex Uncias cocta datur pro doſi.*

**PARIETARIA**, *Parietaria, Caſſepierre, Glaskraut, Tag-und Nacht-Kraut. Folia ovato-acuta, petiolata, ſupra ſaturate viridia, rugoſa, pilis ſparſa, ſapore leviffime adſtringente prædita. Parietaria Officinalis L. Creſcit in Europa temperata, parcius jam in Alſatia & Palatinatu occurrit. Cum in ruderatis creſcat, fuerunt qui Calculum ea imminui crederent.*

**PARIS**, *Uva di Volpe, Raiſin de Renard, Wolfsbeere, Einbeere. Folia ovato-acuta, obſcure viridia, inodora, fatua, naſeofa, Baccæ nigræ, globosæ, tetragonæ, apice depreſſæ, fatuæ, Paris quadrifolia L. Blackwell Tab. 286. Creſcit in omni Europa. Plantæ nonnullis ſpectæ Folia ſiccata non modo non nocuiſſe, ſed ad ſcrupulum unum pueris in Convulſionibus data ſaluberrimos edidiſſe effectus graviffimi Auctores teſtantur. Baccæ Maniacis ad Drachmam unam pro doſi commendantur.*

**PASSULÆ MAJORES**, *Uva ſicca grande, Raiſins ſecs, Zibeben, Meertrauben. Baccæ Uvarum exſiccatae, ovatae, rugosæ, ex flavo in brunum vergentes, ſplendentes, pulſam dulciſſimam & plura ſe-*

*mina continent. Quatuor eorum genera in noſtris tabernis proſtant, Damascenæ, ſive Smyrnenſes, maximæ ad parvi Pruni magnitudinem accedentes, compreſſæ, fulvæ, haud adeo ut reliquæ exquiſiti ſaporis; Raiſinis aut Rubis ventricosæ ſunt, antecedentibus paululo minores; Calabrinæ ventricosæ racemis adhuc adhærentes & filo colligatæ; Vulgares ſolutæ & minores ex Gallia Meridionali quoque advehuntur. Sunt multifariarum varietatum Vitis Viniferæ L. baccæ Lixivio Alcalino interdum etiam aliquantulo Salis & Olei miſto maceratae & deinceps ſuper ſtramenta Sole ſiccatae.*

**PASSULÆ MINORES**, *Uva ſicca picciola, Raiſins de Corinthe, Corinthen, Roſinlein. Baccæ exiguæ ſunt Ribefis minores, rotundæ, ex purpureo nigricantes, rugosæ, dulciſſime, ſubacidæ, in maſticatis lingua nulla ſemina ſentit. Deſumuntur a Viti vinifera Apyrena L. quæ in pluribus Archipelagi Inſulis copioſe colitur; acini aſſatim maturi Aëre & Sole exſiccati peculiaribus cellis inferuntur, mercantibus tradendi. Paſſulas Nutrientes, Saponacæ & Demulcentes vires commendant.*

**PASTINACA**, *Paſtinaca, Panais, Peſtnagel. Radix fuſiformis, alba, rugis tranſverſalibus rugoſa, carne laxiore, proprio odore, ſapore dulci, nonnihil aromatico perſuſa. Semina ovalia ſunt, compreſſo-plana, marginata, ſtriata, flavicantia, odorem radicis ſpirant aromaticum, linguam evidenter pungentem ſaporem habent. Paſtinaca ſativa L. Blackwell Tab. 379. Creſcit paſſim per Europam. Aliquid Olei odorati, nec non Sacchari largiri dicitur. Viribus ad Daucum accedit.*

**PATIENTIA**, *Buttervveckel. Radix fuſiformis, extus ex rufo-luteſcens, intus tota lutea, ſaporis amaricantis, adſtringentis, acris. Rumex Patientia L. Blackwell Tab. 489. Italiæ indigena, noſtratum hyemum patientiſſima. Efficacia virium Lapatho acuto proxima eſt.*

**PENTAPHYLLUM**, *Pentaſillo, fünf Finger Kraut. Radicum nonniſi cortex vulgò recipitur, qui ruſus & ſapore eviden-*



ter adstringens est. *Folia* in quinque, interdum septem laciniis inæquales, serratas divisa, levi modo sapore linguam fringunt. *Potentilla Reptans* L. Per omnem Europam vulgaris. *Olim Adstringendi scopo adhibebatur.*

**PERCARUM LAPIDES**, *Pierres de Perches*, *Bersing* vel *Kaulparstein*, sunt exigui, elliptici, albi, semipellucidi, superne duplici linea longitudinali notati, duri, insipidi, cum Acidis effervescent; bini in *Perca fluviatili* L. ad Offis Occipitalis inferiorem, Vertebra vicinam partem hærent. *Vires Absorbentes possident.*

**PERFOLIATA**, *Percefeuille*, *Durchwachs*. *Folia* ovato-oblonga, obtuse terminata, glabra, saporis & odoris expertia. *Semina* exigua sunt, nigra, duriuscula, inodora, sapore adstringentia, austera. *Bupleurum Rotundifolium* L. In Europa temperata crescit. *A quibusdam ad Hernias commendabatur.*

**PERSICA**, *Persico*, *Pêche*, *Pfersich*. *Flores* pentapetali, petalis rotundatis, roseis, calyce quinquefido, viridi comprehensi, suaves odore, sapore amaricantes. *Fructuum* innumera varietates prostant, magnitudine, figura magis minusve ovata, colore, glabritie &c. a se invicem diversæ; omnium promiscue suavis odor est, sapor dulcis, vinosus, utroque pro generis diversitate nonnisi gradu differente. *Officulum* ovatum, rufescens, ventricosum, profunde sulcatum continet *Nucleum* ovatum, compressum, sub cuticula fusca medullam continentem albam, grate olentem, amaricantem. *Amygdalus Persica* L. *Blackwell* Tab. 101. *Americæ & Asiæ* indigena arbor, longe plurimas varietates produxit, quarum quædam apud nos sylvestres sunt, pleræque in hortis coluntur. *Flores* *Alvi* ducendæ gratia præscribuntur. *Fructus* incibum recipiuntur, *Nuclei Amygdalis* amaris saporis gratia sunt præferendi, viribus equiparandi.

**PERSICARIA ACIDA**, *Persicaria acida*, *Saamkraut*, *Sommerlock*. *Folia* petiolata, ovato-lanceolata, coriaca, levissime ferrata, evidenter acida. *Polygonum Amphibium* L. Ubivis per Europam

obvium. *Fuerunt qui vim ei Lithonripticam tribuerent.*

**PERSICARIA ACRIS**, *Idropepe*, *Hydropiper*, *Cûrage*, *Poivre Aquatique*, *Vasserpfeffer*, *Muckenkraut*. *Folia* petiolata, lanceolata, mucronata, interdum rubro interdum flavo colore tincta, sapore acri perfusa. *Polygonum Hydropiper* L. *Blackwell* T. 119. Copiose per Europam crescit. *Extus ad OEdemata Discutienda laudatur.*

**PERSICARIA MITIS**, *Parietaria*, *Parietaire*, *Flœhkrant*. *Folia* petiolata, obtuse terminata, non raro macula nigra notata, aliquantulum hirsuta, saporis levissime aciduli & acriusculi. *Polygonum Persicaria* L. *Blackwell* Tab. 118. Vulgare per Europam. *Extus contra Gangrænam commendatur.*

**PERUVIANUM BALSAMUM**. *Balsamo de Copaiba* spissius, odorem habet fragrantem, saporem leniter acrem, colorem ex purpureo-nigricantem. Ex *America* calida nobis venit; *Arboris*, unde colligitur, character adhuc dum latet. *Cl. mutis myroxylon Peruiferum* hoc Balsamum largiri observavit: obtineri dicitur e virgulis arboris cum *Aqua* coctis; illud vero, quod arbor sponte fundit, album, nigroque multo præstantius esse perhibent. *Oleum* odoratum, *Benzoën* redolens, fundit, *Floresque*, dum destillatur, exhibet *Benzoinis* satis similes; *Oleis* non dissolvitur, cum *Oleo* unguinoso digestum spissam *Resinæ* ductilis consistentiam induit. *Intus æque ac extus ad Consolidanda Vulnera & Ulcera adhibetur, lasis quoque Tendinibus & Membranis salutariter applicatur.*

**PERUVIANUM BALSAMUM SICCUM** vel *Opobalsamum siccum*. Sub specie *Resinæ* ex purpureo-flavicantis, *Benzoën* evidenter redolentis, in *Cucurbitulis*, fungosa quadam substantia obturatis, ad nos pervehitur. *Intus ob Vires Balsamicas adhibetur.*

**PETASITES**, *Pestilenzwûrzel*. *Radix* fibrosa, digitum crassa, extus fusca, intus alba, odorem exsiccata admodum tenuem, saporem acriusculum, amaricantem habet. *Tussilago Petasites* L. *Blackwell* Tab. 222. Totius Europe do-



metlica. Olei quid odorati fundere, *Putredini resistere fertur.*

**PETROLEUM**, *Petrolio, Steinal.* Oleum ex terræ visceribus profluens, empyreuma olens, gustu acre; *Nigrum* reliquis spissius & gravius olens; *Rubri* tenuior fluiditas, color magis minusve dilutus, odor & sapor penetrantior est; *Album* pelluciditatem aquæ æmulatur, fortiorem reliquis, sed minus nauseosum odorem spirat; hoc proprie *Naptha* dicitur; priora passim in Europa ceterisque Orbis partibus reperiuntur; posterius in Oriente maxime, cujus quidem in locum Officinæ ut plurimum dilutius Rubrum usurpare solent. *Viribus Petroleum ab Asphalto fere nihil differt, specificè contra Taniam commendatur.*

**PETROSELINUM**, *Prezzemolo, Persil, Retersilien, Peterlein.* Radix fusiformis, sub cuticula flavicante, rugis annularibus notata, carnem includit albam, proprium odorem spargentem, sapore dulcem, leniter aromaticam. Folia petiolis sulcatis insident, pinnulis ternatis, integris & incisis duplicato-pinnata, odorem æque ac saporem aromaticum habent; *Semina* sunt convexo-plana, oblonga, profundius striata, saporis aromatici, non admodum grati. Apium Petroselinum L. *Blackwell* Tab. 172. In Sardinia sponte crescere dicitur, ubique in hortis colitur Oleum odoratum Radices & Folia parvissime, Semina largius fundere ferunt. *Radices tanquam Oulus eduntur, Foliis cibi condiuntur; extus eadem ad Lac discutiendum applicantur, omnibus Petroselini partibus vis Diuretica tribuitur.*

**PETROSELINUM MACEDONICUM.** Semen oblongum, utrinque acutum, striatum, villosum, leviter odorem, evidenter aromaticum. Bubon Macedonicum L. *Blackwell* Tab. 382. Orientis indigena, biennis planta, nostratum hyemum patiens. Ob vim Carminativam & Diureticam olim celebrabatur.

**PEUCEDANUM**, *Peucedano, Quevede Pourcean, Haastrang.* Radices fibrosæ, extus fusæ, intus albæ, proprium odorem, non nauseosum, saporem dulciculum, leviter aromaticum habent. *Peu-*

cedanum Officinale L. Europæ temperatæ indigenum. *Viribus Aperientibus pollet, Album leniter laxare asseritur.*

**PELLANDRIUM**, *Felandrio, Ciguë des Marais, Wasserschierling.* Semen ovali-oblongum, striatum, ex viridi-purpureo, odoris aromatici, saporis acriusculi. Phellandrium Aquaticum L. Passim per Europam crescit. Oleum odoratum fundere dicitur. *Ad sananda Ulcera externa & interna & contra Febrem intermittentem a nonnullis commendatur.*

**PHU**, *Fu, grande Valeriane, Katzenwurzel.* Radix cinerea, oblonga, digitum circiter crassa, annulatim rugosa, in omnem longitudinem fibras dimittit longitudinales, descendentes, se ipsa longiores & pallidiores, odorem proprium, fortem, minus gratum spirat, sapore falso, amaricante, linguam leviter pungit. *Valeriana Phu* L. *Blackwell* Tab. 250. Crescit in Europa temperata. *Viribus efficacius etiam quam Valeriana officinalis agere videtur.*

**PHYTOLACCA.** Folia majora, ovata, integerrima, utrinque viridia, sapore leviter acri instructa. Phytolacca Decandra L. In Virginia, Italia & Helvetia sponte crescit, nostræ hyemis patientissima. *Fuerunt, qui ejus contra Cancrum efficaciam laudarent.*

**PICHURIM FABÆ.** Nucleus ovato-oblongus, utrinque obtusus, sesquipollicem circiter longus, octo lineas latus & aliquot crassus, superne convexus, inferne concavus, sub epidermide nigricante medullam ferruginei coloris includit, grate aromaticum spirat odorem, suavique sapore linguam pungit. Suspicio est, a quadam *Lauri* specie in Paraguay crescente eam decerpi. Olei expressi, fragantissimi  $\frac{1}{2}$  circiter fundere fertur. A quinque tere retro lustris in Suecia exorsus ejus usus, multum deinceps laudatus est in sistendo *Alvi fluxu.* Datur ad Drachmam semis.

**PILA MARINA**, *Mecrballen.* Substantia levis, rotunda, ex recrementis radicum conglomeratis efformata, odoris & saporis expers. Formatur ex dissolutis & agitatione Maris conglomeratis



tuberibus Radicum Zosteræ marinæ L. quæ in Oceano & Mari Balthico reperitur. Liquorem Urinosum fundit. *Usta contra Strimas commendatur.*

PILOSELLA videatur AURICULA MURIS.

PIMPINELLA ALBA, *Pimpinella bianca, Bouquetine*. Radices cylindricæ digittum circiter crassæ, rugosæ, odoris levis, saporis evidenter acri ad Saponem accedentis. *Pimpinella Saxifraga* L. *Blackwell* Tab. 472. Oleum fundere dicitur acerrimum. Passim in Europa crescit, *Multum laudis in virtute ejus Resolvende & Aperiente ponitur, maxime contra morbos Mucosos. Datur ad Drachmam dimidiam in substantia, ad Sesquidrachmam in Infuso.*

PIMPINELLA NIGRA. *Pimpinella negra*. Radix cylindrica esse fertur, digittum crassâ, apice ramosa, sub cuticula fusco-nigra, medullam continere cæruleam grati odoris, saporis dulcescentis, mite aromatici. *Pimpinella magna* L. *Marchiæ propria, in quibusdam etiam Europæ temperatæ Floris occurrit. Oleum eam fundere sapphirinum dicunt, & cæruleo colore tingere tam Aquam, quam Spiritum Vini inde abstrahendum. Egregium Resolvens, contra Calculum etiam Remedium habetur.*

PIMPINELLA RUBRA, vel ITALICA, *Pimpinella, Sanguisorba, Pimprenelle*. Folia pinnata, nervo hirsuto instructa, foliolis breviter petiolatis, ovatis, obtusis, profunde crenatis, subtus glaucis, levissimo sapore & odore imbutis. *Poterium Sanguisorba* L. *Blackwell* Tab. 413. *Ad Acetaria recipitur & a Medicis scopo recens præscribitur.*

PINEÆ, *Pignons, Pinien*. Nuclei parvi, oblongi, ventricosi, utrinque obtusi, albissimi, tunica rufescente, gracili, sicca vestiti, sapore perfusi dulci, aliquatenus proprio, neque admodum grato; vel levissima flavedine tincti rejiciendi sunt. *Pinus Pineæ* L. *Blackwell* Tab. 189. In Europa calida crescit, apud nos in frigidario per hyemem custodienda. *Pineæ ultra tertiam sui ponderis partem Olei odorati fundunt. Nostrates eas fere*

*normisi ad Resinosa in Pulverem aut Emulsionem redigenda adhibere solent.*

PINI RESINA, *Pece-Resina, Poix Resine*. In frustis variæ magnitudinis exstat, quæ flava sunt, nitida, facie vitrea, subdiaphana, odoris non ingrati, nec fumus accensorum nauseosus est. Minora hujus Resinæ frusta, a Formicis in suas penus coacervari solita, *Olibani sylvestris* nomine veniunt. Ex annosiore quaque Pinu sylvestri L. passim per Europam obvia arbore sponte effluit. *Recipitur ad Emplastra & Unguenta Roborantia & Maturantia.*

PINI STROBILI. Sunt tenellæ ramorum propagines terminales, cylindroidæ, extus rufæ, intus virides, squamis subdiaphanis, ciliatis imbricatæ, odoris balsamici, ejusdemque & amariusculi insuper saporis. Desumuntur a Pinu sylvestri L. *Eorum Unciæ una cum Aquæ Unciis triginta sex, per viginti quatuor horas infusa, Scorbuticis magnopere commendatur. Recentes exsiccatis multo præstantiores sunt.*

PIPER ALBUM, *Pevere bianco, Poivre blanc, vveisser Pfeffer*. Semina parva, rotunda, lævia alba, odoris proprii fortis, saporis aromatici, linguam urentis. Sunt Semina matura *Piperis nigri* L. *Blackwell* Tab. 348. Insularum Asiaticarum fruticis, cuticula externa nudata. Olei mitis  $\frac{1}{4}$  fundunt. Ejus Extractum tam aquosum, quam spirituosum acerrimum esse dicitur. *Multum calefacit, cibis condimenti loco adjicitur, valide Resolvit & contra morbos Frigidos adhibitum admodum efficax habetur. Cavendum vero, ne dosis ultra Scrupulum dimidium extendatur. Extus Apophlegmatizandi scopo adhibetur.*

PIPER JAMAICENSE, videatur AMOMUM.

PIPER INDICUM vel HISPANICUM. Capsulæ variæ tam figuræ, quam magnitudinis, coloris etiam, quanquam ut plurimum rubræ sunt, nitidiusculæ; calyce sustentantur viridi, quinquesido, sub cute subcarnosa, pulpam includunt flavicantem, siccam, Semina alba, subrotunda, compressa continentem, odor nul-



nullus, sapor acerrimus est, linguam urens, aromatis expers. Capsicum annum L. *Blackwell* Tab. 129. America indigenum in hortis colitur. Infusum aquosum Vitrioli & Alcoholis ope in gelatinam cogi fertur. *Americanis acceptissimum condimentum*, ad Grana sex pro dosi datum Febres pertinaces curasse observatum est. Apud nos nonnisi ab OEnopolis ad acuenda vilioris notæ Aceta adhiberi solet.

PIPER LONGUM, *Amentum* cylindraceum, aliquot pollices longum, totum seminibus protuberantibus quasi totidem squamis prorsus obsectum, odorem, saporem, vires etiam Piperis albi refert, quo tamen mitius est. Piper longum L. *Blackwell* Tab. 356. Eandem cum *Pipere albo* patriam habet.

PIPER NIGRUM. Est Piper album, immaturum, cuticula sua adhuc contentum, nigrum, rugosum, intus album, odore *Pipere albo* fortius, sapore etiam ardentius.

PISTACIÆ NUCES, *Pistacchio*, *Pistaches*. Nuclei oblongi, obsolete trigoni, sub cuticula rufescente, medullam viridem, dulcem & suavem includunt *Pistacia Vera* L. *Blackwell* Tab. 461. Arbor Asiæ indigena, in Europa calida copiose colitur; apud nos in frigidario contra hyemem defendenda. In blandimentum gustus *Bellarii* & *Morsulis* immiscetur.

PIX BURGUNDICA, videatur RESINA.

PIX NAVALIS, *Catrame*, *Goudron*, *Theer*, *Schiffdarr*. Est Oleum empyreumaticum, spissiusculum, consistentiæ Mellis, nigro-rubicundum, odore spirans balsamicum, empyreumatico junctum, sapore perfusum amaricante. Obtinetur ex lignosis partibus *Pinus Sylvestris* L. Arboris supra dictæ, ope destillationis per descensum. Probitas ejus ex aqua ei affusa dijudicatur, siquidem non albedo eam, sed rufo-rosaceo colore imbuunt. Propter Balsamicos effectus *Phthificis* eam Veteres commendare solebant. Ejus Infusum recentioribus temporibus morbis Malignis, Scabie &c. laborantibus enixe commendabatur, videatur. P. II.

PIX NIGRA, *Pech*, *Poix*, *Pech*. Est nigra, atra, lucida, in calore tenax, digitis fortissime adhærescens, fragilis, fractura vitriformis, odore & sapore *Pici navali* multum cedens, ex qua sub perpetua agitatione ad siccitatem cocta paratur. Tenacitatis gratia Emplastris additur; contra Clavos pedum & Malum *Ischiadicum* efficax fertur. Evuluit crudelis *Dropacismus*.

PLANTAGO, *Piantaggine*, *Plantain*, *Wegerich*. Radices rufæ, ex capite parvo quam plurimas fibrillas albidas protrudunt, inodora, sapore salso, in fatuedulcem se resolvante. Folia alias lata, ovata, magnis petiolis instructa, glabra, septem nervis percurta, saporis & odoris fere vacua; alias angusta sunt, lanceolata, quinquenervia, perinde insipida. Semina exigua, rubra, levia, inodora, saporis mucilaginosi. *Plantago Major* L. *Blackwell* Tab. 35. & *Lanceolata* L. *Blackwell* Tab. 14. Crescunt ubique per Europam. Succus ex Foliis expressus eminenter falsus est. Radicum contra Febres; Foliorum in Decoctis *Vulnerariis* usus salutaris habetur; eadem recentia *Insectorum puncturis* cum successu imponuntur.

PLUMBUM, *Piombo*, *Plomb*, *Bley*. Metallum albidum, ad nigredinem vergens, minimæ firmitatis, omnium molliissimum, præter Mercurium gravissimum, paulo majorem, quam Stannum, calorem ad sui fusionem exigit, Aqua, Acidis, Alcalibus, Oleis perinde dissolubile. Exhibetur a Natura sub forma variarum glebarum, passim in Europa occurrentium. Intus cum perniciosissima excitet symptomata nunquam dandum; extus ad Siccandum & Discutiendum haud frustra adhibetur.

POLIUM CRETICUM, *Cretischer Polley*. Cauliculi tetragoni, tomentosi, Foliolis obseffi linearibus, superne crenatis, albidis, calycibus terminati parvis, tomentosis, parum odoris; saporem habent pungentem & amaricantem, odorem fragrantem. *Teucrium Creticum* L. Archipelagi. Quod subsequitur *Polium*, cum in nostris saltem officinis plus



plus aromatis habeat, hujus usum fere abrogavit.

**POLIUM MONTANUM**. Cauliculi Foliis oblongis, crassis & Capitulis obfessi florigeris, utrisque tomentosis; odorem habent fragrantem, saporem amarum & pungentem. Teucrium Polium L. Blackwell Tab. 456. Crescit in Europa temperata. Olim ad Viscera referenda, Urinam & Menstrua pellenda adhibebatur.

**POLYGALA**, Poligala, Kreuzblume. Radices fibrosæ, tres fere pollices longæ, graciles, ex capite crassiusculo sensim filiformes, colore extus pallide luteo, intus albissimo, exsiccatae admodum duræ sunt, nullum odorem, saporem habent levissime falsum. Polygala amara L. Crescit in Europa temperata. In Phthisi eam Recentiorum Medicorum nonnulli commendant, vel ad dimidiam Drachmam bis de die sub forma Pulveris, vel ejus Decoctum scilicet Uncias duas cum Aquæ duabus libris ad unius libræ consumptionem coctas subinde per diem exhibendas.

**POLYPODIUM**, Polipodio, Engelsüs. Radices admodum longæ, anserinum fere calamus crassæ, eminentibus tuberculis, velut articulis divisæ, sub cortice rufo medullam includunt flavam, virescentem, odorem muscosum, saporem cum adstrictione dulcem. Polypodium Vulgare L. Blackwell Tab. 215. Crescit per omnem Europam. Radices inter coquendum amarescunt. Infusum aquosum ad Resolvendum, Viscera Abdominalia referenda, nec non ad scopum Ectoproticum valet.

**POMA**, Pomi, Äpfel. Fructus innumerabilium pene varietatum; jam enim differunt figura, quæ tamen ut plurimum ovali-subrotunda deprehenditur; jam colore; jam sapore acerbo, acido, dulci, vinoso; jam magnitudine; jam maturandi celeritate, qua quidem dulcia omnino vinosis præstare compertum est; ad basin concava, umbilico depresso notata sunt; pulpa quinquelocularis, odor fragrans est & plura Semina continet. Pyrus Malum L. Viribus saponaceis polent; dulcia Demulcent, in morbis Pectoris

potissimum proficue adhibenda; vinosa Refrigerant, Humorum Æstum temperant.

**POMPHOLYX**, videatur NIHILUM.

**POPULUS**, Pioppo, Peuplier, Pappel. Prostant Oculi seu Gemmæ ovato-oblongæ, flavo-rubrae, ex squamis variæ magnitudinis sibi invicem incumbentes imbricatæ, verno tempore succo foetæ sunt viscido, digitis adhærente, suaveolente, amaro. Ante foliorum evolutionem colligendæ. Populus nigra L. Blackwell Tab. 248. Magna ejus ubique per Europam copia provenit. Expressione Resinam, destillatione cum Aqua aut Spiritu Vini Oleum odoratum fundere dicuntur. Propter Balsamicas vires a nonnullis adhibiti, hodie maxime ad parandum denominatum inde Unguentum colliguntur. Exsiccati virtute sua penitus destituti deprehenduntur.

**PORCUS**, Porco, Porc, Schwein. Sus scrofa L. Animal quadrupes per omnem Europam indigenum. Axungia, Saindonx pinguedo mollicula, alba, insipida, inodora, ex Mesenterio hausta. Relinquarum Axungiarum viribus par ad plura Unguenta recipitur.

**PORRUM**, Porro, Porreau, Lauch. Bulbus conoideus, albus, striatus, tunicis siccis vestitus, proprium odorem, Cepaceo mitiorem, similemque saporem emittit. Folia habet longa, profundius viridia, odoris, saporisque itidem proprii, Cepaceo mitioris, nonnihil dulcis. Allium Porrum L. Blackwell Tab. 421. Copiose in hortis colitur. In culinas tanquam olus recipitur. Becchicum, Diureticum, Lithontripticum medicamentum in laude fertur.

**PORTULACA**, Porcellana, Pourpier, Burzel. Folia carnosæ, cuneiformia, nitidiuscula, viridia, punctulis notata, insipida, inodora; Semina exigua, nigra, rotunda, rugosa, saporis oleosi. Portulaca Oleracea L. In Europa temperata & Oriente copiosa, in hortis colitur. Aperientia, Refrigerantia, Antiscorbutica Folia, nonnisi recentia adhibenda. Semina Refrigerantibus minoribus adnumerabantur.

**PRIMULA VERIS**, Paralysis, Tassobarbasso, Primèvere, Schlüsselblumen, Him-



*melschlißel*. Flores calyce exempti, infundibuliformes, quinquefidi, limbo concavo, flavi, sapore dulciculi, suaves odore, qui exsiccando minuitur quidem, neutiquam vero tollitur. *Primula Veris officinalis* L. *Blackvell* Tab. 226. Crescit per omnem Europam. *Ad Infusa Cephalica* recipiuntur. Aqua inde destillata, quæ vulgo in officinis prostat, iners est.

PROPOLIS, videatur CERA.

PRUNA, *Prugne, Prunes, Zwetschen, Pflaumen*. *Drupa* variæ tam magnitudinis, quam figuræ, creberrime quidem ovatæ, varii etiam coloris, ut plurimum tamen cæruleæ, sub cute nitida pulpam habent frequentissime flavescens, odoratam, dulcem, pro varietate diversa aquosam, quæ officulum includit scabrum mox oblongum, compressum, mox ovatum, *Nucleum* continens dulcem, suavem, vix amariusculem. *Prunus domestica* L. *Blackvell* Tab. 494. Europæ Australis indigenæ arboris, nostrates plurimas Varietates in hortis colunt. *Vires saponaceas & Antiputridas cum reliquis Fructibus horæis communes habent; exsiccate & cum Aqua decoctæ solvendæ Alvo* inserviunt.

PSYLLIUM, *Pulicaria, Herbe aux puces, Flöhsaamen*. Semina ovali-oblonga, convexo-concava, nigra, nitida, sub dentibus lentescens, insipida, inodora. *Plantago Psyllium* L. *Blackvell* Tab. 412. Europæ Australis domestica, nostræ hyemis patiens. *Mucilaginis* largitur. *Mucilago* inde parata interdum intus *Demulcendi* scopo, extus contra *Ophthalmiam* adhibetur.

PTARMICA, *Ptarmica, Herbe à éternuer, vilder Bertram*. Radix fibrosa, alba, leviter geniculata, inter mastigandum primum insipida, dein evidenter acris deprehenditur. *Achillea Ptarmica* L. *Blackvell* Tab. 276. Passim per Europam obvia. *Apophlegmatizandi* scopo sunt, qui eam Radicibus *Pyrethri* substituant.

PULEGIUM, *Puleggio, Puliot, Poley*. Cauliculi tetragoni, pubescentes. Foliis obfessi petiolatis, ovatis, obtusis, cre-

natis, albidis & verticillis calycum quinquefidorum, pubescentium, Flores labiatos continentium; odor ut & sapor proprius, aromaticus est. *Mentha Pulegium* L. *Blackvell* Tab. 302. Crescit in Europa temperata. Olei odorati  $\frac{1}{2}$  fundit. *Ad morbos Uterinos maxime adhibetur*.

PULMONARIA ARBOREA, *Polmonaria arborea, Pulmonaire de Chêne, Lungenmoos*. Lichen e latis, laciniatis, coriaceis foliis efformatus, alternis eminentiis, vesicis similibus, & lacunis distinctus, flavicans, inferne tomentosus, inodorus, saporis falsi, levissima amaritie submissa. Lichen *Pulmonarius* L. *Blackvell* Tab. 335. Per omnem Europam truncis arborum ad crescere solet. *In Resolvendo efficax morbis Pulmonum & Laterum laborantibus laudatur*.

PULMONARIA MACULOSA, *Polmonaria, Pulmonaire, gefleckt Lungenkraut*. Folia ex ovatis lanceolata, ciliata, hirsuta, maculis albis notata, subtus albicantia. *Pulmonaria officinalis* L. *Blackvell* Tab. 376. Vulgaris per Europam planta. *A nonnullis Hemoptoicis & Phthisicis commendabatur*.

PULSATILA, *Fior di Donna, Coquelourde, Kuchenschell*. Folia petiolata, pinis linearibus & acutis bipinnata, subtus hirsuta, odore levi, sapore primum levi, dein multum acri. *Anemone pratensis* L. Passim per Europam obvia. Aquam destillatam valde acrem, nonnihil *Camphoræ* emittentem, fundere dicitur. *Succus inspissatus sub Extracti nomine ad Scrupulum semis* exhibetur. *Variis Oculorum morbis medelam attulisse Illustri Stærck observavit*.

PUMEX, *Pomice, Pierre, Ponce, Bimsenstein*. Lapis variæ magnitudinis, aqua levior, multis foraminibus excavatus, non admodum durus, friabilis, saporis & odoris per se expers, si quid habet, mari debet, cui innataverat. *Pumes Vulcani* L. *Montium Ignivomorum* paratus, ad eorum tam adhuc dum ardentium, quam dudum extinctorum oras invenitur, Mari etiam illis vicino haud raro innatat. *Ad Dentifricia adhibetur*.



**PYRETHRUM**, *Pilatro, Bertram*. Radices aliquot pollices longæ, calamum anserinum circiter crassæ, cylindraceæ, fibras capillares emittentes, gryseæ, intus albæ, odoris expertes, sapore acres, linguam urentes. *Anthemis Pyrethrum* L. *Blackwell* Tab. 390. Europæ Meridionalis & Africæ Orientalis propria; in Thuringia & ad Magdeburgum colitur. *Apophlegmatizandi scopo adhibetur*.

**PYROLA**, *Wintergrün*. Folia rotunda, petiolata, minutim ferrata, superne saturate viridia, subtus pallidiora, saporis adstringentis. *Pyrola Rotundifolia* L. In omni Europa crescit. *Tam intus ad Roborandum & Adstringendum, quam extus ad Injections & Gargarismata recipitur*.

**PYRUS**, *Pero, Poire, Birne*. Fructus turbinati, umbilicati, quinqueloculares, magnitudine, colore, sapore, qui tamen in omnibus plus minusve adstringit, tempestivitate etiam maturescendi plurimum variantes; Semina continentes ovato-oblonga, nigricantia, dulcia. Fragrantia præcoces reliquos antecellunt. *Pyrus communis* L. *Blackwell* Tab. 453. Innumerae varietates in hortis coluntur. *Fruetuum horarum viribus pollent; ad solvendum Calculum & Aperientem Alvum apti prædicantur*. Varietates acerbiores coctione cum aqua mitigantur.

**QUASSIA**. *Quassia*, Lignum solidum, leviusculum, cortice ex gryseo albo, intus albescente tectum, flavicans, in tenues lamellas secedens, inodorum, amarissimum. *Quassia amara* L. Surinami indigena. Extracti aquosi amarissimi  $\frac{1}{4}$ , Spirituosi  $\frac{1}{4}$  largitur. A quinque retro lustris in Europa ad Rem medicamentariam admitti cœpit. *Roborando Ventriculo, Arthritidi Febribusque Intermittentibus sanandis commendatur*. Drachma ejus una cum duodecim Aquæ Unciis infunditur. *Aptissime sub forma Extracti datur*.

**QUERCUS**, *Quercia, Chêne, Eiche*. Corticem habet crassum, extra cinereum, intra ferrugineum, acerbum, stypticum. Folia cuneiformia, oblonga, firmula, laciniis pinnatis sinuata, adstringentia; Glandes calyce sustentatæ sunt, Cupula

dicto, cinerascienti, integerrimo; dura, extus rugosa, intus lævissima, sub officulo lævi, nitido, flavicante, ovali-oblongo, fragili includunt *Nucleum* solidum, tunica vestitum, intense amarum & stypticum. *Quercus Robur* L. *Blackwell* Tab. 487. Vulgaris per Europam arbor. *Extus Adstringendi ergo adhibentur quæque Quercus partes; Glandes tostæ, eum aqua decoctæ a quibusdam nuper contra Atrophiam laudabantur*.

**QUERCUS MARINA**. Cartilagineus Fucus, cujus Caulis planiusculus, aliquot mox pollices, mox pedes longus, in plures diffunditur ramos bifurcos, in folia dispersos latius usque procrescendo extensa & in apicem bilobum, trilobumve exeuntia, pluribus in utraque superficie vesiculis & fibris rugosa. Color ex nigro flavicat. Fucus vesiculosus L. Ad littora Maris copiose occurrit. In cineres nigros combustus nomine *Æthiopis Vegetabilis ad obstructions Glandularum aperiendas & ad Sanguinem depurandum adhibetur, iisdem etiam usibus extractus inde Sal Alcalinus destinatur*.

**RACKASIRA BALSAMUM**. Resina sicca, subdiaphana, rubro-brunea, inter digitos ductilis, inter mandendum tenax, dentibus adhærescens, odoris non ingratis balsamici, similis saporis, resinosi, amaricantis; Cucurbitis inclusa ex India nobis apportatur. Calore funditur, accensum suavem spirat & fortem odorem. *Fuerunt, qui contra Gonorrhœam & Ulcera viarum Urinariarum ejus virtutem laudarent*.

**RANA**, *Rana, Grenouille, Frosch*. *Rana Esculenta* L. Amphibium quadrupes notissimum, ad aquas & paludes copiose degens. Femora in cibum recipiuntur. *Cum Jure decocta Demulcendi aquæ ac Relaxandi scopo exhibentur*.

**RANARUM SPERMA**, *Frais de Grenouilles, Froschlaiche*. Substantia alba, viscida, Albumini ovorum similis, germina novorum animalium sub forma corpusculorum rotundorum & nigrorum vehens, verno tempore stagnis ac paludibus innatans, e varii generis Ranis enixa. *Extus Demulcendi & Refrigerandi*



scopo a quibusdam commendatur. Aqua inde destillata Paracelso *Sperniola* dicta omnino iners est.

**RANUNCULUS**, *Ranunculo*, *Ankenblümlein*, *Hanenfus*, Variæ *Ranunculo*rum species Flores habent sapore peracres, cutemque, cui applicantur, in vesicam elevantes; nostrates vulgo *Ranunculum* acrem L. recipiunt; eundem effectum edunt *Aquatis* L. *Lanuginosus* L. *Bulbosus* L. *Sceleratus* L. *Arvensis* L. *Flammula* L. *Lingua* L. Huc etiam *Anemonem sylvestrem* L. sub nomine *Ranunculi albi* nonnulli referunt. Aquam ab his plantis abstractam acrem esse contendunt & nauseosam. *Brachio aut Carpo imponuntur ad fugandas Febres Intermitentes*.

**RAPA**, *Rapa*, *Rave*, *Navet*, *Navau*, *Rübe*. Radices alias rotundæ, alias cylindroides, varii tam coloris, quam magnitudinis, odoris proprii, saporis in junioribus amari, in adultis dulcissimi. *Brassica Rapa* L. *Blackwell* Tab. 231. *Planta Anglica & Belgica*. Plures ejus varietates in hortis & agris coluntur. *Mensis apponuntur. Resolvendi fine intus dantur ex Jure coctæ. Extus gelu constrictæ Perniones sanant*.

**RAPHANUS**, *Rafano*, *Radis*, *Rettich*. Radices figura, magnitudine, colore, saporis acumine multum variantes, odore proprio, sapore acri perfusæ. *Raphanus sativus* L. *Blackwell* Tab. 81. In China sponte nasci dicitur, apud nos plurimæ ejus varietates copiose coluntur. *Condimenti loco esitatur. Resolvendi, Urinam ducendi, Scorbutum pellendi gratia Succus inde expressus exhibetur*.

**RAPHANUS RUSTICANUS**, videatur **ARMORACIA**.

**RAPUNCULUS**, *Raperonzo*, *Raiponse*, *Rapunzel*. Hoc nomine nostrates verno tempore tenellas plantas *Phyteumatis Orbicularis & Spicati* L. vel *Oenotheræ biennis* L. in cibum recipere solent. Sunt qui scopo medicato *Campanulæ Rapunculi* L. haud infrequentis Europæ plantæ Radices adhibeant fibrosas, albas, dulces; *ejusque virtutem Resolventem laudent*.

**REGULUS**, *Reattino*, *Roitelet*, *Zaunkæ nig*. *Avicula corpore grysea, rostro subulato alisque instructa, fuscis fasciis distinctis, subinde etiam albis maculis notatis. Motacilla Troglodytes* L. *Vulgaris per Europam avis. In olla combustæ Pulvis olim Calculo mederi credebatur*.

**RESINA**, *Resina*, *Poix de Bourgogne*, *Harz*. In magnis frustis prostat, solida, sicca, nitidiuscula, fragilis, inter tractantes digitos plastica, iisque adhærens, odorata amariuscule, calore liquescens, ignem concipiens, accensa fumum gravem emittens. Ex *Pino Abiete* L. vulgari per Europam arbore, cui detracto cortice, per æstatem, exsudata adhæret, inde derafa in lebetæ aqua pleno liquatur & crasso linteo percolata depuratur. Solet etiam, antequam mercaturæ amandetur, *Vesicæ immitti & aquæ ministerio Oleum inde destillari flavum, odore minus gratum & vehemens, sapore linguam pungens, Templinum Schroederi, Tannzapfenöl nominant. Idem Oleum quandoque ex Pinus Sylvestris* L. ramis tenellis aut conis viridibus destillatione cum aqua paratur. *Resina Emplastris solidandis & tenacitate perfundendis additur; suppurandi quoque & Putredinem arcendi fine adhibetur. Oleum Templinum Balsamo Hungarico aut Carpathico multum olim ad sananda Vulnèra, Ulcera, Rheumatismos, &c. laudato substituitur; pro Oleo etiam Terebinthinæ non raro venditur*.

**RHABARBARUM**, *Rabarbaro*, *Rheum*, *Rubarbe*. Radix cujus magna frusta ad nos pervehuntur, subrotunda, in medio ut plurimum perforata, cuticula exteriore nudata, extus flava, rubellula, intus albo & roseo variegata, odoris proprii, minus grati, saporis amari, acrimonia submissi. Minoris æstimanda frusta leviora, digitos tingentia interiore rubedine magis ad nigredinem vergente. Desumi videtur a variis *Rhei* speciebus in China & regione Tangutica inter 26 & 36 gradum latitudinis Borealis crescentibus. *Rheum palmatum* L. sub cælo Europæo optime vegetans, optimo quod nobis affertur *Rhabar-*



barbaro satis similes Radices exhibet, siquidem per decennium cultum fuerit. Rhabarbarum *Moscoviticum* præstantissimum est, aliud enim, nisi a publice ad id negotium constituto delegato, Jachtæ habitante, delectum & comprobatum, per totam Russiam divendere non licet. Æquas Extracti Aquosi & Resinosi partes vehit. *Vi principii volatilis, quo scaturit, Album ducit, quam ob causam ab omni Præparato, coctionis ope inde obtento, vis Laxans abest. Primas vias Roborat, Obstructionibus Hepatis medetur, Renibus quoque prodest. Datur ad Drachmam unam sub forma Pulveris, ad Drachmas duas in Infuso.*

## RHABARBARUM MONACHORUM.

Radix fibrosa, crassa, rugosa, extus ex fusco-lutescens, intus flava, odoris levis, minus grati, neutiquam Rhabarbarini, saporis amaricantis cum aliquantula adstrictione subacris. Rumex Alpinus L. Crescit in Europa temperata. Rhabarbaro, utique multo inferius, minus apte substituitur.

## RHAPONTICUM MOSCOVITICUM.

Radix, cujus magna nobis mittantur frusta oblonga, ex albo leviter flavicantia, intus striis purpureis variegata, odore tenui, sapore amaro & cum quadam acrimonia adstringente. *Gmelin a Rumice obtusifolio L. Europæ temperatæ civi, Cl. Pallas autem a Rheo Undulato L. Chinæ & Sibiricæ indigeno, nostras hyemes optime ferente, desumi contendunt. Rhabarbari veri viribus polle-re dicitur, dummodo majori dosi sumatur.*

RHAPONTICUM VULGARE. Radices cylindraceæ, lutescentes, intus rubro-variegatæ, odore & sapore præcedentes referunt. Desumuntur vel a Rheo Rhapontico L. *Blackwell* Tab. 262. Thraciæ, in Europa culta; vel a Centaureo Centaurio L. *Blackwell* Tab. 93. Tartariæ, Italiæ &c. indigeno. Priori viribus cedit.

RHINOCEROS, *Rinoceronte, Nashorn.* Cornu ejus conoideum est, pedem circiter longum, uno latere leviter arcuatum, basis ovata, diametro longitudinali semipedem, transversa quatuor pollices æquans, intus concava, conoidea, spon-

giosa, nigricans, extus nigro-fusca, rugosa, in corpus contrahitur læve, splendens, fuscum, in facie arcuata striis longitudinalibus sulcatum; apex obtusus est; odore & sapore caret. Rhinoceros Unicornis L. Africae & Indicæ Quadrupes. *Indi hoc Cornu Venenis resistere putant.*

RHODIA RADIX. Tuberosa est, crassa, extus flavicans, intus alba, cicatricibus obsessa, recens leviter exsiccata, evidenter Rosas redolet, amara. Rhodiola Rosea L. Habitat in Alpibus Europæ, optime in hortis coli potest. Olei Oleo L. Rhodii similis  $\frac{1}{2}$  fundere dicitur. *A quibusdam Adstringentibus adnumerabatur.*

RHODIUM LIGNUM. Frusta impari magnitudine, & crassitie, ramosa, varie torta, dura, sub cortice gryseo, non raro rugoso, substantiam lignosam, albam, rubris flavis quæ striis notatam includunt; fricata roseum odorem edunt, sapor levissime amarus est. Genista Canariensis L. Insularum Canariensium indigena arbor. Quale vulgo in officinis prostat, minimum Olei odorati largitur. *Lignum ad Suffitus recipitur, Oleum odoramentis adjicitur, vulgo apud Sepiasarios prostant multo Oleo unguinoso adulteratum est.*

RIBES NIGRUM, *Grossularia nigra, Ribes negro, Chassis, schwarze Johannis-trauben vel Beeren.* Folia subcordata, triloba, ferrata, odore ad Rutam accedente, sapore leniter adstringente. Baccæ globosæ, nigrae, umbilicatæ, succo purpureo turgentes, polypyrenæ, Cimices redolentes, ex dulci aciduli saporis. Ribes nigrum L. *Blackwell* Tab. 285. Passim per omnem Europam occurrit. *Folia ad Sanguinem Depurandum & Diuresin promovendam, Baccæ contra Renum vitia valere dicuntur.*

RIBES RUBRUM, *Ribes, Groseille.* Baccæ rotundæ, nitentes umbilicatæ, partim rubrae, partim albæ, sapore vinoso, acido, odore levi imbutæ, polypyrenæ. Ribes rubrum L. *Blackwell* Tab. 285. Passim per Europam obvium. *Refrigerandi gratia adhibentur.*

RORELLA, *Ros Solis, Herbe de la Goutte, Sonnentbau.* Folia exsiccata, par-



va, rotunda; hirsuta, rubra; margine sinuato cincta, longioribus petiolis hirsutis innixa, sapore acri & adstringente prædita. Drosera Rotundifolia L. *Blackwell* Tab. 432. Occurrit in omni Europa. A tribu *Paracelsistica* magni facta, hodie evilit. *Recentem Cuti impostam Vesicas inducere observatum est.*

ROSA ALBA. Rosa bianca, Florum petala majuscula, obvata, alba, levius odorata, dulciuscula. Rosa alba L. *Blackwell* Tab. 73. Colitur in hortis; præstant omnino Spinosissima L. copiose sub nostro cælo crescens & Sempervirens L. apud nos contra hyemis injurias defendenda, minoribus petalis, sed multo fragrantioribus instructa. Extus contra morbos Oculorum adhibentur.

ROSA PALLIDA, Rosa pallida, Rose de Damas, leibfarbige Rose. Petala obovata, majuscula, dilutius rubra, quem proprie roseum colorem dicunt, fragrantia, dulciuscula. Desumuntur a variis Rosæ speciebus, in nostris hortis cultis; maxime a Centifolia L. Damascena *Blackwell* Tab. 82. Sunt qui Rosæ etiam Caninæ L. petala recipiant. Pauxillulum Olei pellucidi, aëre temperato consistentis fundunt. Ob fragrantiam scopo Analeptico inserviunt; Eccoproticos quoque edunt effectus.

ROSA RUBRA, Rosa rossa, Rose de Provins, Essigrose. Petala, antequam sese explicuerint, resectis unguibus flavicantibus recipiuntur profundius rubra, præcedentibus minus fragrantia, sapore adstringente prædita. Rosa Gallica L. patientissime nostras hyemes ferens, cui creberrime, in Germania maxime, Rosam sativam rubram C. B. minus saturati coloris, substituere solent. Roborandi & Adstringendi causa tam extus quam intus adhibentur.

ROSMARINUS, Rosmarino, Anthos, Romarin. Folia linearia, obtusa, rugosa, supra viridia, subtus alba, proprio, fragrantia odore, sapore aromatico perfusa. Flores ringentes, calyce bilabiato sustentati, dilute violacei, sapore & odore Foliis multo inferiores. Rosmarinus officinalis L. *Blackwell* Tab. 159. Eu-

ropæ calidæ indigenus frutex, apud nos contra hyemis rigores defendendus. Olei odorati  $\frac{1}{2}$  exhibet. Olim Cephalico scopo intus dabatur, hodie Roborandi & Discutiendi sine extus applicatur. Oleum destillatum, nimii ad internum usum caloris, modo ad externum adhibetur. Spiritus Vini inde abstractus, cui Aquæ Reginæ Hungariæ nomen est, itidem extus ad Refocillandum, Roborandum, Discutiendum usurpatur.

ROSMARIMUM SYLVESTRE, Rosmarino salvatico, Romarin de Bohème, Post-Wanzen-vel Mottenkraut. Folia linearia, obtusa, ad marginem revoluta, supra luteo-viridia, nitidiuscula, subtus tomentoso-ferruginea, odore graveolentia, aromatica, sapore amara. Ledum palustre L. Europæ Septentrionalis indigenum & officinale. Laudatur Infusum ejus aquosum ad pessimæ Scabiæ species, nec non Tussim ferinam sanandam.

RUBIA TINCTORUM, Robbia, Garance, Farberæthe. Radix fibras calamum circiter crassas dimittens, geniculata, tota rubra, leviter odorata, amaricans, subadstringens. Rubia Tinctorum L. *Blackwell* Tab. 326. Europæ temperatæ propria, passim in agris colitur. Extracti aquosi acidulo sapore instructi  $\frac{1}{2}$ , resinosi, austeri  $\frac{1}{4}$  circiter largitur. In quinque Radicum aperientium numero habetur. Rachiticis, Ictericis, Scabiosis commendatur.

RUBINUS, Rubino, Rubis. Gemma Adamantem pondere superans, duritie subsequens, colore rubro fulgens. Alumen Gemma pretiosa Rubinus L. Ex Ava, Pegu & Brasilia advehitur, in Hungaria & Germania quoque offendi dicitur. Cordiales olim ei, Bezoardicæ &c. affungebantur vires.

RUBRICA FABRILIS, Rubrica Crayon rouge Ræthel. Est Lapis calcareus, molliculus, fissilis, digitos tingens, odoris nullius, saporis adstringentis. Talcum rubrum L. Passim in Europa reperitur. Vera minera Ferri, Hamatitæ viribus pollere videtur.

RUBIMORA, Mewres de Renard, Brombeeren. Folia ternata & quinata, ultimo impari, non raro lobato, omnia ovato-



lanceolata, serrata, subtus tomentosa, subadstringentia; *Baccæ Moris* satis similes, colore nigro, sapore aquoso, viscidulo, odore nullo. *Rubus fruticosus* L. *Blackwell* Tab. 45. In Europa ubique crescit. *Sunt, qui Folia ad Gargarismata adhibeant; Baccæ ob vim Refrigerantem laudantur.*

**RUBUS IDÆUS**, *Lampione, Framboise, Himbeere*. *Baccæ rubræ*, subinde etiam albæ, rotundæ, villo obsessæ, ad basin concavæ, quarum receptaculo conoideo acini adherent succulenti, monospermi, stylo setaceo coronati, proprium, suavissimum odorem, saporem habent vinosum, dulcem. *Rubus Idæus* L. *Blackwell* Tab. 289. Copiosius ejus per Europam proventus est. *Ad Analepticum, nec non Refrigerandi & Putredinem arcendi finem Succus in Syrupum, Rotulas, Gelatum conversus exhibetur. Aqua inde destillata gratum odorem spirat.*

**RUSCUS**, *Rusco, Bruscus, petit houx, Mausdorn*. Radix fibrosa, cylindracea, calamus crassa, plurimas fibrillas dimittens, alba, cum lenissima acrimonia primo gustu dulcis, dein amara. *Ruscus Aculeatus* L. *Blackwell* Tab. 155. Europæa Meridionalis, nostræ hyemis apprime patiens. *Vis ejus Resolvens & Diuretica laudatur; quinque Radicibus Apertientibus majoribus adnumeratur.*

**UTA**, *Ruta, Ruë, Rante*. Folia aliquot pinnulis rotundis, glaucispinnata, odore proprio, forti & gravi, sapore acri & amaro, utroque exsiccatione mitescente. *Semina* exigua sunt, angularia, nigra, sapore & odore ad Folia accedunt. *Ruta graveolens* L. *Blackwell* Tab. 7. Europæ calidæ propria, nostras hyemes innocua fert. Olei odorati  $\frac{1}{2}$  fundit. *Resolvens, Venenis resistens, Urinam pellens internum olim remedium habebatur; externus ejus usus in Ulceribus abstergendis, Rubefaciendo, Malignitatem Aeris corrigendo versatur. Oleum destillatum Balsamis Cephalicis immiscetur.*

**UTA MURARIA**, *Adiantum album, Sauvevie, Mauwrauten*. Cauliculi teneri, teretes, herbacei, albidi superne ramosi, tribus vestiti foliolis, parvis, cuneifor-

mibus, crenulatis, odoris nullius, saporis levissime adstringentis. *Asplenium Ruta Muraria* L. *Blackwell* Tab. 219. Crescit passim per Europam. *Reliquis Adiantis viribus æquiparanda.*

**SABADILLI SEMEN**, *Mexicanischer Laus-Saamen*. Capsulæ ternatæ, oblongæ, æquales, flavicantes, latere interiore dehiscentes, triloculares, Semina continent oblonga, acuta, nigra, amaro & fervido sapore linguam ferientia. *Verastrum Sabadilla Retz*. Mexicana planta. Hoc seculo demum in Europa innotuit. *Extus contra Pediculos adhibetur. Contra Affectus Nephriticos & Taniam ad Drachmam unam usque pro dosi datum fuisse lego.*

**SABINA**, *Sabina. Sevenbaum*. Folia longa, ex foliolis linearibus, acerosis, imbricatis efformata, odore gravi, forti, sapore amaricante & acri. *Juniperus Sabina* L. *Blackwell* Tab. 214. Orientis & Europæ calidæ propria arbor, nostras hyemes citra noxam fert. Olei odorati circiter  $\frac{1}{2}$  fundere dicitur. *Validissime Sanguinem Uterinum maxime commovet, quapropter nunquam intus danda. Extus Porris Venereis, Ossibus cariis, Fungis Dura matris inspergitur.*

**SACCHARUM**, *Zuccher, Sucre, Zucker*. Sal essentialis, dulcis, in aqua facillime solubilis, sub varia forma apud nos prostat; qui pulverem fuscum, humescentem refert, alieno, minus grato sapore, *Saccharum Thomæum* nuncupatur, nec nisi ad usus Eccoproticos adhibetur; ficcum & albidius *Cassonade* dicitur. Iteratis depurationibus in cohærentes panes conoideos ex granis formatos redactum Saccharum pro diversa soliditate, albedine, granorum splendore differt. Belgæ ut & Germani in *Miscellaneum*, cui *Farinose* etiam nostro idiomate, *Lumpenzucker* nomen est, *Melisseum* sive *Melis*, *Melis parvum*, *Rasfinatum*, *Boyerbrod*, *Canariense* denique Saccharum distinguunt. Ad singulas Sacchari depurationes, *Rafinationes* dicunt, liquor defluit Syrupi consistentiæ, plus minus badius, sordidus, alienum spirans odorem Saccharum liquidum; *Syrupus Saccharinus*, *Syrop dictus*. Obtinetur Saccharum ex succo Sacchari



Officinarum L. sub Tropicis sponte crescentis, recentiori ævo in America quoque calidiore, Sicilia, Hispania copiose culti, apud nos in tepidario asservandi. *Alimentario, Resolvente, Demulcente, Antiseptico, Relaxante scopo sub multiplici forma intus adhibetur; extus ad Abstergentia & Discutientia refertur. Plurimarum Formularum Basis est, Constituens & Corrigens.*

SAGAPENUM, *Sagapeno, Gomme Seraphique, Serapin Gummi*. Succus concretus in granis minoribus ad nos pervenit, ex rubro-flavescentibus, semipellucidis, cornu referentibus, odore nauseoso, gravi; sapore fastidioso & amaro, cui alliacei quid submistum est. Massæ majores, pannis cæruleis involutæ, profundius fuscæ, fordibus inquinatæ in sorten dicuntur. Sagapenum ex Alexandria venire constat, cui vero plantæ acceptum illud sit referendum ignoratur, ad Umbelliferas eam pertinere valde verosimile est. In aqua, maximam partem solubilis est, Alcohol quoque ejus portionem recipit, igne non liquabilis, accensum nauseosum odorem spirans, aliquantum Olei odorati fundere dicitur. *Intus ad Resolvendum & Viscera Reseranda commendatur, extus Resolvendi scopo applicatur.*

SAGO, *Sagu*. Grana, granis Hordei mundati similia, non raro angulosa, extus ex albo flavicant, medullam albißimam includunt, sapore & odore carent, coctione intumesunt, aquam, cum qua coquuntur, viscidam reddunt, & diutius cocta penitus in aqua dissolvuntur, eique spissæ gelatinæ formam induunt. Paratur Sago ex varii generis *Palmis*, quorum nondum satis determinatus character est; in Insulis Moluccis & Australibus, nec non a Borneo ad Siam usque copiose crescunt. Ex caudice *Palmæ* medullam aqua eluunt, in pastam efformant, inter lapides foraminibus exculptos in modum panis coquunt, unde ei forma manent, sub qua ad nos vehitur. Sub initium hujus sæculi ab Anglis hæc grana ob octo retro lustris a Gallis & Germanis in usum cibarium & medicamentosum recipi cœperunt. *Phthificis præcipue laudantur.*

SAL COMMUNE, *Sal Panis. Sal commune, Küchensalz*. Sal medius in crystallos cubicas concreescens, proprii saporis prunis superspersus decrepitans, ex proprio Acido & Alkali fossili constans. *Muria L. Pro tripartito, quod ipsa Natura largitur, genere, solet distingui.* SAL FOSSILE, eo quod ut plurimum pellucens obtinetur, *Sal Gemma* dicitur. *Mura montana L. Sel Gemme, Stein-vel Bergsalz* in frustis variæ magnitudinis, interdum permagnis per universum orbem ex montium visceribus effoditur; a fordibus, si quas habet, aut qualicunque colore prius depurandum est, quam in usum trahatur. SAL FONTANUM, *Muria fontana L.* quod proprie *Commune* appellant, ex peculiaribus fontibus, quos Salinas dicunt, solerti evaporatione obtinetur, & ab heterogeneis, quibus mixtum esse solet, salibus purgatur. SAL MARINUS, *Muria marina L.* ex omni, quod Globum nostrum ambit, Mari, & quidem in regionibus calidioribus naturali, quæ per Aërem & Solem fit, evaporatione, in frigidioribus vero eodem modo, quo Sal fontanus ex Salinis, obtinetur. Cum diversa sit ratio, qua Sal communis acidum vehere videtur, diversam quoque acrimoniæ rationem esse oportet. Salmarinus omnes reliquos acrimonia superat, quanquam hic ipse pro vario Mari, unde gignitur, differt. Salis communis probitas ex albedine, omnis peregrini saporis privatione & quod in aëre non humefcat, dignoscitur. *Humores incidit, Fibras stimulat, Putredini, sufficiente quantitate receptus, resistit tam extus, quam intus.*

SALEP RADICES. Ovatae sunt, undiquæ læves, ventricosæ, cornu instar subdiaphanæ & tenaces, insipidæ, inodoræ. Ex Turcia afferuntur; in nostris quoque regionibus optime parantur, siquidem de *Orchide* aut *Satyrio* bulbis indivisis constante, adempta exteriori cuticula, sumuntur bulbi, frigida infunduntur, ex filis deinde suspenduntur & exsiccantur. *Phthificis & Dysentericis hæc radix; sive sub forma Pulveris, sive eodem pulvere cum menstruo aquoso, sub stre-*  
nna,



*nua, ope virgulae agitatione in gelatinam cocto, Jure aut Lacte diluendam commendatur.*

**SALICARIA**, *Salicastro, Salicaire, Weiderich*. Folia lanceolata acuta, supra glabra, infra levissime tomentosa, inodora, insipida. *Lythrum Salicaria* L. Passim per Europam obvium. *Ad Alvi fluxus chronicos moderandos laudatur.*

**SALIX**, *Salcio, Saule, Weiden*. Cortex ramorum juniorum, colore viridis & splendens, odore gratus, sapore balsamicus, amaricans. *Salix pentandra* L. Vulgaris per Europam arbor. *Corticem Salicis quidam Cortici Peruviano ad curandas Febres intermittentes substituere conati sunt.*

**SALVIA**, *Salvia, Sauge, Salbey*. Folia ovato-oblonga, obtusa, rugosa, utrinque tomentosa, crenata, proprio aromatico odore, sapore linguam pungente amaricante: *Flores* majores, labiati, labio superiore fornicato, cærulei, sapore & odore multo foliis inferiores sunt. *Salvia officinalis* L. *Blackwell* Tab. 71. Europæ calidæ indigena nostras hyemes impunis fert. Pauxillulum Olei odorati fundit. Condimenti loco non raro recipitur; *viribus cum reliquis Vegetabilibus aromaticis æquipollet, in morbis Pectoris maxime usurpatur.*

**SAMBUCUS**, *Sambuco, Sureau, Holder*. Cortex intermedius, sive Liber extus viridis, intus albus, adstringens & austeriusculus; *Folia* pinnata sunt cum impari, pinnæ acutæ, glaucæ, ferratæ, saporis herbacei; *Flores* cymosi, parvo calyce sustentati, quinquefidi, albi, suavi odore & levi sapore perfusi; *Baccæ* in officinis *Grana Actes* nuncupatæ, rotundæ sunt, umbilicatæ, nigrae, pulpam condunt purpuream, saporis dulciusculi. *Sambucus nigra* L. *Blackwell* Tab. 151. Crescit in omni Europa. *Flores* abstrahendam a se Aquam & Spiritum Vini fragrantè odore imbuunt, pauxillum etiam Olei odorati butyracei fundere dicuntur. *Cortex* subinde Cathartico scopo ad Unciam unam usurpatur. *Foliorum extus contra Hemorrhoides & Erysipelas efficacia laudatur. Flores sub forma Infusi ad pellendum Sudorem, tanquam Epithema Discutiendi scopo adhibentur; Baccas nullo earum merito, sunt, qui contra Dysenteriam commendent.*

**SANDARACA GUMMI**, videatur **JUNIPERUS**.

**SANICULA**, *Radix* tenuis, fibrosa, grysea, amaricans. *Folia* reniformia, duriuscula, irregulariter lobata, lobis subrotundis serrata, inferne pallida, saporis leviter adstringentis, nonnihil etiam falsi. *Sanicula Europæa* L. *Blackwell* Tab. 63. Admodum frequens Europæ planta, *Intus æque ac extus adhibita contra Hemorrhagias magnopere commendabatur.*

**SANLAY** a *Seba* dicta. Est *Radix Calami Acori veri* sub **CALAMO AROMATICO** recensita, ex China in taleolas tenues secta & ad nos missa.

**SANTALUM ALBUM**. Magna & crassa, frusta alba, pallida, ponderosa, saporis & odoris expertia; *Alburnum Santali albi* L. Arboris in India crescentis, esse dicitur. *Plane iners.*

**SANTALUM CITRINUM**. Frusta magna & crassa, coloris pallide flavicantis, fricata fragrantem spirans odorem, saponem lingua vix percipit, Arboris præcedentis Medullam esse asserunt. *Oleum destillatum egregie fragrans fundere dicitur. Ob Analepticas virtutes olim laudabatur, quæ vero, prout in nostris certe tabernis illud prostat, valde exigua deprehenduntur.*

**SANTALUM RUBRUM**. In frustis nobis mittitur multo, quam præcedentia, majoribus & crassioribus extus obscuriore, intus sanguineo rubore tinctum; cortice caret, fibræ ejus evidenter crispæ sunt. Arboris cujusdam, ignoti adhuc characteris, ex Coromandel & Africæ regionibus Orientalibus venientis medulla esse fertur. Arbor in *Supplemento Linnæano Pterocarpi Santolini* nomine describitur. *Eviluerunt ejus Hepaticæ & Referigerantes vires, quin & ad coloranda medicamenta rarius hodie adhibetur.*

**SAPONARIA**, *Seifenkraut*. *Radix* fibrosa, calamo anserino crassior, sub cuticula flavescente medullam albam & dulcem condit. *Folia* ovato-lanceolata, glabra, neque odorata neque sapida sunt. *Saponaria officinalis* L. *Blackwell* Tab. 113. In omni Europa invenitur. *Lintea Saponis vice hac planta abstergi jam*



jam diu observatum est, qua quidem virtute Folii Radices præstare, recentiora experimenta docuerunt. *Ob vires Resolventes a Recentioribus multum laudatur sub forma sive Infusi, sive Extracti data.*

**SAPPHIRUS.** Gemma duritie Rubinum subsequens, coloris cærulei. Alumen gemma pretiosa cæruleum L. In iisdem ac Rubinus locis occurrit: Muria Chrysolampis L. cærulea, passim in fodinis Europam obvia, non raro ei substituitur. *Vanum est quicquid de viribus ejus Medicatis jactatur.*

**SARCOCOLLA.** Grana variæ magnitudinis, maximæ Nucem Juglandem æquant, rugosa, flavicantia, cum rubeдинis vestigio, odorem nullum, saporem ex dulci nauseose amaricantem, acriusculum habent. Obtineri ea ex Penæa Sarcocolla L. Æthiopix frutice fuerunt. Accensa gratum odorem spirant, in Aqua penitus, in Alcohole aliquatenus dissolubilia sunt. *Resolvendi & Abstergendi scopo olim usurpabatur.*

**SARSAPARILLA.** Radices interdum bipedales, flexiles, quapropter in gyrum crebro flexæ deprehenduntur, impariter interdum ad calamum usque anserinum crassæ, multas fibrillas teneras emittunt, quas autem inde recidi oportet, sub cortice ex rubicundo cinerascens, medullam continent farinaceam, albissimam, fissilem, odore & sapore carent. Advenerunt corbis compactæ, ex radicum serpentium genere quodam, ipsis parum dissimili, confectis. Radices graciles; extus nigrae, quæque facillime findi recusant, rejiciendæ. Similax Sarsaparilla L. *Blackwell* Tab. 339. Americæ calidioris, nobis in frigidario per hyemem servanda. Aqua cum Sarsaparilla cocta rubra & sapida evadit. *Ab omni tempore & vel recentissima experimenta multum contra morbos Venereos laudatur.*

**SASSAFRAS LIGNUM.** Frusta magna & ramosa, levia, sub Cortice ferrugineo, spongioso, rugoso Lignum continent pallidius, minus durum, cujus transversim secati fibræ facillime a semet ipsa discedunt; odor fortis, non ingratus ad Fœniculum accedit, sapor aromaticus

est. Cortex sapore æque ac odore Ligno præstat. *Laurus Sassafras* L. Americæ Septentrionalis propria; arbores juniores in nostra plaga contra hyemis injurias defendendæ sunt. Olei odorati  $\frac{1}{2}$  fundit. *Contra morbos Catarrhales, Rheumaticos, Cutaneos & Venereos Cortex ad Scrupulos duos, Lignum ad Sesquidrachmam datur in Infuso.*

**SATUREJA, Satureja, Sariette, Bohnenkraut.** Canes multum ramosi, diffusi, albidi, Folii vestiti parvis, lanceolatis & Florum ringentium verticillis, odorem habent gratum, aromaticum, saporem linguam pungentem. Satureja hortensis L. *Blackwell* Tab. 419. Europæ calidæ propria planta, apud nos copiose in hortis colitur. Olei odorati pauxillum fundit. *Vires plantarum aromaticarum exserit, rarius ad usus medicatos, crebrius ad culinarios adhibetur.*

**SATYRIUM, Stendelwurcz.** Radices sphæroides sunt, cinerascens, rugosæ, insipidæ & inodora. Desumuntur ab omnibus Orchidis & Satyrii speciebus, quarum bulbi indivisi sunt. Ex quo *adscrip-tas ipsis vires Aphrodisiacas experientia non confirmavit, eviluerunt eo etiam magis, quod Radices Salep ipsis omnino præstant.*

**SAXIFRAGA ALBA,** Bulbilli exigui, rotundi, involucri rufo, piloso tecti, aliquantulum carnis albæ, primum insipidæ, dein amaricantis exhibentes. Saxifrage granulata L. *Blackwell* Tab. 56. Crescit per omnem Europam. *Vires Lithontripticas his Radicibus adscriptas experientia non confirmavit.*

**SCABIOSA.** Folia ex ovatis-oblonga, hirsuta, inodora, levissime amaricantia Flores asservantur ex calyce evulsi tubulosi, cærulescentes, insipidi, inodori. Scabiosa arvensis L. *Blackwell* Tab. 185. Vulgaris per Europam. *A virtute Becchica & Vulneraria laudatur.*

**SCAMMONEUM.** Succus concretus in majoribus frustis ad nos vectus, ex gryseo-nigricans est, in pulverem gryseum, cui *Diagrydii* nomen, redigi patiens, odoris proprii, nauseosi, saporis evidenter acris. *Aleppense* ad Marasch, quatuor dierum itinere ab Aleppo distans, col-



collectum levius, magis gryseum, ex Convolvuli Scammonæ L. Asiæ Occidentalis, apud nos per hyemem in tepidario asservandi radicibus fauciatis obtinetur; *Smyrnaum* ex Galatia & Cappadocia Smyrnam translatum vilius est; vilissimum *Antiochenum* nigerrimum, multis foraminibus exesum, empyreuma redolens; duo posteriora ex variis Convolvuli speciebus parari dicuntur. Tam Aqua, quam Spiritus Vini ejus aliquantulam partem dissolvunt. *Validioribus Catharticis adnumerandum ad Grana decem vel quindecim exhibetur.*

**SCARABÆUS MAJALIS**, *Scarafaggio, Hanneton, Maikæfer*. Insectum pedibus instructum, alas tegmine duriusculo rectas, scutatas habet, thorace villoso instructum. Scarabæus Mellontha L. vel nimis frequenter occurrit. *A quibusdam contra Hydrophobiam commendatur.*

**SCHOENANTHUM**, *Kameelheu*. Culmi teretes, spithamæi, flavi; superne angustati & in ramos parallellos capillares diffusi, includentes substantiam fungosam, obvoluti aliquot foliis vaginantibus, glabris, margine scabriusculis, odoris proprii, aromatici, saporis amaricantis, linguam ferientis. Andropogon Schoenanthum L. Indiæ Orientalis & Arabiæ indigenum. Aliquantillum Olei odorati fundere dicitur. *Ob vires Aromaticas olim in usum trahabatur.*

**SCILLA**, *Scilla, Squilla, Meerzwiebel*. Radix bulbosa, amplitudine non raro aliquot pugnos æquans, ex basi angustiore, rotunda, fibrillas dimittente, protinus in corpus amplum & ventricosum distenditur, quod superne in formam conoideam contractum, extus tunicis vestitur membranaceis, ficcis, aridis, rufis; bulbi caro constat squamis albidis, levi rubedine suffusis, apprime amaris, non admodum acribus, in meditullio minus amaris. Scilla maritima L. Europæ calidæ & Orientis propria, in nostris hortis si colitur, contra hyemis rigorem est defendenda. *Ob vim Resolventem & Diureticam ab omni ætate fuit laudata; recens pulverisata illi, quæ sub nomine præparatæ asservatur, præferen-*

*da videtur. Datur ad Scrupulum semis pro dosi.*

**SCINCUS**, *Stincus*. Animal quatuor pedibus tetradactylis instructum, sex pollices circiter longum, linea longitudinali abdomen, visceribus exentis, apertum ostendit; cutis squamosa est, argentea, cum vestigio flavedinis, deorsum, fasciis caruleis transversis notatum, spina eminens distinguit, cauda ad latera contracta brevis, caput trunco continuatum est; odore caret, saporem salsum habet. Lacerta Scincus L. In Ægypto & Arabia petrea occurrit. *A vi Aphrodisiaca commendabatur.*

**SCLAREA**. videatur **HORMINUM**.

**SCOLOPENDRIUM**, *Lingua Gervina*. Folia oblonga, ad finem paulatim magis dilatata, integerrima, firma, inodora, linguam leviter adstringentia. Asplenium Scolopendrium L. *Blackovell* Tab. 138. Europæ temperatæ. *Scopo Adstringendi & Roborandi usurpabatur.*

**SCORDIUM**, *Scordeo, Chamaras, Lachen-Knoblauch*. Folia ovato-oblonga, crenata, hirsuta, odoris proprii, Allio vicini, saporis amari, acriusculi. Teucrium Scordium L. Passim per Europam obvium. *Ob virtutem potissimum Antisepticam laudatur, quo quidem scopo tam extus, quam intus adhibetur; datur insuper interne ad reseranda viscera, promovendasque Excretiones aquosas.*

**SCORPIUS**. Hoc nomine quæ nobis veniunt animalcula juniora Oleo condita, vix aliquot lineas æquantia, colore bruno, antennis in chelas terminatis & cauda instructa sunt, cujus ultimus articulus in aculeum arcuatum abit. Scorpium Europæus L. *Oleum, in quo Scorpiones infusi erant, propria vi contractum animalium venenatorum pollere creditur.*

**SCORZONERA**. Radices longæ, fibrosæ, pollicaris circiter crassitie, sub cuticula nigra carnem albam, dulcem, lacte madentem includunt. Demta cuticula in officinis asservantur extus rubræ, intus albæ, dulces. Scorzonera Hispanica L. *Blackovell* Tab. 406. Europæ calidæ civis nostratis hyemis patientissima. *Primo aut secundo a satiatione anno*



*Radices in usum cibarium, trimæ vel quadrimæ propter indolem suam saponaceam in officinas recipiuntur.*

**SCROPHULARIA**, *Braunwurze*. Radices ex tuberculis ovatis, nodulis obfessis, fibrillas albidas emittentibus constant, extus gryseæ, intus albidæ sunt, odorem spargunt levissimum, nauseosum, saporem edunt acriusculum, leviter amarum. *Foliorum petiolatorum, ovatorum, ferratorum, gravis odor, sapor amariuscule est. Scrophularia nodosa L. Blackwell Tab. 87. Crescit per omnem Europam. Radices aque ac Folia contra Scrophulas & Hemorrhoides cacas commendabantur.*

**SEBESTEN**, *schwarze Brustbeeren*. Fructus parvis Prunis similes, ovati, utrinque acuti, nigricantes, rugosi, calyce sustentati sicco, flavicante, repando, pulpa fusca & dulci ossiculum recondunt ovatum, prædurum, nucleo dulci foetum. Macri, calyce orbati, alieno sapore contaminati, rejiciendi sunt. *Cordia Myxa L. Ægypti & Indiæ arbor, apud nos in caldario fervanda. Ob vires Demulcentes olim ad Decocta Pectoralia recipiebantur.*

**SECALE**, *Segale, Seigle, Roggen*. Grana strigosa, inferne acuta, superne aliquantum obtusa, sulco longitudinali notata, sub cuticula flavicante, ad nigrum vergente farinam albissimam includunt. *Secale Cereale L. Blackwell Tab. 424. Mucilaginis viscidæ ponderis sui dimidium vehit. Farina Secalis cum Cerevisiæ facie in pastam redacta & Collo imposita Asperitati Fancium & Anginæ mederi fertur.*

**SEDLICENSIS SAL**. Crystalli exiguae, cuspides referentes, facillime in aqua dissolubiles, nullam ab aëre mutationem patientes, evidenter amaræ, ex Acido Vitriolico Magnesia saturato, natæ. Obtinetur evaporationis ope ex variis, in quodam Bohemiæ vico scaturientibus fontibus. *Frequentissimus ejus in ducenda Alvo usus est, quo scopo ejus Uncia aut Sesquiuncia in duodecim Aquæ Unciis dissolvitur.*

**SEDUM MINUS**, *Sedo, Tripe, Madame, Katzentrauben*. Cauliculi teretes, undique versum imbricati, Foliolis tere-

tibus, ovatis, obtusis, convexo-gibbis, acris saporis, odoris expertes. *Sedum acre L. Blackwell Tab. 232. Vulgare per omnem Europam. Intus ad unum aut alterum cochlear sumtum Vomitus & secessus Alvinos excitat. Extus Clavos pedum consumit, Cancro & Ulceribus fungosis medullam attulisse relatum legitur.*

**SEIDSCHUZENSIS SAL**. Sedlizeni adeo similis, ut unus ab altero distinguere vix possit. Obtinetur evaporationis ope fontibus cognominibus, non longe a Sedlizio distantibus; Magnesiæ  $\frac{2}{3}$  plus quam Sedlizenis vehit; ceterum eadem utriusque tam virium, quam dosis ratio est.

**SELENITES**, videatur **GLACIES MARIÆ**.

**SEMPERVIVUM**, *Semprevivo, Foubarbe, Hauswurzel*. Folia ex ovato oblonga, crassa, ciliata, convexo-concava; saporis subacerbi. *Sempervivum tectorum L. Blackwell Tab. 366. Totius Europæ domesticum. Intus Resolventibus & Detergentibus viribus poliet. Extus earundem laudem habet, Clavis pedum etiam salubriter imponitur.*

**SENECIO**, *Cardoncello, Senecon, Kreutzekkraut*. Folia oblonga, semipinnata, pinnis ferratis & latis, insipida. *Senecio Vulgaris L. Blackwell Tab. 132. Copiosissime per Europam crescit. Resolvendis Tumoribus imponitur.*

**SENECKA**. Radix fibrosa, calamum anserinum circiter crassa, ex capite crassiore fibras dimittit, aliquot nobis distinctas, medullam continet, sub cortice ex cinereo flavo, albam, saporem habet Pimpinellæ albæ vicinum, sed acriorem. *Polygala Senega L. Americæ Septentrionalis. Sanguinem Pleuriticum, nec non spissitudinem Arthriticam resolvit. Uncia ejus una cum Aquæ viginti quatuor Unciis ad duodecim residuas coquitur, cochleatim exhibetur.*

**SENNA**. Foliola ovato-lanceolata, medio nervo percursa, acuta, viridia cum suffuso flavo, proprii odoris, nauseosi, saporis amari, quadantenus acris. *Folliculi Legumina ovata, utrinque compressa, viridia, feminibus oblongis foeta, odoris vacua, sapore falso Foliis quodam-*



dammodo comparando. Cassia Senna L. Ægypti indigena. Nonnisi *Alexandrina* folia & Legumina, in commercio de la Palte dicta, recipienda sunt. Folia *Tripolitana* majora & obtusa, *Italica* obtusa & magnis venis perfusa, *Mochana* angustiora, longiora, acutiora, suo quaque odore Alexandrini cedunt. Folliculi *Tripolitani* minores sunt, minus virides, nigro & rufo maculati. Folia Oleum odoratum fundere dicuntur. Tam Folia, quam Folliculi ad Unciam semis Alvum quid ducunt, irritant tamen; coqui recusant; nec Infusum eorum valde exprimendum est.

SEPIÆ OS, Osso di Seppia, Os de Sèche, vreis Fischbeid. Testa a squamis coalitis orta, oblonga, utrinque angustata, albissima, dura, linguam falis sensu afficiens, cujus faciei concavæ substantia alba inhæret pulverulenta, laxa, insipida. Sepia officinalis L. In Oceano & Mari Mediterraneo occurrit. Adstringentes ipsi tribuuntur vires, substantia laxa ad Dentifricia recipitur.

SERICUM, Seta, Soie, Seide. Fila firma, tenacia, alba vel flava, flexibilia, inodora & insipida, folliculum tegentia ovatum, in cujus cavitate Nympha delitescit Phalenæ Bombycis Mori L. Persiæ indigenæ, & hodie passim in Europa cultæ. Multum Salis volatilis largitur. Scopo Cephalico & Cordiali olim laudabatur.

SERPENS, Serpente, Serpent, Schlange. Exuvium Serpentis, tenax, inodorum, insipidum, pro vario unde defumitur genere varie coloratum, & maculatum, apud nos a Colubro Natrice L. vulgo defumitur. Axungia Piscium axungie simillima. Lapidis nomine hodie venit substantia nigra, in medio macula alba notata, ad margines attenuata, bibula, linguæ adhærens, insipida, ex Cornu Cervino icto parata. Exuvia ad opitulandum Partum Ventri & Lumbis alligabantur; ad incrementum Pilorum accelerandum adhibebantur; intus scopo Diuretico infereiebant; viribus quoque Axungia cum Adipe Piscium aequipollet; Lapis Vulneribus venenatis imponi solebat.

SERPENTARIA VIRGINIANA. Radix ex tenui capite plures fibrillas, aliquot pollices longas, emittit, ferruginea, intus albida, Camphoram evidenter olens, sapore acriuscula & amaricans. Aristolochia Serpenteria L. Crescit in Virginia & Carolina. Aliquantum Olei odorati fundere dicitur. In penum medicamentariam Europæorum exunte demum superiore seculo admissa est. Virium Alexipharmicarum, Anodynarum, Antisepticarum laudem habet. Datur in Pulvere ad Scrupulum unum, in Infuso ad Drachmam unam.

SERPILLUM, Serpillo, Serpolet, Quendel. Cauliculi teneri, teretes, albidi, Foliis vestiti parvis, ovatis, obtusis, odore perfusi aromatico, proprio sapore qui linguam pungit. Thymus Serpillum L. Blackwell Tab. 418. Crescit per omnem Europam. Per paulum Olei odorati fundere dicitur. Menses & Urinam promoveri, Cephalalgiam ex crapula ortam pellere dicitur; extus ad Discutiendum & Roborandum adhibetur.

SESAMUM. Semina exigua, ovata, albida, dulcia, Oleo turgida. Sesamum Orientale L. In Oriente & Corsica crescit. Annua planta nostræ plagæ culturam patitur. Vim Relaxantem ei nonnulli tribuunt.

SESELI CRETICUM seu Montanum, Bergkummel. Semina parva, utrinque obtusa, convexo-concava, tribus lineis eminentibus notata, rufa, vix odora, saporis leviter aromatici. Tordylium Officinale L. Europæ calidæ planta annua, in nostris hortis coli patiens.

SESELI MASSILIENSE. Priori simile, magis gryseum & odoratum. Laserpitium Siler L. Blackwell Tab. 426. Orientis & Europæ calidæ. Utrumque Sefeli Resolvendi & Urinam Ducendi scopo adhibebatur. Varia Semina aromatica plantarum umbelliferarum hoc nomine passim in officinis occurrunt.

SIDERITIS, Siderite, Crapaudine, Glied-vel Berus-vel Beschrey-Kraut. Folia oblonga, obtusa, ferrata, scabra, hirsuta, odore tenui, sapore adstringente prædita. Stachys recta L. Passim in Europam



obvia. *Vis ei Vulneraria tribuitur, ad Balnea contra Rhachitidem recipitur.*

**SIGILLUM SALOMONIS**, *Weißwurz*. Radix cylindrica, crassitie calami anserini, striis eminentibus rugosa, extus flavicans, intus alba, levem spirat odorem, saporem prodit dulcem. Convallaria Polygonatum L. *Blackwell* Tab. 251. Vulgaris per Europam. Mucilaginis ultra dimidium sui ponderis largitur. *Contra Hemorrhagias & Hemorrhoides efficax prædicatur.*

**SILER MONTANUM**. Semen, quod sub **SESELI MASSILIENSIS** titulo descripti, hoc nomine subinde prostat.

**SILEX**, *Selce, Caillon, Kieselstein*. Lapis rotundus, durus, ad Chalybis ictum scintillas evomens, fractura in frustula lavia, quasi vitrea, convexo-concava dilabens, varie coloratus, citra fusionem nullo menstruo solubilis, insipidus, inodorus. *Silex Pyromachus* L. In fluviorum alveis & ad ripas offenditur. *Iners omnino Lapis olim Lithonripticis adscribebatur.*

**SILIQUEA DULCIS**, *Caruba, Carobe, Carouge, Johannesbrod*. Fructus oblongus, utrinque compressus, plus minus incurvus, fusco-brunus, nitidus, rugosus, intus multis septis distinctus, pulpam continentibus, siccam, rufam, dulcem, semina foventem subrotunda, splendentia, fusca, nucleum album includentia. Macra, quæque concussæ crepitant, rejiciendæ sunt. *Ceratonia Siliqua* L. *Blackwell* Tab. 209. Vulgatissima Europæ calidæ & Orientis arbor, apud nos contra hyemis rigorem est defendenda. *Decoctis Pectoralibus adjicitur.*

**SIMAROUBA**. Cortex non crassus, cujus frusta pede longiora, aliquot pollices lata, laciniata ad nos adferuntur, fractu pertinax, extus levissime rugosus, cinereus, intus pallidior, per se in pulverem redigi impatiens, inodorus, amarissimus. Pro *Quassia dioica* hanc arborem habet *Pharmacop. Succ. Clar. Aublet* contra monœciam esse observavit; *Linnaeus* in *Supplemento* *Quassiam* *Simarubam* appellat. In Insulis Americæ calidæ crescit. Prioribus hujus Seculi annis primum a Gallicis contra *Dysenteriam* usurpatus est hic Cor-

tex. Datur ad *Scrupulos* duos pro dosi ex *Aqua decoctus*.

**SINAPI**, *Senape, Montarde, Senf*. Semina parva, rotunda, rubicundo-brunea, sapore admodum acri statim linguam & in pulverem redacta transpalatum nares quoque irritantia. *Sinapis nigra* L. Passim in Europa obvia, apud nos copiose in agris colitur. Oleum unguinosum mite, odoratum acerrimum fundere dicuntur. *Ad condimenta hæc Semina recipiuntur Medicis Resolventium, Diureticorum, Antiscorbuticorum nomine commendantur. In Cataplasma redacta extus ad Rubefaciendum adhibentur.*

**SMARAGDUS**, *Smeraldo, Emeraude*. Gemma reliquis mollior, viridis, igne colorem non mutans, variæ, angularis figuræ. *Borax Gemma nobilis viridis* L. Ex India potissimum & quidem pretiosior nobis venit, in Bohemia & Gallia quoque obtrinetur. Fluorem ei viridem sive Muriam lucidam L. passim ex Europæ fodinis effossum plerumque substituere solent. *Gemmis affusa olim vires medicæ Smaragdo etiam assingebatur.*

**SMIRIS**, *Smiriglio, Emery, Schnirgel*. Minera Ferri ponderosa, lapidem durissimum, nigro-gryseum referens, in pulverem trita ad rufum vergens. *Ferrum Smiris* L. Hinc inde in metalli fodinis reperitur. *Multifarius eius in variis artibus usus est. Olim ad Dentificia recipiebatur.*

**SODA**, *Alumen Catinum, Soda, Soude*. Massa terreo-salina, in prægrandes glebas efformata, perdura, gryseo-nigricans, carulescens, plurimis foraminibus pertusa, odoris non ingrati, saporis salis, lixiviosi. Orientalis, multum laudata, *Rechetta Alexandrina* dicitur, ex Occidentalibus *Alonensis* præcipue commendatur. Paratur ex variis Salsolæ L. *Salicorniæ* L. & *Mesembryanthemi* L. ad Mare crescentibus speciebus. In Aëre humescens, soluta foetens, crusta viridi obducta, minoribus foraminibus pertusa, rejicienda est. *Sal inde paratus vires Alcalium aquat.*

**SOLANUM**, *Solano, Morelle, Nachtschatten*. Folia rhomboidea, dentato-angularata, odoris & saporis expertia. So-



lanum nigrum L. *Blackwell* Tab. 107. Passim per Europam obvium. Inconsulto venenis narcoticis adscripta; extus Discutiendi scopo in usum trahuntur.

**SOLDANELLA**, *Chou marin*, *Meerkohl*. Folia longius petiolata, reniformi-cordata, obtusa cum parvo mucrone, crassiuscula, inodora, amaricantia, acria. Convolvulus Soldanella L. Ad Oceani Europæ littora minus frigida crescit. Valide & cum irritatione purgat. Datur in substantia ad Drachmam dimidium, in Infuso ad Drachmas duas.

**SONCHUS**, *Cicerbita*, *Laitron*, *Sau-vel*, *Gensdistel*. Folia longa, glauca, semipinnata, pinnis ferratis, odora, Papaveri propinqua, sapore amara. Sonchus Oleraceus L. *Blackwell* Tab. 130. Crescit ubique. A quibusdam Cicorio substituitur.

**SOPHIA CHIRURGORUM**, *Besenkraut*. Folia magna, circumscriptione triangulari, aliquoties pinnata, pinnis ordinatim decreescentibus, ultimis pinnulis linearibus, angustissimis, mollia, levissimi odoris, saporis acriusculi. Semina minima, ovata, rufa, acria. Sisymbrium Sophia L. *Blackwell* Tab. 440. Passim per Europam occurrit. Vires Incidentes ei tribuuntur. Semina olim Adstringendi, Urinam ducendi, Vermibus medendi scopo laudabatur.

**SOBRUS AUCUPARIA**, *Sorbo*, *Sorbier*, *Vogelbeerenbaum*. Baccæ rotundæ, umbilicatæ, rubræ, inodoræ, acido-acerbæ. Sorbus Aucuparia L. Frequens per Europam arbor. Dicuntur Stranguriæ mederi, Calculo Renali obistere.

**SPECULARIS LAPIS**, videatur GLACIES MARIÆ.

**SPICA CELTICA**. Radix parva, foliis exiguis squamarum instar vestita, nervos quoque foliorum marcidiorum emittens, odore aromatico proprio, sapore amaro, falso, aromatico perfusa. Valeriana Celtica L. Alpibus Europæ calidæ propria planta. Olim scopo Diuretico laudabatur; hodie in Orientem mittitur, ad usus Cosméticos adhibenda.

**SPICA INDICA**, *Marien-Magdalenen-Blume*. Radicis exiguum capitulum ferrugineum, pluribus foliorum marcidiorum nervis sibi invicem incumbentibus

& convolutis instructum, odore proprio forti, cui nonnihil mucidi inesse videtur, sapore leviter amaro perfusum. Andropogon Nardus L. Indiæ & Syriæ Gramen. A quibusdam Spica Nardi dicitur, qua voce alii utramque Spicam, alii Lavendulam supra memoratam indicant. Præter odorem rarissimus ejus usus est.

**SPIGELIA**. Folia dicuntur ovato-oblonga esse, acuta, supra viridia, infra glauca, odore & sapore putridum referentia. Spigelia Marilandica L. Americæ Septentrionalis propria planta. Haud ita pridem in Europam allata, contra Vermes, præcipue ab Anglis, maximopere commendatur. Adultis duæ pro dosi Drachmæ bis de die dantur; justo majore quantitate data Soporosos edidisse effectus comperitum est. Ipsi debiliorem esse Spigeliæ Anthelmiam L. Americæ calidæ, annuam plantam, apud nos Semina maturantem asserunt, cujus Folia ovato-acuta, hirsuta, fatui saporis sunt.

**SPINA CERVINA**, *Prugnolino*, *Nerprun*, *Kreutzbeerlein*. Baccæ rotundæ, Pifa majora magnitudine æquantes, puncto eminente umbilicatæ, nitidæ, succo lurido turgidæ, ad nigredinem cum vestigio viroris vergente, acriusculæ, cum quadam adstrictione nauseosæ. Rhamnus Catharticus L. *Blackwell* Tab. 135. Vulgaris per Europam arbor. Ex Succo Alumine mixto oritur pigmentum, *Verd de Vessie*, *Saßgrün* appellatum. Baccas ad Drachmas duas datas, Alvim ducere ferunt, frequentissime parando Syrupo Domestico inseruiunt.

**SPONGIA**, *Spugna*, *Eponge*, *Schwamm*. Substantia fibrosa, subglobosa, lobata, fusci plus minus diluti coloris, odoris proprii minus grati, nullius saporis, multis foraminibus variæ magnitudinis hiulca, quibus liquorem sorbens turget. Spongia officinalis L. Copiose in Mari Mediterraneo & Rubro invenitur. Spongiæ quo Molliores sunt, quo minoribus poris quoque dilutiore colore præditæ, eo meliores sunt & Eponges fines, *Badschwamm* appellantur; majoribus contra foraminibus pertusæ, minus sequaces *Roschwamm* earumque fru-



frusta minora *Fragmenta Spongiarum* dicuntur. *Combustæ* intus contra *Strumas* exhibentur, *integræ* extus ad *Hæmorrhagias* sistendas usurpantur.

**SPONGIARUM LAPIDES.** *Lythophyta* membranas lapideas, fragiles, diversissime figuratas, cellulares referunt, manifesta, quod aliis substantiis adhæserint, signa præ se ferunt, odorem Maris spirant. *Cellepora Spongites* L. Testis & rupibus adcreta in Mari Mediterraneo reperitur. *Usti medicamenti* contra *Strumas* admiscuntur.

**STANNUM**, *Stagno*, *Etain*, *Zinn*. Metallum omnium levissimum & minore, quam reliqua, calore liquabile, albedine & firmitate Plumbum superans, in omnibus Acidis nec non Alcalibus solubile. Nativum rarius existit, sub variarum glebarum forma in Anglia maxime & Germania offenditur. *Scopo Anthelmintico* ejus *Rasuram* vel ultra *Semiunciam* pro dosi sunt qui laudent; qui vero hoc medicamento recte uti volent, caute circumspiciant, ne Plumbo aut alio Metallo noxio sit mangonifatum.

**STAPHIS AGRIA.** Semina subrotunda, angulata, inferne latiora, superne contracta, in facie plana linea longitudinali distincta, sub cortice nigro, rugoso nucleum oleosum, albidum, amarum, acerrimum condunt. *Delphinium Staphis agria* L. *Blackwell* Tab. 265. Planta biennis Europæ calidæ, apud nos in tepidario ab hyemis rigore tuenda. *Acerrimum medicamentum* nunquam intus dandum, contra *Pediculos* usurpatur.

**STOECHAS ARABICA.** Spicæ cylindricæ, multis calicibus sibi arctissime incumbentibus Floresque marcidos emittentibus efformatæ, colore cinereo, odore levi, sapore aromatico ad *Lavendulam* accedente, sed minus grato. *Lavendula Stœchas* L. *Blackwell* Tab. 241. Orientis & Europæ Meridionalis propria, in tepidario contra nostras hyemes defendenda. Olei odorati uberem copiam fundere dicitur. *Rarissime in usum* trahitur. *Lavendula Spica* vicem ejus sustinente.

**STOECHAS CITRINA**, *Immortelles*

*jaunes*, *Rheinblumen*. Flores tubulosi, lutei, calyce sustentati luteo, ex squamis constante siccis, lanceolatis, imbricatis, insipidi, inodori. *Gnaphalium Arenarium* L. Passim per Europam obvium. *Lenes vires Adstringentes* edere dicitur.

**STORAX CALAMITA.** Succus concretus, sive sub forma massarum variæ magnitudinis, ex badio rufarum, tenacium, pinguiuscularum, proprii, suavis admodum odoris, acriusculi saporis, quæ quidem in *Granis* dicitur; sive in prægrandibus massis prostat, sacci, in quo præli pressionem passæ erant, manifesta vestigia gerentibus, sabulo & lapillis inquinatis, friabilibus, odore & sapore antecedentibus similibus; hæ quo aridiores, eo viliores sunt. *Styras officinalis* L. Orientis & Europæ calidæ propria arbor, apud nos per hyemem in tepidario asservanda. In Gallia & Italia aliquantum Resinæ inde obtinetur. Oleum odoratum & Salem Essentialem emittere dicitur. Spiritu Vini vix non tota solvitur, Oleis nequaquam. Olim scopo *Becchico* intus dabatur, hodie *Suffitibus* potissimum inservit.

**STORAX LIQUIDA.** Resina quæ consistentiam Unguenti spissioris habet, grysea, sæculenta, sordida, antecedentis odorem spirans. Liquidambar *styraciflua* L. *Blackwell* Tab. 485. Virginicæ civis, nostras hyemes impune fert. Quæ in officinis prostat Resina, haud obscure mangonium prodit. *Ad consolidanda Vulnera* adhibetur.

**STRAMONIUM**, *Stramonio*, *Pomme épineuse*, *Stechapfel*. Folia magna, viridia, ovato-acuta, angulosa, in lacinias latas divisa, odore virulenta, sapore nauseosa. *Datura Stramonium* L. *Blackwell* Tab. 313. Americanæ originis planta, justo frequentius hodie in Europa occurrit. Omnibus hujus plantæ *Narcoticas vires inesse* experientia edocuit. Succum inspissatum ad sex Grana bis de die datum *Convulsiones & Maniam* curasse observatum est.

**STRUTHIONIS, OVA**, *Uovi di Struzzo*, *OEufs d' Autruche*, *Strausseneyer*. Testæ albæ, præmagnæ *Ovorum Struthio-*



thionis Cameli Lignum Asiæ & Africæ avis. *A quibusdam scopo Lithontriptico laudabantur.*

SUBER, *Sughero, Liege, Kork-vel Pantoffelholz.* Cortex planus, crassiusculus, levis, coriaceus, firmus & compactus, facile scindendus, coloris dilute brunei, insipidus, inodorus. *Quercus Suber* L. *Blackwell* Tab. 193. Europæ calidæ, apud nos contra hyemis injurias defendenda. *Olim Adstringendi causa intus adhibebatur, extus ustum sub forma Unguenti Hæmorrhoidibus applicatur; usus ad Epistomia notissimus, ejusdem carbo in pulverem nigrum contritus Noir d'Espagne sistit.*

SUCCINUM, *Succino, Ambre jaune, Carabé, Agstein, Bernstein.* Bitumen in fructis variæ rotunditatis & magnitudinis exstat, plus minus profunde citrinum, pellucidum, grate olens, nullo calore fundi patiens, suavem odorem exhalans; quo minus colorata, quo pellucidiora, quo majora frusta, eo sunt pretiosiora. Quæ inter tornandum decidunt ramenta, RASURÆ SUCCINI nomine in officinas recipiuntur. Succinum Electricum L. Copiosissime ad Mare Balticum, rarius in aliis Europæ regionibus reperitur. *Olim contra affectus Capitis & morbos Catarrhales commendabatur; ejus suffitus Roborandi, Discutiendi, Aerem purgandi gratia adhibetur.*

SUCCISA, *Morsus diaboli, Mors du diable, Teufelsabbiss.* Radix fibrosa, ex parvis capitulis, ad quorum latus germen novi caulis accretum specie morsus quosdam fefellit, fibras emittit capillares, gryseas, ex albo flavescentes, amaras. Scabiosa Succisa L. *Blackwell* Tab. 142. *Superstitione vel ad gravissimos morbos efficax habita, præ ceteris nihil proprii habet.*

SULPHUR, *Solfo, Soufre, Schwefel.* Substantia solida, flava, cum crepitatione fragilis, mediocri calore fundenda, colorem fundendo rufum induens, proprio ingrato odore nares feriens, insipida, ignem concipiens, flamma cærulea & acida ardens, in Oleis & Spiritu Vini, neutiquam in Aqua solubilis.

Pyrites L. Occurrit passim per Europam, sive Nativum, sive cum variis metallis in varias mineras conversum, sive Fontibus foteriis immixtum. Constat ex maxima Acidi Vitrioli & minima Principii inflammabilis portione. Nonnisi flavum in cylindros fustum recipi debet, quod quidem Citrinum dicitur, aut Vivum Soufre à Canons, aut in Flores sublimatum. *Intus ad Viscerum Ulcera, ad promovendam Diaphoresin, curandam Scabiem; extus contra morbos Cutaneos adhibetur.*

SUMACH. *Eacæ exsiccatæ, racemo adherentes, rubræ, multo villo obductæ, Semina includentes nigra, subrotunda; acido, admodum adstringente sapore.* Rhus Coriaria L. *Blackwell* Tab. 486. & 541. Europæ Meridionalis & Orientis propria arbor, nostras hyemes sine noxa fert. *Rami teneriores cum foliis exsiccati in usum Tinctorum asservantur. Baccae exsiccatæ valide Adstringunt, quo quidem scopo tam intus, quam extus adhibentur.*

SYMPHYTUM, *Consolida maggiore, Consolida major, grand Consoude, Schwarzwurzel, Wallwurzel.* Radices fibrosæ, aliquot pollices crassæ, foris nigrae, intus albæ, insipidae, inodora. Folia ovato-lanceolata, hirsuta, aspera, rugosa, odoris & saporis expertia. Symphytum officinale L. *Blackwell* Tab. 252. Crescit passim per Europam. Ego saltem Mucilaginem, ob quam ab Auctoribus Hæmoptoicis, Nephriticis & Dysentericis commendatur, iteratis quoque experimentis inde non potui obtinere. Radices exsiccatæ mihi semper Extractum aquosum, bruneum & falsum exhibuerunt.

TACAMACHA. Resina, quæ sub varia forma nobis venit, alia in fructis rufo-flavescentibus, nitidis, gratum odorem spirantibus, levi & nauseosi saporis, calore liquefcentibus, quæque accensa minus gratum spargunt odorem; eadem in massas quoque majores, multis sordibus pollutas coacta prostat, & hæc quidem *en Mâtes, in Sorten* dici solet, alia priori quidem similis, sed palidior, viridescens, Cucurbitis dimidia-



tis inclusa, cui *en Coques* nomen tributum; occurrit etiam *Tacamahaca viridis* parvis frustis efformata, tota viridis, inodora, sapore multum nauseosa, igni admota fluens, accensa minus gratum fumum emittens. Nondum de arbore has Resinas fundente constat. Priorem a Populo balsamifera L. Sibiriae & Americae Meridionalis arbore, nostram hyemem patienter ferente, alteram a *Fagara octandra* L. Americae Meridionalis obtineri ferunt. *Extus debili Ventriculo sub forma Emplastri applicatur, Suffitus ejus ad Roborandum & Discutiendum adhibetur.*

**TAFFIA**, *Rum*. Spiritus inflammabilis, flavicans, praeter saporem & odorem Spiritibus per fermentationem paratis communes & quidem multum eminentes, nullis propriis instructus. Ex Insula Francica & Madagascar adfertur, ubi ex succo *Sacchari officinarum*, justam fermentationem vinosam passo, paratur. Ex ejus Unciis viginti sex Spiritus rectificati Uncias septendecim, & ex his Alcoholis octo obtinui. Qui post rectificationem remanet Liquor turbidus, non male olens, dulciusculus est. Spiritus, qui in Americae officinis Saccharinis ex Syrupo Saccharino paratur, empyreuma habet & acrimoniam, eum ibi proprie *Taffia* dicunt, probe a priori, quem *Rum* appellant, distinguendum. *Praeter vires Spiritui Vini proprias Medicis ob virtutem Antarthriticam commendatur.*

**TALCUM**. Squamis efformatur, tactu pinguibus, nitidis, cohaerendo invicem in massas majores, minoresve excrescentibus, fragilibus, subpellucidis, albicantibus, virescentibus, insipidis, inodoris. Mica Talcosa L. in Suecia & Regno Neapolitano nascitur. *Olim ad usus Cosméticos commendabatur, Oleum inde parandum ad somnia Alchymicorum ablegandum.*

**TALPA**, *Talpa*, *Taupe*, *Maulwurf*. Animal quadrupes, gryseum, terram fodiens. Talpa Europaea L. nimis frequens in arvis, combusta intus contra *Arthritidem* dabatur, extus *Fistulis & Strumis* applicabatur.

**TAMARINDI**. Pulpa nigra, levi odo-

re, sapore acido instructa, cui varia filamenta & semina majuscula, ex rotundo angulata, spadicea immixta sunt: exsucca & carne Prunorum adulterata rejicitur. *Tamarindus Indica* L. *Blackwell* Tab. 201. Arbor Indiae, Aegypti & Arabiae, in America hodie frequenter culta, apud nos in caldario sustentanda. *Filamentis & Seminibus cribri ope, per quod transprimitur, purgata egregium Eecoproticum est in Febribus acutis, Biliosis, putridis.*

**TAMARISCUS**, *Tamarisco*, *Tamaris*. Cortices tenues, angusti, extus rufi, intus albi, sapore amaricantes & adstringentes. *Tamarix Germanica* L. *Blackwell* Tab. 331. f. 2. Frutex Europae temperatae. *Ad Decocta Aperientia recipitur.*

**TANACETUM**, *Tanaceto*, *Tanais*, *Rheinfarn*. Folia longa, viridia, punctata, pinnata, pinnis incis, serratis; Flores tubulosi, flavi, calice hemisphaerico imbricato sustentati; Semina cylindroidea, parva, angulata, utrinque truncata: omnes Tanaceti partes odorem proprium, fortem, minus gratum habent, saporem aromaticum, amaricantem. *Tanacetum vulgare* L. *Blackwell* Tab. 464. Passim per Europam occurrit. Oleum odoratum, flavum, acre & amarum fundit. *Contra Vermes, ad morbos Uteri & Arthritidem commendatur.*

**TARAXACUM**, *Dens Leonis*, *Pissen-Lit*, *Pfaffenrœhrlein*, *Seichblumen*. Radices sub cortice nigricante medullam albam & dulcem includunt; Folia sunt runcinato-pinnatifida, pinnis triangularibus dentatis, leviter amara; Cauliculi nonnisi recentes recipiendi, glabri sunt, cavi, teneri, lacte amaricante turgidi. *Leontodon Taraxacum* L. *Blackwell* Tab. 1. Vulgatissima per Europam plantata. *Multum ad reserandas Obstructiones Hepatis laudatur. Folia tenella primo vere tanquam olus eduntur.*

**TARTARUS**, *Tartaro*, *Tartre*, *Weinstein*. Sal essentialis ex succo Uvarum & Vino secedens, odore levi, sapore acido imbutus, ex Vino albo gryseus, ex rubro ruber evadit, multam aquam, eamque ferventem, ad sui solutionem



exigit, præter Acidum oleofas quoque partes vehit & calcareas. Monspeli aut Venetiis depuratus vulgo sub nomine CRYSTALLORUM TARTARI venit. Sordibus putridis Primarum Viarum, aut morbis Biliosis laborantibus, nec non Hydro-picis exhibetur; datur quoque Cathartico scopo.

TAURUS, Toro, Taureau, Stier. Bos Taurus L. Quadrupes notissimum, cicur per omnem Europam occurrit, asservatur Fel ejus sive Bilis inspissata, vire-scens, amarissima; extus ad Abstergen-dum, intus autem sub inertia Bilis ad ali-quot Grana pro dosi exhibetur.

TAXUS, Tasso, Blaireau, Dachs. Ani-mal quadrupes, supra cinereum, infra nigrum, linea longitudinali nigra, trans aures & oculos ducta notatum. Ursus Meles L. Per omnem Europam indige-na. Axungia ejus reliquorum quadrupedum Axungia colore, consistentia, viribus similis est.

TEREBINTHINA. Balsamum tenax, ceteris Resinis liquidis spissius, varii, pro arboris unde obtinetur diversitate, odoris saporis amaricantis & resinosi, pellucens, magis minusve dilute flavum, uberem Olei admodum odorati, olidi & acris copiam fundit, cum Aqua co-cta solidescit. Argentoratensis reliquis, si Chiam exceperis, spissior, flava, abie-gnum odorem spirans, colligitur ex ve-siculis epidermidis Pinus Piceæ L. Eu-ropeæ temperatæ arboris. Chia vel Cypria proxime ad consistentiam siccam acce-dit, alba cum vestigio flavedinis, sua-veolens, nec amara, nec acris, destil-lat ex vulnerata Pistacia Terebintho L. Blackwell Tab. 478. Europæ Australis, Asiæ & Africæ indigena, apud nos in frigidario contra hyemen defendenda. Communis sequente spissior, turbida, rufi fere coloris, odoris minus grati, tædæ haud absimilis; obtinetur ex fauciata Pinu Sylvestri L. Non raro ipsi substi-tuitur spuma, quæ Resinæ inter depu-randum supernatat, in lebetæ cocta & Oleo Templino permixta, Veneta reli-quis omnibus liquidior, pallide lutea, levius & minus grate odorata, amari-cans, profluit ex fauciata Pinu Larice L. Blackwell Tab. 477. in altioribus

Europæ temperatæ montibus crescente. Reliquarum Resinarum vires exserit, exoti-cis mitior. Ad Abstergendum & Consoli-dandum tam intus quam extus exhibetur; Diuretico quoque scopo datur. Oleum Aquæ ope inde destillatum, cum totum pellu-ccat, Spiritus nomine venire solet, cum Sanguinem multum exæstuet & validissime in Renes agat, nunquam intus dandum est; extus potenter Resolvit, partes Membrana-ceas Roborat, Vulneratos Nervos & Ten-dines Consolidat, Putredinem arcet, Hæmor-rhagias sistit.

TERRÆ SIGILLATÆ. Argillæ varii coloris, in massas variæ figuræ ut plu-rimum rotundas vel cylindraceas effi-ctæ, variisque sigillis notatæ. Denomi-nantur vel a patria, vel a colore, vel a sigillo. Inertes omnino terræ pene in uni-versum eviluerunt.

TESTUDO, Testuggine, Tortue, Schild-kræte. Amphibium quadrupes, carne molli, capite & pedibus verrucis obse-sis, testa tegitur dura, variis maculis distincta. Testudo orbicularis L. in Gal-lia Meridionali & Italia occurrit. Ca-pite & Pedibus rejectis ex Aqua coquitur. Phthificis maxime, nec non Humoribus acri-bus Demulcendis a nonnullis magnopere com-mendata.

TERTIANARIA, Toque, Fieberkraut. Folia petiolata, cordato-lanceolata, ob-tusiuscula, dentata, leviter rugosa, odo-ris minus grati, saporis amari. Scutel-laria galericulata L. Crescit per omnem Europam. A quibusdam contra Febres In-termittentes commendabatur.

THALICTRUM FLAVUM, gelbe Wiesenraute. Radices extus fuscæ, rugis transversis distinctæ, intus luteæ, sapo-re leviter amaricantes. Thalictrum fla-vum L. Passim per Europam obvium. Contra Iterum ei tribuuntur vires.

THEA BOHEA. Folia paulum con-torta, siccissima, ut plurimum diffracta, ad colorem nigrum vergunt, gratissi-mum odorem Rosæ vicinum spargunt, amariuscule sapiunt. Thea Bohea L. Blackwell Tab. 352. Chinæ, Siam, Ja-poniæ indigena arbuscula, nobis per hye-nem in caldario servanda. Plures ejus, quæ



quæ prostant, varietates vel variæ folia colligendi rationi, vel mangonio originem debent. *Minori dosi quam sequens recipitur, validius quoque Adstringit.*

**THEA VIRIDIS.** Folia viridia, contorta, pro diversa varietate, variæ magnitudinis; quin suavitas etiam odoris ad Violas accedentis in diversis evidenter diversa est, sapor aliquid acerbi habet. Thea viridis L. Chinæ arbuscula, nobis ad hyemem in frigidario tuenda. Innumeræ ejus varietates tam a colligendi modo, quam a mangonio pendent. Circa medium superioris sæculi Thea in Europa usurpari cœpit. Ratio, qua ab Europæis assumitur, evincere videtur, Infusi ejus effectus Aquæ calidæ potius quam foliis esse adscribendos.

**THLASPI**, *Senape salvatica, Baurensenf.* Siliculæ orbiculatæ, late marginatæ, compressæ, apice bifidæ, feminibus ovatis, obtusis, rubicundis, bruneis fœtæ, fortis, nauseosi, alliacei odoris, sapore acres. Thlaspi arvense L. *Blackwell* Tab. 68. Vulgare per Europam. *Urinam & Menses movere, Abscessus internos aperire quibusdam dicitur. Tota planta efficax contra Curculiones & Cimices habetur.*

**THYMIAMATIS CORTEX**, *Thuris Cortex, Thus Judæorum.* Frusta ex squamis lineis, sibi irregulariter incumben- tibus & substantia pulverulenta, resinosa, quasi conglutinata, ex fusco rufescentia, odore fragrante, sapore leviter aromatico, vix amaricante instructa, accensa gratissimum odorem spirant, usta in carbonem & cinerem redigi patiuntur. Ex India nobis veniunt; a qua arbore desumantur, nescimus. *Tantum ad Suffitus adhibentur.*

**THYMUS CRETICUS.** Folia habet lanceolata, basi latiora, ad marginem levissime ciliata; Spicas subrotundas, obtusas, bracteis majoribus, imbricatis, albidis, ciliatis distinctas, Floribus ornatas labiatis, violaceis, odore fragrans, sapore aromaticus. Satureja Capitata L. Europæ calidæ & Orientis, apud nos per hyemem in frigidario asservanda.

**THYMUS VULGARIS**, *Timo, Thym, Thymian.* Cauliculi ramosi, lignosi, ob-

folete tetragoni, pubescentes; Foliolis petiolatis, ovali-oblongis, albidis, Floribus labiatis, exiguis, verticillatis, odore grato, sapore linguam pungente præditi. Thymus vulgaris L. Europæ calidæ & Orientis, nostratis hyemis patientissima planta. Oleum inde odoratum, quin etiam Camphora obtenta est. *Vires habet cum reliquis plantis aromaticis communes; condimenti loco in culinas recipitur.*

**TIGLIA GRANA**, *Pineæ purgantes, Pignons d'Inde.* Cataputia majore minora, obtuse triangularia, una facie plana, sub cortice nigro, flavo-rufescente nucleum includunt albidum, pinguem, tennerrima cuticula tectum, ejusdem ac Cataputia acrimoniæ. Croton Tiglium L. Indiæ propria arbor, nobis nonnisi in tepidario fervanda. Oleum fundere dicitur unguinosum, acerrimum, aliquot solummodo guttis Alvum ducere valens. *Vires cum Cataputia eadem.*

**TILIA**, *Tiglio, Tilleul, Linden.* Flores albi, calice quinquesido & quinque petalis ornati, pedunculis sustentantur ex peculiari foliorum genere oblongo, albedo-virente, obtuso, integerrimo protrusis; recentes fragrantissimi, exsiccati, inodori, insipidi sunt. Tilia Europæa L. *Blackwell* Tab. 469. Vulgaris per Europam arbor. *Florum recentium laus in vi Nervina ponitur; exsiccatorum vis omnino nulla est.*

**TOLUTANUM BALSAMUM**, *Balsamo di Cartagena, Beaume de Chartagene,* Balsamum Balsamo de Mecca vix spissius, aurei coloris, odoris grati, saporis Balsamo de Mecca paulo acrioris. Prostat quoque siccum testis cucurbitaceis inclusum. Tolvisera Balsamum L. Crescit ad urbem Tolu in præfectura Carthagenensi. Oleum odoratum & Flores fundere dicitur. *Vires Balsami de Mecca inde expectantur.*

**TOPASIUS.** Gemma flavo colore splendens, Adamante. Rubino & Saphiro mollior, in igne colorem amittit & in lamellas secedit, varie figurata reperitur. Borax Gemma flava Topasius L. in Oriente, Brasilia & Saxonia nascitur. Fluor ei vulgo spathosus flavus



*Waller. Muria lucida flava L. passim in Europa obvia, substitui solet. Sunt, qui vires ei Cephalicas & Cordiales tribuant.*

**TORMENTILLA.** Radices nodosæ, quasi tuberosæ, circum undique plurimas fibrillas emittentes, extus ferrugineæ, intus pallide rubræ, inodoræ, adstringentes. Tormentilla erecta L. Crescit ubique per Europam. *Ad Decocta Adstringentia tam interne, quam externe adhibetur.*

**TRAGACANTHA.** Gummi album, fragile, sub dentibus lentescens, inodorum, insipidum, formam mox vermium, mox filorum in se revolutorum, mox granorum refert. Quæ in Sorten dicuntur Frustra colorata, sordibus inquinata, quæque ipse, sub nomine Gummi de Bassora, aliquando accepi, rejicienda sunt. Sponte effluit ex Astragalo Tragacantha L. Orientis & Europæ Australis frutice, apud nos per hyemem in frigidario asservando. Difficulter ignem capit, ardens fœtentem fumum evomit, pars ejus exigua magnam aquæ copiam in mucilaginem vertit. *Tanquam Demulcens & Relaxans præscribitur, Mucilago inde parata est commune constituens plurimorum Trochiscorum.*

**TRAGOPOGON,** Barba di Becco, Barbe de Bouc, Bocksbart. Radix fusiformis, sub cuticula flava albam & dulcem carnem includit Tragopogon pratense L. Vulgaris per Europam planta. *Scopo Aperiendi a quibusdam exhibetur.*

**TRIBULI AQUATICI,** Tribolo acquatico, Cataignes d'eau, Wassernusse. Noces Castaneis minores, quatuor alis acutis instructæ, sub cortice nigro, duro includunt Nucleum cordiformem, album & dulcem. Trapa natans L. Passim per Europam & Asiam occurrit. Viribus cum Castaneis equipollere videntur.

**TRICHOMANES,** vide **ADIANTHUM RUBRUM.**

**TRIFOLIUM,** Trifoglio, Trefle. Klee. Flores papilionacei, albi, calyce quinquefido sustentati, levissime odorati, insipidi. Trifolium repens L. Vulgare per Europam. A nonnullis contra Fluorem album ejus Infusum commendatur.

**TRIFOLIUM FIBRINUM,** Trifolium

*Aquaticum, Trifoglio acquatico, Menyanthe, Biberklee. Folia petiolata, ternata, foliolis majusculis, ovatis, firmulis, inodoris, intense amaris. Menyanthes trifoliata L. Blackwell Tab. 474. Passim per Europam offenditur. Oleum odoratum largiri dicitur. Contra Scorbutum, Obstructiones Abdominales & Arthritidem efficax habetur.*

**TRIPOLITANA TERRA,** Tripoli, Tripoli, Trippel. Terra arida, sicca, albida & flavicans, in tenerrimum pulverem conteri patiens, aspera & scabra, siticulosa, contactu inquinans, cum Acidis non effervescens, igne indurescens, inodora, insipida. Argilla Tripolitana L. Passim in Europa reperitur. A quibusdam Intertrigini inspergitur, poliendis potissimum Metallis inservit.

**TUNICA,** Viola, OEillet, Grasblume, Nelke. Florum petala, calyce exempta, unguibusque recisis, obovata, rotundata, ferrata, saturate rubra, gratissimum, Caryophyllis aromaticis proximum odorem spirantia, gustu dulcia. Dianthus Caryophyllus L. Blackwell Tab. 85. In Europa Meridionali & Archipelago spontaneus, apud nos in hortis copiose colitur. *Recentes Flores Analepticas vires habent, exsiccati leniter Adstringere creduntur.*

**TURPETHUM.** Cortices longitudine fere digitum, crassitie lineam æquant, striis longitudinalibus, nigris, resinosis notati, extus cinereo-fusci, intus magis albicantes, inodori, insipidi. Interdum prostant Radices ex capite ad quatuor pollices crasso in corpus cylindroidem excrecentes, rugis longitudinalibus notatæ, hinc inde rimis fissæ. Convolvulus Turpethum L. Crescit in India. Olim scopo Cathartico in substantia ad Drachmam unam, in Infuso ad Unciam dimidiam dabatur.

**TUSSILAGO,** videatur **FARFARA.**

**TUTIA.** Substantia laminarum instar formata, friabilis, grysea, fornacum, in quibus Zinci minera funditur, lateribus adhærens, insipida & inodora. Est ipsum Zincum, sed exustum variisque sordibus pollutum. *Tanquam Exsiccans ad Intertriginem, tanquam Discutiens ad morbos Oculorum adhibetur.*



**VALERIANA**, *Baldrian*. Radix ex capite brevi, crassiusculo cavitatem unde caulis prodierat servante innumeras fibras filiformes circum undique emittens, extus fusca, intus alba, odorem fortem, Nardi similem spirat, saporem exhibet falsum. Valeriana officinalis L. *Blackwell* Tab. 271. Passim per Europam crescit. *Laudatur a virtute nimiam Nervorum Irritabilitatem corrigendi, Vermes fugandi, Oculos roborandi. Datur sub forma Pulveris ad Drachmam unam pro dosi.*

**VANILLA**. Siliqua dimidio pede longior, dimidium fere pollicem lata, utroque extremo producto & obtuso, compressa, striis longiusculis notata, uno margine acuta, altero crassiuscula tenax, quodam quasi oleari splendore nitens, fusca, pulsam granulofam, nigram includens, odoris suavitate Flores Persicorum superans, sapore aromatica. Epidendron Vanilla L. Americæ calidæ proprius frutex. Exsiccatione demum odorata evadit, & exsiccata, ut ætatem ferat, Oleo inungitur. *Ad Capitis æque ac Primarum viarum robur restituendum adhibetur. Præcipue Chocolatæ conficiendæ & condiendis Lacticiniis inservit.*

**VERBASCUM**, *Verbasco, Bouillon blanc, Volkraut*. Folia longa, & lata, decurrentia, crenata, utrinque tomento obsessa, leniter adstringentia; Flores rotati, quinquefidi, levi tomento obfessi, flavi, odore perfusi leni & suavi, sapore dulces. Verbascum Thapsus L. *Blackwell* Tab. 502. Europæ planta, sponte ubique locorum crescit. Flores Oleum odoratum fundunt, succus eorum Saccharum largitur. Folia Emolliendi scopo subinde usurpantur. *Florum Infusum dilutum salubriter contra Pectoris affectus præscribitur, iidem ad Clysmata Emollientia & Anodyna recipiuntur.*

**VERBENA**, *Verbena, Verveine, Eisenkraut*. Folia longiuscula, laciniata, laciniis, denuo laciniatis, amara. Verbena officinalis L. *Blackwell* Tab. 41. Crescit in omni Europa. *Quæ de Verbena Veterum traduntur virtutes, aliarum plantarum laudes sunt, ad poëticas fabulas, unde natæ, relegandæ.*

**VERONICA**, *Veronica, Veronique, Ehrenpreis*. Folia ovata, obtusa, subtiliter hirsuta, crenata, suffuso aromate suave amara, leniter adstringentia. Veronica officinalis L. *Blackwell* Tab. 143. Destillatione Spiritum Urinosum fundere dicitur. *Ad Infusa Pectoralia creberrime recipitur.*

**VICTORIALIS LONGA**, *Allermannsbarnisch*. Bulbus quatuor fere pollicum longitudinem æquans, oblongus, superne paulum contractus, insipidus & inodorus, sub involucri gryleo, reticulari, fibroso, sicco, carnem condit siccatus effœtam. Allium Victoriali L. In Europa temperata provenit. *Ad ridiculos usus olim adhibebatur.*

**VICTORIALIS ROTUNDA**, *runde Siegvurzel, Ackerschwuerdel*. Bulbilli duo eodem ac præcedens involucri tecti, uterque albus, alter alteri insidens, alter ventricosus, inferior minus orbiculatus est, utrinque compressus, radicis exsiccatae sapor dulcis. Gladiolus communis L. Europæ calidæ, nostras hyemes optime fert. *Ad eosdem cum antecedente usus a pinguis ingenii hominibus adhibebatur.*

**VINCA PER VINCA**, *Pervinca, Perwenche, Ingrün, Singrün*. Folia ex ovatis oblonga, acuta duriuscula, inodora amariuscula. Vinca minor L. *Blackwell* Tab. 59. Passim per Europam crescit. *Immiscetur Infusis Pectoralibus.*

**VINCETOXICUM**, videtur **HIRUNDINARIA**.

**VINUM**. Liquor fermentatione ex fructuum horæorum, maxime Uvarum, succo obtentus, destillatione Spiritum inflammabilem fundens, coloris sive albi, sive rubri, in utroque diversorum etiam graduum, quanquam omne Vinum, quod rubrum non est, vulgo album dicitur; proprii ac jucundi pro innumeris varietatibus plurimum variantis odoris æque ac saporis. Sunt quæ Saccharina dulcedine palatum afficiunt Vina, & hæc quidem ut plurimum spissiusculam consistentiam habent. Vina, quæ ex alio, quam Uvarum succo parantur, quæ acida sunt, acerba, turbida, mangonio adulterata, a scopo medicato ar-



cenda sunt : patria omnino differunt ; sed hic plurimæ omnino fraudes obtinent & a certioribus, quæ usus subministrat iudiciis, potius quam a fide cœnopolarum standum est. Vinis rubris semper aliquid adstringentis inest ; alba, si a Gallicis discesseris, nunquam non aliquantulo Acidi linguam afficiunt. Vina Saccharina Dulcedine plena ex Orientis regionibus ex Europa etiam Orientali, Occidentali & Meridionali nobis missa, vel ex Uvis passis, vel ex musto, varia ratione aliquanta aquæ partē privato, parata, reliquis fortius Caput petunt, non tam ob largius Alcohol, quam ob resinofas, quibus abundant, partes. Vehit Vinum Aquam, Alcohol, Mucilaginem & Tartarum. Coctione semper accescit. *Sitim sedat, motum Spirituum & omnium Humorum intendit, fibras Primarum viarum roborat, Putredinem arcet, Excretiones aquosas promovet, extus Refocillat, Roborat, Discutit.*

VIOLA, *Viola, Violette, Viole*. Folia, quæ *Violaria* dicuntur, sunt cordata, glabra, obtusa, inodora, insipida ; Flores pentapetali, irregulares, in cornu formam curvati, cærulei, suavissimo odore, sapore dulci ; Semina parva, rotunda glabra, alba, *Viola dorata* L. *Blackwell* Tab. 55. Crescit passim per Europam. Folia olim Emollientibus adnumerabantur, Flores ad Dēmulcendum & ad Alvum leniter ducendam præscribuntur. Semina Diuretica habentur.

VIPERA. Serpens est, pollicem circiter crassa & sesquipedem longa, cervice parva, capite compresso, in dorso flavescente, squamis instructa rhomboideis, gryseo-nigris in catenæ modum connexis, lateribus albis, ventre toto scutis transversalibus notato, cauda terete, conica, acute terminata, odore proprio, sapore nullo. Coluber Berus L. Nobis ex Helvetia & Comitatu Burgundiæ accersitur. Diversis in locis diversæ Colubri species adhibentur. Animal, cujus ictus pessimum venenum venis instillat. *Fusculum, ex Vipera recente, demto capite & cauda, cum menstruo aquoso puratum, multum contra morbos Cu-*

taneos commendatur. *Vipera exsiccata vix aliquid proprii polliceri videntur. Axungia consistentiam Olei unguinosi & spissiusculi, colorem flavum, odorem levem, saporem nullum habet. Commendatur ad Abstergenda Corneæ Ulcera.*

VIRGA AUREA, vid. CONSOLIDA SARRACENICA.

VIRIDE ÆRIS, *Ærugo, Verderame, Verd de Gris, Grünspan*. Adfertur nobis in panibus majoribus viridibus, nauseosum & vehementem Æris odorem spirantibus, acri sapore imbutis. Dera-ditur laminis Cupri, sub fermentatione acetosa corrosis ; optimum Monspeli conficitur. Gratianopoli quoque & in Anglia præparari lego. *Intus nunquam dandum, extus a quibusdam Septico scopo Unguentis adjicitur.*

VISCUM, *Vischio, Glu, Vogelleim*. Massa spissa Unguenti consistentiæ, ex flavo viridescens, tenacissima, minus grati, resinosi odoris, perinde ac saporis, difficulter flammam capit, in Alchole & Oleis solubilis, nequaquam in Aqua. Conficitur ex Illicis Aquifolii L. *Blackwell* Tab. 205. vulgaris per Europam arboris, interno cortice, tundendo in pastam redacta, unde dein resoluta putredine filamenta, affusa aqua, separantur. Olim scopo Rubefaciendi usurpabatur.

VISCUM, *Gui, Mispel*. Surculi lignei, mox recti, mox incurvi, ramosi, sub cortice fusco & rugoso lignum ex rufo-flavescens, leviter adstringens continentes. Viscum album L. *Blackwell* Tab. 184. Parasiticus frutex, qui variis per Europam arboribus innascitur, de Quercubus sumtus reliquis præfertur. *Magna ejus laus est in medenda Epilepsia.*

VITIS, *Vite, Vigne, Rebstock*. Folia quinqueloba, lobis inciso-dentatis, infra pallida, leviter odora, saporis aciduli, non ingrati. Fructus immaturi, *Verjus* dicti, acido & adstringente turgent succo, cui *Omphacio* aut *Agrestæ* nomen est. Ad condimenta ciborum recipitur ; scopo Refrigerandi usurpatur. Vitis vinifera L. *Blackwell* Tab. 152. Colitur per totum orbem temperatum. Roborandi causa Balneis adji-



*adjiciuntur folia. Succus ex Uvis expres-*  
sus, *Mustum, Mout, Most* dictus, turbi-  
dus est, viscidus, dulcis, proprii odo-  
ris, coctione spissitudinem & aciditatem  
nanciscitur; ad dimidias coctum Mustum  
*Raisiné, Sapa, VVeinmus*, ad trientem  
si evaporarit *Defrutum* appellatur; inter-  
dum condimenti loco cibus adjicitur. Uva-  
rum pressarum *Vinacea, Marc, Trabern*  
cum & Vinum & adstringentes Uva-  
rum pelliculas contineant, ad *Roboran-*  
dum *Balneis* adjiciuntur. Circa Uvas con-  
ferantur Passulæ.

VITIS IDÆA, videantur MYRTILLI.

VITRIOLUM ALBUM, *Vitriuolo bian-*  
co, *Galitzenstein*. In majoribus exiguarum  
crystallorum concretarum massis, Sac-  
charo in panes formato similibus pro-  
stat, sapor nauseosus adstringens est.  
Vitriolum album L. Paratur Goslariæ ex  
glebis ustulatis, aqua lixivatis; Sal, ne  
in majores crystallos concreseat, fusus,  
donec refrigerit, agitur. Præter Zin-  
cum & Plumbum Æs quoque vehit; qua-  
propter internum ejus usum, quamvis sint,  
qui ad viginti quinque grana Vomitorio sco-  
po laudent, nullatenus tamen equidem com-  
mendare ausim. Aqua dissolutum Ophthalmicæ  
medetur.

VITRIOLUM CÆRULEUM vel de  
Cypro. Pulcherrimas crystallos cæruleas  
refert, valde nauseoso sapore linguam  
afficit, imo evidenter rodit. Vitriolum  
Cyprinum L. Passim per Europam, sive  
ex Gleba Cupri pyritosa, sive Æs cum  
Sulphure calcinando paratur. *Vi corrosi-*  
*va reliqua Vitrioli genera superat, nec nisi*  
*ad usus externos recipitur.* Calcinatum PUL-  
VIS SYMPATHETICUS est. Quondam  
egregie a quibusdam celebratus, hodie meri-  
to rejectus.

VITRIOLUM VIRIDE vel vulgare.  
Crystalli virides, proprii, sed non fortis  
odoris, gustu falsæ & adstringentes, in  
aëre aut calore in pulverem ferrugineum  
dilabentes. Existit vel Nativum vel in  
Crystallis concretum, Vitriolum Martis  
L. vel tomenti aut pulveris instar exter-  
ra lapidibusve efflorescens, varie colora-  
tum Vitriolum Atramentarium L. rufum  
CHALCITIS nominatur, cinereum SO-

RY, nigrum MELANTERIA, flavum  
MISY; denique ex resoluta etiam Pyri-  
ta Ferri L. arte paratur. Rarissime pu-  
rum tabernas intrat, vix non semper  
Ære plus minus inquinatum. Minus bene  
a patria distingui in *Inst. Mat. med.* p. 447.  
monui. Ad usus internos nunquam, nisi  
prius cum Ferro coctum, eoque ab omni  
labe Cuprea purgatum, quod cum Vi-  
triolo Martis P. II. definiendo, unum  
idemque est; extus ad *Medicamenta Ad-*  
*stringentia* adhibetur.

VITRUM, *Vetro, Verre, Glas*. Sub-  
stantia pellucida, rigida, inodora, insi-  
pida, vulgo ex terris vitrescentibus &  
Sale Alkali fixo fusionis ope confecta,  
frangendo in frusta scindentia dilabens.  
Quædam Vitra Arsenicum, quædam  
Plumbum recipiunt, utraque humano  
corpori, utcumque demum applicentur,  
periculum afferunt. *Vitrum in frustis deglu-*  
*titum, ad Primas vias venenorum mechani-*  
*corum tragædiam utique aget; in tenerimum*  
*pulverem redactum plebecula Umbilico In-*  
*fantum imponere solet scopo Anthelmintico.*

ULMARIA, videatur BARBA CA-  
PRÆ.

UMBILICUS MARINUS, *Fava mari-*  
*na, Faba marina, Meerbohne, Nabelstein*.  
Testa rotunda, inferne plana, obscurius  
colorata, margine rotundato, albo ter-  
minata, superne convexa, nitida, rubro-  
dilute flavicans, fovea notata, cujus mar-  
gines inæqualis crassitiei sunt & in qua  
tuberculum album, semipellucidum obti-  
net, insipida, inodora. Est operculum  
Cochlearum Maris Mediterranei. *Absor-*  
*bens olim & Adstringens habebatur.*

UNICORNU FOSSILE, videatur  
EBUR FOSSILE.

UNICORNU VERUM, *Liocorno, Li-*  
*corne, Einhorn*. Dens variæ magnitudi-  
nis, vel octo pedes non raro exceden-  
tis, ex basi latiuscula longe cylindricus,  
in fine sensim angustatus, ex fibris spi-  
raliter intortis efformatus, sub cortice  
flavicante albissimam substantiam con-  
dit. Monodon Monoceros L. Ceti spe-  
cies Maris Septentrionalis cujus bini sunt  
in maxilla superiore ejusmodi dentes.  
*Vires Alexipharmicæ & Antispasmodicæ, qui-*



bus medio ævo celebrabantur, deinceps experientia iudice his dentibus sunt ademptæ.

ULMUS, Olmo, Orme, Rusten. Cortex intermedium, albidus tenax, odoris expers, saporis levissime amaricantis. Ulmus campestris L. Arbor per Europam vulgaris. Decocto multum efficaciæ ad Scabiem inveteratam medendam tribuitur.

VOMICÆ NUCES, Krähenaugen. Nuclei rotundi, utrinque vel compressi, vel levissime convexo-plani, villosi, gryseo-albidi, intus cornei, valde tenaces, inodori, amarissimi. Strychnos Nux Vomica L. Blackwell Tab. 395. Indiæ arbor. Vario quadrupedum generi certissimum venenum, hominibus quidem hæc nuces contra Pestem, Dysenteriam, Hydrophobiam &c., ad Scrupulum unum dandæ, magnopere quondam commendabantur, sed usum ejus internum, cum convulsivos motus excitasse, imo necasse homines, Observatores testentur, commendare nollem.

URSUS, Orso, Ours, Bær. Animal quadrupes fatis notum, victu & vegetabili & animali utens. Ursa Arctos L. frigidior Europam inhabitat. Axungia Porcinæ &c. & colore & consistentia & viribus similis; vulgo ad crinium incrementa laudatur.

URTICA, Ortica, Ortie, Nessel. Folia petiolata, cordata, ferrata, pilis rigidis utrinque obsessa. Semina ovata, sub cortice fragili, nitente, spadiceo medullam albam, dulcem includunt. Urtica dioica L. Copiosa per Europam. Folia olim Rubefaciendi gratia adhibebantur; Seminibus virtus Diuretica tribuitur.

UVA URSI, Boufferole, Steinbeere. Folia petiolata, ovata, oblonga, obtusa, integerrima, duriuscula, supra viridia, rugosa, subtus pallida, inodora, cum quadam amaritie adstringentia. Arbutus Uva Ursi L. Fruticulus passim per Europam obviis. Folia dantur sub forma Pulveris ad Drachmam unam, cum aquæ Unciis duodecim decocta ad Drachmas duas contra affectus Nephriticos.

VULPES, Volpi, Renard, Fuchs. Animal quadrupes, carnivororum proprio fœtore notum. Canis Vulpes L. Orbis antiqui vulgare animal. Pulmones cum tra-

chea exsiccati, nauseosi saporis & odoris olim ad affectus Pectoris laudabantur.

VULVARIA, Arroche puante, kleine Mistmelten. Folia parva, rhombo-ovata, acuta, integra vel sinuata, farina quasi conspersa, foetidissimum Urinæ putrescentis odorem, saponem falsum habent. Chenopodium Vulvaria L. Passim per Europam crescit. Hystericarum Umbilico imponitur.

UVULARIA, Laurus Alexandrina, Zäpfleinkraut. Folia ovato-oblonga, acuta, petiolata, nitidiuscula, in medio foliolum lanceolatum, acutum, fructificationem tegens emittentia, sapore amaricantia. Interdum ad Gargarismata adhibetur.

VVINTERANUS CORTEX. Frusta aliquot Pollices longa, Canella alba crassiora, convexo-concava, non convoluta, colore cinamomeo, odore grate aromatico, sapore linguam pungente. Arborem, unde desumitur, in freto Magellanico crescentem primus Fothergill in Medical Observat. by a Society of Physicians T. V. descripsit. Drymis Vvinteri Forster Nov. Act. Upsal. T. III. p. 182. Ob virtutem potissimum Antiscorbuticam laudatur; Canella ei alba ut plurimum substituitur.

XANTHIUM, Zappola minore, petit Glouteron, Bettlerlaus. Folia hirsuta, ovata, inferne angustata, leviter lobata, lobis irregulariter dentatis, amara. Xanthium Strumarium L. Blackwell Tab. 444. Occurrit per omnem Europam. Succum ad Sanguinem Depurandum & contra Scrophulas commendant.

ZEDOARIA, Zettovario, Zittover. Radices tuberosæ, oblongæ, aliquot pollices longæ, minimum digitum crassæ, levibus rugis & tuberculis obsessæ, extus gryseæ, intus rufæ, odore perfusæ proprio, ad Camphoram accedente, sapore acri, amaricante. Kampferia rotunda L. Blackwell Tab. 399. Crescit in Madagascar & India. Oleum odoratum spissum largiri dicitur. A vi Roborante & Incidente laudatur.

ZIBETHUM. Substantia consistentiæ Unguenti, albida, odoris proprii, fortissimi; quo propior bruneo color ejus, est,



est, eo vilius habetur. Est Unguen, quod ex propriis receptaculis inter officina Sexus & Ani Viverræ Zibethæ L. Arabiæ & Indiæ Orientalis indigenæ, & Civette Buffon, Guineam inhabitantis, cochlearis ope hauritur. Unguen, quod hodie carissime constat, medicamentis externis odoris gratia immiscebatur, quem exigua ejus portio magno substantiæ, cui adjicitur, volumini impertit. Nostra ætate hic odor minus, quam olim, naribus acceptus est. Adhibetur adhuc ad capturam piscium.

ZINCUM, Zinco, *Splinter*. Semimetallum nec malleabile, nec in pulperem pistillo regidi patiens; diffractum strias vel laminas ostendens, ad cæruleum colorem paululum vergentes; fustum flamma cærulea ardet in Flores albos abiturum. Flavo colore Cuprum tingit, in omnibus Acidis solubile. Obtinetur ex vario glebarum genere, terræ potius, quam mineræ formam habente. Larga

ejus copia ex India Orientali mittitur, quædam Goslaræ paratur. Nonnisi sub forma Mineræ aut Florum ad usus medicatos recipitur.

ZINZIBER, Zenzero, Zingiber, Gingembre, Ingber. Radices tuberosæ, lobatæ, lobis varie figuratis, omnibus rotunde terminatis, intus ex rufo flavæ, extus flavescentes, odoris proprii, saporis insigniter acris & aromatici. Rubræ, quarumque superficiem terra tegit, a vermibus perforatæ rejiciendæ sunt. Amomum Zingiber L. *Blackwell* Tab. 402. Indiæ Orientalis, unde in Americam fuit delatum, ubi hodie copiose colitur. Apud nos in vaporario asservandum. Oleum odoratum fundere observatum est. Recentes quoque radices in India conditæ asservantur. Piperis vires, sed mitiores edit: extus ad Apophlegmatismos recipitur; cum successu Uvula a muco tumenti applicatur; conditum egregie Ventriculo, a causa frigida laboranti, conducit.



PHARMACOPŒA  
GENERALIS

EDITA

A

D. JACOBO REINBOLDO  
SPIELMANN.

*EDITIO PRIMA VENETA,*  
TOMUS SECUNDUS.



V E N E T I I S,

Sumptibus JOANNIS ANTONII PEZZANA.


---

M D C C L X X V.

*SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.*



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY



PHYSICS DEPARTMENT  
530 CHICAGO  
ILLINOIS 60637  
TEL. 733-4331



RECEIVED  
JAN 10 1964

PHYSICS DEPARTMENT  
530 CHICAGO





## ACETUM.

**A** Cetorum genera, quæ in Officinis asservantur, parantur Vegetabilia exsiccata & comminuta octuplo circiter boni Aceti infundendo, & usus tempore tantum inde decantando, quantum in usum recipere lubet. Talium Acetorum vires ex viribus Aceti & Vegetabilium Aceto infusorum compositæ sunt. Ut plurimum extus, sive scopo Analeptico, Naribus admoventur, sive aliis usibus tanquam Fomentationes inserviunt; intus quoque quædam cochleatim exhibentur. Quidam etiam Acetum Vegetabilibus infusum destillare, & destillatum in usum trahere solent. Frequens, qui in Officinis obtinet, Acetorum numerus, ex quo morbi Maligni Exanthematici strages edere cœperunt, obtinuisse videtur. Simplicium Acetorum deletus a Medicis & ab usu recepto pendet.

**ACETUM ANTISEPTICUM** *Parif. vulgo Aceto dei quattro Ladroni, Vinaigre des quatre Voleurs.*

**Rx.** Herbarum Absynthii uncias tres,  
Rorismarini,  
Salviæ,  
Menthæ,  
Herbæ Rutæ ana unciam unam semis,  
Florum Lavendulæ uncias duas,  
Spicarum Allii Drachmas duas,  
Radicum Calami Aromatici,  
Cinnamomi,  
Caryophyllorum,

Nucis Moschatæ ana drachmas duas:  
Incisa probe misceantur & infundantur calore justo, in vase clauso per duodecim dies,

Aceti optimi centum octo & viginti unciis.

Cum forti expressione colatis & filtratis addatur

Camphoræ Spiritu vini solutæ Semuncia.

Asservetur vase probe clauso.

*In Peste Massiliensi hoc medicamentum scopo Prophylactico multum celebrabatur, partes corporis aëri expositas eo lavabant, ejus suffitu vestes imbuebant, & conclavia infumabant, intus quoque cochleatim illud assumebant.*

## ACETUM AROMATICUM *Klein.*

**Rx.** Radicum Zedoariæ,  
Galangæ ana semunciam,  
Herbarum Rorismarini,  
Rutæ,  
Mari veri,  
Florum Lavendulæ ana drachmas duas,  
Corticum Citri recentium,  
Caryophyllorum Aromaticorum,  
Cubebarum,  
Cardamomi minoris ana semunciam:  
Comminuta misceantur & immittantur  
Aceti optimi unciis quadraginta  
Liliorum convallium,  
Tunicæ ana unciis duabus.

Asserventur in vase probe clauso.

*Tanquam Odoramentum adhibetur, & Resoeillandi ergo Naribus admoventur, Epithematibus Cordis & Pulsuum inspergitur.*



## ACETUM BEZOARDICUM

*Wirtenbergenſium.*

℞. Radicum Angelicæ,  
 Enulæ,  
 Imperatoriæ,  
 Hirundinariæ,  
 Zedoariæ ana drachmas ſex,  
 Herbarum Scordii,  
 Rutæ,  
 Salviæ ana unciam unam,  
 Baccarum Juniperi unciam ſemis,  
 Corticum Citri drachmas ſex:  
 Minutim incifis affundantur

Aceti optimi uncia ſex & triginta,  
 Poſt digeſtionem per aliquot dies ex-  
 primantur & filtratum Acetum repona-  
 tur ad uſum, in vitro probe clauſo.

*In morbis Contagioſis, præcipue Peſte,  
 tam internum quam externum huius medi-  
 camenti uſum ad Odoratum & Collutionem  
 oris commendant; ab uncia dimidia ad in-  
 tegram propinatur.*

## ACETUM CAMPHORATUM

*MAJUS Richard.*

℞. Camphoræ drachmam unam.  
 Teratur in mortario lapideo cum  
 Spiritus vini rectificati guttis viginti,  
 Sacchari albi unciis duabus,  
 Probe tritis affundantur  
 Aceti vini optimi uncia decem;  
 Mixta aſſerventur.

*Medicamenti Antiphlogiſtici eximii un-  
 cia ſemis omni triborio præſcribitur.*

ACETUM CHALYBEATUM *Fuller.*

℞. Aceti optimi uncias duodecim,  
 Limaturæ Chalybis unciam unam:  
 Fiat infuſio triduana frigida, dein co-  
 letur Liqueor.

*Adhibetur parando Oxymelli Chalybeato.*

ACETUM COLCHICUM *Stærck.*

℞. Radicis Colchici recentis, Autumno  
 collectæ & in taleolas tenues ſectæ un-  
 cias duas,

Aceti optimi uncias duodecim:

Macerentur in lagenâ vitrea per qua-  
 tuordecim dies, ſæpius liquorem agitan-  
 do; dein coletur levi expreſſione Acetum  
 & ſervetur ad conficiendum Oxymel.

ACETUM CONCENTRATUM *Stahl.*

Hyeme exponatur Acetum frigori gla-  
 ciali in vaſe terreo ampliori, relinqua-  
 tur omnis portio in glaciem verſa,  
 quod remanſit & ablata aqua admodum  
 acre evaſit, aſſervetur.

*Ad Chemicos potius quam ad Clinicos  
 uſus adhibetur.*

## ACETUM CONCENTRATUM

*Westendorf.*

℞. Cryſtallorum Sodæ, quantum volue-  
 ris, cum Aceti deſtillati quantitate  
 ſufficiente ſaturetur; ſolutio ſaturata  
 leni calore inſpiſſetur, & commit-  
 tatur Retortæ, vitreæ, cui ea ſit am-  
 plitudo, ut dimidiam modo ejus  
 partem materia occupet; tunc ſub  
 perpetua retortæ commotione pede-  
 tentim inſtilletur Olei vitrioli ejus  
 ponderis dimidium, applicetur ce-  
 leri manu Excipulum ventricolum,  
 roſtro Retortæ veſica madida jun-  
 gendum; leni multum igne inſtitua-  
 tur deſtillatio tam diu continuanda,  
 quamdiu aliquid vaporis prodire ocu-  
 li diſcernunt. Reſiduum iteratis ſo-  
 lutionibus & filtrationibus depuratum  
 Salem mirabilem Glauberi eſſe fa-  
 cile patet.

*Acetum concentratum hac ratione paratum  
 priore omnino fortitus, reliquis autem, quo-  
 rum apud Chemicos mentio ſit, multo &  
 gratus & ſincerius.*

*Evicit Clariſſ. Westendorf, hoc Acetum  
 vires omnes Vulgaris multo efficacius edere,  
 ob majorem qua gaudet penetrabilitatem,  
 quam ejus odor evidentiffime evincit, imo  
 in morbis Putridis etiam illi multum præ-  
 ferendum eſſe, quia Humorū diſſolutioni  
 quoque medetur. Datur ad drachmam unam  
 multa aqua dilutum. Eximios effectus Ana-  
 lepticos edit, ſi Naribus admoventur.*



## ACETUM DESTILLATUM,

*SPIRITUS ACETI Parisiensium.*

Acetum immittatur five Retortæ vitreæ five Vesicæ æneæ, nullum enim contagium ab hoc Aceto surgere, evici in *Instit. Chem. Exper.* 55. ubi largior quantitas Aceti destillavit, crebrius liquor prodiens Naribus est examinandus, & quam primum odor empyreumaticus observatur ab ulteriori destillatione est desistendum. Primus, qui obtinetur, liquor, vulgo *Phlegma* dicitur & jubetur rejici; sed ego nunquam evidentiorē inter illum & reliquum differentiam potui observare. Residuum ab hac destillatione Tartarum lagiri a Chemicis est annotatum.

*Destillatione Acetum & Olei & Acidi portione privatur, hinc ejus vires imminuantur omnino; adhibetur ad omnes morbos, ad quos Acetum commune laudatur.*

## ACETUM HYSTERICUM Ludovici.

℞. Spiritus florum Liliorum convallium unciā unā,  
Olei destillati florum Lavendulæ Drachmas duas,  
Aceti Rutæ unciā unā,  
Essentiæ Castorei Drachmā unā.  
Misceantur.

*Inservit pro Odoramento vel Fotu Corporum & Temporum.*

## ACETUM ODORATUM

*Wirtenbergenfium.*

℞. Radicum Cyperi rotundi,  
Galangæ minoris,  
Zedoariæ aāa unciā semis,  
Herbarum Rorismarini,  
Salviæ,  
Florum Lavendulæ,  
Florum Liliorum Convallium recentium,  
Rosarum rubrarum,  
Ligni Rhodii,  
Cinnamomi,

Caryophyllorum Aromaticorum,  
Corticum Citri recentium ana drachmas duas:

Incisis superfundantur

Aceti optimi unciæ quatuor & viginti.

Post triduanam digestionem filtretur.

*Usus ejus est externus pro Odoramentis & Epithematibus ad Pulsus, reficit atque spirituosus longe præferendum est.*

## ACETUM SATURNINUM Basil. Valent.

*DECOCTUM SATURNINUM Kleinii.*

℞. Lithargyrii subtiliter triti uncias duodecim,

Aceti optimi uncias triginta & sex.  
Coquantur, lento igne, ad dimidiæ partis consumptionem, sub continua cum spatula lignea agitatione; liquor filtretur.

*Ad Inflammationes, Ulcera maligna exsiccanda & Affluxum Humorū prohibendum applicari solet, caute tamen adhibendum est, ne usus ejus externus clanculum interne Phthisin inducat.*

## ACETUM SCILLITICUM Pythagore.

℞. Radicis Scillæ præparatæ & minutim incisæ uncias octo,

Aceti optimi uncias nonaginta sex.  
Digerantur leni calore per octiduum, forti expressione coletur Acetum & dein filtretur.

*Hoc Medicamentum adhibetur in Pectoris Infarctu viscido expediendo, Tussi difficili, Asthmate humido; gravitatem Auditus a Pituita ortam Gargarisatione discutit, a drachma una ad unciā dimidiā exhibeatur. Rarius per se præscribitur, maxime adhibetur ad parandum Oxymel.*

## ÆRIS FLORES Basil. Valent.

℞. Viridis Æris, quantum volueris.

Pulverisatum dissolvatur in sextuplo Aceti destillati, dissolutum filtretur, ad cuticulam evaporetur, & reponatur ut in Crystallōs concrefcat.



Rarus est hujus preparati in Medicina usus, a Pictoribus & Mechanicis frequentius expetitur, usus ejus internus ab Helvetio juniore aliisque contra Læm præsertim veneream impense commendatus merito penitus rejicitur.

### ÆS USTUM Galeni.

Æris lamina stratificentur sive cum Sale marino, sive cum Sulphure, sive, præcipiente Oribasio, cum utroque; detineantur in igne satis valido per duodecim circiter horas, sive usque dum laminae totæ friabiles fiant, quæ deinde in pulverem redigendæ sunt; qui rufescit, si Sal communis fuerit adhibitus, nigrescit autem, si Sulphur receptum fuerit.

Usus externus est in Exsiccandis præsertim Ulceribus; medicamentum evidenter Septicum raro hodie usurpatur.

### ÆTHER VITRIOLI.

Videatur Liquor Anodynus.

### ÆTHIOPS ANTIMONIALIS Eller.

℞. Antimonii in pollinem triti partes duas,

Mercurii revificati partem unam:

Terantur in mortario, quod æneum non sit, usque dum omnes globuli Mercuriales disparuerint,

Ad Depurandum Sanguinem plurimum valet.

### ÆTHIOPS MARTIALIS Lemery.

Limatura Martis committitur vasi sive vitreo sive porcellaneo, superfunditur ipsi Aqua, quæ quatuor digitis transversis super eam emineat, quotidie spatula ferrea agitetur, & quando aquæ volumen imminutum observatur, tunc de novo aqua affundenda, ut Ferrum semper illo aquæ volumine tectum sit, quod sub initium laboris erat adhibutum; post elapsam longius temporis intervallum omnem splendorem amittet Limatura & in pulverem nigrum redacta erit, qui

exsiccat & supra Porphyritem lævigatus asservari debet.

Magno hic labore obtinetur Ferrum in tenerrimum pulverem redactum, & omnis rubiginis expers; idem medicamentum acquirimus, quando Limaturam Martis supra Porphyritem in pollinem reducimus, eidem deinde aliquot Olei guttas aspergimus & in Crucibulo ignito Oleum deflagrare facimus, hac ratione redditur Ferro principium inflammabile, quod sub Preparatione perdidit, & pulverem nigerrimum sistit.

Ubi Tonico & Aperiente scopo Ferrum adhibere volumus, Æthiops Martialis omnibus reliquis preparatis palmam omnino præripit. Datur ad Scrupulum unum pro dosi.

### ÆTHIOPS MINERALIS Mayerne.

℞. Argenti vivi revificati Partes duas, Florum Sulphuris Partem unam, Terantur in mortario lapideo, usque dum omnes globuli Mercuriales disparuerint.

Eximie huic Pulveri Sulphurato Mercuriali adscribuntur vires in Tumoribus Glandularum Colli, Exulcerationibus antiquis Fistulosis, Scabie sicca, Febre quartana, & ubi Vermium suspicio est; infanti tenero ad Grana tria vel quinque, adultiori ad Scrupulum dimidium datur & per plures dies absque metu Salivationis ejus usus continuari potest.

### AGARICUS PRÆPARATUS

Brossard.

Agaricus Quercus a cortice externo & substantia filulosa separatus & discissus malleo subjiciatur, usque dum ita mollescat, ut in frusta tenuia discerpi queat.

Historiam hujus Medicamenti in Inst. Mater. Med. p. 415. dedi & monui, quod illi Fomes vulgaris nullo Lexivio salino imbutus substitui possit.

### ALCAHEST Glauberi.

Videatur Nitrum Fixum.

• ALOES



## ALUMEN.

### ALOES DEPURATA, LOTA

*Galen.*

### EXTRACTUM ALOES AQUOSUM.

Aloës Succotrinæ, q. v. digeratur cum aquæ frigidaë duodecuplo per aliquot dies, liquor decantatus & colatus leni calore in consistentiam Extracti evaporetur.

Si loco aquæ Succus Florum Cordialium recipiuntur, surgit ALOES INSUCCATA, si Infusum Florum Rosarum, ALOES ROSATA, cum Infuso autem Florum Violarum ALOES VIOLATA.

Hoc Medicamentum longe securius, promptius & minori quantitate sumtum Aluum laxat quam integra Aloes, qua quoque præstat, quia liberatum est à resinosa substantia, Hemorrhoidalium motuum sæpius causa, qui frequentiore Aloëticorum usum sequuntur. Grana octo sufficiunt pro Alvo stimulanda, pro Laxanda vero vel drachma semis dari potest. Aloes Insuccata, Rosata, Violata jure evolverunt.

### ALUMEN SACCHARINUM

*Brassavole.*

℞. Aluminis crudi uncias sex,  
Cerussæ Venetæ drachmas sex,  
Vitrioli albi drachmas tres,  
Sacchari albissimi unciam unam semis,

Fiat omnium pulvis subtilissimus, qui Albumine ovorum in pastam reducatur, unde parvi coni efformentur, qui exsiccati charta cœrulea obvolvuntur.

Usus præcipuus est in Collyriis & Cosmetics, Detergit & Carnem luxuriantem auferit.

### ALUMEN TINCTUM *Mynsichti*, correctum ab *Helvetio*.

℞. Aluminis rupei uncias duas:  
Fundantur in vase ferreo & adjiciatur  
Pulveris Sanguinis Draconis uncia  
una:

## ANTIMONII.

Ex massa semi refrigerata formentur celeri manu Pilulæ exiguæ.

In sistendis Hamorrhagiis eximias vires magni Viri inde experti sunt. Dosis interdum ad dimidiam drachmam usque extenditur.

### ALUMEN USTUM *Dioscoridis*.

Alumen vasi terreo amplo immissum committitur fornaci Figuli, dum vasa argillacea coquuntur. Omni aqua crystallisationis hoc modo privatum, in massam levem, spongiosam, friabilem abiit.

Ad Dentifricia & Carnem luxuriantem absumentam adhibetur; sed prior usus nequam commendandus esse videtur.

### ANTI-HETICUM Poterii, BEZOARDI- CUM seu DIAPHORETICUM JOVIALE.

℞. Reguli Antimonii uncias sex,  
Stanni Anglici uncias duas:  
Fundantur in Crucibulo, fluentibus ad-  
jiciantur per vices

Nitri puri unciaë quatuor & viginti:  
Educoretur Calx cum Aquæ quantitate  
sufficiente.

Olim ad moderandos Hæcticorum sudores adhibebatur. Datur ad drachmam semis.

### ANTIMONII BUTYRUM, CAUSTI- CUM ANTIMONIALE & CIN- NABARIS *Basilii Valentini*.

℞. Mercurii sublimati uncias quindecim,  
Antimonii crudi uncias sex.

Probe conterantur per plures horas, immittantur dein Retortæ, quæ elapsis aliquot diebus Balneo arenæ committantur, subministretur calor, prodibit in præpositum Retortæ Excipulum liquor spissior, quem Butyrum Antimonii appellant, hic cum omnis prodierit, intendatur ignis ad summum usque & sustineatur per aliquot horas; ex refrigerata dein Retorta auferatur Cinnabaris, quæ hac ratione surrexit, illa in pulverem redacta denuo ex Cucurbita sublimetur.



*Butyrum a Chirurgo loco Cauterii adhibetur. Cinnabari specifica virtus Antiepileptica & Antispasmodica adscribitur, maxime ab Hoffmanno Diss. de Cinnabare Antimonii; à vulgari factitia plane non differre ostendi Instit. Chem. Experim. 83. Dosis ad scrupulam unum extenditur.*

### ANTIMONII CLYSSUS Glauberi.

℞. Nitri uncias viginti quatuor,  
Antimonii uncias duodecim,  
Sulphuris uncias tres:

Probe misceantur & pulverisentur, eorum Drachmæ circiter duæ ingerantur Retortæ ferreæ tubulatæ in igne aperto candenti, & cui ope Argillæ Excipulum peramplum sit junctum; pulvere ingesto, statim operculum orificio tubi exactissime applicandum est, nec nova portio ingærenda, antequam detonatio tota cessaverit, liquor ex vaporibus sub qualibet detonatione in Excipulum prorumpentibus surrectus asservetur.

*In Siti & Calore nimis extinguendis laudatur, in Febris etiam malignis, loco Spiritus Vitrioli, potui ordinario & Fulapiis additur. Medicamento minus grato, & quod neutiquam tanquam purum acidum considerari potest, prudenter hodie Spiritus Vitrioli substituitur.*

### ANTIMONII HEPAR.

Videatur Crocus Metallorum.

### ANTIMONIUM DIAPHORETICUM. PULVIS ANTIMONII ALBUS

*Basil. Valentini.*

### CALX ANTIMONII LOTA Suecorum.

℞. Antimonii crudi partem unam,  
Nitri depurati partes duas.

Exacte mixta immittantur per vices Crucibulo candenti, ea lege, ut qualibet vice nonnisi Drachmæ circiter duæ detonent, omnis materies ubi detonavit, spatula ferrea agitetur, & immitatur aquæ; hæc inde defundatur, & nova affundatur usque dum pulvis albus plane fuerit edulcoratus, qui exsiccatus asservetur.

Aqua ad edulcorationem adhibita juxta ratione in crystallos coacta Salem Polybrestum largitur. Aquæ, in qua candens Antimonium Diaphoreticum fuit extinctum, si adjicitur Acetum, secedit ad fundum pulvis albus, quem MATERIEM PERLATAM Krugneri appellare solent. Si tres Nitri partes ad unam Antimonii fuerint receptæ, ex aqua ad edulcorationem adhibita recuperatur Nitrum, quod sub labore non destructum fuit, illud NITRUM ANTIMONIAM, NITRUM ANODYNUM, ANODYNUM MINERALE appellant.

*Antimonio Diaphoretico adscribuntur vires Absorbentes, Alexipharmacæ, Diapnoicæ, Sanguinem depurantes, datur a granis quindecim ad drachmam dimidiam in Febris cujuscunque generis, Conf. Instit. Chem. Exper. 93. Nitrum Antimoniatum omnino Calcem Antimonii vehit; observat Vener. Triller illud frequentiori in usu Hoffmanno fuisse. Fateor me semper malle Nitrum depuratum, quam Antimoniatum, ex quo vel solum Acidum Vegetabile rodentem spiritum expellit exhibere.*

### ANTIMONIUM PRÆPARATUM.

Antimonium crudum lævigetur supra Porphyritem, immittatur tunc vitro cylindræco, ipsi larga aquæ quantitas adjiciatur & cum ea probe agitetur, aqua turbata decantetur, cum residuo pulvere nova Aqua eadem ratione tractetur, pollen in aquis decantatis subsidens, exsiccatum asservetur.

*Hac elutriatione & tenerrimum & ab omnibus partibus heterogeneis liberum Antimonium obtinetur.*

### ANTIQUARTIUM Riverii.

Videatur Panacea Mercurialis,

APOZEMATA vide DECOCTA.

### AQUÆ DESTILLATÆ SIMPLICES.

Parantur, dum Vegetabili qualicunque comminuto & Vesicæ immisso ad-

fun-



funditur Aqua ad eminentiam aliquot digitorum, & inde duo trientes destillantur. Circa has Aquas sequentia notanda sunt:

- 1) Minus bene a corporibus inodoris Aqua destillatur, licet enim illa quædam inde recipiat mucilaginosas aut gelatinosas partes, tamen hæ adeo parvæ sunt, ut nequaquam aliquem effectum edere queant; aqua nil inde acquirit præter saporem & odorem minus gratum, qui autem inde, dum Aeri exponuntur in vasis apertis, mitescent.
- 2) Vegetabilia, quorum odor exsiccatione perit, omnino recentia debent adhiberi.
- 3) Optimum est in Officinis eas præcipue Aquas simplices destillatas asservari, quæ sub destillatione Oleorum prodierunt; aut a Floribus odoratis, quamvis nullum Oleum largientibus, obtinendas, sed hi semper recentissimi adhibendi sunt.
- 4) Ex tempore quævis Aqua destillata efficax parari potest, quando Aquæ communis destillatæ uncias duodecim adjicitur uncia dimidia Spiritus vini, in quo tres vel quatuor Guttæ destillati Olei, cujus odorem Aqua habere debet, fuerint dissolutæ.
- 5) Si loco Aquæ, Vinum a Vegetabilibus abstrahitur, liquor AQUA VINOSA dicitur, hic & 4. locum quoque habet, si loco dimidiæ Unciæ Spiritus Vini ejus unciæ duæ recipiuntur.

## AQUA ABSYNTHII COMPOSITA

Edinburg. prior. edit.

- R. Radicum Calami Aromatici,  
Galangæ,  
Zedoariæ ana uncias duas,  
Corticum recentium Aurantiorum,  
Cinnamomi ana uncias quatuor,  
Herbarum Absynthii vulgaris uncias sex,

Tom. II

Herbarum Menthæ,

Salviæ ana uncias duas,  
Cardamomi minoris,  
Nucis Moschatæ ana unciam unam,  
Macis unciam semis:

Incisis & contusis affundantur

Spiritus vini trecentæ quinquaginta  
sex uncia:

Instituatur secundum artem Destillatio.

Minus bene hoc medicamentum Aqua dicitur, cum Spiritibus omnino accensendum sit, nec ab Absynthio debuisset denominari; reliqua enim ingredientia æque ac Absynthium ad ejus efficaciam faciunt. Egregium Stomachicum esse dicitur in Anorexia, Nausea, Vomitu, Bradypepsia, & aliis supini Ventriculi affectibus languidis; egregium etiam Anticolicum & Carminativum esse, imprimis si a causa frigida Colica statulenta nata fuerit; neque minus fœminis Hystericis prodesse, in pacandis rebellis Uteri turbis, item pallentibus ex Chlorosi puellis, insignem quoque usum Anthelminticum præstare, commode tandem ad morbos serosos, Hydropem, Febres intermittentes, maxime Quartanam posse adhiberi. Dari potest parvum cochlear in vehiculo aquoso.

## AQUA ACUSTICA Ludovici.

- R. Radicum Levistici,  
Valerianæ,  
Herbæ Rorismarini,  
Florum Lavendulæ ana unciam semis,  
Baccarum Lauri,  
Castorei,  
Camphoræ ana drachmas duas,  
Spiritus Juniperi uncias duodecim:  
Incisa, contusa macerentur per quatuordecim, tunc addantur  
Spiritus Salis Ammoniaci uncia semis,  
Olei Juniperi drachma semis:  
Omnia probe mixta asserventur usui.  
Hujus Spiritus una aut altera gutta Gossypio excepta immittitur Auri, cujus Meatus auditorius obstructus aut Tympanum relaxatum est.

## AQUA ALEXITERIA Londinensium.

- R. Foliorum Menthæ recentium uncias duas cum dimidia,

B

Sum-



Summitatum Absynthii Pontici recentium,  
 Radicum Angelicæ recentium ana  
 uncias duas,  
 Aquæ uncias septuaginta.  
 Fiat secundum artem Destillatio.  
 Pro SPIRITUOSA addantur ante Destillationem,  
 Spiritus vini uncia triginta cum duabus.  
 SPIRITUOSÆ Unciis sedecim si adjiciuntur  
 Aceti uncia duæ,  
 Surgit AQUA ALEXITERIA SPIRITUOSA cum ACETO.  
*Scopo. Alexipharmaco & Sudorifero hæ Aquæ cochleatim exhibentur.*

## AQUA ALUMINOSA Fallopii.

Rx. Aquarum destillatarum Rosarum,  
 Scordii ana  
 Uncias duodecim,  
 Aluminis crudi,  
 Mercurii sublimati ana Drachmas duas.  
 Dissolutis per ebullitionem Salibus, filtratur liquor.  
*Ad Ulcera Cacoëthea & Venerea munda adhibetur.*

## AQUA ALUMINOSA Paris.

Rx. Aquarum destillatarum Rosarum.  
 Plantaginis  
 ana uncias  
 viginti quatuor,  
 Aluminis drachmas tres,  
 Misceantur.  
*Ad Sanguinem sistendum extus adhibetur.*

## AQUA ANHALTINA Schræderi.

Rx. Ligni Aloes drachmas tres,  
 Croci Orientalis drachmas duas cum dimidia,  
 Caryophyllorum Aromaticorum,  
 Nucis Moschatae,  
 Cubebarum,

Cinnamomi ana Drachmas sex,  
 Baccarum Lauri,  
 Seminis Fœniculi ana unciam semis,  
 Olibani electi unciam unam:  
 Incisa, contusa infundantur per aliquot dies, cum  
 Spiritus Vini unciis sexaginta.  
 Addantur.  
 Terebinthinæ uncia sex.  
 Instituatur Destillatio; Oleo ablato fervetur liquor, in quo suspendantur, si placet

Moschi in petia ligati Grana quindecim.

*Vulgo huic medicamento insignes adscribuntur vires in Ventriculo roborando, Colica flatulenta & Urina pellenda; sed caute adhibendum est, ne Sanguis inde nimis commoveatur; Externus, usus frequentior est, cum Ventriculo applicatum Vomitus sistat, & ad roboranda membra Paralyti debilitata valere, sit observatum. Terebinthinæ Oleum, quo hoc medicamentum scatet, ejus usum internum nimis exæstuantem, externum vero nauseosum reddit.*

## AQUA ANODYNA Pragensium correctæ.

Rx. Spiritus Salis Ammoniæ vini uncias sex,  
 Essentiæ Croci unciam unam,  
 Olei destillati Lavendulæ Drachmam semis.

*In doloribus Arthriticis & Rheumaticis aliisque ex stagnantibus humoribus viscidis acribusque obortis commodum usum Paregoricum & Anodynum præstare refert & asseverat Trillerus; addens, Dolores externos vel acerrimos inde consopitos fuisse, se aliquoties expertum, latum adhuc recordari.*

## AQUA APOPLECTICA Langii correctæ.

Rx. Radicum Calami aromatici,  
 Ireos,  
 Aristolochiæ rotundæ ana  
 unciam unam semis,  
 Herbarum Majoranæ,  
 Chamæpityos,  
 Rorismarini,



## AQUA.

Florum Primulæ Veris ana Manipulum unum,  
 Seminis Sileris montani,  
 Fœniculi ana Drachmam unam semis,  
 Cubebæ,   
 Nucis Moschatæ,  
 Caryophyllorum ana Drachmas tres.  
 Cinnamomi,  
 Ligni Aloes una Drachmas duas,  
 Piperis longi,  
 Sagapeni,  
 Opoponacis,  
 Myrrhæ;  
 Gummi Juniperi ana Drachmam unam semis,  
 Aquarum florum Paralyseos,  
 Tiliæ,  
 Salviæ ana uncias octodecim.

Incisa, contusa stent in Infusione per dies octo, postea Destillantur.

*Laudatur ad Prophylaxin Apoplexiæ & curandas Paralyseos, in eo certe reliquis Aquis apoplecticis præferenda, quod, cum spirituosâ non sit, Sanguinem minus commoveat, minusque adeo morbum, cui arcendo destitatur, provocet. Datur per Cochlearia.*

## AQUA AROMATICA Danica.

℞. Herbæ Menthæ Piperitidis uncias tres,  
 Cinnamomi uncias duas,  
 Flavedinis Corticum Citri unciam unam,  
 Macis Semunciam,  
 Seminis Angelicæ unciam unam,  
 Spiritus Vini centum quadraginta quatuor uncias.

Instituatur Destillatio.

*Spiritus hic Aromaticus in Debilitate Primarum viarum exhiberi poterit. Dosis est parvum Cochlear.*

## AQUA ASTMATICA Augustanorum

correcta a Kleinio.

℞. Radicum Enulæ uncias duas,  
 Ireos Florentinæ unciam unam cum dimidia,

## AQUA.

11

Herbarum Hyssopi,  
 Rorismarini,  
 Mari veri ana unciam unam,  
 Seminum Anisi,  
 Fœniculi,  
 Cinnamomi ana unciam semis,  
 Cardamomi minoris Drachmas duas,  
 Croci Scrupulos duos,  
 Spiritus Vini uncias duodecim,  
 Aquæ Hyssopi cohobatæ uncias viginquatuor.

Digesta per triduum Destillantur.

*Ad Asthma serosum & pituitosum laudatur, senibus maxime commendatur. Datur per Cochlearia.*

## AQUA BALSAMI EMBRYONUM

*Augustanorum correctâ, a Pharmacopœa Austriaco-Provinciali.*

℞. Radicum Pœoniæ,  
 Zedoariæ,  
 Zinziberis ana uncias duas,  
 Galangæ Drachmas sex,  
 Herbarum Salviæ,  
 Melissæ,  
 Fœniculi,  
 Menthæ ana uncias tres,  
 Florum Tunicæ,  
 Tiliæ ana uncias sex,  
 Lavendulæ,  
 Nucis Moschatæ ana uncias tres,  
 Caryophyllorum,  
 Cinnamomi,  
 Cubebæ,  
 Granorum Paradisi,  
 Macis ana uncias duas:

Incisa, contusa infundantur per aliquot dies cum

Spiritus Vini unciis quadraginta quatuor,

Aquæ fontanæ unciis ducentis quadraginta.

Dehinc Destillantur inde Liquoris uncia centum nonaginta duæ.

*Pessime hæc Aqua contra Abortum exhibetur, quippe quem, cum Sanguinem commoveat, promovere potius, quam arcere valebit; scopo Carminativo potius, monentibus Trillero & Schultz, ad duo Cochlearia pro*



*dosi datur ; extus quoque cum crusta panis calida Abdomini imponitur.*

**AQUA BENEDICTA** *Rulandi*, **VINUM ANTIMONIATUM** *Huxhami*, **ESSENTIA ANTIMONII** *Ejusdem*, **VINUM EMETICUM** *vulgo*.

**Rx.** Vitri Antimonii uncia una.

Redigatur in pulverem, infundatur frigide per duodecim dies cum Vini Hispanici aut Maderaici unciis viginti quatuor, agitentur aliquoties de die; Liquor clarus filtretur charta bibula.

*Illustris Huxham hoc Preparatum antimoniale reliquis omnibus antepont; ejus Unciam unam aut duas valide Vomitus movere, Drachmas duas tres lenem modo Vomitus, subinde unamque ac alteram Alvi defectionem, quoque Sudorem excitare, a triginta ad sexaginta vel octoginta Guttulas datum Alterare, Diaphoresin & omnes Secretiones promovere observat.*

### AQUA CALCIS.

Calcis vivæ uni parti  
affundantur gradatim

Aquæ fontanæ partes decem :  
Finita ebullitione, Aqua cum Calce probe agitur, charta filtretur & in vitro probe clauso asservetur.

*Hujus Medicamenti usus plerumque externus est ad Inflammationes, Ambusta, Ulcera & id genus affectiones. Internæ in frigidis morbis, Chronicis imprimis, Unciæ quatuor bis de die propinantur, scopo Siccandi & Detergendi : egregias ipsi virtutes Diaphoreticas, Nephriticas, Anthelminticas & potissimum Lithonripticas tribuunt Alston in singulari Dissertatione, quem strenue sequitur Robertus VVhytt in propria Dissertatione & alii egregii Medici.*

### AQUA CALCIS COMPOSTA *Londinensium.*

**Rx.** Ligni Quajaci uncias sex,  
Corticis Ligni Sassafras unciam semis,  
Radici Liquiritiæ unciam unam,  
Seminis Coriandri drachmas tres.

Incisa macerentur per biduum cum  
Aquæ Calcis vivæ unciis duabus & septuaginta : colentur.

*Ad Acrimonias varias humorum corrigendas adhibetur. Aliquot Cyathii bibantur de die.*

### AQUA CAPONIS FLORENTINORUM *correcta.*

Capo évisceratus in frusta dissectus coquatur leni igne cum Aqua, usque dum caro ossa relinquit; unciis duodecim hujus jusculi, ablata ante omni supernatante pinguedine adjiciantur.

Aquarum Rosarum uncia duodecim,  
Cinnamomi uncia duæ.

Misceantur.

*Potentiores sane hæc Aqua vires Analepticas edet, quam Aquæ Caponis destillatæ, quales vulgo in Dispensatoriis præscribuntur. Si quos odor Aquæ Rosarum offenderit, Aquam Rubi Idæi aut aliam odoratam recipiant.*

### AQUA CARBUNCULI *Schræderi* *correcta.*

**Rx.** Rerbarum Majoranæ,  
Salviæ ana unciam unam  
semis,  
Rorisinarini unciam unam,  
Florum Lavendulæ uncias quatuor,  
Liliorum Convallium,  
Rosarum,  
Cinnamomi,  
Cardamomi minoris ana unciam unam,  
Nucis Moschatæ,  
Macis,  
Caryophyllorum ana unciam semis,  
Zinziberis,  
Galangæ,  
Baccarum Juniperi ana drachmas tres.

Spiritus Vini rectificati uncias duodecim,

Aquarum Rubi Idæi,  
Lavendulæ ana uncias triginta sex :

Incisa & confusa Infundantur per octiduum; deinde Destillentur ad dimidias.



Liquori destillato commisceantur quædam folia Auri.

*Extus ad Epithemata Cordis & Pulsuum adhibetur ; ad Fœtum roborandum gravidarum Abdomini cum Aqua Balsami Embryonum imponitur . Nomen inde habere dicitur , quod Carbunculos & Bubones Pestilenciales expellat , & retrocessionem eorum inhibeat . Cum Sanguinem exastuantia in Peste quoque perniciosa esse hodie evictum sit , inter- nus hujus Aquæ usus exiluit .*

### AQUA CARMELITARUM, MELISSÆ COMPOSITA *Lemery correctâ.*

*Rx.* Summitatum Melissæ recentis uncias duodecim ,  
Flavedinis recentis Corticum Citri uncias duas ,  
Nucum Moschatarum unciam unam ,  
Seminis Coriandri uncias quatuor ,  
Caryophyllorum aromaticorum ,  
Cinnamomi ana unciam unam ,  
Radicum Angelicæ unciam semis ,  
Spiritus Vini rectificati uncias sexaginta quatuor .

Incisa, contusa Infundantur per aliquot dies, dein Destillentur leni calore octo & quadraginta uncia.

*Ejus dosis si quidem intus Roborandi scopo datur , nunquam ultra parvum Cochlear debet extendi ; Cephalicæ inde , Analepticæ & Roborantes vires expectantur , sed crebrius externe scopo Excitandi , Roborandi , Discutiendi adhibetur .*

### AQUA CARMINATIVA *Dornkrellii.*

*Rx.* Florum Chamomillæ Romanæ uncias octodecim .

Infundantur in  
Aquæ Chamomillæ unciis centum quadraginta

per octiduum; exprimantur forti expressione; Liquori expresso addantur:

Herbarum Absynthii Pontici,  
Pulegii,  
Origani,

Summitatum Centaurei minoris ana drachmæ duæ,

Seminis Anethi uncia duæ,

Seminis Anisi,

Fœniculi ana uncia una,

Carvi uncia semis,

Baccarum Juniperi,

Lauri,

Calami Aromatici,

Zedoariæ ana drachmæ duæ,

Cinnamomi uncia semis.

Incisa & contusa Infundantur in Spiritus Vini centum nonaginta & duabus unciis; instituaturs Destillatio.

### AQUA CARMINATIVA *Regis Borussicæ Friderici I.*

*Rx.* Flavedinis Aurantiorum Chinenesium recentium,  
Citri recentis ana uncias duas,

Salis Tartari drachmam unam.

Infundantur cum

Vini Tokaviensis unciis viginti quatuor,

per aliquot dies, deinde Destilletur Spiritus, qui Edulcoretur

Julepi Rosarum uncia una.

### AQUA CARMINATIVA VULGARIS *Austriacorum.*

*Rx.* Herbarum Absynthii Pontici,

Menthæ crispæ,

Pulegii,

Origani ana unciam unam semis,

Florum Chamomillæ Romanæ uncias duodecim,

Corticum Aurantiorum,

Citri,

Seminum Coriandri,

Carvi ana unciam unam semis,

Aneti uncias duas,

Anisi,

Fœniculi ana unciam unam.

Incisa & contusa Infundantur per duodecim horas in Aquæ fontanæ unciis centum nonaginta & duabus. Abstrahatur inde medietas.

*Harum Aquarum vires nomine patent , cavendum ne Spiritus in Colicis sanguineis exhi-*



*exhibeantur ; Austriaca per Cyathos hauriri potest.*

### AQUA CONTRA CARIEM *Plenk.*

*Rx.* Aquæ Calcis vivæ uncias duas,  
Mercurii in pari sui ponderis parte  
Aquæ fortis dissoluti Drachmam unā.  
Misceantur.

*Vires ex nomine patent, adhibetur teste  
Cl. Plenck etiam contra Ulcera Phagadenica.*

### AQUA CATAPULTARUM.

Videatur Aqua Vulneraria.

### AQUA CINNAMOMI CYDONIATA *Hamburgensium.*

*Rx.* Cinnamomi uncias quatuor.  
Infundantur per triduum cum  
Succi Cydoniorum unciis octo & quadraginta.

Abstrahantur Liquoris uncia triginta sex.  
Si loco Cydoniorum recipitur Aqua  
Florum Buglossi, surgit AQUA CINNAMOMI BUGLOSSATA *Mynsichti*; si sumuntur Aquæ quatuor Cordiales, Liquor prolectus dicitur AQUA CINNAMOMI CORDIALIS *Recent.* cum Decocto Hordei obtinetur AQUA CINNAMOMI HORDEATA *Pharm. Bat.* cum Aqua Ceraforum nigrorum AQUA CINNAMOMI SINE VINO *Leidens.* cum Aqua fontana AQUA CINNAMOMI SIMPLEX *Londinens.* & *Danorum*, *Vulgaris Austriacorum.*

### AQUA CINNAMOMI cum VINO *Coloniensium.*

*Rx.* Cinnamomi crassiuscule contusi uncias sex,  
Vini generosi uncias octodecim.  
Post Digestionem aliquot dierum instituaturs Destillatio, quam diu Liquor lactei coloris prodit.

*Hæ Aquæ propter gratum præcipue saporem commendabiles, Analeptica & Stomachica sunt, ideo in morbis a causa præsertim frigida oriundis & Debilitatem cor-*

*poris inducentibus nec non ad fractas Vires erigendas commode exhibentur.*

### AQUA COLONIENSIS.

*Rx.* Spirituum Vini rectificati uncias septuaginta & duas,  
Rorismarini uncias octodecim,  
Aquæ Carmelitarum uncias duodecim,  
Oleorum Bergamotti unciam unam,  
Citri drachmas duas,  
Neroli,  
Rorismarini ana drachmam unam,

Probe mixta Destillentur.

*Convenit ratione virium cum Aqua Carmelitarum.*

### AQUA CONFORTATIVA sive PERLATA *Augustanorum.*

*Rx.* Aquarum Ceraforum uncias novem,  
Tiliæ uncias tres,  
Cinnamomi Vinosæ drachmas sex,  
Margaritarum Occidentalium præparatarum scrupulum unum,  
Coralliorum alborum præparatorum drachmam semis,  
Cornu Cervi ulti præparati scrupulos duos,  
Julepi Rosati sesqui unciam.  
Misceantur.

*Infantibus & aliis, qui medicamenta reformidant, solet offerri ab Uncia dimidia ad integram. Julepus demum usus tempore debet adjici.*

### AQUA CORNU CERVI CITRATA *Waldschmidii correctæ.*

*Rx.* Rasuræ Cornu Cervi uncias sex,  
Pomorum Citri cum corticibus incisorum numero quatuor.  
Coquantur cum Aquæ fontanæ unciis quatuor & quadraginta ad remanentiam quatuor & viginti, filtratis addantur  
Aquarum Rosarum,  
Melissæ,

Aqua-



# AQUA.

Aquarum Scordii ana uncia octo-  
decim.

*Analeptica & Alexipharmaca predicatur.*

**AQUA DIVINA MIRABILIS** *Parisien-*  
*sium correcta à Beaumé.*

℞. Spiritus Vini rectificati uncias sexa-  
ginta & quatuor,

Quintarum Essentiarum Citri,

Bergamotti  
ana drach-  
mam unā,

Aquæ Florum Aurantiorū uncias octo:  
Destilletur Spiritus & probe misceatur cum  
Sacchari unciis triginta & duabus,  
dissolutis in

Aquæ uncis centum viginti & octo.  
Filtretur per chartam emporeticā.

*Aquæ Divinæ denominatio multum am-  
bigui habet, ipsam Phagedænicam quoque hoc  
nomine comprehendunt, nostra verum Cla-  
retum est, quod virtutem Analepticam, Cor-  
diacā, Stomachicā, Carminativā habet.  
Datur ad uncias duas.*

**AQUA EPILEPTICA** *Langii.*

℞. Florum Recentium Liliorum Con-  
vallium uncias  
sex.

Lavendulæ un-  
ciam unam,  
Rorismarini.

Stœchadis Arabicæ ana un-  
ciam semis.

Cinnamomi drachmas sex,  
Nucum Moschatarum unciam semis.

Piperis longi,  
Cubebarum ana drachmas duas,

Visci Querni,

Radicum Pœoniæ,

Fraxinellæ ana unciam se-  
mis,

Macerata in Vini generosi libris octo  
per triduum, Destillentur ad dimidias.

*Ad Epilepsiam, Vertiginem & Apople-  
xiam tum arcendas quam pellendas, in ipso  
paroxysmo, vulgo commendari solet. Quid  
vero in his morbis hæc Aqua, quippe Aro-  
matica, efficere possit, dijudicatu proclive est.*

# AQUA.

15

**AQUA FLORUM OMNIUM** *Batean.*  
**AQUA FIMI** *Fuller.*

℞. Stercoris Vaccini uncias quinquaginta.  
Includantur sacco linteo, qui com-  
mittatur Vesicæ centum quinquaginta  
libras Aquæ continenti, Destillatione eli-  
ciantur Aquæ uncia septuaginta quinque.

*Ad Arthritidem, Colicam, Calculum &  
Urinæ suppressionem laudatur, externe inter  
Cosmetica numeratur, sed sub hoc florido  
omnium Florum velamento nihil nisi fatuam  
fatuorum Aquam latere prudenter monet Ven.  
Triller. Ipsa Vaccarum urina aliquando sub  
titulo Aqua di mille fiori, Eau de Mille-  
fleurs maximis encomiis celebrabatur.*

**AQUA FOETIDA** *Pragensium.*

℞. Radicum Pœoniæ unciam semis,  
Dictamni albi drachmas  
duas,

Levisici unciam semis.

Zedoariæ drachmas tres,

Herbarum Matricariæ,

Artemisiæ,

Menthæ ana manipulum  
unum,

Rutæ manipulos duos,

Florum Chamomillæ,

Sambuci,

Anthos,

Liliorum Convallium,

Primulæ veris ana pugillos  
duos,

Seminum Pœoniæ,

Sileris Montani ana unciam  
semis,

Cinnamomi drachmas tres,

Galangæ minoris uncias tres,

Cubebarum,

Macis ana drachmas duas,

Galbani,

Asæ foetidæ ana uncias tres,

Myrrhæ electæ unciam semis.

Castorei Moscovitici uncias duas:

Incisa grosso modo & contusa infundan-  
tur in

Vini albi generosi unciis centum &  
viginti,

Aquæ



Aquæ Matricarie unciis viginti quatuor :

Destillentur lege artis,

*Trillerus Aquam hanc eximii plane usus esse affirmat in affectibus Hystericis & quibuscunque similibus, passim tam in-quam externe adhiberi ad avertendos aut interruptendos paroxysmos, conducere etiam in aliis affectibus Torminosis Colicis ac Flatulentis a Stomacho vel Digestionis vitii oriundis. Ad semicochlear & ultra propina.*

### AQUA FORTIS Geberi.

℞. Nitri depurati libras tres;  
Vitrioli viridis calcinati libram unam:

In pulverem redacta probe misceantur & Destillentur ex Retorta terrea seu vitrea loricata in excipulum, cui prius Aquæ libra una semis fuerit immissa.

*Nunquam in usus medicatos recipitur, sed aliorum Medicamentorum præparationi inservit.*

*Pharmacopola a propriis, quos Laboranten vocant, artificibus fere sibi comparant Aqua fortem. Quæ vero cum & Vitriolico & Salis communis Acido vulgo sit contaminata, instillanda ei est solutio Argenti usque dum amplius non turbetur. Dicitur tunc Aqua fortis Præcipitata & est Acidum Nitri purissimum.*

### AQUA FORTIS MERCURIALIS Plenckii.

Videatur Aqua contra Cariem.

### AQUA ad GINGIVAS Parsiensem correcta.

℞. Aluminis Rupei unciam semis,  
Dissolvatur in  
Aquæ ebullientis unciis triginta:  
Refrigeratæ solutioni addantur

Oleorum destillatorum Cinnamomi  
guttæ sex,

Caryophyl-  
lorum gut-  
tæ duæ,

Quintæ Essentiæ Citri guttæ decem:

Dissolutæ in

Spiritus Vini rectificati unciis sex,  
Aquæ Florum Aurantiorum uncia una  
Filtrentur.

Gingivæ Roborandi ergo hac Aqua coluntur.

### AQUA GRYSEA Gohlii.

℞. Mercurii vivi,

Aquæ Fortis ana unciam unam:  
Dissolutis affundantur

Radiciſ Chelidoniæ majoris uncia  
semis,

Herbarum Ejusdem.

Solani,

Aristolochiæ,

Florum Rosarum pallidarum ana ma-  
nipulus unus,

Cum Aqua unciis centum & viginti ad remanentiam unciarum nonaginta & sex decoctæ & colatæ.

*Hanc Aquam ad Ulcera Phagedænica & Synoviam curandam facere observatur in Act. Med. Berol. D. 1. Vol. 3. p. 86. antequam in usum trabatur, semper est agitata, ut pulvis ad fundum hærens in ipsa suspendatur. Hanc Aquam cum Liquore Bellostii convenire Cl. Klein in Select. Medicaminum p. 14. annotat.*

### AQUA HIRUNDINUM Augustanorum.

℞. Pullorum Hirundinum dissectorum nu-  
mero triginta,

Visci Querni,

Radiciſ Pœoniæ ana unciam unam  
semis,

Seminis Ejusdem unciam unam,

Florum Liliorum Convallium recen-  
tium uncias quatuor,

Florum Sambuci unciam unam semis,  
Aquæ fontanæ uncias centum & vi-  
ginti.

Destillentur ad dimidias.

*Vires Analeptica & Hysterica huic Aquæ adscribuntur. Ad drachmas sex præscribi solet. Prudentiores Medici ridiculam fatuam, nullusque plane pretii & usus esse asserunt.*



AQUA HIRUNDINUM cum CASTOREO *Gullmanni*.

℞. Pullorum Hirundinum vivorum in partes dissectorum numero quadraginta,

Herbæ Rutæ hortensis uncias duas,

Castorei optimi unciam unam,

Vini albi uncias nonaginta & sex :

Destillentur ex vesica ad dimidias,

*Gesner Epist. L. I. p. 486. huic Aquæ vires Antepilepticas & Hystericas adscribit. Datur ad unciam unam.*

## AQUA HUNGARICA sive REGINÆ HUNGARIÆ.

℞. Ramorum Rorismarini cum Foliis & Floribus uncias quadraginta & octo,

Spiritus Vini uncias centum quatuor & quadraginta.

Destillentur usque dum Phlegma appa-  
ruerit.

*Convenit cum Aqua Carmelitarum; usus externus est ad Decubitum humorum, Contusiones &c.*

AQUA LAXATIVA ANGELICA *Vien-  
nensium; Austriaco-Provinciali correctâ.*

℞. Cremoris Tartari drachmas duas:  
Dissolvantur in

Aquæ ebullientis unciis octo :

Dissolutis solvantur

Mannæ electæ uncia duæ,

Salis Vegetabilis drachma una semis,

Succus Pomi Citri unius.

Infundantur fervide in vase clauso super corticibus ejusdem pomi.

Liquor Albumine Ovorum clarificatus  
filtretur.

*Medicamentum eccoproticum una dosi hân-  
riendum.*

AQUA LAXATIVA *Viennensium.*

℞. Foliorum Sennæ sine stipitibus dra-  
chmas sex,

Passularum minorum drachmas tres,

Tom. II.

Radicum Polypodii scrupulos duos,

Seminis Coriandri drachmam semis.

Cremoris Tartari drachmam unam:

Incisa & contusa coquantur cum Aquæ fontanæ unciis decem, ad remanentiam unciarum sex, in Colatura dissolvantur

Mannæ Siciliensis uncia duæ.

Clarificentur.

*Fortius Album ducit.*

Hæ duæ Aquæ mora corrumpuntur, & non nisi usus tempore parandæ sunt.

## AQUA Luce.

Videatur Spiritus Salis Ammoniaci Succinatus.

AQUA MAGNANIMITATIS *Kunrath.*

℞. Spirituum Formicarum uncias se-  
xaginta,

Meliissæ uncias quadragin-  
ta octo,

Flavedinis Corticum Citri unciam  
semis,

Cinnamomi drachmas tres,

Caryophyllorum unciam unam,

Cardamomi,

Cubebæ ana drachmas tres,

Zedoariæ unciam unam,

Mastichis,

Styracis Calamitæ,

Benzoës ana unciam unam semis.

Stent in Digestione per octiduum, postea  
lege artis Destillentur.

*Absurde profecto Magnanimitatis nomen  
huic Aquæ imponitur, aut inde quod vel  
Audaciam vel Venerem sit auctura expecta-  
tur; Nervinas, Analepticas, Cardiacas, Ce-  
phalicas ac Stomachicas videtur polliceri &  
ad Atrophiam, Arthritidem vagam, dolores  
Ischiadicos, Spasmos, Paralysem aliosque id  
genus affectus laudatur.*

AQUA MASTICHINA *Augustanorum  
correctâ.*

℞. Mastichis electæ uncias quatuor,  
Nucum Moschatarum unciam unam:

Contusis affundantur

Spiritus Vini rectificati uncia duo-  
decim,



Stent in Digestione per triduum, tunc adjiciantur

Aquæ fontanæ uncia octo & quadraginta.

Destillentur inde uncia triginta sex.

*Hæc Aqua vires Stomachum confortantes possidet, & in Singultu, Ciborum fastidio, Flatulentia, Diarrhæa & Vomitu commendatur, Dosi ejus ad unciam unam ascendit.*

### AQUA MELLIS ANDERNACI.

Rx. Mellis optimi, quantum vis  
Ex Cucurbita inde Destilletur Phlegma.

*Laudatur ad promovendum incrementum Capillorum.*

### AQUA MELLIS ODORATA REGIA

*Parisiensium correctæ à Beaumé.*

Rx. Seminis Coriandri uncias octo,  
Flavedinis corticum Citri recentium  
unciam unam,

Nucum Moschatarum,

Styracis Calamitæ,

Benzoës ana unciam dimidiam,

Vanigliarum drachmas tres:

Incisa contusa infundantur per nyctemerum cum

Spiritus Vini rectificati unciis quadraginta octo:

Fiat secundum Artem Destillatio; Spiritui destillato addantur, si placet, usus tempore

Tincturæ Moschi,

Ambra ana parum.

*Analeptico, Cephalico, Nervino, Cardiaco & Paregorico sine laudatur. Cosmetico scopo præcipue usurpatur.*

*Egregias hæc Aqua & odore ac sapore perquam grata & amæna vires exserit Analepticas, Nervinas, Cephalicas, Cardiacas, Stomachicas, Carminativas, Hystericas. Panno aut pane excepta, Stomachique regioni extus applicata Anthelminticas quoque edere dicitur. Alvi fluxum blande sistit, Vomitus compescit, ructuososque Singultus cohibet. Trillero Aqua hæc polychresta est. Datur intus ad unciam semis.*

### AQUA MELISSÆ COMPOSITA.

Videatur Aqua Carmelitarum.

### AQUA MENTHÆ COMPOSITA

*Parisiensium.*

Rx. Herbarum recentium Menthæ uncias viginti quatuor,

Absynthii uncias tres,

Ocymi,

Pulegii ana uncias duas,

Rorifinarini,

Florum Lavendulæ ana drachmas duas,

Cinnamomi unciam semis,

Caryophyllorum,

Seminis Coriandri ana drachmam unam:

Incisa & contusa infundantur per aliquot dies in

Spiritus Vini rectificati unciis sexdecim,

Aquæ Menthæ unciis sexaginta.

Destillentur fere ad siccitatem.

AQUA MERCURIALIS videatur MERCURIUS LIQUIDUS. AQUA MERCURIATA *Augustanorum* correctæ. MERCURIALIS ad usus externos.

Rx. Cerussæ Venetæ unciam unam.

Lithargyrii unciam semis,

Aluminis crudi drachmas sex,

Mercurii sublimati,

Salis Ammoniaci ana drachmā unam,

Aquarum fontanæ uncias duodecim,

Rosarum uncias quatuor,

Aceti uncias sex:

Lithargyrium & Cerussa coctione cum Aceto solvantur, deinde addantur reliqua & non colata asserventur.

*Hæc Aqua prodesse dicitur Cuti deformata, ad Verrucas, Scabiem malignam, Serpiginem, Ficus, Fissuras, Ulcera maligna, vel ubi Mundificandum est, penicillo illita.*



AQUA MILLEPEDUM *Fulleri.*

℞. Millepedum vivorum,  
 Sacchari albi ana unciam unam:  
 Probe subactis affundantur  
 Vini albi unciae quatuor:  
 Colatura adhibeatur ad usum.  
*Sanguis inde depuratur, Nervi roboran-  
 tur, Obstructiones referantur, Renes & Ve-  
 fica emundantur, Urina quoque blande mo-  
 vetur.*

Hoc Medicamentum cum tempus non  
 ferat, non nisi usus tempore paran-  
 dum est.

AQUA MULSA *Hippocratis.*

℞. Mellis optimi uncias duas,  
 Aquæ fontanæ uncias duodecim:  
 Mixta colentur.  
*Medicamentum egregie Resolvens, Refri-  
 gerans, Demulcens maximo in usu erat apud  
 Artis nostræ Parentes.*

Portio Mellis pro gustu ægroti potest  
 augeri aut minui: non ultra aliquot dies  
 asservari debet.

AQUA MYRRHÆ *Virtembergensium.*

℞. Myrrhæ rubræ uncias octo.  
 Digerantur per triduum cum  
 Aquæ fontanæ duabus & septuaginta  
 unciis:  
 Destillantur inde unciae quadraginta octo.  
*Commendatur in affectibus a vitio Men-  
 sum ortis, & morbis Pectoris atque Venti-  
 culi, datur ad Unciam unam.*

AQUA OPHTHALMICA ALBA *Danica.*

℞. Aquæ Rosarum uncias duodecim,  
 Vitrioli albi drachmam unam,  
 Sacchari Saturni drachmam semis,  
 Camphoræ, Pineis tritæ, scrupulum  
 unum:  
 Misceantur.  
*Ad Opthalmiam Discutiendam adhibetur.*

## AQUA OPHTHALMICA CHARAS.

℞. Sacchari Candi albi unciam unam,  
 Radicis Ireos Florentinæ drachmas  
 tres,  
 Tutia præparatæ drachmas duas,  
 Sarcocollæ,  
 Vitrioli albi,  
 Aloës Succotrinæ ana drachmā unam,  
 Caryophyllorum scrupulum unum,  
 Aquarum Euphrasæ,  
 Fœniculi,  
 Rosarum ana uncias octo,  
 Vini Hispanici uncias viginti quatuor:  
 Infundantur in Sole æstivo per quindecim  
 dies & agitentur per vices, liquor  
 clarus in usum recipiatur.

*Linteis excepta & Oculis imposita lauda-  
 tur ad Lippitudinem & Ulcuscula Palpe-  
 brarum.*

AQUA OPHTHALMICA COERULEA  
*Danica, COLLYRIUM COERULEUM  
 Lemery, COLLYRIUM EXSICCANS  
 Paris. AQUA OPHTHALMICA SAP-  
 PHIRINA Schræderi correctæ, COL-  
 LYRIUM SAPPHIRINUM Richardi,  
 AQUA COELESTIS Vitet.*

℞. Aquæ Calcis vivæ uncias duodecim.  
 Salis Ammoniaci drachmam unam,  
 Florum Viridis Æris grana quinque:  
 Probe trita filtrentur.  
*Ad Ulcera Palpebrarum & Corneæ Ab-  
 stergenda & Solidanda adhibetur.*

AQUA OPHTHALMICA *D. Daguin.*  
 COLLYRIUM *Comitis du Bourg  
 Argentinenfium.*

℞. Tutia præparatæ,  
 Caryophyllorum,  
 Sacchari Candi ana unciam unam,  
 Camphoræ Pineis tritæ,  
 Aloës ana drachmam unam cum di-  
 midia:  
 Pulverifata infundantur in sole per quin-  
 decim dies cum  
 Vini Hispanici unciis quadraginta  
 octo,



## AQUA.

Aquarum Rosarum albarum unciis sex,  
Chelidonii,  
Fœniculi,  
Euphrasie,  
Rutæ ana unciis duabus.

Liquor decantatus recipiatur ad usum.

*In varii generis Lippitudine, quædam hujus Aquæ guttæ instillantur in Oculum affectum & probe per ipsum diffunduntur.*

## AQUA PANIS Bierling.

℞. Crustæ Panis recenter ex clibano extracti & adhuc calentis uncias viginti quatuor,

Cinnamomi acuti,

Caryophyllorum,

Nucum Moschatarum ana unciam dimidiam,

Vini albi generosi uncias nonaginta sex;

Destillantur ad dimidias.

*Aquis Analepticiis & Stomachicis accensetur. Huic Aquæ, quæ insunt Aromata, omnino vires Roborantes conciliabunt, nec in totam iners erit vapor ex Pane ipsi immixtus.*

## AQUA PESTILENTIALIS Hartmanni.

Videatur Spiritus Vini Camphoratus Crocatus.

AQUA PHAGEDÆNICA Lemery. LIQUOR MERCURIALIS Austriaco-Provincialis.

## AQUA DIVINA Fernelli.

℞. Mercurii Sublimati drachmam semis: Dissolvatur probe terendo cum

Aquæ Calcis vivæ unciis duodecim:

Hoc Medicamentum, Exulcerationibus externis, Ulceribusque Venereis adhiberi solitum, equidem semper magistraliter præscribi, Mercuriique Sublimati portionem, quam morbus postulat, quamque nonnulli ad drachmam integram usque extendunt, adcuratissime determinari velim.

Formulæ præscriptæ si adjiciuntur Pulveris Alcës sex drachmæ & Mellis Ro-

## AQUA.

fati sesquiuncia, surgit AQUA ALOE-TICA MERCURIALIS Zvvælfseri.

AQUA PICEA videatur Infusum Picis.

AQUA Rabelii, ELIXIR ACIDUM, ANTIPODAGRICUM, ANTINEPHRITICUM Dippelii.

℞. Olei Vitrioli uncias quatuor, Spiritus Vini rectificatissimi uncias duodecim.

Misceantur lente, & non nisi post octo aut plures a commixtione dies trahatur ad usum.

*Adstringendi causa in Hemorrhagiis adhibetur, nec non scopo Antiseptico in morbis Putridis. Datur ad guttas octo in sufficiente vehiculi quantitate.*

## AQUA RAPHANI COMPOSITA

*Londinensium.*

℞. Herbæ Cochleariæ recentis uncias viginti quatuor,

Radicis Raphani Rusticani recentis, Corticum Aurantiorum recentium ana uncias duodecim,

Nucum Moschatarum uncias quatuor cum dimidia,

Spiritus Vini uncias nonaginta sex, Aquæ fontanæ uncias quinquaginta:

Destillantur ex Vesica unciæ sex & nonaginta.

*Egregium contra Scorbutum medicamentum per Cochlearia exhibetur.*

## AQUA REGIS.

℞. Spiritus Nitri partes tres, Salis partem unam:

Misceantur.

*Unice ad dissolvendum Aurum adhibetur.*

## AQUA SERPYLLI COMPOSITA

*Mynsichti.*

℞. Radicum Zedoariæ,

Galangæ ana drachmam unam,

Pœoniæ unciā unā semis,

Her-



## AQUA.

Herbarum Serpylli manipulos sex,  
 Fœniculi manipulos quatuor,  
 Verbenæ,  
 Melissæ,  
 Florum Tiliæ,  
 Liliorum Convallium,  
 Lavendulæ,  
 Rorismarini ana pugillos  
 duos,  
 Cubebæ drachmam unam,  
 Cinnamomi drachmam semis,  
 Macis,  
 Nucis Moschatæ ana drachmas duas,  
 Visci Querni unciam unam semis,  
 Vini generosi uncias centum duas &  
 nonaginta.

Fiat secundum artem Destillatio.

*Vires habere dicitur Cephalicas, Cardiacas, Stomachicas atque Carminativas, inde dolores Colicos atque Tormina Intestinorum compescere, Menses quoque atque Partum promoveri; Dosis vel ultra duo Cochlearia, urgente necessitate, extendi poterit; non solum autem usui interno, sed & externo, partibus corporis Debilitatis, Sensu Motuque carentibus, aut Sugillatis cum leni frictione adhibetur, nec non membris Atrophicis.*

## AQUA SINE PARI, EAU SANS PAREILLE.

Rx. Aquæ Regiæ Hungariæ uncias octo,  
 Spiritus Vini rectificati uncias duas  
 & septuaginta,  
 Oleorum Citri unciam dimidiam,  
 Bergamotte drachmas duas  
 semis,  
 Cedrat drachmas duas,  
 Mixta destillantur ad remanentiam unciarum novem,  
*Ejusdem cum Aqua Carmelitana ac Colonienfi usus est.*

## AQUA SCLOPETARIA.

Videatur Aqua Vulneraria.

## AQUA STIBIATA Richardi.

Rx. Tartari Emetici grana quatuor:

## AQUA.

21

Dissolvantur in Aquæ fervidæ unciis sedecim.

*Singulis horis sumantur uncie quatuor, donec desideratus effectus sequatur.*

## AQUA STYPTICA Berolinensium.

Rx. Succorum expressorū Sempervivi majoris,  
 Sanguisorbæ,  
 Chærefolii,  
 Aristolochiæ,

Aceti Vini ana quantum vis.

Destillantur secundum artem.

*Adhibetur ad sistendas Hemorrhagias & sananda Vulnera.*

## AQUA STYPTICA Danorum. LIQUOR STYPTICUS Weberi.

Rx. Aluminis rupei,  
 Vitrioli cœrulei ana uncias tres:  
 Mixta dissolvantur coquendo cum  
 Aquæ fontanæ unciis quatuor & viginti:

Liquori filtrato addantur

Olei Vitrioli drachmæ duæ:

Misceantur.

*Spleniolis exceptus Liquor partibus Gruentatis applicatur.*

Huic Analoga sed valentior est AQUA VITRIOLICA COERULEA Londinensium, quæ ex Vitrioli cœrulei partibus tribus, Aluminis partibus duabus, Aquæ octodecim partibus, solutis, & Olei Vitrioli partibus duabus constat.

## AQUA THEDIANA.

Rx. Aquæ Acetosæ,  
 Spirituum Vini ana uncias triginta sex,  
 Vitrioli uncias decem,  
 Sacchari albi uncias duodecim.

Mixta filtrentur.

*Cl. Plenck hanc Aquam in compescendis Hemorrhagiis, moderanda nimia Vulnerum Suppuratione & consolidandis Vulneribus, omnibus hucusque laudatis Aquis Vulnerariis palmam præripere asserit; ad Vulnera quoque & Ulcera Vasorum, & Tumores Lymphaticos curandos unicum & efficacissimum remedium esse videri.*

## AQUA



## AQUA THERIACALIS.

Videatur Spiritus Theriacalis.

## AQUA THERIACALIS Londinensium.

℞. Theriacæ Andromachi uncias quatuor,  
Vini albi uncias sexaginta,  
Abstrahantur ex Cucurbita uncia triginta.

*Hanc Aquam reliquis Aquis Theriacalibus, quarum quodque fere Dispensatorium propriam habet compositionem, præferendam duco; Alexipharmaca censetur, vim habet Stomachicam & Carminativam. Datur Coctaleatim.*

AQUA AD TORMINA INFANTUM  
Argentoratensium.

℞. Aquarum Menthæ,  
Chamomillæ ana uncias  
duas,

Syrupi Florum Papaveris Rhœados,  
Chamomillæ ana unciam semis:

Misceantur.

*Hæc Aqua Colicæ & Torminibus sedandis, infantum Flatibus dissipandis & fibris Intestinorum relaxandis optime inservit: Coctaleatim datur. Sed cum mora corrumpatur, non nisi in ipso usus articulo parandum est hoc Medicamentum.*

AQUA TYPHORUM CERVI  
COMPOSITA.AQUA TENELLORUM CORNU  
CERVI Kalde.

℞. Radicum Scorzonæræ,  
Zedoariæ ana unciam unam,  
Cinnamomi unciam semis,  
Lignorum Santali rubri drachmam  
unam semis,  
Aloës,  
Cassie lignæ ana drachmam unam,  
Nucis Moschatæ,  
Macis ana unciam semis,  
Florum quatuor Cordialium unciam  
unam,

Lavendulæ unciam semis,  
Typhorum Cornu Cervi uncias decem:

Incisa & contusa Infundantur in  
Vini Malvatici uncias sexaginta,  
Spiritus Vini Gallici uncias triginta  
sex.

Destillantur secundum artem.

*Alexipharmacæ & Cordiales vires inde expectantur. Dosis est ad drachmas duas..*

AQUA VEGETO-MINERALIS Goulard.  
AQUA SATURNINA Suecorum.

℞. Extracti Saturni unciam dimidiam,  
Aquæ fontanæ destillatæ uncias vi-  
ginti quatuor.

Spiritus Vini uncias duas.

*Discutiendis Inflammationibus apprime con-  
ducens Medicamentum cum summo successu  
partibus Sugillatis applicatur, commendatur  
quoque ad partes Excoriatas.*

AQUA VERONICÆ cum VINO  
Berolinensium.

℞. Herbæ Veronicæ florecentis uncias  
sex & triginta,

Vini albi uncias sex & nonaginta.

Destillantur lento igne uncia quadra-  
ginta octo.

*A Stablio & ejus affeclis Tussi tam Pul-  
monali quam Hypochondriaca, imprimis se-  
nibus Asthmaticis & ad Marasimum pronis  
adhibenda laudatur; bis vel ter de die ad  
Unciam unam semis exhibetur.*

AQUA VIOLACEA, EAU de VIO-  
LETTES Beaumé.

℞. Radicis Iridis Florentinæ uncias qua-  
tuor,

Spiritus Vini rectificati uncias duas  
& triginta.

Infundantur per duas septimanas; Tin-  
ctura ita obtenta in usum trahatur.

*Non nisi Cosmetico scopo adhibetur.*

## AQUA VIRIDIS Hartmanni.

℞. Sulphuris vivi,  
Aluminis crudi,  
Viridis Æris ana drachmam unam,  
Albi Græci,



# AQUA.

Summitatum Sabinæ ana drachmā unā,  
 Florum Hyperici,  
 Herbarum Rorismarini,  
 Rutæ,  
 Plantaginis,  
 Salviæ,

Herbæ Pulegii ana pugillos duos :  
 Incisa & trita coquantur cum

Vini,

Aquæ ana unciis duodecim :

Ad consumptionem quartæ partis , ad-  
 dantur

Mellis Rosati drachmæ duæ.

*Hartmann hanc Aquam ad Ulcera fœti-  
 da, Venerea maxime nec non ad Scorbutum  
 egregie laudat.*

## AQUA VITÆ MULIERUM Bæcleri.

℞. Radicum Ireos Florentinæ ,  
 Zedoariæ,  
 Calami aromatici ana dra-  
 chmas tres,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Granorum Paradisi ana unciam unam,

Seminis Anisi uncias sedecim,

Fœniculi,

Papaveris albi,

Cumini ana unciam semis ,

Spiritus Vini uncias duas & septua-  
 ginta.

Stent in Digestione per octiduum , po-  
 stea secundum artem Destillentur ; Li-  
 quori destillato addantur

Sacchari albissimi uncia quatuor.

Liquor filtratus fervetur.

*Trillerus annotat, hoc Medicamentum in  
 plerisque Uteri affectionibus præsentaneum  
 veluti remedium esse, siquidem Caput, Ven-  
 triculum & reliqua Viscera corroborando ;  
 Suffocationes & Flatus compescat, Catar-  
 rhosque tollat; sed prudenter quoque addit,  
 gravidas a largo & frequenti ejus usu arce-  
 ri debere. Dosis est ad aliquot drachmam.*

## AQUA VITÆ SAPONACEA Richardi.

SPIRITO DI SAPONE, ESPRIT de  
 SAVON.

℞. Saponis Veneti unciam unam:  
 Dissolvatur.

# AQUA.

23

Spiritus Vini Camphorati unciis se-  
 decim.

*Extus Discutiendi & Resolvendi gratia ap-  
 plicatur.*

## AQUA VITRIOLICA Suecorum.

℞. Vitrioli albi drachmam unam:

Dissolvatur

Aquæ fontanæ unciis duodecim:

Filtrentur.

*Discutiendæ Oculorum Inflammationi ad-  
 hibetur.*

## AQUA VITRIOLICA COERULEA

*Londinensium.*

Videatur Aqua Styptica.

## AQUA VULNERARIA. ACQUA DI

ARCHIBUGIATA, EAU D'

ARQUEBUSADE *Lemery.*

## AQUA CATAPULTARUM, AQUA SCLOPETARIA.

℞. Radicum Symphiti,

Herbarum Ejusdem,

Artemisiæ,

Bugulæ ana manipulos  
 quatuor,

Betonicæ,

Saniculæ,

Buphthalmi,

Symphiti minoris,

Scrophulariæ,

Plantaginis,

Agrimoniæ,

Verbenæ,

Absynthii,

Fœniculi ana manipulos  
 duos,

Hyperici,

Aristolochiæ,

Telephii,

Veronicæ,

Centauri minoris,

Millefolii,

Nicotianæ,

Menthæ,

Hyssopi ana manipulum  
 unum:

Con-



Contusa infundantur per triduum in loco calido, cum

Vini albi centum & quadraginta quatuor unciiis,

Destillentur secundum artem.

*Absonam hanc compositionem longe a plurimis Dispensatoriis receptam, Lemery non primus præscripsit, sed aliunde acceptam publicavit; quædam Dispensatoria eam mutant, quædam etiam auxerunt. Laudatur ad Contusiones, Sugillationes, Luxationes, Ambusta, Inflammationes, Gangrenam præcavendam; præterea ad partes Roborandas.*

### AQUA VULNERARIA Baumé.

Rx. Foliorum recentium Salviæ,  
Angelicæ,  
Absynthii,  
Saturejæ,  
Fœniculi,  
Menthæ,  
Hyssopi,  
Melissæ,  
Ocymii,  
Rutæ,  
Thymi,  
Majoranæ,  
Rorismarini,  
Origani,  
Calaminthæ,  
Serpilli,

Florum Lavendulæ ana uncias quatuor.  
Infundantur concisa per nycthemerum cum

Spiritus Vini rectificati unciiis centum octo & viginti:

Destilletur omnis inde Spiritus; (si Aqua loco Spiritus assumitur, surgit AQUA VULNERARIA AQUOSA, si Vinum, VINOSA, si Spiritus Vini a Vegetabilibus non abstrahitur, sed post infusionem decantatus filtratur, obtinetur AQUA VULNERARIA RUBRA.)

*Vel tyro Chymiciæ perspicit, hac ratione paratam Aquam Vulnerariam reliquis efficaciorum esse. Varia morbi, cui applicari debet, natura indicat, Aquosa ne, an Vinosa, an vero Spirituosa recipi debeat.*

### AQUA VULNERARIA MERCURIALIS Plenckii.

Rx. Aquæ Rosarum uncias sex,  
Solutionis Mercurii dulcis unciam unam,

Mellis Rosacei unciam semis.

Misceantur.

*Adbibetur ad curanda Ulcera Venerea.*

### AQUA VULNERARIA MINERALIS Plenckii.

Rx. Camphoræ uncias tres:  
Subactis

Spiritus Vini uncia una

Adjiciantur sensim sensimque

Sacchari Saturni drachma semis,  
dissoluti

Aquæ fontanæ unciiis quadraginta quatuor.

Misceantur & usus tempore probe concutiatur Liquor.

*Ulcera antiqua sanare, Cancrum apertum mitigare; & ipsi obicem ponere, linteis tepide applicatam Inflammationes mirifice solvere Clarissimus Plenck assa-  
verat, haud incongrue Aqua vegeto-mineralis Camphorata denominari posset.*

### AQUILA ALBA.

Videatur Mercurius dulcis.

### ARCANUM CORALLINUM.

Videatur Mercurius Præcipitatus ruber.

### ARCANUM DUPLICATUM Buffii sive Holstetnensium, SAL DE DUOBUS Parisiensium.

Residuum a Destillatione Aquæ fortis, rite Elixivetur, Lixivium ope affusæ solutionis Salis Tartari tentetur, num rite sit saturatum; si cum hac solutione non effervesceat nec turbatur, evaporetur lente ad cuticulam, filtretur, & inde surgentes Crytalli asserventur.

*Vires sub Tartaro Vitriolato dicentur.*



## AXUNGIARUM.

### ARCANUM TARTARI.

Videatur Terra foliata Tartari.

AURUM FULMINANS *Bas. Valentini.*

℞. Auri per Antimonium depurati quantum vis:

Dissolvatur

Aquæ Regis quantitate sufficiente; instilletur Alkali sive fixum sive volatile, usque dum omne Aurum ad fundum secesserit, calx probe edulcorata sicce- tur in umbra, exsiccata cautissime sine ulla frictione colligatur.

In *Instit. Chem.* monui, ne Ducatorum quidem Aurum, cum semper Cuprum contineat, ad hanc Calcem, si ea scopo medicato applicanda fuerit, reci- piendum esse:

*Purgantibus stimuli loco ad unum alterum- ve Granum adjiciebatur. Hodie inter Medi- cos evuluit.*

AURUM HORIZONTALE *Wepferi.*  
PANACEA *Kornmanni.*

℞. Croci Solis drachmas duas,  
Cinnabaris Antimonii unciam semis,  
Olei destillati Cinnamomi guttas tres.  
Probe inter se invicem terantur.

*Vires Analeptica, quæ huic Medicamento adscribuntur, pendent ab Oleo Cinnamomi.*

AURUM POTABILE *Helvetii.*

Videatur Tinctura Auri *Geoffroy.*

### AXUNGIARUM DEPURATIO.

Cellulosa, quæ Adipem habet, in fru- sta dissecatur, & cum Aqua tam diu conquassatur, usque dum Aqua ipsi de- nuo affusa inde defluat prorsus limpi- da, leni deinde calore liquatur Adeps, ut omnis ex Cellulosa secedat & ipsi limpidus supernatet, eodem quoque ca- lore Aqua, quæ ipsi sub prioris labore adhæserat, disflatur; disflatam autem esse una aut altera Adipis gutta carbo-

Tom. II.

## BALSAMUM.

25

nibus injecta ac sine strepitu deflagrans indicio est; Adeps depuratus adhuc flu- idus committitur.

### BACILLI AD FORNACEM.

Videatur Massa ad Fornacem.

### BACILLI DE LIQUIRITIA.

Videatur Liquiritia cocta.

## BALSAMA.

Plurima parantur, ubi uni uncia; Olei Nucis Moschatae ope Spiritus Vini odore suo privati affunditur Olei qua- liscunque odorati drachma una, a quo Oleo odorato deinceps Balsamum de- nominatur.

BALSAMUM ADSTRINGENS *Richard.*

℞. Olei Vitrioli unciam semis;

Affundatur sensim

Olei Terebinthinæ uncia semis:

Adjiciantur

Spiritus Vini rectificati uncia tres:

*Hoc medicamentum ad Scrupulos duos us- que pro dosi ad sistendam Gonorrhæam ad- hibetur.*

*Proxime accedit ad Balsamum Ischæma- ticum Brunsvicensium.*

BALSAMUM ANODYNUM *Pharmacop.*  
*Bateanae ab Edinburgensibus correctum.*

℞. Opii unciam unam,  
Saponis albi Hispanici uncias quinque;  
Spiritus Vini rectificati uncias vigin- ti quatuor:

Comminuta Digerantur per triduum;  
in liquore filtrato dein dissolvantur

Camphoræ uncia duæ

Olei Stillatitii Rorismarini semuncia.

*Arthriticis & Rheumaticis commendatur.*



BALSAMUM APOPLETICUM *Pharm.**Bateanae correctum.*

℞. Oleorum Nucistæ expressi uncias tres  
 semis,  
 Jasmini,  
 Destillatorum Cinnamomi,  
 Ligni Rhodii  
 ana drach-  
 mam unam  
 semis,  
 Lavendulæ,  
 Majoranæ,  
 Caryophyl-  
 lorum ana  
 drachmam  
 unam,  
 Rutæ,  
 Succini ana  
 scrupulum  
 unum,

Balsami Peruviani scrupulos duos:  
 Probe mixtis addantur

Moschi,

Ambrae ana grana sedecim, Spiritu  
 Rosarum trita,

Spodii nigri præparati quantum satis  
 ad Balsamum nigro colore tin-  
 gendum.

*Apoplecticorum Naribus, Vertici, Tem-  
 poribusque illinitur, potissimum vero ob Odo-  
 ris commendationem expeti olim solebat.*

## BALSAMUM AROMATICUM.

Videatur Balsamum Scherzeri.

BALSAMUM ARCÆI. UNGUENTUM  
 e GUMMI ELEMI *Londinensium.*

℞. Terebinthinæ,  
 Gummi Elemi ana uncias sex,  
 Sevi Cervini uncias novem,  
 Olei Hyperici uncias duas:

Leni igne liquentur & probe agiten-  
 tur usque dum refrigerint.

*Præstans Vulnerarium & Digestivum est,  
 quod in Vulneribus feliciter adhibetur; si Di-  
 gerendi scopus est, unguento digestivo aut  
 Basilico temperatur. Parum ab hoc Balsa-*

*mo differt Balsamum vulnerarium Minde-  
 reri.*

BALSAMUM ARCÆI LIQUEFA-  
 CTUM *Plenckii.*

℞. Balsami Arcæi,  
 Virellorum Ovorum ana unciā unam:  
 Probe subacta diluantur  
 Spiritus Vini unciis octo.  
*Ad Ulcera & Vulnere sinuosa injicienda  
 adhibetur, si quidem Spirituosa admittant.*

## BALSAMUM CATHOLICUM.

Videatur Balsamum Commendatoris de  
 Perne.

## BALSAMUM CELLENSE.

Videatur Balsamum Scherzeri.

## BALSAMUM CEPHALICUM

*Saxonicum.*

Videatur Balsamum Scherzeri.

BALSAMUM CHALYBEATUM, BAL-  
 SAMO DI AGHI, BEAUME D'  
 AIGUILLES *Parisiensium.*

℞. Acuum chalybearum unciam se-  
 mis:

Dissolvatur in

Spiritus Nitri sesqui-uncia:

Solutioni addantur

Olei Olivarum uncia duæ semis,

Spiritus Vini rectificati uncia duæ:

Leni calore detineantur & agitentur,  
 usque dum probe sint unita,

*Laudatur contra dolores Arthriticos & Po-  
 dagricos.*

## BALSAMUM AD DENTITIONEM

*Charas.*

℞. Succī expressi Cancrorum fluviati-  
 lium,  
 Mucilaginis Radicis Althææ ana un-  
 cias duas,  
 Butyri optimi uncias tres,

Suc-



Succi Axungiarum Gallinæ,  
Anatis ana drachmas duas:

Mixta coquantur lento igne ad humiditatis consumptionem. Colaturæ addantur

Sacchari Candi pulverisati unciaë quatuor,

Vitellorum ovi numero unum:  
Probe misceantur.

*Sententiæ Charas, qui hoc medicamento tenellorum Dentienti Gingivulæ illinendo, Dentitionem egregie promoveri experientia doctus docet, plures accedunt.*

## BALSAMUM Fioraventi.

℞. Baccarum recentium Lauri uncias quatuor,

Gummi Elemi,  
Tacamahacæ ana unciaë unam,  
Galbani,  
Olibani,  
Myrrhæ,  
Hederæ ana uncias tres,

Styracis liquidæ uncias duas,

Ligni Aloës uncias tres,

Galangæ minoris,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Nucis Moschatæ,

Zedoariæ,

Zinziberis,

Dictamni albi,

Aloës Succotrinæ,

Succini ana unciam unam,

Spiritus Vini rectificati uncias nonaginta sex:

Digerantur per novem dies, tunc addantur

Terebinthinæ unciaë sedecim:

Abstrahatur inde Spiritus, quem BALSAMUM Fioraventi SPIRITUOSUM appellant.

A Destillatione residuum Retortæ commissum lento igne Destilletur, flavum quod inde elicitur oleum Balsamum Oleosum, dicitur. Quo obtento augeatur ignis, & quod jam prodit magna nigrum empyreumaticum, sub nomine Balsami Nigri asservetur.

*Medicamentum a nugivendolo Alchemico celebratum Medicorum nonnulli receperunt; Balsamum spirituosum, quod quidem Balsamum Fioraventi simpliciter præscripturis semper est recipiendum, a quibusdam quoque tanquam vires edens Analepticas, Nervinas, Nephrticas, Diureticas, Alexipharmacas, Traumaticas, Antihystericas & Carminativas adeo commendatur, ut in variis morbis a causa præsertim Frigida aut Flatulenta oriundis, opportune adhibitum, insignem usum præstare videatur. Huic admodum analoga Aqua videtur esse Anhaltina. Balsamum Oleosum odoratorum, Balsamum Nigrum autem Empyreumaticorum Oleorum vires edet.*

## BALSAMUM HYSTERICUM Parisiense.

℞. Gummi Asphalti,

Galbani,

Ladani ana drachmam unam,

Assæ foetidæ scrupulum unum,

Aloës drachmam unam,

Castorei,

Opii ana drachmam semis,

In mortario calido contendantur in massam, cui addantur

Oleorum Destillatorum Rutæ,

Succini ana

guttæ decē,

Absynthii,

Sabinæ,

Tanacetii,

Petrolei ana

guttæ duo-

decim.

Olei expressi Nucis Moschatæ scrupuli duo:

Probe misceantur.

*Hoc Balsamo motos in Utero fluctus, quosque vulgo Hystericas Passiones aut Suffocationes vocant, turbas placide sedari perhibent. Admovetur Naribus; illinitur Umbilico.*

## BALSAMUM ISCHÆMATICUM

*Brusvicensium.*

Videatur Balsamum Adstringens.



**BALSAMUM LECTORENSE, BEAUME DE LAICTURE DE VINCEGUERRE, DE CONDOM** a *Baumé* correctum.

**Rx.** Camphoræ comminutæ,  
Crocī pulverisati ana drachmā unam,  
Moschi,  
Ambræ tritæ ana drachmam semis:  
Infundantur in vase clauso per aliquot  
dies leni calore cum

Petrolei albi,  
Oleorum Destillatorum Lavendulæ,  
Terebinthinæ,  
Baccarum Juniperi,  
Caryophyllorum,  
ana uncia una,  
Macis,  
Nucis Moschatæ ana drachmis duabus,  
Benzoës uncia dimidia.

Ufus tempore decantatur Olei quantum opus est.

*Analepticarum, Nervinarum, & Anodynarum virium nomine hoc Medicamentum, ad corrigendum præterea Aerem malignum laudatur.*

### BALSAMUM LITHUANICUM.

Videatur Oleum Betulinum.

### BALSAMUM LOCATELLI. ITALICUM RUBRUM *Pharmacop. Bateanæ*.

**Rx.** Cera citrinæ uncias quatuor,  
Olei Olivarum uncias sex,  
Vini Malvatici uncias quinque:  
Leni igne ad consumptionem humiditatis coctis colatisque addantur  
Terebinthinæ optimæ uncia sex,  
Santali rubri pulverisati unciam semis:

### BALSAMUM.

Agitentur fortiter, satisque refrigeratis admisceantur.

Balsami Peruviani drachmæ duæ.

*Ad Vulnera, Contusiones, Variasque læsiones internas pariter ac externas commendatur, interne a drachmis duabus ad unciam semis propinatur.*

### BALSAMUM AD LORICANDUM CADAVER CONDITUM *Parisiensium*.

**Rx.** Balsamorum Peruviani,  
de Copaiba,  
Styracis liquidæ ana uncias quatuor & viginti,  
Oleorū expressi Nucis Moschatæ uncias octo,  
Destillati Lavendulæ uncias duas,  
Thymi unciam semis:

Liquefiant leni igne.

### BALSAMUM MERCURIALE *Plenckii*.

**Rx.** Mercurii vivi drachmas duas:  
Extinguantur probe in  
Terebinthinæ drachma una:  
Addantur

Axungia Porci drachmæ sex,  
Balsami Arcaei drachmæ novem,  
Mercurii dulcis grana viginti & tria:  
Exacte misceantur.

*Clarissimus Auctor hoc Medicamentum ad Ulcera Venerea consolidanda admodum conducere contendit.*

### BALSAMUM NERVINUM *Parisiensium*.

**Rx.** Oleorum Palmæ,  
Nucis Moschatæ,  
Medullarum Cervi,  
Cruris bovis ana uncias quatuor,  
Axungiarum Hominis,  
Taxi,  
Viperæ ana unciam unam:  
Leni calore liquatis adjiciantur  
Oleorum Destillatorum Lavendulæ,  
Menthæ,  
Oleo-



Oleorum Destillatorum Rorismarini,  
 Salviae,  
 Thymi,  
 Caryophyl-  
 lorum ana  
 drachma  
 una,

Camphoræ drachmæ duæ,

Balsami Peruviani sicci uncia una :

Duo ultima dissoluta in Spiritus vini  
 quantitate sufficiente :

Mixta asserventur.

*Inungitur membris Debilitatis & Torpidis.*

## BALSAMUM ODONTALGICUM

*Würtenbergensium.*

Rx. Opii,

Camphoræ ana scrupulos duos :

Dissolvantur in Spiritus Vini pauxillo :  
 Addantur

Oleorum Destillatorum Ligni Sancti  
 drachmæ  
 duæ,  
 Caryophyl-  
 lorum dra-  
 china una,

Expressi Nucistæ drachmæ  
 sex :

Probe misceantur.

*Hoc Balsamum vel solum, vel Gossypio  
 exceptum, Dentiumque cavitatibus applica-  
 tum probatæ fertur esse efficaciæ ad sedan-  
 dos Dentium dolores vel gravissimos.*

## BALSAMUM OPHTALMICUM RU-

BRUM, *Pharmacop. Danicæ.*

Rx. Cerae albæ drachmas sex :

Leni calore liquatis admisceantur

Butyri recentis optimi uncia tres,

Mercurii præcipitati rubri in tenuis-  
 simum pulverem triti

drachmæ duæ & grana quin-  
 decim :

Misceantur exactissime.

*Pterygiis & Maculis Corneæ curandis bis  
 de die unum aut alterum granum inungitur.*

## BALSAMUM OPHTALMICUM,

*Saintyves.*

Rx. Balsami Ophthalmici rubri uncias  
 duas,

Camphoræ scrupulum unum,

Tutiz drachmam semis :

Misceantur.

*Paribus fere cum antecedentibus viribus  
 sese commendat, quin, si Ophthalmia acces-  
 serit, fertur præferendum.*

BALSAMUM PECTORALE *Meibomii*

Rx. Terebinthinæ optimæ,

Oleorum Amygdalarum dulcium ana  
 drachmas octodecim,

Hyperici uncias duas,

Spermatis Ceti unciam semis,

Sanguinis Draconis optimi,

Extracti Opii aquosi,

Balsami Peruviani ana drachmas duas,

Butyri optimi unciam unam cum  
 femisse :

Misceantur.

*Hoc remedium Duci incerti nominis Brunf-  
 vicensi, in Phthysos suspicionem vocato, a  
 Meibomio ad decem quindecimve de die  
 in diem guttas præscriptum eo valuisse, re-  
 fert Schulzius l. c. p. 50, ut senectutem  
 iste Dux inde affectus sit satis provectam  
 æque ac vegetam.*

BALSAMUM COMMENDATORIIS de  
 PERNE CATHOLICUM TRAUMA-  
 TICUM *Suecorum.*

Rx. Balsami Indici sicci unciam unam,

Styracis electæ uncias duas,

Benzoës electæ uncias tres,

Olibani electi unciam semis :

Trita dissolvantur in

Spiritus Vini rectificatissimi unciiis  
 quindecim :

Filtrata solutio commisceatur cum Tin-  
 ctura parata ex

Radiciis Angelicæ,

Herbæ Millefolii,

Aloës Succotrinæ,

Myrrhæ electæ ana uncia dimidia,

Spiritus Vini rectificatissimi unciiis  
 decem.



Pomet qui primus hujus Balsami descriptionem nobis suppeditavit, magnis illud laudibus extulit. In variis morbis, omnis generis Vulneribus & Ulceribus internus æque ac externus ejus usus magnopere commendatur. Interne autem caute & parce, ne Sanguinem exastuet, præscribendum videtur. Guttae decem sufficiant.

## BALSAMUM SAMARITANUM

*Schræderi.*

Rx. Olei Olivarum,  
Vini generosi ana uncias octo.  
Coquantur ad consumtionem humiditatis.  
*Traumatico scopo usurpatur.*

BALSAMUM SAPONACEUM *Edinburgensium.* INFUSUM SAPONACEUM.  
UNGUENTUM OPODELDOCH *Suecorum.*

Rx. Saponis albi Hispanici uncias quinque,  
Camphoræ unciam unam:  
Dissolvantur in  
Spiritus Vini rectificati unciis viginti quatuor,  
Oleorum destillatorum Rorismarini,  
Origanī ana  
drachmis  
duabus.

*Laudatur maxime ad resolvendos Tumores Cysticos & affectus Rheumaticos.*

BALSAMUM SATURNI *Goulard.*  
UNIVERSALE.

Rx. Cerae Citrinæ uncias octo,  
Liquentur leni igne cum  
Olei Rosarum unciis octodecim:  
Addantur  
Extracti Saturni uncia quatuor,  
Camphoræ trita drachma una:  
Probe misceantur.

*Multum contra Impetigines, Ulcera fistulosa, Gangrenæque & Sphaceli formidinem laudatur.*

## BALSAMUM SCHAUERIANUM

*Brumvicensium.*

Rx. Radicum Symphyti drachmas sex,  
Ostrucii unciam dimidiam,  
Calami Aromatici drachmas tres,  
Caryophyllatæ,  
Enulæ ana drachmam unam,  
Angelicæ grana quindecim,  
Galangæ drachmas tres,  
Dictamni drachmas sex,

Styracis,  
Olibani ana drachmas tres,  
Galbani drachmas novem,  
Nucis Moschatæ,  
Cubebarum ana drachmas duas,  
Zinziberis,  
Cinnamomi ana drachmas tres,  
Caryophyllorum,  
Ligni Santali albi ana drachmas duas,  
Cardamomi,  
Ligni Aloës ana drachmam unam,  
Gummi Benzoës drachmas tres,  
Mastyches unciam semis,  
Aloës hepaticæ drachmam unam,  
Myrrhæ drachmam semis,  
Terebinthinæ Venetæ unciam unam  
semis.

Spiritus Vini rectificati uncias nonaginta sex.

Destilletur lento igne Spiritus & in eo dissolvantur,

Camphoræ drachma una.

Olei Destillati Baccarum Lauri uncia una.

*Hoc medicamentum in Germania passim celebratur, satisque frequens ejus, tanquam Vulnerarii polychresti, usus est. Intus quoque ad modum Balsami Fioraventi adhibetur.*

BALSAMUM SCHERZERI *Kalde correctum.* AROMATICUM *Suecorum.*

Rx. Olei expressi Nucis Moschatæ unciam unam semis,  
Oleorum Destillatorum Majoranæ,  
Lavendulæ,  
Rorismarini,  
Oleo-



## BALSAMUM.

Oleorum Destillatorum Succini,  
Serpilli ana  
drachmas  
duas,  
Rutæ,  
Pulegii,  
Melissæ,  
Menthæ,  
Cardamo-  
mi ana  
scrupulum  
unum:

Misceantur.

*Hoc medicamentum Balsamo Cellensi & Cephalico Saxonico est analogum; præter odorem satis gratum virtutibus pollet Anticolis, Carminativis & Stomachicis; hinc in Torminibus ventris, infantum præcipue, Abdomini utiliter illinitur. Quin & adultioribus in affectibus Colicis, Flatulentis, Hystericis, a causa frigida originem ducentibus interne quoque cum jusculo modica dosi præscribi posse Schulizius Auctor est l. cit. p. 51.*

## BALSAMA SIMPLICIA.

℞. Olei expressi Nucistæ opè Alcoholis omni odore & sapore privati, quod corpus pro Balsamo appellare solent, partes quinque,

Olei destillati, unde Balsamum denominatur, partem unam: Probe misceantur.

Usu receptum, quod BALSAMUM CARYOPHYLLORUM Pulvere Caryophyllorum, BALSAMUM CINNAMOMI Bolo Armena, BALSAMUM LAVENDULÆ Cœruleo montano, BALSAMUM MAJORANÆ Herbæ Majoranæ, BALSAMUM RUTÆ Viridi Æris tingantur.

*Balsama simplicia a viribus Oleorum unde denominantur, dijudicanda esse facile patet.*

## BALSAMA SULPHURIS.

BALSAMUM SULPHURIS CRASSUM  
*Edimburgensium.*

℞. Sulphuris citrini partem unam,  
Olei unguinosi, unde denominatur, partes sex:

## BALSAMUM.

In vase terreo amplo, sub perpetua agitatione coquantur usque dum Sulphur calore liquatum, subisse oleum pateat ex colore, odore, satisque magna intumescencia. Oleum quoddam destillatum si recipiendum est, decem ejus adhibentur partes, solutioque fit in Cucurbita vitreâ ope Balnei Arenæ.

Ex Oleo quocunque destillato surgit BALSAMUM SULPHURIS ANTIMONIALE *Hoffmanni*, si quidem isti Oleo admiscueris Hepar Antimonii ex aqua oriundum, cum Reguli Antimonii simplicis Scoriis cocta. Pro BALSAMO SULPHURIS *Rulandi* jam cum quodam Oleo unguinoso paratum recipere, jam eidem insuper octavam Olei Terebinthinæ partem adjicere solent.

*Monui in Institution. Chemiæ ad Experimentum XV. prudentiores Medicos a nauseosis his Medicamentis & acribus abstinere. Præcipuè eorum vires ab Oleo pendent ad eorum præparationem adhibito. Quæ Olea unguinosa receperunt, mitiora quidem sunt Oleorum odoratorum ope paratis, sed ne hæc quidem acritudine carent, quippe Oleum quodque mitissimum alias, ubi sub præparatione incaluerit, evadet acre.*

## BALSAMUM TRANQUILLANS

*Parisiensium.*

℞. Foliorum recentium Strammonei, Solani nigri, Phytolacæ, Belladonnæ, Mandragoræ, Hyoscyami ana uncias quatuor: Papaveris sativi uncias octo. Persicariæ unciam unam,

Buforum viventium numero quinque: Incisa coquantur cum

Olei Olivarum unciis sexaginta, Ad consumptionem humiditatis; Oleo per colum trajecto Addantur

Summitatum recentium Rorifinarini, Salviæ,  
Sum-



Summitatum recentium Ruthæ,  
 Hyssopi,  
 Lavendulæ,  
 Thymi,  
 Majoranæ,  
 Costi hortensis,  
 Menthæ,  
 Hyperici ana  
 uncia una,  
 Absynthii un-  
 ciæ duæ,

Florum recentium Sambuci uncia una:  
 Digerantur in vase clauso leni calore  
 per quatuordecim dies, colatum Oleum  
 elapsis aliquot diebus a fœcibus, quas  
 deponit, decantetur, & usui servetur.

*Hoc Oleum, improprie sane Balsmum  
 dictum, exterius fricando, inungendo adhi-  
 bitum, permulcendis & consopientis sævis  
 Arthriticorum, Ischiadicorum & Rheumati-  
 corum doloribus egregie valet.*

### BALSAMUM TRAUMATICUM

*Edinburgense.*

Videatur Balsamum Commendatoris de  
 Perne.

### BALSAMUM TRAUMATICUM

*Londinense.*

Videatur Balsamum Commendatoris de  
 Perne.

### BALSAMUM VIRIDE *Du Clos, five Metensium, five de Fœuillet.*

℞. Viridis Æris uncias tres,  
 Vitrioli albi unciam unam semis:  
 Pulverisata subigantur in mortario cum  
 Oleorum Lini,  
 Olivarum ana unciis sex,  
 Olei Laurini uncia una:  
 Addantur  
 Terebinthinæ uncia duæ,  
 Calefiat mortarium, omnia, ut exacte  
 coëant, agitentur, tunc adjiciantur  
 Aloës pulverisata drachmæ duæ:  
 Oleorum destillatorum Juniperi un-  
 ciam semis,

Oleorum Destillatorum Caryophyllo-  
 rum drach-  
 ma una:

Optime mixta asserventur & tempore  
 usus denuo agitentur, ut quæ subsederunt  
 insidentibus remisceantur.

*Adhibetur ad Ulcera detergenda & ad  
 consumendam Carnem Fungosam.*

### BALSAMUM VITÆ *Funni.*

℞. Salis Tartari unciam unam semis:  
 Dissolvatur in  
 Aquæ fontanæ unciis viginti quatuor:  
 Addantur  
 Olei Terebinthinæ uncia tres,  
 Saponis Veneti pulverisati uncia duæ:  
 Probe mixtis adjiciantur  
 Spiritus Juniperi uncia duæ,  
 Olei Culilabani uncia tres:  
 Misceantur.

*Hoc Balsamo membra Arthritica, Rheu-  
 matica, Paralytica, & quæ Sugillationes  
 habent, efficacissime fricari Auctor contendit.*

### BALSAMUM VITÆ *Hoffmanni.*

℞. Oleorum destillatorum Lavendulæ,  
 Majoranæ,  
 Caryophyllo-  
 rum,  
 Cubearum,  
 Cardamomi  
 ana scrupu-  
 lum unum,  
 Macis scrupu-  
 los duos,  
 Cinnamomi  
 scrupulum  
 unum,  
 Rutæ,  
 Succini,

Balsami Peruviani ana scrupulum se-  
 mis,

Quintæ Essentiæ Citri scrupulum unum:  
 Probe mixtis subigatur

Ambraë Gryseæ scrupulus semis:

Addantur

Spiritus Vini rectificatissimi uncia  
 viginti:

Solutio rite parata asservetur.



*Hoc Balsamum Hoffmannus jam in Notis ad Poterium descripserat, cum autem labente tempore quæstum sibi inde comparare consultum fore crediderit, ejus parandi modum sibi solinotum esse divulgavit, & idem quoque ejus discipulus Schulz. l. c. p. 54. tradidit. Adhibetur vero hoc medicamentum extus ad Odorandum & partes debilitatas Roborandas, ad Ventriculi affectus, Nauseam, Ructus, Colicam & Diarrhæam. Interno etiam usui iisdem in morbis ad guttas usque Viginti commendatur.*

## BALSAMUM VITÆ EXTERNUM

Plenckii.

℞. Saponis ficcati & in pulverem triti uncias sex,

Salis Tartari unciam unam semis,

Olei Terebinthinæ uncias duodecim:

Misceantur.

*Egregium medicamentum resolvens contra Tumores Cysticos, & alios frigidos, Anchyloses &c. laudatur si duodecuplo Aquæ dilutum sub forma Fomenti vel Stillicidii adhibetur.*

## BALSAMUM VITÆ Teichmeieri.

℞. Quintarum Essentiarum Citri scrupulos quatuor,  
Bergamottæ guttas duodecim,

Oleorum Destillatorum Cinnamomi,  
Menthæ anæ guttas octodecim,

Cardamomi,  
Caryophyllorum,

Melissæ Turcicæ,

Macis,

Rorismari,

Lavendulæ

anæ guttas duodecim,

Rutæ,

Salviæ anæ

guttas quinque,

Dissolvantur in

Spiritus Vini alcalisati loti uncias sex:  
Colorentur

Radicis Alcannæ sufficiente quantitate:  
Filtrato liquori addatur,

Essentiæ Ambraë drachma semis.

*Ex quo insignis, quem sibi suo Balsamo Vitæ comparaverat Hoffmannus, innotuit quæstus, alii quoque Medici, eadem spe ducti, ad idem negotium frequentes se applicuerunt. Hinc dissolutis in Alcohole aut Liquore Anodyno fragrantibus Oleis multa deinceps atque varia concinnata videmus Balsama Vitæ sive quæ Principium Vitæ restaurent medicamina, nomine & genera diversa, viribus congrua.*

## BALSAMUM VULNERARIUM

Edimburgensium.

Videatur Balsamum Commendatoris.

## BALSAMUM VULNERARIUM

Londinensium.

Videatur Balsamum Commendatoris.

## BALSAMUM VULNERARIUM

Mindereri.

Videatur Balsamum Arcæi.

## BALSAMUM VULNERARIUM Stablit.

℞. Essentiæ Succini uncias duas,

Myrrhæ unciam unam,

Olei Terebinthinæ unciam semis:

Misceantur & loco calido in vase clauso Digerantur.

*Ad Vulnere & Ulcera partium Exsanguium adhibetur.*

## BEZOARDICUM JOVIALE.

Videatur Antihecticum Poterii.

## BEZOARDICUM MARTIALE, PULVIS CACHECTICUS Ludovici, SPECIFICUM STOMACHICUM Poterii.

℞. Limaturæ Martis uncias sex,  
Antimonii crudi uncias sex:

E

Mix-



Mixta fluant in Crucibulo, effundantur, reducantur in pulverem, & detonentur cum

Nitri crudi unciis sex & triginta:  
Calx probe edulcorata fervetur usui.

*Huic Calci vires Roborantes, Acidum Absorbentes, & Transpirationem promoventes adscribuntur. Ad viginti quinque grana adhibetur.*

### BEZOARDICUM MINERALE MOEBII.

Rx. Mercurii Vitæ partem unam,

Nitri crudi partes tres:

Misceantur, Detonentur in Crucibulo candente, committantur Aquæ, pulvis subsidens bene edulcoratus fervetur.

*Ostendi in Instit. Chem. p. 272 hanc Calcem ab Antimonio Diaphoretico nequaquam differre.*

### BOLI ARMENÆ PRÆPARATIO.

Bolus Armena pulverisata cum Aqua agitur; Aqua turbida a spisso, quod fundum tenet, leniter defundatur; Aquæ denuo affundatur, quæ paulisper agitata priori addatur, atque hic actus usque repetatur dum in Aqua cum Bolo agitata parum vel nihil amplius turbidi appareat; Pulvis ita elutriatus exsicceatur.

### BOLUS ANTHELMINTICUS PURGANS *Nouffer.*

Rx. Panacæ Mercurialis,

Diacydii præparati ana grana decem,

Gummi guttæ grana decem

Pulverisata redigantur cum

Confectionis de Hyacintho quantitate, quæ sufficiat, in Bolum.

*Specificè ad expellendam e corpore Tæniam laudatur.*

### BOLI LITHONTRIPTICI *Roséen.*

Rx. Saponis Alicantini uncias octo,

Testarum Ovorum calcinatarum,

Fructuum Cynosbati ustorum ana unciam unam,

Salis Tartari drachmam unam:  
Mixta efformentur cum Spiritu Vini in Bolos sexaginta.

*Eorum quatuor in diem sumantur.*

### BOLI IN QUARTANA *Richard.*

Rx. Corticis Chinæ tenerime pulverisati drachmas sex,

Scillæ præparatæ scrupulos duos,

Kermes mineralis grana sex,

Spiritus Salis Ammoniaci drachmam unam,

Conservæ Rosarum quantum satis:

Misceantur & formentur Boli duodecim.

*Quater de die per æqua intervalla singulatim sumantur.*

### BOLI VERMIFUGI *Richard.*

Rx. Pulverum Radicum Filicis unciam semis,

Rhei electi drachmas duas,

Seminis Cinæ uncia semis:

Mercurii dulcis drachmam unam:

Misceantur & Syrupi Absynthii qua sufficit quantitate cogantur in Bolos duodecim.

*Per singulos dies tres eorum sumantur.*

### BUTYRUM CACAO *Homborgii.*

Rx. Nuces Cacao:

Torreantur in sartagine ferrea, ut a Cortice possint nudari, decorticatæ contundantur in pulverem, qui committatur sacco linteo inter preli laminas probe calefactas collocando. Oleum inde obtentum leni calore liquatum detineatur, usque dum facès deposuerit, a quibus defusum asservetur.

*Ad usum tam internum quam externum Spermati Ceti substituitur, cui suavitatem & gratiam præstat.*

### BUTYRUM VEL UNGUENTUM MAJORANÆ *Kalde.*

Rx. Herbarum recentis Majoranæ,

Butyri recentis ana partes æquales:

Le-



Leni igne coquantur usque dum aliquot guttæ igni instillatæ sine strepitu deflagrent, tum linteo commissa subjiciantur prelo.

*In Narium infantum obstructione a Muco viscido oriunda expetitur, quo scopo radici & alis Nasi illinitur.*

## BUTYRUM RUBRUM.

Videatur Unguentum rubrum Potabile.

## BUTYRUM VIRIDE.

Videatur Unguentum Viride Potabile.

CANDELÆ vel CEREOLI  
CHIRURGICÆ *Goulard.*

Ceræ liquatæ

Adjiciatur

Extractum Saturni:

Massæ liquidæ immittatur tenue lin-  
teum, ope Spathæ illa supra hoc exten-  
datur, paratus hac ratione Sparadrapus  
in linguam latæ bascos & verticis acu-  
tissimi dissecetur, mediantibus digitis  
convolvatur, & inter duos asseres sive  
lapides politos lævigetur, crassities his  
cereolis ea detur, quæ cavo Urethræ  
respondet; varia eorum longitudo est,  
maxima novem pollices æquat, triplex  
eorum genus *Illustris Richard* præscribit,  
primum  $\frac{1}{3\frac{1}{2}}$  Extracti Saturni recipit, se-  
cundum  $\frac{1}{8}$ , tertium  $\frac{1}{4}$ .

*Hi Cereoli Oleo illiti inseruntur Urethræ  
ad illum usque locum ubi angustata est; quæ  
quidem angustia quo gravior quoque magis  
callosa est, eo major Extracti Saturni quan-  
titas ad instruendam candelam recipitur; cum  
sensibiliores per morbum Urethræ rigidiores,  
candelas ægrius admittant, Goulard ingre-  
dientibus recensitis  $\frac{1}{3\frac{1}{2}}$  Axungie Pervecinæ  
& totidem Olei Amygdalarum adjici jubet.*

CANDELÆ CHIRURGICÆ  
MERCURIALES *Plenckii.*

Rx. Ceræ flavæ uncias sex;

Liquatis addantur

Extracti Saturni uncia dimidia,

Mercurii dulcis drachmæ duæ:  
Formentur inde Cereoli ratione modo  
dicta.

*Has Candelas maxime ad revocandam Go-  
norrhæam suppressam commendant.*

CANDELÆ FUMALES *Juncken*  
*correctæ.*

Rx. Benzoës electæ uncias octo,  
Styracis Calamitæ unciam unam fe-  
mis,  
Ladani,  
Olibani,  
Mastychis,  
Caryophyllorum ana drachnam unā  
femis,  
Carbonum Tiliæ uncias sex & triginta:  
Pulverisatæ redigantur cum  
Mucilaginis Tragacanthæ quantitate  
sufficiente in massam, ex qua formentur  
parvi coni, quorum bases in tres pedes  
figurantur.

*Vires ex nomine patent.*

CASSIA cum MANNA *Richard.*

Rx. Medullæ Cassiæ unciam semis:  
Salis vegetabilis drachmam unam  
femis,  
Mannæ uncias duas:  
Dissolvantur in  
Aquæ fontanæ unciis quinque.  
Colatura exhibeatur pro una dosi, tan-  
quam lene Laxans.

CASSIA PRO CLYSTERIBUS *Val. Cordi.*

Rx. Fliorum Betæ,  
Malvæ,  
Mercurialis,  
Parietariæ,  
Violaræ,  
Florum Violarum ana manipulum  
unum.  
Incisa coquantur cum  
Aquæ unciis triginta  
Ad uncias viginti, colatura discoquatur  
cum  
Medullæ Cassiæ quantitate sufficiente  
ad Consistentiam Mellis, cui uncias duo-  
de-



decim æquanti addantur

Sacchari Thomæ uncie octodecim.  
Coquantur ad Consistentiam Electuarii.

*Movendæ Alvi gratia Clysteribus adjicitur  
ab uncia una ad duas.*

### CASSIA EXTRACTA.

Videatur Pulpa Cassiæ.

### CATAPLASMA ANODYNUM Richard.

℞. Foliorum Althææ manipulos quatuor,  
Papaveris fativi manipulum  
unum,  
Hyoscyami manipulum se-  
mis:

Crasse contusa coquantur cum  
Lactis quantitate sufficiente ad con-  
sistentiam Pultis;

Adjciantur

Olei Lini uncie duæ,  
Farinæ Seminis Lini uncia una:

Misceantur probe.

*Vires ex nomine patent.*

### CATAPLASMA ANTISEPTICUM

*Plenckii.*

℞. Pulveris Antiseptici partes quatuor,  
Spiritus Vini Camphorati partes duas,  
Aceti Vini quantum satis ad paran-  
dum Cataplasma,

*Ad Gangrænam humidam & Tabum pu-  
tridum commendatur.*

### CATAPLASMA ex BRYONIA Plenckii.

℞. Radicum Bryoniæ uncias tres,  
Florum Sambuci unciam unam,  
Herbæ Cicutæ uncias duas:

Pulverifata coquantur cum  
Aceti quantitate sufficiente ad con-  
sistentiam Pultis, cui addantur  
Pulveris Gummi Ammoniacy uncias  
semis,

Salis Ammoniacy Drachmæ duæ,

*Egregium Remedium esse dicitur, ad re-  
solvendos Scirrhus, Scrophulas, Strumas  
induratas & Tumores Articulares commen-  
dabile.*

### CATAPLASMA EMOLLIENS Plenckii.

℞. Micæ Panis Siliginei Lacti imbutæ  
uncias, sex,  
Vitellorum Ovorum Numero tres,  
Pulveris Croci drachmas duas,  
Farinæ Seminis Lini quantum satis.

Fiat Cataplasma,

*Adhibetur ad emolliendos Tumores in-  
flammatorios nec non ad Suppurationem ex-  
citandam.*

### CATAPLASMA MATURANS Plenckii.

℞. Farinæ Seminis Lini uncias quatuor,  
Gummi Galbani Vitello Ovi soluti  
unciam unam,  
Pulpæ Ceparum sub cineribus assata-  
rum drachmas duas,  
Fermenti Panis uncias duas,  
Unguenti Basilici unciam unam,  
Olei Liliorum alborum quantum satis:

Fiat Cataplasma.

*Vires nomen indicat.*

### CATAPLASMA MATURANS

SAPONACEUM Richard,

℞. Cataplasmatidis de Mica panis uncias  
sedecim,

Saponis rasi uncias duas:

Prope misceantur.

*Cum antecedente collatum minus quidem  
efficax est, sed minores quoque dolores ex-  
citat.*

### CATAPLASMA de MICA PANIS

*Richard.*

℞. Micæ Panis Siliginei uncias sedecim,  
Pulverum Florum Meliloti,  
Sambuci ana dra-  
chmas duas,

Coquantur cum

Lactis unciis octo & quadraginta,

Ad consistentiam Pultis.

*Relaxandi & Maturandi scopo adhibetur.*



## CATAPLASMA POMACEUM

*Plenckii.*

℞. Pulpæ Pomorum uncias duodecim,  
Camphoræ,  
Pulveris Crocis ana scrupulum unum:  
Misceantur

*Medicamentum ad omnem Oculorum Inflammationem peridoneum; ad Vultus Corneæ post Cataractæ operationem deligandum multum laudatur.*

CATAPLASMA RESOLVENS *Plenckii.*

℞. Farinarum Resolventium quantum vis,  
Aquæ Vegeto-mineralis octuplum:  
Coquantur ad consistentiam Pultis.

*Tumores inflammatorios egregie discutere dicitur.*

CATAPLASMA RESOLVENS ad  
SCIRRHOS *Plenckii.*

℞. Seminis Lini,  
Herbæ Cicutæ ana partes æquales;  
Crasso modo contusa coquantur in  
Lactis octuplo  
Ad consistentiam Pultis.

*Tumores inflammatorios valide dissolvere dicitur.*

## CATHOLICUM.

Videatur Electuarium Catholicum.

## CAUSTICUM ANTIMONIALE.

Videatur Butyrum Antimonii.

CAUSTICUM COMUNE *Geber*,  
POTENTIALIALE. LAPIS CAUSTICUS.

℞. Cinerum Clavellatorum partē unam,  
Calcis vivæ partes quatuor:  
Coquantur cum  
Aquæ vigecuplo

Per aliquot horas: trajiciatur liquor per filtrum, filtratus evaporetur in vase vitreo ad siccitatem, fundatur leni calore & effundatur in modulum, quo

ad præparationem Lapidis Infernalis uti solent.

*Inservit ad excitandos Fonticulos & ad auferendas Excrecentias præternaturales.*

## CAUSTICUM LUNARE.

Videatur Lapis Infernalis.

CAUSTICUM COMMUNE MITIUS  
*Edimburgensium*. CAUSTICUM POTENTIALIALE, VEL COMMUNE *Suecorum*.

℞. Causticum commune *Geber*.  
Dissolvatur in  
Aquæ triplo,  
Adjiciatur sensim

Calcis vivæ quantum fatis, ut omnis liquor absorbeatur, & Pasta surgat in vase obturato asservanda.

*Vires nomen indicat.*

## CERA ARBOREA.

℞. Cerae,  
Resinæ ana uncias sedecim,  
Terebinthinæ uncias sex:  
Fundantur leni igne.  
*Arborum Vulneribus obducitur.*

## CERA CITRINA.

Videatur Emplastrum Citrinum.

CERA AD CRINES *Vallbanii*.

℞. Cerae albæ,  
Unguenti Pomati ana partes æquales:  
Leni calore liquata fundantur in Magdaleones.  
*Adhibetur ad usus Cosméticos.*

CERA VIRIDIS *Kalde*.

℞. Cerae Citrinæ uncias tres & triginta,  
Resinæ,  
Terebinthinæ ana uncias duodecim:  
Mixtis & liquatis adjiciantur  
Viridis Æris probe triti uncia duæ.  
*Contra Glavos pedum feliciter adhibetur.*



CERATUM COSMETICUM, POMMA-  
DE EN CREME *Baumé*.

Rx. Cerae albæ,  
Spermatis Ceti ana unciam dimidiam,  
Olei Amygdalarum dulcium unciam  
unam:

Leni calore liquata agitentur usque dum  
refrigerint:

Tunc sensim affundantur

Aquæ Rosarum drachmæ sex;

Sub perpetua agitatione reliquæ massæ  
commiscendæ.

*Adhibetur Cosmetico scopo ad Cutim mollem  
reddendam & lævem.*

CERATUM DETERGENS *Falckii*.

Rx. Cerae albæ uncias quatuor,  
Olei Olivarium uncias sex:

Liquefactis admisceantur

Mercurii dulcis uncia duæ,

Præcipitati rubri uncia se-  
mis:

Sacchari Saturni uncia una:

Singula prius in tenerrimum polli-  
nem lavigata,

Olei destillati Lavendulæ drachma  
femis:

Effundantur in capsulas chartaceas qua-  
dratas, & dum refrigerint in quadra-  
ta secantur.

*Ad Ulcera Venerea Detergenda adhibetur.*

CERATUM ad LABIA *Argentoratensium*  
correctum.

Rx. Succu Uvatum,  
Pomorum ana uncias duodecim,  
Butyri recentis uncias duas & tri-  
ginta:

Coquantur lento igne ad consumptionem  
humiditatis, per linteum trajectis ad-  
dantur

Cerae albæ uncia sedecim,

Spermatis Ceti uncia una:

Leni calore liquentur, sub perpetua agi-  
tatione refrigeratis immisceatur

Olei destillati Lavendulæ drachma una.

*Non modo ad Fissuras labiorum & Pa-*

*pillæ cum successu adhibetur, sed egregie  
quoque contra Impetiginem facit. Quibus in  
hoc medicamento arridet rubedo, commen-  
danda Radix Alkannæ.*

CERATUM REFRIGERANS *Galenii*  
AMYGDALINUM *Parisiensium*, EM-  
PLASTRUM ad FONTICULOS.

Rx. Cerae albæ uncias duas,

Olei Amygdalarum uncias octo:

Liquentur leni igne, & continuo agi-  
tentur, usque dum refrigerint, tunc  
sensim admisceantur

Aquæ Rosarum uncia sex.

*Qui in hoc Cerato desideratur color albus;  
ut obtineatur, Oleo, quod Galenus præci-  
pit, Rosarum substituiimus Oleum Amyg-  
dalarum. Partibus, Inflammatione aut Im-  
petigine laborantibus, pariter ac ab acribus  
Humoribus defendendis inungitur; contra  
Fissuras quoque cum successu adhibetur, quin  
& deligandis Fonticulis usum suum præstat.*

CERATUM SATURNINUM *Goulard*.

Rx. Cerae albæ uncias octo,

Olei Amygdalarum uncias octode-  
cim:

Leni igne liquatis addantur

Extracti Saturni uncia quatuor:

Sub perpetua agitatione refrigeratis ad-  
misceatur:

Camphoræ, parum Olei Amygda-  
larum dissolutæ, Drachma una.

*Ad Ulcera Callosa, Fistulosa Scrophulo-  
sa & Venerea, nec non ad Impetiginem  
laudatur.*

## CEREOLI.

Videantur Candela.

CERUSSA ANTIMONII *Barchusen*.

Rx. Reguli Antimonii partem unam,  
Nitri partes tres:

Mixta in pulverem redacta Detonentur,  
Calx edulcorata asservetur.

*Plane non differt ab Antimonio Diapho-  
retico.*



## CHALYBS PRÆPARATUS.

Limatura Chalybis in mortario ferreo pistilli ferrei ope reducatur in tenerrimum pollinem; per cribrum ferreum trajectus, asservetur in vitro probe clauso.

*Vires Æthiopis Martialis exserit.*

## CHOCOLATA.

℞. Nucum Cacao *Cavaques* leviter tostorum uncias sedecim:

In pulverem redactæ committantur mortario ferreo, prunis super imposito & sub gradu caloris eo, quem manus sustineat, agitentur pistillo, usque dum in pastam abierint; adjiciantur sub agitatione, neque remisso calore continuanda:

Pulveris Sacchari unciae duodecim:

Ubi nulli ulterius grumuli in Massa observantur,  
Addantur

Vanillæ, cum Sacchari Drachmis tribus in pulverem tritæ, drachma una.

Exacte mixta Pasta committitur modulis parallelogrammis ferreis Stanno obductis.

Chocolata, quæ nulla Aromata recipit, *Chocolade de Santé* appellatur.

Rarius hodie in Pharmacopoliis Chocolata paratur, quippe, occupatis in ea conficienda propriis Artificibus, relinquitur proprio pro paranda Pasta instrumentorum apparatu instructis. Varia his Vanillæ adjiciendæ ratio est. Si scrupulum unum ad Libram recipiunt, Chocolatam a *Une Vanille*, si duos a *Deux Vanilles* &c. denominare solent.

Pastam quoque ex America mittere solent, ast vero, utpote non raro ex minus bonis Nucibus paratæ, præferenda fere videtur ea quam sibi Artifices ipsi parant.

*Vires Chocolatæ tribuuntur Nutrientes, Corroborantes & Demulcentes. Patent hæc vires Chocolatæ ex Nucleis unde conficitur, quippe quibus præter mite Oleum ope Sac-*

*chari in Aqua suspendendum, Adstringentis & Aromatici quid inhaeret; Uncia una cum menstrui Aquosi Unciis sex pro dosi exhiberi solet.*

## CINERES.

Videatur Sal. per incinerationem paratus.

## CINERES CLAVELLATI DEPURATI.

Cineres clavellati dissolvantur aqua frigida, solutio filtrata inspissetur.

*Cineres clavellati, cum non solum ab omnibus sordibus sed a Tartaro quoque Vitriolato, qui ipsis crebro immixtus est, liberentur, adhibentur ubicunque indicatio Alkali fixum adhiberi jubet. Cum autem Cineres clavellati non raro Salem communem contineant, ad usus Chemicos ista depuratio non sufficit.*

## CINNABARIS ANTIMONII.

Videatur Antimonii Cinnabaris.

CINNABARIS CREMOR *Jungkenii.*

Cinnabaris supra Porphyritem lævigata coquatur cum Aqua in vase terreo, quæ inde superficiei aquæ supernatant cuticulæ colligantur, exsiccentur & in pulverem terantur.

*Obtinetur hac ratione Cinnabaris admodum tenera, illisque maxime commendabilis, qui ex principiis mechanicis, quomodo Sanguinem subire possit, explicare conantur.*

CINNABARIS FACTITIA *Geber.*

℞. Florum Sulphuris partem unam: Fundantur in vase terreo, & ipsi sub perpetua ope pistilli ferrei agitatione adjiciantur.

Mercurii vivi partes septem.

Ubi omnia in pulverem tenerrimum abierint, hic committatur Cucurbitæ & Sublimetur; prima sub Sublimatione si non omnis pulchre splendet & cohæret pulverisata, Sublimetur denuo; rite Subli-



blimata supra Porphyriten in tenerri-  
mum pulverem trita asservetur.

*Neutiquam a cinnabaris reliqua differt.*

### CINNABARIS NATIVA PRÆPARATA.

Cinnabaris in pulverem trita ex Cu-  
curbita Sublimatur, ut ab omnibus he-  
terogeneis liberetur, Sublimata supra  
Porphyriten lavigatur.

*De ejus viribus jam sermo fuit.*

### CLARETA LIQUEURS.

Parantur sive ex partibus Vegetabi-  
lium cum Vino infusis, quibus Spiritus  
Vini quarta ratione Vini pars, & ter-  
tia Sacchari adjicitur, sive ex Succis  
Fructuum, quibus æquæ partes spiritus  
Vini & duæ trientes Sacchari commi-  
scentur, sive ex Vegetalibus cum Spiri-  
tu Vini maceratis, quibus octava pars  
aquæ ratione Spiritus Vini additur, Spi-  
ritus calore Balnei Mariæ inde evoca-  
tur & Syrupò, qui Saccharum in pari  
cum Spiritu ratione habet, commisce-  
tur; sive ex partibus anaticis Aquæ de-  
stillatæ odoratæ & Spiritus Vini, quibus  
mixtis eorum ponderis quarta pars Sac-  
chari & Olei cujusdam destillati aliquot  
guttæ adjiciuntur; ita CLARETUM  
ANISI, CINNAMOMI, MENTHÆ,  
PIPERITIDIS, quod EAU DE CHAS-  
SEURS appellatur &c. parari possunt.  
Claretum quovis modo paratum per Fil-  
trum trajicitur.

*Clareta vix scopo medicato exhibentur,  
potius voluptatis gratia bibuntur: eorum ope  
Digestio omnino potest juvari, si Ventriculo  
cibo repleto committuntur.*

Ut plurimum proprium Artificum ge-  
nus circa eorum præparationem occupa-  
tum est; usitatissimorum parandi ra-  
tionem ex Cl. Machy Art du Destillateur  
Liquoriste exhibeo.

### CLARETUM EAU DIVINE.

Videatur Aqua divina.

### CLARETUM BARBADENSE.

℞. Flavedinem pomorum Citri numero  
sex.

Cinnamomi uncias duas:

Incisa & contusa infundantur per sex  
dies cum

Spiritus Vini unciis ducentis quin-  
quaginta sex, addantur

Aquæ uncia triginta duæ:

Ex Vesica inde destillentur uncia du-  
centæ sexaginta quatuor, quibus com-  
misceantur

Aquæ uncia sexaginta quatuor,

Sacchari uncia centum viginti octo:

Relinquantur per quatuordecim dies &  
filtrentur.

Si uncia Spiritus modo centum vigin-  
ti & octo Destillatione eliciuntur, &  
Sacchari unciis octo & quadraginta in  
Aquæ unciis centum octo & viginti dis-  
solutis, edulcorantur, Liquor Cremor  
Barbadensis dicitur.

### CLARETUM CACAO.

℞. Nucum Cacao decorticatarum & to-  
starum uncias sexdecim,

Cinnamomi unciam unam,

Vanigliæ drachmas duas,

Caryophyllorum drachmam unam,

Contusa infundantur per octiduum in  
Spiritus Vini unciis centum octo &  
viginti:

Filtratis addatur

Spiritus paratus ex

Nucum Cacao decorticatarum & to-  
starum unciis duabus & triginta,

Cinnamomi uncia una,

Contusis per sex dies, infusis cum

Spiritus Vini unciis centum viginti  
& octo

& unde Destillationis ope Spiritus un-  
cia sexaginta & quatuor erant elicita ::

Adjiciantur Sacchari uncia quatuor &  
sexaginta dissolutæ in centum viginti &  
octo unciis Aquæ;

Elapsis quatuordecim diebus Liquor  
filtretur.



## CLARETUM CAFFÉE.

Paratur ut antecedens, præterquam quod Nucibus Cacao substituantur Noces Caffée, & Aromata, Vaniglia excepta, omittantur.

CLARETUM CORONARIUM EAU  
*de Bouquet.*

℞. Caryophyllorum drachmam unam,  
Ligni Rhodii drachmas duas:  
Iacisa & contusa infundantur per octiduum cum Spiritus Vini unciis centum viginti & octo:  
Destillando inde elicitis sex & nonaginta unciis Spiritus addantur  
Olei Jasmini scrupulus unus,  
Vanillæ contusæ scrupulus dimidius,  
Radicis Ireos Florentinæ contusæ drachmæ duæ,  
Sacchari uncia triginta duæ, in totidem unciis Aquæ solutæ,  
Ambra gryseæ, Saccharo tritæ, granum unum:  
Elapsis octo diebus filtrentur.

CLARETUM FLORUM AURANTIORUM,  
HUILE DE FLEURS D'ORANGE *dictum.*

℞. Florum Aurantiorum uncias sedecim:  
Infundantur per mensem cum Spiritus Vini unciis sex & quinquaginta:  
Coletur liquor valida expressione, adjiciantur  
Sacchari uncia quadraginta dissolutæ in  
Aquæ unciis octo & viginti:  
Elapsis quatuordecim diebus filtretur.

## CLARETUM FRUCTUUM.

℞. Ceraforum dulcium maturorum partes triginta,  
Ribesiorum partes duodecim,  
Ruborum Idæorum partes sex:  
Contundantur & infundantur per mensem cum  
Tom. II

Spiritus Vini pari quantitate:  
Succi ope preli expressi unciis quingentis & duodecim addantur  
Caryophyllorum contusorum numero quadraginta octo:  
Vanigliæ filiqua una,  
Sacchari uncia nonaginta sex:  
Elapso mense Liquor filtretur.

CLARETUM *de Garus.*

Videatur Elixir de Garus.

## CLARETUM NUCLEORUM.

℞. Nucleorum Perficorum num. centum:  
Integri infundantur per mensem cum Spiritus Vini unciis duabus & triginta:  
Addantur  
Vanigliæ, Saccharo tritæ, grana sex,  
Sacchari uncia octo,  
Post diem decimum quartum Liquor filtretur.

CLARETUM, HUILE *de VENUS*  
*dictum.*

℞. Seminum Carvi drachmas decem,  
Dauci drachmas quinque,  
Macis scrupulos quinque:  
Contusa infundantur per quatrimum in Spiritus Vini trecentis & viginti unciis:  
Addantur  
Sacchari uncia ducentæ & quadraginta,  
Aquæ uncia centum & viginti,  
Crocii quantum satis ad colorandum:  
Filtrentur.

CLARETUM EX SEMINIBUS CARNI-NATIVIS, ROSSOLIS *de SIX*  
GRAINS *Parisiensium.*

℞. Seminum Anisi,  
Anethi,  
Fœniculi,  
Coriandri,  
Carvi,  
Dauci Cretici ana unciam unam:  
Contusa infundantur per mensem cum  
F Spi-



Spiritus Vini unciis ducentis & triginta:  
Addantur

Sacchari,

Aquæ ana uncia quadraginta:  
Filtrentur.

*Hoc Claretum se non tam saporis suavitate, quam virtute Carminativa commendat.*

CLYSMA CARMINATIVUM Richard.

Rx. Baccarum Juniperi,  
Seminum Anisi,

Cumini ana drachmas duas:  
Contusa coquantur in Aquæ unciis sedecim ad remanentiam

Unciarum duodecim, quibus dissolvatur  
Saponis Veneti uncia dimidia.

CLYSMA COMMUNE Londinensium.

Rx. Herbarum Malvæ unciam unam,  
Florum Chamomillæ,  
Seminis Fœniculi ana unciam dimidiam:

Incisa & contusa coquantur cum  
Aquæ unciis duodecim:  
Colentur.

*Effectus Carminativos edit.*

CLYSMA EMOLLIENS Plenckii.

Rx. Lactis Vaccini,  
Olei Lini ana uncias quatuor:  
Misceantur.

*In Tenesmo, Inflammatione Intestinorum,  
Uteri ac Vesicæ cum successu injicitur.*

CLISMA LENIENS Richard.

Rx. Seminis Lini unciam dimidiam:  
Contusæ & in Aquæ unciis decem ad  
uncias sex decoctæ  
Addantur

Olei Lini uncia duæ.

CLYSMA NUTRIENS Plenckii.

Rx. Jusculi Carnis Bovinæ.  
Lactis Vaccini ana uncias tres,  
Gelatinæ Cornu Cervi unciam unam:  
Misceantur.

*Injicitur Nutrimenti loco quibus Deglutendi impedita facultas est.*

CLYSMA OPIATUM Plenckii.

Rx. Seminis Lini contusi unciam unam:  
Infundatur per horam cum

Aquæ fervidæ unciis sex:

Colatura dissolvantur

Extracti Opii grana duo.

*Scopo Anodyno & Antispasmodico injicitur.*

CLYSMA SIMPLEX Richard.

Rx. Foliorum Malvæ manipulum unum:  
Incisus coquatur Aquæ unciis sedecim  
ad uncias duodecim:

Colatis dissolvantur

Saponis Veneti drachmæ duæ.

*Adhibetur ad referendam Alvum.*

CLYSMA ad SOPOROSOS AFFECTUS  
Richard.

Rx. Foliorum Sennæ,  
Salis communis ana unciam semis:  
Incisa cum Aquæ unciis sedecim ad  
uncias duodecim decoquantur:  
Colaturæ addantur

Vini Emetici turbidi uncia duæ.

CLYSMA TEREBINTHINARUM  
Plenckii.

Rx. Terebinthinæ unciam dimidiam:  
Dissolvatur Vitello ovi:  
Addantur

Decocti Emollientis uncia decem,  
Olei Lini uncia una:

*Contra Ascarides & Ulcera Intestinorum  
injicitur.*

COLLUTORIUM ANTISCORBUTICUM Plenckii.

Rx. Aquæ Cochleariæ.

Tincturæ Laccæ ana uncias duas,

Spiritus Cochleariæ unciam unam:

Misceantur.

*Adhibetur ad Stomacacem & Aphthas curandas.*



COLLUTORIUM GINGIVALE, EAU  
de MADAME de la URILLIERE  
*Beaumé.*

Rx. Herbarum recentium Nasturtii Aquati uncias sex,  
Cochleariæ uncias octo,  
Flavedinis Corticum Citri unciam unam semis,  
Cinnamomi uncias duas,  
Caryophyllorum drachmas sex,  
Florum Rosarum rubrarum unciam unam:  
Incisa, confusa infundantur per viginti quatuor horas cum  
Spiritus Vini rectificati unciis octo & quadraginta:  
Destillentur secundum artem.

*Hoc Spiritu aquis partibus Aquæ Cochleariæ mixto Palatum colluitur.*

COLLUTORIUM ODONTALGICUM  
*Plenckii.*

Rx. Radicis Pyrethri drachmas duas,  
Salis Ammoniaci drachmam unam,  
Extracti Opii grana duo,  
Aceti,  
Aquæ destillatæ Lavendulæ ana uncias duas:  
Incisa & trita infundantur calide per aliquot horas:  
Colatura fervetur.

*Hujus Collutorii Cochlear unum crebrius de die Ore clauso contentum Odontalgie cariæ & rheumaticæ remedium esse dicitur haud spernendum.*

COLLYRIUM ADSTRINGENS *Richard.*

Rx. Trochiscorum alborum Rhases drachmam unam,  
Vitrioli albi drachmam semis,  
Sacchari Saturnini scrupulum semis,  
Aquæ Rosarum uncias quatuor.  
*Ad Ophthalmiam humidam & Epiphoram adhibetur.*

COLLYRIUM *Lanfranci.*

Rx. Auri pigmenti drachmas duas,  
Viridis Æris drachmam unam,  
Myrrhæ,  
Aloës ana scrupulos duos:  
Probe tritis sensim commisceantur  
Vini albi uncia sedecim,  
Aquarum Plantaginis,  
Rosarum ana uncia tres:  
Misceantur.

*Rarissime ad morbos Oculorum adhibetur, Ulcera Oris Venerea una aut altera ejus gutta haud inepte tinguntur; injiciendo quoque contra Ulcera Venerea aliarum partium adhibetur.*

COLLYRIUM RESOLVENS *Richard.*

Rx. Sacchari Saturni,  
Salis Ammoniaci depurati ana grana tria,  
Aquæ fontanæ uncias duodecim:  
Dissolvantur  
*Laudatur contra Ophthalmiam Scorbuticam.*

COLLIRIUM ROBORANS *Richard.*

Rx. Aquæ Rosarum uncias quatuor,  
Vini Emetici unciam semis,  
Balsami Fioraventi drachmas duas:  
Misceantur.  
*Conducit ad curandam Ophthalmiam serosam.*

COLLYRIUM SAPPHYRINUM.

Videatur Aqua Ophthalmica cœrulea.

CONCHÆ CITRATÆ *Ratisbonensium.*

Conchis bene ablutis & in pulverem redactis affundatur iterum iterumque Succus Citri, usque dum ex affuso nulla amplius surgat effervescencia. Inde nata pasta teratur in pulverem.

*Quid vero, quod hac ratione & Conchæ & Succus Citri reddantur inertes? Ego certe, quam ob causam Medicorum nonnullis*



has Conchas Diureticas esse voluerint, non video?

## CONCHÆ PRÆPARATÆ.

Testæ Concharum abluantur primo multum diluto Lixivio vulgari, dein aqua simplici, usque dum hæc cum illis aliquantis per agitata non amplius turbetur; Conchæ ablutæ exsiccentur, in pulverem terantur, supra Porphyriten lavigentur aqua. Ex pulpa inde orta, per infundibulum pennæ ope premenda, efformentur pyramidulæ.

## CONDITA.

*Cortices* aut *Radices* recentes mundantur, Aqua fontana per biduum macerantur, coquuntur usque dum mollescant, defunditur inde aqua ad usum mox dicendum asservanda; ipsæ denuo aqua abluuntur, utque humor inde secedat super inversum cribrum ponuntur; commissis deinde vasi figulino superfunditur eorum ponderis Sacchari duplum cum Aqua, in qua fuerant decoctæ, ad leviolem consistentiam coctum & despumatum; elapsis aliquot diebus eximuntur Vegetabilia condienda, magis inspissatur Syrupus, & frigidus illis denuo adjicitur, quæ operatio post aliquot dies denuo repetitur.

Drupæ immaturæ acu perforatæ, in Aqua frigida, per sex vel octo dies singulos mutanda, macerantur; quo facto ad mollitiem coquuntur; & cocto Saccharo committuntur.

Poma vix matura, demto cortice & excisis seminibus, absque prævia maceratione ad mollitiem coquuntur & adjiciuntur Saccharo, antequam istud ad consistentiam pervenerit, ut cum eodem adhuc aliquot ebullitiones sustineant.

Baccæ committuntur æquis partibus Sacchari ad consistentiam tabulandi cocti, hoc cum inde diluatur, continuanda est coctio usque dum Saccharo consistentia Tabulandi sit restituta.

In Sacchari coctura parandis Conditis instituenda cavendum, ne ulla resideat spuma neque vas, cui Conditum com-

mittitur, nisi elapsis aliquot diebus, tegatur.

*Hoc Præparatorum genus, ab Arabibus ad nos perlatum, cum hodie varius ad usus medicatos recipiatur, Conditum ut plurimum ex Officinis Cupedinariorum petuntur.*

CONFECTIO ALKERMES *Mesue* correctæ.

R. Succi pomorum recentiorum uncias sedecim:

Sacchari albi uncias triginta,

Dissolutis & Clarificatis addantur

Succi granorum Kermes Monspeliensis uncia sedecim,

Pulveris Cinnamomi uncia semis,

Coccionellæ drachmæ tres,

Foliorum Auri numero quinquaginta:

Agitentur Spatula lignea in vase lapideo ad Auri foliati comminutionem.

Si COMPLETA desideratur, addantur

Ambra gryseæ, Saccharo tritæ, scrupulus unus,

Moschi, Saccharo triti, grana decem.

*Ab Arabibus etiam nimis laudatum Medicamentum, scopo Analeptico inseruit. Datur ad Drachmam unam. Lapidem Lazuli, cum aliis inertibus, quæ in Veterum occurrunt Compositionibus, expunxi, non quod cum Trillero & multis aliis Auctoribus irritationem Primarum Viarum inde metuum, sed quia ejus vires in ea, qua hanc Confectionem ingredi solet, ratione, omnino nullæ sunt, & quia non raro ipsi Lapidem Armenum, veram utique Cupri glebam, solent substituere. Dosis Confectionis Alkermes una Drachma absolvitur.*

*Completa plane non differt ratione virtutum a Confectione Alkermes Regia Charas.*

## CONFECTIO ANISI LAXATIVA

*Jungken.*

R. Seminis Anisi probe purgati uncias tres,

Immittantur Aheno latiori funde instructo, tepefactis adjiciantur

Sacchari ad consistentiam Tabulandi cocti uncia viginti quatuor

Ea lege, ut primum ejus aliquot cochlea-



## CONFECTIO.

chlearia Semini superfundantur, & dein inspurgatur Pulvis ex

Resinæ Jalappæ, nucleis Pinei probe tritæ, drachmis tribus cum dimidia

Pulveris Cinnamomi drachmis duabus paratus, agitentur probe usque dum siccæ appareant; denuo aliquot cochlearia adjiciantur & agitentur & hæc repetantur usque dum omne Saccharum adhibitum fuerit.

Hac ratione omnes *Confectiones Siccæ* parantur, quæ autem hodie ut plurimum a Cupedinariis petuntur.

*Olim Confectio Anisi laxativa multo in usu erat, hodie cum reliquis Purgantibus Resinosi variis usurpatur. Pueris atque illis qui alia medicamenta Laxantia reformidant, inservire potest. Uncia una octo circiter grana Resinæ habet.*

## CONFECTIO CINNAMOMI REGIA *Mynsichti.*

℞. Chocolate uncias quatuor,  
Nucum Indicarum Conditarum numero tres:

Probe contusis addantur

Confectionis Alkermes uncia una,

Olei Cinnamomi drachma semis,

Syrupi Cinnamomi uncia sex:

Probe omnia misceantur.

*Analepticum gratissimum egregiumque Stomachicum hæc Confectio præbet; datur ad drachmam unam pro Dosi.*

## CONFECTIO HAMECH Rhazes correctæ.

℞. Radicum Polypodii drachmas octodecim,

Prunorum dulcium

Passularum ana uncias octo,

Myrobalanorum citrinarum uncias sex,

Herbarum Absynthii vulgaris unciam dimidiam.

Thymi unciam unam.

Cuscute uncias duas,

Rhabarbari uncias duas cum dimidia,

Foliorum Sennæ unciam unam,

Colocynthis a Seminibus purgatæ,

Agarici albi ana drachmas octodecim,

## CONFECTIO.

45

Florum Rosarum rubrarum,

Seminum Anisi,

Fœniculi ana drachmas sex,

Violarum uncias duas:

Incisa & contusa macerentur per horas viginti quatuor cum

Seri Lactis Vaccini Ducentis octoginta octo unciis:

Deinde bulliant per horam; fiat colatura sub valida expressione; residuum bulliat cum

Aquæ ducentis & sexaginta unciis per semi horam; decoctum fortiter exprimatur & priori adjiciatur; omnis liquor postquam per viginti quatuor horas repositus fuerit, decantetur a fæcibus, quas deposuit, & blando calore vaporet ad consumptionem tertiæ partis; ipsi addantur

Sacchari uncia octodecim,

Coquantur ad consistentiam Syrupi tenuioris, in quo dissolvantur

Mannæ uncia duæ,

Pulpæ Cassiæ uncia quatuor,

Tamarindorum uncia quinque:

His refrigeratis, addatur & probe immisceatur Pulvis constans ex

Diacrydii unciam unam semis,

Myrobalanorum drachmis octodecim,

Rhabarbari drachmis tribus,

Seminis Anisi,

Spicæ Nardi ana drachmis duabus.

*Schulz l.c. eam Plantis Pedum impositam ad referendam Alvum commendat. Ego inconcinnam compositionem omissem, nisi constaret, illam vel hodie adhuc ad unciam unam usque morbis Cutaneis & Venereis laborantibus exhiberi, Clysmatibus quoque ubi Alvus pertinaciter clausa est adhiberi.*

## CONFECTIO de HYACINTHO Avicennæ a Parisiensibus correctæ.

℞. Pulveris Croci uncia semis,

Syrupi Citri e toto uncias duas & triginta:

Probe mixtis addantur

Lapidum Hyacinthi præparatorum uncias semis,

Oculorum Cancrorum, præparatorum,

Pul-



Pulverum Terræ sigillatæ ana uncia  
tres,  
Cinnamomi uncia una,  
Dictamni Cretici,  
Santali Citrini ana dra-  
chmæ tres,  
Myrrhæ electæ drachmæ  
duæ:

Misceantur.

*Huic medicamento olim ob Gemmas, qua-  
rum plures recipiebat, vires Cordiales ma-  
xime adscribebantur, cum autem Gemmas  
intertes esse constet, non nisi Lapis Hyacinthi,  
a quo denominationem accepit, retinetur.  
Ita correctum in nimis Hæmorrhagiis &  
aliis Fluxionibus moderandis ad drachmam  
integram cum fructu exhibetur.*

CONFECTIO de REBECHA Renodæi.

Videantur Trochisci Becchici albi.

CONFECTIO UNIVERSALIS.

Videatur Electuarium Catholicum du-  
plicatum.

CONSERVÆ.

Sunt Vegetabilia, quæ non exsiccata,  
ope Sacchari a corruptione defenduntur,  
& ita absque ulla principiorum jactura  
conservantur. Hoc scopo hæ substan-  
tiæ ope pistilli lignei in mortario la-  
pideo cominuantur in pulpam tener-  
rimam, cui duplum Sacchari adjicitur  
& tundendo cum eis miscetur exactis-  
sime.

Conservæ ex *Fructibus* parantur, ho-  
rum pulpam per cribrum trajiciendo &  
cum Saccharo miscendo. Medicamenta,  
quæ ex Vegetabilibus siccis ope Aquæ  
& Sacchari parantur, non Conservæ sunt,  
sed Electuaria. Si Conservarum unciis  
duodecim adjiciuntur drachmæ duæ Spi-  
ritus Vitrioli, appellantur VITRIO-  
LATÆ.

CONSERVA SPAGYRICA *Emmerici*  
VISCERALIS *Argentoratensium*  
correcta.

℞. Salis Absynthii uncias tres cum dra-  
chmis sex,  
Cinnamomi drachmas duas,  
Macis,  
Caryophyllorum,  
Zinziberis ana drachmam unam,  
Tartari Vitriolati uncia unam &  
drachmas sex,  
Sacchari albi uncias octo:

In tenuissimum Pulverem redactis ad-  
dantur

Conservarum Rosarum rubrarum un-  
ciæ sedecim,

Tunicæ uncia octo,

Spiritus Vitrioli drachmæ duæ,

Oleorum destillatorum Anisi,

Citri ana dra-  
chma una,

Fœniculi dra-  
chma semis,

Cinnamomi  
scrupulus u-  
nus,

Menthæ gut-  
tæ quatuor:

Misceantur optime.

*Laudatur ad Viscera roboranda eorumque  
Obstructiones referandas. Datur ad drach-  
mam unam.*

CORALLIA PRÆPARATA.

Parantur sine prævia ablutione, in mo-  
dum Concharum.

CORNU CERVI AURATUM

*Noricorum.*

℞. Croci Solis *Noricorum* scrupulos qua-  
tuor,

Cornu Cervi philosophice præparati  
unciam unam:

Misceantur.

*Medicamentum in Variolis, Morbillis, Fe-  
bribusque malignis Sudoriferum esse & Cor-  
diale præstare dicitur; cum autem utrumque  
ejus*



## CREMOR.

*ejus ingrediens iners sit, quid inde sit sperandum, facile patet.*

## CORNU CERVI PHILOSOPHICE SEU SINE IGNE PARATUM *Augustanorum.*

Cornu Cervi apices coquuntur cum Aqua, usque dum mollescant, eximitur inde cultri ope medulla, separatur externus nigricans cortex, siccantur & in Pulverem reducuntur.

*Quivis videt Cornu Cervi hac ratione maxima portione suæ Gelatinæ, unde omnis ejus vis medicata pendet, privatum iners omnino evasurum.*

## CORNU CERVI USTUM *Galen.*

Cornua Cervina, in frusta dissecta, inter medios carbones candentes continentur usque dum tota alba evadant, nec in diffractis ulterius aliquid nigri appareat.

*Frustra ab inerti terra aliquid medicati expectatur, nec Aqua cum eo cocta plures quam ex Silice recipiet virtutes.*

## CORNU CERVI USTUM PRÆPARATUM.

Paratur in modum Coralliorum præparatorum.

*Ad Polienda Metalla maxime adhibetur.*

## CORNUUM PRÆPARATIO.

Lima in scobem reducuntur, quæ in tenuissimum Pulverem, per linteum tenue trajiciendum, reducitur.

## COSMETICUM CLAVII.

Videatur Magisterium Marcasitæ.

## CREMOR TARTARI.

Conficitur ex Crystallis Tartari in Pulverem redigendis.

## CROCUS.

47

## CROCUS ANTIMONII.

Videatur Crocus Metallorum.

## CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

Hoc nomine *Würtembergensibus & Brunsvicensibus* venit Vitriolum ad rubedinem calcinatum; *Parisiensibus & Argentoratensibus* Limatura Martis calcinata.

*Ad Usum internum non adhibetur, sed Emplastris Exsiccantibus & Adstringentibus additur.*

## CROCUS MARTIS APERITIVUS.

Hoc nomine venit sive secundum *Zuwoelffer* Ferrum ex Vitriolo dejectum & præcipitatum, quod minus bene calcinari jubent, sive præunte *Lemery* Rubigo Lota.

*Calcibus evidenter Adstringentibus minus bene vires Aperientes adscribuntur.*

## CROCUS MARTIS APERITIVUS ANTIMONIATUS *Stahlii.*

Scoriæ Reguli Antimonii Martialis reponantur in cellam usque dum in pulverem dilabantur, hic Pulvis agitur cum Aqua, quæ inde turbida post aliquam moram defundatur; affundatur pulveri nova Aqua, agitata denuo decantetur & hæc continuentur, usque dum nova affusa Aqua inde ulterius parum aut plane non turbetur; hæ aquæ turbidæ inter se confusæ reponantur in quietem, Pulvis inde secedens Detonetur cum Nitri triplo, & edulcoratus asservetur.

*Hoc Medicamentum in Hemorrhagiis Uteri, Hemorrhoidum nimio Fluxu, Diarrhæa, Febribus intermittentibus, laudabilem & præsentaneam sæpe operam navare Stahlius testatur; se ipsum in Lochialibus Puerperarum turbis, Spasticis etiam, nec non in Atrophicis Puerorum affectibus per frequenter Croco hoc usum esse affirmat, quin ipsi Cortici peruviano longissime præferendum ducit. Ultra grana sex ejus Dosis non extendendam volunt.*

CRO-



CROCUS METALLORUM *Quercetani*.  
CROCUS ANTIMONII.

Est Hepar Antimonii Aqua fervida edulcoratum.

*Vehemens Emeticum nunquam in substantia præbendum, grana tria vel quatuor per noctem in Vini unciiis duabus infusa Vinum virtute Emetica imbuunt. Veterinarii ad Equos Purgandos pro una dosi ad unciam semis imo ad drachmas sex devorandum exhibent.*

CROCUS SOLIS *Noricorum*.

℞. Nitri depurati uncias decem,  
Aluminis uncias octo,  
Salis communis uncias quinque,  
Foliorum Auri unciam semis:

Mixta terantur usque dum Aurum disparuerit; dissolvantur Aqua fervida; solutioni adjicitur Oleum Tartari per deliquium; Aurum inde dejectum Aqua fervida probe edulcoretur; & dein in Crucibulo calcinetur, usque dum colorem violaceum induerit.

*Vires Cordiales & Bezoardicas, quas olim huic Calci affinxerunt; nullas esse, hodie uberrime est evictum.*

CRYSTALLI LUNÆ.

Videatur Lapis Infernalis.

CRYSTALLUM MINERALE.

Videatur Lapis Prunellæ.

CRYSTALLUS MONTANA  
PRÆPARATA.

Fragmenta Crystalli montanæ ignita Aqua extinguantur, reducantur in Pulverem, & tractentur ut sub Coralliis dictum fuit.

CUPRUM ANTIMONIATUM.

Videatur Specificum Antepilepticum *Weismanni*.

DECOCTUM ALBUM *Sydenhami*  
correctum.

℞. Rasuræ Cornu Cervi.  
Micæ Panis Tritici albissimi ana unciam semis:

Coquantur ex

Aquæ fontanæ unciiis triginta sex,  
Ad residuas uncias quatuor & viginti:

Colatura dissolvantur

Gummi Arabici drachma una semis,  
Sacchari drachmæ duæ.

*In Febribus ad Æstum Sitimque refrenandam laudatur.*

DECOCTUM AMARUM *Parisiensium*.

℞. Radicis Gentianæ drachmas duas:  
Bulliant per horæ semiquadrantem in  
Aquæ communis unciiis octo & quadraginta;

Tum addantur

Summitatum Centaurei minoris,  
Herbarum Cardui benedicti,  
Scordii,

Flavedinis Corticum Citri recentis  
ana drachmæ duæ,

Infundantur in vase tecto usque dum Decoctum frigidum evaserit, quod deinde decantetur.

*Bibitur per Cyathos pro roborandis Primis Viis & reserandis Visceribus Abdominalibus.*

DECOCTUM ANTIPSORICUM

*Suecorum.*

℞. Rasuræ Lignorum Guajaci sesqui unciam,  
Juniperi unciam unam,

Radicis Chinæ confusæ uncia semis:

Immittantur in

Aquæ fontanæ uncias septuaginta duas:

Addantur

Argenti vivi,

Antimonii contusi ana uncia sex:

Sacculo linteo inclusa coquantur ad dimidium, sub finem

Addatur

Radicis Liquiritiæ uncia semis:

Cum



## DECOCTUM.

Cum semel adhuc ebulliverint, colentur.

*Pro Sanguine depurando, in morbis Scabiosis & Venereis conducit.*

## DECOCTUM ANTISCORBUTICUM

*Richard.*

℞. Radicum Raphani rustici uncias duas:

Coquantur per horæ quadrantem ex Aquæ unciis octoginta:

Tunc addantur

Herbarum recentium Beccabungæ,  
Nasturtii aquatici,  
Cochleariæ,  
Acetosæ ana pugilli duo,  
Paululum coquantur, colentur & addantur

Aceti uncia quatuor.

*Exhibetur per Cyathos.*

## DECOCTUM ANTIVENEREUM

*Ulyssiponense.*

℞. Lignorum Santali albi,  
rubri ana uncias tres,

Rhodii,  
Guajaci,  
Sassafras ana unciam unam,

Radici Sarsaparillæ uncias tres,  
Antimonii uncias duas,  
Corticum Mezeræi unciam dimidiam:

Incisa & contusa infundantur per nycthemerum cum

Aquæ fontanæ bullientis unciis centum & viginti:

Coquantur deinde ad dimidium, sub finem adjiciantur

Radici Liquiritiæ uncia dimidia: Colentur.

*Multum tam ad Luem Veneream curandam, quam ad auferenda mala, quæ curam Mercurialem excipere solent, laudatur. Ejus uncia octodecim ad quadraginta octo usque de die exhibentur.*

## DECOCTUM.

49

## DECOCTUM ANTIVENEREUM

*LAXANS Parisiensium.*

℞. Rasuræ Ligni Guajaci,  
Radicum Sarsaparillæ,  
Chinæ ana drachmas duas,  
Antimonii unciam unam:

Incisa & contusa coquantur ex

Aquæ fontanæ unciis duabus & triginta  
Ad remanentiam unciarum quatuor & viginti:

Tum addantur

Radicum Polypodii uncia semis,  
Rhabarbari electi drachma semis,  
Liquiritiæ,

Foliorum Sennæ sine stipitibus

Ligni Sassafras ana drachma una,

Salis Tartari grana quatuor,

Seminis Coriandri drachma dimidia:

Incisa & contusa infundantur per noctem, mane semel bulliant & deinde colentur

*Hoc Decoctum usui Mercurii interponitur, integra Dosis de die hauritur, augendæ etiam apud robustiores sunt Purgantium rationes.*

## DECOCTUM AVENACEUM *Louveri.*

℞. Avenæ excorticatæ uncias tres,  
Ligni Santali rubri incisi drachmas duas:

Coquantur cum

Aquæ fontanæ unciis duabus & septuaginta.

Ad trientis consumptionem, Colaturæ addantur

Nitri depurati drachmæ duæ,  
Sacchari albi uncia una.

*Humores diluit, Æstum temperat, pro Potu ordinario assumi potest.*

## DECOCTUM CHINÆ RADICIS

*Suecorum.*

℞. Radici Chinæ,  
Passularum minorum ana unciam unam:  
Incisa coquantur ex  
Aquæ fontanæ unciis duabus & septuaginta:



Ad consumptionem quadrantis. Colentur.

*Ad Sanguinem temperandum aliquot ejus Cyathi hauriuntur de die.*

### DECOCTUM CITRI *Mynsichti.*

Rx. Malorum Citri numero quinque,  
In taleolos tenues & rotundos secta  
coquantur  
Aque fontanæ unciis duabus & septuaginta

Ad consumptionem trientis:

Colatura dissolvantur

Sacchari albißimi uncia quatuor.

*Decoctum gratissimum in omni Febrium genere, nec non in morbis Biliosis pro Potu ordinario bibitur.*

Si loco Aque Decoctum Hordei aut Cornu Cervi recipitur, surgit DECOCTUM HORDEI aut CORNU CERVI CITRATUM.

### DECOCTUM COMMUNE, sive PTISANA COMMUNIS *Parisiensium.*

Rx. Hordei depurati uncias duas,  
Radice Graminis incisæ unciam unā:  
Coquantur ex  
Aque fontanæ centum octo & viginti unciis  
Ad residuas uncias sex & nonaginta:  
Sub finem cocturæ addatur  
Radice Liquiritiæ incisæ uncia semis:  
Coletur.

### DECOCTUM DIURETICUM *Richard.*

Rx. Radicum Petroselini,  
Fœniculi ana unciam unam,  
Seminum Dauci sylvestris,  
Fructuum Alkekengi ana unciam semis:  
Incisa & contusa coquantur ex  
Aque fontanæ unciis sexaginta,  
Ad residuas uncias octo & quadraginta:  
Sub finem addantur  
Herbæ Parietariæ manipulus unus,  
Passularum majorum incisarum uncia semis:  
Colatura dissolvantur  
Nitri depurati drachmæ duæ.

### DECOCTUM FEBRIFUGUM *Richard.*

Rx. Corticis Chinæ electi uncias duas:  
Coquantur per dimidiam horam cum  
Aque unciis sex & nonaginta:  
Colatura dissolvatur  
Nitri depurati drachma una.  
*Quater de die exhibetur Cyathus ad pellendam Febrem.*

### DECOCTUM seu APOZEMA FEBRIFUGUM LAXANS *Richard.*

Rx. Corticis Chinæ electi & crasse contusi uncias duas,  
Coquantur ex  
Aque fontanæ unciis nonaginta sex,  
Ad residuas uncias quatuor & septuaginta:  
Sub finem addantur  
Herbarum recentium Cichorii sylvestris,  
Endiviæ ana pugilli duo,  
Foliorum Sennæ uncia dimidia:  
Colaturæ adjiciantur  
Salis mirabilis Glauberi uncia semis,  
Syrupi Cichorei cum Rhabarbaro uncia duæ.  
*Priori substituitur, ubi suspicio est, Viscera Abdominalia non omnino esse libera.*

### DECOCTUM AD FUNGOS ARTICULORUM *Heisteri.*

Rx. Lithargyrii uncias sex,  
Boli Armenæ unciam unam,  
Mastyches,  
Myrrhæ ana unciam dimidiam,  
Aceti uncias quatuor & viginti:  
Mixta coquantur leni igne per dimidiam horam.  
*Applicatur sub forma Fomenti.*

### DECOCTUM HORDEI CITRATUM.

Videatur Decoctum Citri.



DECOCTUM HORDEI *Suecorum.*

℞. Hordei integri uncias tres,  
Radicum Graminis concifarum un-  
ciam unam,  
Aquæ fontanæ unias centum & vi-  
ginti:

Coquantur ad uncias usque nonagin-  
ta sex:

Colaturæ si addantur Oxymellis simpli-  
cis uncia quatuor,  
ACIDULATUM dicitur.

*In Febribus, Hæmorrhagiis, Fluxibus  
Alvi, Morbis biliosis &c. in Potus ordina-  
rii vicem cum summo successu bibitur.*

DECOCTUM IPECACUANHÆ  
*Pisonis.*

℞. Radicis Ipecacuanhæ crasse contusæ  
drachmas duas:

Decoquantur lento igne ex  
Aquæ fontanæ unciis quatuor  
Ad trientis consumptionem:  
Coletur.

Residuum rursus coquatur ex  
Aquæ unciis quatuor; ut antecedens  
coletur.

Denuo decoquatur residuum, modo  
dicta ratione.

*Decocta singula dentur pro Dosi Dysen-  
tericis tribus diebus continuis.*

DECOCTUM LAPATHI *Richard.*

℞. Radicum Lapathi acuti uncias duas,  
Enulæ Campanæ,

Baccarum Juniperi ana unciam semis:  
Incisa & contusa coquantur ex

Aquæ unciis duabus & septuaginta  
Ad dodrantis evaporationem:  
Sub finem addatur

Herbæ Fumariæ incisæ manipulus  
unus:

Colentur.

*In morbis Cutaneis ad Sanguinem depu-  
randum per Cyathos exhibetur.*

## DECOCTUM LIGNORUM

*Brunsvicensium.*

℞. Rasuræ Ligni Guajaci  
Juniperi,  
Radicum Bardanæ ana unciam unam  
semis:

Scrophulariæ,  
Stipitum Dulcamaræ,  
Herbæ Saponariæ cum toto ana un-  
ciam semis:

Incisa coquantur cum  
Aquæ fontanæ unciis centum & qua-  
draginta quatuor ad dimidias:  
Sub finem coctionis addantur:  
Rasuræ Ligni Sassafras uncia semis,  
Radicis Liquiritiæ incisæ,  
Seminis Anisi contusi ana drachmæ  
duæ. Colentur.

*Ad Sanguinem depurandum aliquot Cyathi  
de die bibuntur.*

## DECOCTUM PECTORALE

*Parisiensium.*

℞. Oryzæ mundatæ unciam unam:  
Coquatur cum

Aquæ fontanæ contum viginti octo  
unciis ad crepaturam Oryzæ:  
Cum hoc Decocto infundantur per horæ  
quadrantem

Radicum Liquiritiæ incisæ,  
Althææ incisæ ana uncia  
semis,

Herbæ Capillorum Veneris Canaden-  
sis conscissæ,  
Florum Farfaræ ana drachmæ duæ,  
Papaveris Rhæados inciso-  
rum drachma una.

*Liquor decantatus in affectibus Pectoris  
spasticis ex vasculis infuso Theæ dicatis  
aliquoties de die hauritur.*

## DECOCTUM SUDORIFERUM

*Richard.*

℞. Ligni Guajaci uncias duas:  
Radicum Sarsaparillæ,  
Radicum Chinæ ana uncia semis,  
Antimonii<sup>r</sup>crudi uncias duas:



Incisa & contusa macerentur per nycthemerum in

Aquæ calidæ unciis sex & nonaginta, Bulliant in vase obturato horæ unius spatio, tunc adjiciantur

Rasuræ Ligni Sassafras uncia una,  
Radicum Caryophyllatæ incisarum  
uncia semis,

Baccarum Juniperi contusarum drachmæ duæ:

Bulliant adhuc per horæ quadrantem, deinde colentur.

*In Affectibus Veneris, Catarrhalibus & Cutaneis aliquot ejus Cyathi hauriuntur.*

Si sub finem coctionis adjicitur Foliorum Sennæ incisorum uncia una, surgit DECOCTUM SUDORIFICUM LAXANS. Ejusdem conferantur Species pro Decoctis.

#### DENTIUM PRÆPARATIO.

Eodem modo quo Coralliorum præparatio instituitur.

#### DIACRYDIUM, DACRYDIUM.

Est Scammoneum usui interno adaptatum. Veteres illud ex Decocto Glycyrrhyzæ vel Infuso Rosarum suspendere, ortam inde Emulsionem ad formam Extracti evaporare, vel in pulverem reductum vaporibus Sulphuris exponere soliti, corrigi his rationibus ejus virulentiam putarunt. Hinc DIACRYDIUM GLYZYRHIZATUM, ROSATUM, SULPHURATUM præscripserunt. Verum enim vero omnes has ita dictas correctiones inanes esse experientia docuit. Itaque hodie sub nomine DIACRYDII non nisi Scammoneum in pulverem tritum prostat, quod usus tempore cum Nucleis Pineis teritur.

#### DIACODION *Montani.*

Videatur Syrupus Diacodii.

#### DIACYDONIUM AROMATICUM

*Mesue correctum.*

℞. Succī Cydoniorum uncias centum quadraginta & quatuor,  
Sacchari albi uncias duas & septuaginta:

Coquantur ad consistentiam Syrupi tenuioris, cui Clarificato & adhuc tepenti adjiciantur

Pulverum Nucum Moschatarum,  
Cinnamomi ana uncia  
quatuor,  
Caryophyllorum,  
Zinziberis,  
Galangæ ana uncia duæ,  
Nardi Celticæ,  
Piperis nigri,  
Macis,  
Zedoariæ,  
Cubearum,  
Cardamomi minoris ana  
uncia una:

Probe misceantur.

*Exhibetur ad roborandum Ventriculum & sistendos Alvi fluxus, nec non Vomitus.*

#### DIACYDONIUM JALAPPINUM.

℞. Diacydonii simplicis uncias & triginta,

Resinæ Jalappæ, Nucleis Pineis tritæ, uncias duas:

Diu inter se invicem agitentur, ut aqualiter Resina per omne volumen Diacydonii dispergatur.

*Optime Resina Jalappæ Scammoneo, quod Valerius Cordus præscribit, substituitur. Hoc medicamento olim Nostrates loco Purgantis polychresti utebantur; aqua solutum infantibus æque ac adultis exhibetur.*

*Uncia semis Resinæ grana quindecim requirit.*

#### DIACYDONIUM LUCIDUM JALAPPINUM.

Diacydonii simplicis ad consistentiam cocti & adhuc tepentis unciis quatuor & sexaginta commiscentur

Resinæ Jalappæ in Spiritus Vini Rectificati



ficati unciis duodecim dissolutæ uncia quatuor:

Effundatur in modulos & refrigeratum committatur scatulis.

*Olim per se deglutiendum eadem ac antecedens dosi exhibebatur; hodie merito evuluit, cum oculis quidem neutiquam autem linguae gratum sit. Hic quoque melius Resina Falappæ, quam Scammonium, quod VVelschius præcipit, recipitur.*

### DIACYDONIUM SIMPLEX LUCIDUM Galenii vel GELATINA CYDONIORUM.

℞. Cydoniorum, unde lintei ope omne tomentum ablatum fuit, uncias centum viginti & octo:

Scindantur in taleolas & omnia Scimina inde auferantur; coquantur ex Aqua usque dum emollita fuerint, committantur cum Aqua sacco, & valde exprimantur;

In Liquore expressio dissolvantur

Sacchari uncia sex & nonaginta, Clarificentur aliquot Albuminibus Ovorum; Liquor clarificatus leni calore evaporetur, usque dum aliquot ejus Gutta disco frigido instillatæ in modum Gelatinæ consistant, tunc committatur ollis, non nisi Gelatina refrigerata operiendis.

*Et Gustus voluptati & roborando Ventriculo & cohibendis Alvi fluxibus inservit.*

### DIAPHORETICUM JOVIALE.

Videatur Antihecticum Poterii.

### DIAPHORETICUM seu BEZOARDICUM MARTIALE.

Videatur Bezoardicum Martiale.

### DIGESTIVUM LIQUEFACTUM Plenck.

℞. Terebinthinæ claræ uncias duas: Subigantur

Vitelli Ovorum uncia una:

Addantur

Mellis uncia duæ,

Aquæ fontanæ uncia quatuor,

Spiritus Vini uncia sex;

Misceantur.

*Calide injectum in Vulnere profunda, angusta, sinuosa & sclopetaria Suppurationem movet & detergit.*

### EBUR USTUM ALBUM SEU SPODIUM Valerii Cordi.

Ebur in tenues lamellas dissectum igne aperto calcinetur ad albedinem; Calcinatedum reducatur in pulverem super Marmore lævigandum.

*Cum Cornu Cervi isto Preparato convenit.*

### EBUR USTUM NIGRUM.

Fragmentis Eboris repletur olla, quæ operculo, Limi ope, probe tegitur & fornaci figuli per omne tempus, quo vasa Argillacea uruntur, committitur; ustum in modum antecedentis lævigatur.

*Artifices eo ad tingendas varias substantias utuntur.*

### ECLEGMA.

Videatur Loch.

### ELÆOSACCHARA.

Parantur cujuscunque Olei destillati Guttas decem cum uncia una pulveris Sacchari albißimi probe terendo.

Usus deinceps tempore parentur.

### ELÆOSACCHARA AURANTIORUM vel CITRI, ESSENTIÆ SICCÆ Brunsvicensium.

Optime parantur, dum Poma Aurantium vel Citri Saccharo albißimo affricantur, cui quod inde abhæret madidum abraditur.

*Integerrimum, quod horum Pontorum Corticum cellulis continetur, Oleum, cum hac ratione Saccharum subeat, præferenda hæc operatio priori videatur, cum Destillatio his oleis semper aliquid suavitatis adimat.*



## ELÆOSACCHARUM MYRRHÆ

*Hoffmanni.*

℞. Extracti Myrrhæ aquosi drachmam  
unam,  
Pulveris Sacchari albissimi unciam  
unam:

Misceantur probe.

*Improprie hoc Medicamentum Elæosaccharum vocari, nemo non videt.*

## ELATERIUM Hippocratis.

Cucumeres Asinini, antequam penitus maturuerint, collecti in taleolas scindantur, rejiciantur, quæ ipsis inhaerent, Semina, contundantur in mortario lapideo, committantur sacco, valide exprimantur, Succus expressus leni calore usque ad consistentiam Extracti evaporet.

*Hæc Medicamentum Humores præcipue Serofos violenter per Alvum educit, in Hydrope aliis Purgantibus ad Grana tria vel quatuor additur. Hippocratem, Galenum aliosque Veteres Medicos deficientibus quippe tunc mitioribus Purgantibus frequenter eodem usos esse constat, sed nostra ætate in tanta meliorum & tutiorum Catharticorum copia, anceps hoc & violentum Remedium rarius in usum trahitur,*

## ELECTUARIUM ANTHELMINTICUM Heisteri.

℞. Mercurii vivi unciam semis:  
Probe teratur cum

Gummi Arabici uncia una:

Affundendo paulatim Aquam fontanam, usque dum Mucilago surrexerit, in qua nulli ulterius Mercurii globuli appareant, Tunc addantur

Corticis Chinæ tenuissime pulverisati uncia una,

Syrupi Menthæ quantum satis ad consistentiam Electuarii molles.

*Exhibetur aliquoties de die Dosis, quæ Avellanam æquat.*

*Vires ex nomine patent.*

## ELECTUARIUM ANTIFEBRILE

*Trilleri.*

℞. Pulverum Corticis Chinæ optimi unciam unam,  
Florum Chamomillæ vulgaris drachmas duas,  
Nitri depurati,  
Diaphoretici Martialis ana drachmam unam,  
Syrupi Corticum Aurantiorum quantum satis.

Misceantur in Electuario:

*Asseverat Trillerus hoc per quam eximium Electuarium Antipyreticum jam per annos plus minus quadraginta semper votis suis & expectationi ita respondisse, ut sexcenti pene agroti omnis generis Febribus Intermittentibus conflictati ipsius singulari virtute pristinae sanitati integræ & perfectæ tandem sint restituti, sibimet ipsi totique suæ familiæ imo sæpius tenerriam ætati adeo feliciter aliquoties obtigisse, ut etiam in Febribus pertinacissimis & justo longiore circuitu inordinate nonnunquam reversis hoc remedium auxilium tulerit præsentissimum & præstantissimum; hinc se ejus laudes singulari Carmine Eucharistico celebrasse, quod exstat in Poematum suorum Physico-Ethicorum T. III. p. 280.*

## ELECTUARIUM e BACCIS LAURI

*Rhazes.*

℞. Baccarum Lauri unciam unam semis,  
Radiciis Calami Aromatici drachmas duas,

Herbarum Rutæ,

Menthæ,

Origani,

Seminum Ammeos

Cumini,

Nigellæ,

Ligustici,

Carvi,

Dauci,

Piperis nigri,

longi,

Castorei ana drachmas duas,

Sagapeni unciam semis,

Opo-



## ELECTUARIUM.

Opoponacis drachmas tres:  
Omnia trita excipiantur,  
Mellis despumati unciis quatuordecim.  
*Adjicitur Glysmatibus ad unciam unam  
pro Dosi.*

## ELECTUARIUM CATHOLICUM

*Præpositi.*

℞. Radicis Polypodii uncias sex:  
Coquantur ex  
Aquæ fontanæ unciis octo & quadra-  
ginta  
Ad consumptionem quartæ partis:  
In Colatura dissolvantur  
Pulparum Cassiæ,  
Tamarindorum ana uncia  
quatuor,  
Sacchari uncia octo & quadraginta:  
Coquantur lento igne ad consistentiam  
Mellis, tum addantur sensim  
Pulverum Radicum Polypodii,  
Rhabarbari veri  
ana uncia duæ,  
Liquiritiæ drach-  
ma duæ,  
Foliorum Sennæ  
uncia quatuor,  
Florum Violarum,  
Seminis Anisi ana uncia  
duæ:

Misceantur.

*Blande Alvum laxat ad unciam unam  
exhibitum. Admiscetur etiam Glysmatibus.*

## ELECTUARIUM CATHOLICUM *pro* CLYSTERIBUS *Vernii correctum.*

℞. Radicum Polypodii uncias sex,  
Herbarum Malvæ,  
Mercurialis,  
Parietariæ,  
Violaria ana manipulos  
duos:

Incisa coquantur ex

Aquæ fontanæ unciis centum quadra-  
ginta & quatuor,

Ad tertiæ partis consumptionem; Cola-  
tura dissolvantur

Mellis uncia sex & nonaginta:  
Coquantur ad consistentiam Syrupi, quo  
dissolvantur,

## ELECTUARIUM.

55

Pulpæ Prunorum uncia quatuor & vi-  
ginti:

Addantur sensim

Pulverum Radicum Polypodii,  
Rhabarbari ana  
uncia quatuor,  
Liquiritiæ uncia  
semis,

Foliorum Sennæ uncia octo,  
Florum Violarum uncia  
quatuor,

Seminum Fœniculi,

Quatuor Frigi-  
dorum majo-  
rum ana uncia  
una,

Anisi uncia qua-  
tuor:

Misceantur.

*Immiscetur ad uncias duas usque Glysma-  
tibus Laxantibus.*

## ELECTUARIUM CATHOLICUM DU- PLICATUM RHABARBARO *seu* CONFECTIO UNIVERSALIS *Mery* *correcta.*

℞. Radicis Polypodii incisæ uncias octo:  
Coquantur ex

Aquæ fontanæ unciis sex & nonagin-  
ta ad dimidiæ partis consumptionem:

Colatura Emulgeantur

Seminum quatuor Frigidorum majo-  
rum ana uncia semis,  
Violarum uncia duæ:

Denuo colatis dissolvantur

Sacchari albi uncia octo & quadra-  
ginta:

Coquantur ad consistentiam Syrupi, cui  
addantur sensim

Pulparum Cassiæ,

Tamarindorum,

Pulverum Rhabarbari electi,

Foliorum Sennæ mundato-  
rum ana uncia quatuor,

Seminis Anisi uncia duæ,  
Glycyrrhizæ uncia una:

Probe misceantur.

*Scopo Eccoprotico ad unciam unam pro  
Dosi exhibetur, commendabatur olim præci-  
pue Fluxibus Alvi laborantibus.*

ELE-



## ELECTUARIUM CHALYBEATUM

*Garzonii.*

℞. Alcoholis Limaturæ Martis uncias septem,  
 Specierum Aromaticarum Rosatarū,  
 Pulverum Cinnamomi,  
 Nucum Moschatarum ana drachmas sex,  
 Rhabarbari unciam semis,  
 Sacchari ad consistentiam tabulandi cocti,  
 Mellis despumati ana uncias duodecim,  
 Misceantur.

*Hoc Medicamentum ad Mensum retentionem & ad Cachexiam ad drachmam unam, quæ Martis granis duodecim constat, præscribitur.*

## ELECTUARIUM DENTIFICUM.

Videatur Electuarium Gingivale.

## ELECTUARIUM DIASATYRIUM

*Nicolai correctum.*

℞. Radicum Satyrii recentium uncias quatuor:  
 Minutim incisæ contundantur cum  
 Sacchari ad consistentiam Tabulandi cocti unciis duodecim: per sectaceum trajectæ probe contundantur cum  
 Nucis Indicæ conditæ,  
 Zinziberis conditi,  
 Pinearum,  
 Pistaciorum ana uncia una:  
 Probe comminutis addantur  
 Pulverum Caryophyllorum aromaticorum,  
 Cinnamomi,  
 Stincorum marinorum ana uncia semis,  
 Brodii Zinziberis conditi quantum factis ad consistentiam Electuarii.

*Analepticas & Roborantes Vires huic Electuario nemo denegabit, sed frustra inde expectatur, ut Venerem languentem excitet & Semen augeat.*

## ELECTUARIUM DIASCORDIUM

*Fracastorii.*

℞. Radicum Bistortæ,  
 Tormentillæ,  
 Gentianæ ana unciam semis,  
 Zinziberis drachmas duas,  
 Herbarum Dictamni Cretici unciam semis,  
 Scordii unciam unam,  
 Seminis Acetosæ drachmam unam semis,  
 Cinnamomi,  
 Cassiæ lignæ ana unciam semis,  
 Piperis longi drachmas duas,  
 Boli Armenæ unciam unam semis,  
 Terræ Lemniæ unciam semis,  
 Gummi Arabici,  
 Galbani,  
 Styracis ana unciam semis:

Probe pulverisatis & mixtis addantur:  
 Conservæ Rosarum uncia duodecim,  
 Mellis uncia triginta,  
 Opii, in Vini Hispanici unciis tribus soluti, drachma una semis:  
 Optime omnia misceantur.

*Sudorifera, Alexipharmaca, Anodyna & Styptica virtute commendatur, hinc ad Diarrhæam & Dyenteriam quoque sistendam laudatur. Datur ad drachmas duas vel tres. Uncia integra duo circiter grana Opii vehit.*

ELECTUARIUM DIASCORDIUM Suecorum  
CONFECTIO JAPONICA  
*vulgo.*

℞. Terræ Japonicæ uncias tres,  
 Herbæ Scordii,  
 Fabarum Pechurim,  
 Radicis Tormentillæ ana uncias duas:  
 Probe pulverisatis addantur  
 Opii, in Vino Hispanico dissoluti, drachma una semis,  
 Syrupi Rosarum uncia viginti octo:  
 Probe misceantur.

*In sopiendis Alvi Auxibus, antecedente potentius operatur, uncia una tria grana Opii fere habet.*



## ELECTUARIUM DIATRAGACANTE.

℞. Aquarum Pæoniæ uncias duas,  
Menthæ,  
Melissæ,  
Syrupi Papaveris Rhœados,  
Pulverum Sacchari ana unciam unam,  
Gummi Tragacanthæ electæ drachmas duas:

Misceantur.

*Hanc Pultriculam mulierculæ Argentoratenses infantibus pro sopiendis Torminibus solent exhibere.*

ELECTUARIUM GINGIVALE vel  
DENTIFICUM Argentoratensium.

℞. Lapidis Pumicis præparati,  
Cremoris Tartari ana unciam semis,  
Aluminis usti scrupulos quatuor,  
Coralliorum rubrorum præparatorum drachmas tres,

Myrrhæ electæ drachmam unam:

In tenerrimum pulverem tritis commisceatur

Pulveris Coccionellæ drachma una,  
probe trita cum

Salis Tartari scrupulo uno:

Omnia excipiantur

Mellis Rosarum unciis duabus:

Addantur

Quintæ Essentiæ Citri guttæ decem:  
Misceantur.

*Vires ex Denominatione patent.*

ELECTUARIUM ad GINGIVAS  
Trilleri.

℞. Radicum Tormentillæ drachmam unam semis,  
Caryophyllatæ drachmam unam,  
Ireos Florentinæ drachmam semis,

Herbarum Salvix,  
Abrotani,  
Rutæ,

Florum Aquilegiæ,  
Rosarum rubrarum,

Tom. II.

Florum Balaustiorum ana drachmam unam,

Seminum Cochleariæ,  
Aquilegiæ ana drachmam unam semis,

Mumiæ veræ,  
Myrrhæ electæ ana drachmam unam,  
Gummi Mastichis,

Laccæ ana drachmas duas,  
Sanguinis Draconis drachmam unam semis,

Aluminis usti drachmam semis:

Probe pulverisata excipiantur

Mellis Rosati quantitate sufficiente.

*Testatur Venerandus Auctor, se hoc Electuario Ulotico seu Epulotico sapius insigni cum successu olim usum esse in Dentibus vaillantibus & malefidis firmandis, Gingivis tabescentibus ac cruentis consolidandis & sanandis, fœdis oris Ulcaribus Abstergendis, Halitu denique fœtido corrigendo & purificando.*

## ELECTUARIUM Hamech.

Videatur Confectio Hamech.

ELECTUARIUM HIERA PICRA  
Andromachi.

℞. Pulverum Aloës uncias quatuor,  
Crocī,  
Cinnamomi,  
Spicæ Indicæ,  
Asari,  
Ligni Aloës ana drachmas sex,

Mellis uncias viginti:

Misceantur probe.

*Multus est Galenus circa hoc medicamentum, quod hinc quoque vulgo ab ipso solet denominari, & circa rationem Aloës pro varia indicatione mutandam. Hodie vero ejus usus nullus est, nisi ad Glysteres, quibus ad drachmas sex commiscetur.*



**ELECTUARIUM HYDRAGOGUM** *sen*  
**PURGANS** *Austriacorum* correctum.

℞. Rob Ebuli,  
Juniperi ana uncias duas,  
Syrupi de Spina Cervi unciam unam,  
Pulverum Resinæ Jalappæ, Pineis tri-  
tæ, sesqui drachmam,  
Tartari vitriolati drach-  
mas sex:

Misceantur exactissime.

*Alvum valide ducit, aquas Hydropicorum evocat. Uncia una ad quiddecim grana Resinæ Jalappæ vshit. Uncia semis ad drachmas sex potest pro dosi dari.*

**ELECTUARIUM** *pro* **INFANTIBUS**  
*Danorum.*

℞. Magnesiæ albæ drachmas sex,  
Pulverum Seminis Anisi Semunciam,  
Croci drachmam unam,  
Syrupi Cichorei cum Rhabarbaro  
quantum sufficit pro formando  
Electuario.

*Infantibus ob Tormina ejulantibus exhibetur. Dosis est parvum Cochlear.*

**ELECTUARIUM JOVIALE** *ad* **TAE-**  
**NIAS** *Brunsvicensium.*

℞. Stanni purissimi,  
Mercurii vivi ana unciam unam:  
Fiat secundum artem Amalgama, cui  
commisceatur

Goncharum præparatarum uncia una:  
Exactissime mixtis addantur

Conservæ Absynthii uncia tres,  
Syrupi Menthæ quantum satis for-  
mando Electuario.

*Vermibus laborantibus bis de die exhiben-  
tur Electuarii drachmæ duæ.*

**ELECTUARIUM LENITIVUM** *sive*  
**TAMARINDORUM** *Austriacorum.*

℞. Pulpæ Tamarindorum,  
Prunorum ana uncias octode-  
cim,  
Rob Sambuci uncias duodecim,

Pulveris Foliorum Sennæ uncias sex,  
Cremoris Tartari uncias quatuor,  
Mellis quantum satis, ut fiat Electua-  
rium.

*Omnino præferendum sequenti, cui virtu-  
tibus par, sed concinnitate superius est.*

**ELECTUARIUM LENITIVUM**  
*Florenzolæ.*

℞. Radicum Polypodii uncias duas,  
Glyzyrrhizæ unciam semis,  
Herbarum Adianthi nigri,  
Mercurialis ana unciam  
semis,

Hordei decorticati,  
Passularum minorum ana uncias duas,  
Jujubarum,

Sebesten ana unciam unam:

Incisa & contusa coquantur in  
Aquæ fontanæ unciis triginta, ad un-  
cias duodecim residuas:

Colentur & addantur

Pulpæ Cassiæ,  
Prunorum,  
Tamarindorum,

Sacchari albi,  
Conservæ Violarum ana uncia sex,  
Pulveris Foliorum Sennæ uncia tres  
semis:

Misceantur exacte.

*Refert Trillerus, hoc Electuarium, li-  
cet rarus ejus hodie, nec nisi in Enemati-  
bus usus sit, blande tamen Alvum ducere,  
Bilem educere, inque affectibus Renum cum  
successu dari posse.*

**ELECTUARIUM LENITIVUM** *cum*  
**SULPHURE** *ad* **MORBOS PSORI-**  
**COS** *Richard.*

℞. Electuarii Lenitivi Florenzolæ uncias  
quatuor,

Florum Sulphuris unciam unam:

Misceantur.

*Vires ex nomine patent. Dosis est ad  
unciam dimidiam aliquoties, interdum ite-  
randa.*



ELECTUARIUM seu PULTICULA de  
MANNA Württembergensium.

Rx. Mannæ electæ,  
Sacchari albissimi ana uncias duas :  
Dissolvantur in  
Aquæ Rosarum unciis duabus :  
Colatis addantur  
Pulveris Radicis Iridis Florentinæ  
drachma una,  
Olei Amygdalarum dulcium uncia  
semis :  
Probe misceantur.

*Alvum leniter lavat . Tenellis & inpr-  
mis recens natis ad Meconium & humores  
educendos datur.*

ELECTUARIUM MITRIDATICUM ,  
ANTIDOTUS MITHRIDATICA Da-  
mocratis .

Rx. Myrrhæ electæ,  
Croci ,  
Agarici ,  
Zinziberis ,  
Cinnamomi ,  
Nardi Indicæ ,  
Olibani ,  
Seminum Thlaspi ana uncias decem ,  
Dauci uncias septem ,  
Fœniculi ,  
Anisi ,  
Petroselinum ana uncias quin-  
que ,  
Seseli ,  
Hyperici ana uncias duas  
semis ,  
Herbarum Schoenanthi uncias octo ,  
Poli ,  
Scordii ana uncias septem ,  
Radicum Costi ,  
Gentianæ ana uncias octo ,  
Calami Aromatici ,  
Asari ,  
Valerianæ ana uncias tres ,  
Mei uncias duas semis ,  
Styracis ,  
Piperis longi ana uncias octo ,  
Albi uncias septem ,  
Castorei uncias duas semis ,

Succorum Acaciæ ,  
Hypocistidis ,  
Foliorum Malabathri ana uncias octo ,  
Carpobalsami uncias septem ,  
Gummi Arabici ,  
Opii ,  
Cardamomi ,  
Florum Rosarum rubrarum ana un-  
uncias quinque ,  
Trochiscorum Cypheos uncias se-  
ptem :

Probe in pulverem redactis & mixtis ad-  
misceantur

Galbani  
Opoponaceis ana uncia octo :  
Bdellii uncia quinque ,  
Sagapeni uncia tres ,  
Vini Hispanici unciis octo & qua-  
draginta diluta ,

Probe subacta excipiantur  
Mellis octingentis & sexaginta unciis ,  
prius exacte tritis cum  
Opobalsami ,  
Terebinthinæ ana unciis octo :  
Omnia misceantur exacte .

*Hanc compositionem ex Galeno de An-  
tidotis L. II. C. 2. desumpsi . Absurdissimum  
medicamentum retinendum est ob auctorita-  
tem , quam ipsi antiquitas conciliavit , ideo-  
que cur mutari debeat , non video .*

ELECTUARIUM MUNDIFICANS  
Verlhoffii .

Rx. Radicum Sarsaparillæ uncias tres ,  
Rhabarbari drachmas duas ,  
Ligni Guajaci unciam unam ,  
Corticis Ligni Sassafras drachmam  
unam ,  
Foliorum Sennæ selectissimorum un-  
ciam unam ,  
Seminis Anisi drachmam unam :  
Probe pulverisata misceantur cum  
Mellis unciis duodecim .

*In varia Humorū acrimonia aliquot ejus  
drachmæ aliquoties de die , dari possunt .*



**ELECTUARIUM pro PECORIBUS Danorum. THERIACA DIATESSERON Avicennæ.**

℞. Radicum Gentianæ,  
Aristolochiæ rotundæ,  
Baccarum Lauri,  
Myrrhæ ana uncias duas,  
In pulverem redactis admisceantur  
Mellis despumati uncia quatuor &  
viginti.  
*Vires ex nomine patent.*

**ELECTUARIUM PECTORALE LAXATIVUM Argentoratens. correctum.**

℞. Loch fani & experti uncias duas,  
Syrupi Papaveris Rhœados drachmas sex,  
Resinæ Jalappæ, Pineis tritæ, sesqui  
drachmam:

Probe misceantur.

*Infantibus affectibus Mucosis laborantibus  
Purgandi præcipue scopo exhibetur. Drachma  
una quatuor fere grana Resinæ Jalappæ vehit.*

**ELECTUARIUM PHILONIUM  
ROMANUM Avicennæ.**

℞. Radicum Pyrethri,  
Zedoariæ,  
Doronici,  
Florum Balaustiorum ana unciam unam,  
Piperis albi,  
Seminis Hyoscyami albi ana uncias  
viginti,  
Opium uncias decem,  
Euphorbii,  
Castorei,  
Margaritarum ana unciam unam,  
Crocii uncias quinque:  
In pulverem redacta exacte misceantur  
cum  
Mellis unciis trecentis.

*A Philone, Medico Romano, denomina-  
tum hoc Medicamentum volunt. Diversum  
omnino ab Antidoto cognomine a Galeno  
de Compos. Medicam. secundum locos L. IX.  
cap. 4. prolata, ut reliqua hujus commatis  
medicamenta Sudorem movet, Dolores sopit,*

*Somnum conciliat, uncia una sesqui granum  
circiter Opium vehit.*

**ELECTUARIUM PURGANS Richard.**

℞. Dagrydii unciam dimidiam,  
Pulveris Radicis Jalappæ uncias qua-  
tuor:

Probe terantur cum Amygdalarum dul-  
cium numero viginti, tunc addantur  
Pulverum Foliorum Sennæ uncia duæ,  
Seminis Anisi,  
Cremoris Tartari ana uncia una,  
Pulparum Prunorum uncia sedecim,  
Tamarindorum uncia octo:  
Misceantur exactissime.

*Ubi valide Purgandum est, aut aqua  
Hydropicorum educenda, ad drachmas sex  
usque, quæ grana circiter quinque Diagrydii  
& quadraginta quinque Radicis Jalappæ ve-  
hant, in aqua dissolutum exhiberi potest.*

**ELECTUARIUM REQUIES Nicolai.**

℞. Radicis Mandragoræ,  
Florum Rosarum,  
Seminum Hyoscyami,  
Papaveris,  
Endiviæ,  
Lactucæ,  
Portulacæ,  
Psyllii,  
Opium,  
Nucum Moschatarum,  
Cinnamomi,  
Zinziberis ana unciam unam semis,  
Lignorum Santali albi  
Rubri,

Spodii,  
Tragacanthæ ana drachmas sex,  
Sacchari candi unciam unam:

Omnia in pulverem redacta excipiantur  
Julepi Rosarum unciis viginti quatuor.

*Idem de hoc ac de Mithridatico judicium  
ferendum est. Descriptionem ex NICOLAO  
MYREPSO de Antidotis Sect. I. cap. 205.  
exhibeo. Pessime mulierculæ hujus generis me-  
dicamentis ad conciliandum infantibus Som-  
num utuntur; nimis crebro lethales & noxii  
inde excitati effectus fuerunt observati. Un-  
cia una ad undecim grana Opium habet.*



## ELECTUARIUM RESUMTIVUM

*Wurtembergensium.*

R<sup>x</sup>. Radicum Glycyrrhizæ,  
Herbarum Hederæ terrestris,  
Veronicæ ana unciam se-  
mis:

Incisa infundantur in

Aquæ ferventis unciis sexaginta:

Macerentur per noctem, mane colentur,  
& in colatura coquantur

Radicum Farfaræ recentium, minutim  
incisarum,

Passularum minorum ana uncia sex-  
decim,

Emollita trajiciantur per fetaceum; cum  
decocto defuso Emulgeantur

Amygdalarum uncia septem:

Emulsione diluatur Pulpa per fetaceum:  
trajecta & addantur

Sacchari albi uncia triginta duæ:

Coquantur leni igne ad consistentiam  
Pulpæ, addantur

Flavedo Citri a tribus pomis recen-  
tibus derafa,

Pulverum Cinnamomi uncia semis,  
Caryophyllorum Aromati-  
corum drachmæ tres:

Omnia probe misceantur.

*Hoc Electuarium Heëticis, Tabidis nec non  
Tussi acri & sicca laborantibus commendatur.  
Ejus uncia semis bis vel ter de die assumitur.*

## ELECTUARIUM ad STOMACACEN

*Kleinii.*

R<sup>x</sup>. Pulverum Radicis Ireos Florentinæ,  
Sanguinis Draconis ana  
drachmas tres,

Aluminis crudi drachmas  
duas,

Myrrhæ electæ,

Mastychis electæ ana Dra-  
chmam unam,

Syrupi Balsamici quantum satis ad  
Electuarium.

*Vires ex nomine patent.*

## ELECTUARIUM TAMARINDORUM.

Videatur Electuarium Lenitivum.

## ELECTUARIUM THERIACA

*Andromachi.*

R<sup>x</sup>. Radicum Ireos florentinæ,

Liquiritiæ ana uncias duo-  
decim,

Costi,

Rhapontici,

Pentaphylli ana uncias sex,

Mei,

Rhei,

Gentianæ ana uncias qua-  
tuor,

Aristolochiæ uncias duas,

Herbarum Scordii uncias duodecim,

Schoenanthi,

Marrubii,

Dictamni Cretici,

Calaminthæ ana uncias sex,

Polii,

Chamæpiteos,

Chamædryos ana uncias  
quatuor,

Foliorum Malabathri uncias quatuor,

Florum Rosarum rubrarum uncias  
duodecim,

Stœchados uncias sex,

Hyperici uncias quatuor,

Centaurei minoris uncias  
duas,

Croci uncias sex,

Carpobalsami uncias quatuor,

Cinnamomi uncias duodecim;

Cassia lignæ,

Spicæ Indicæ ana uncias sex,

Lecticæ uncias quatuor,

Piperis longi uncias viginti quatuor,

Nigri,

Zinziberis ana uncias sex,

Cardamomi uncias quatuor,

Agarici,

Seminum Napi ana uncias duodecim,

Petrofelini Macedonici un-  
cias sex,

Anisi,

Fœniculi,



Nasturtii,  
Seselseos,  
Thlaspi,  
Seminum Amomi,  
Ammeos ana uncias, quatuor,

Dauci uncias duas,  
Opii uncias viginti quatuor,  
Opobalsami uncias duodecim,  
Myrrhæ,  
Olibani,  
Terebinthinæ ana uncias sex,  
Styracis,  
Gummi Arabici,  
Sagapeni ana uncias quatuor,  
Asphalti,  
Opoponacis,  
Galbani ana uncias duas,  
Succi Acaciæ,

Hypocistidis ana uncias quatuor,  
Castorei uncias duas,  
Terræ Lemniæ,  
Vitrioli calcinati ana uncias quatuor,  
Trochiscorum Scillinorum uncias quadraginta octo,

Viperinorum,  
Hedycheri ana uncias viginti quatuor:

Balsama, Resinæ & Gummi Resinæ subigantur

Vini generosi quantitate sufficiente,  
Ut in formam pultis abeant:

Omnia excipiantur

Mellis optimi unciis nongentis & sexaginta,

*Theriacam aliquam in limine ædis Æsculapii versibus lapidi inscriptam tribus ante æram nostram Seculi jam usitatam refert Plinius L. XX. Cap. 24.*

*Compositionem, quam vulgo solent præscribere, si quidem retinendi mens est, cur a præscriptione quam Galenus nobis reliquit, recedamus, non perspicio. Itaque secundum hunc Auctorem de Theriaca ad Pisonem Cap. II. eam hic appono. Si quod aliud hoc certe medicamentum diversissima judicia est expertum; mihi quidem licet inconcinnam omnino hanc compositionem libentissime largiar, reprehendendi omnino videantur, qui Theriacam tantum non pro medicamento universali & Antidoto Catholica venditant,*

*male quoque me habeat iste fastus, quo variis in locis publica auctoritate preparatur, aut certe preparari jubetur, neutiquam tamen perspicio, cur in illam multi adeo invehant, cum ejus compositio non magis absurda sit, quam innumera aliæ, quas a Veteribus accepimus. Roborandi scopo nec non fine Sopiendi tam extus quam intus datur. Uncia una drachmam unam circiter Opii vehit, quæ ratio in Præscriptionibus, quæ vulgo prostant, multo minor esse solent.*

## ELIXIRIA.

### Canones.

I. Mittamus hyperbolicam, quam Alchymici voci *Elixir* tribuerunt, significationem. Officinæ hac voce denotant medicamentum, quod ut plurimum infusione paratur, eamque extrahendorum quantitatem recipit, aut ea admittit vel ingredientia vel Menstrua, quibus spissior redditur consistentia, quam ea est qua Essentiæ vel Tincturæ gaudent.

II. Ingredientia sicca comminuuntur in crassum pulverem; eis superfunditur Menstruum ad eminentiam unius duorumve digitorum; digestio, quæ cum Vinum pro Menstruo assumatur, debet esse frigida, per duos vel tres dies continuatur; liquor filtratus asservatur.

III. Pro Menstruo sive Vinum & quidem vel Hungaricum vel Hispanicum sive Spiritus Vini adhibetur, rarissime Aqua.

IV. Infusiones cum Spiritu Vini instituuntur in Cucurbitis Alembico & Excipulo instructis; mane & vespera agitantur; Spiritus qui destillavit, reliquo affunditur.

V. Interdum etiam Solutiones Extractorum Elixiria dicuntur.

### ELIXIR ACIDUM Dippelii.

Videatur Aqua Rabelii. Idem dicitur a Brunsvicensibus.



ELIXIR ACIDUM *Halleri*.

Dum pares ingredientium partes recipiuntur.

ELIXIR ALOES SAPONACEUM *Suecorum*, ELIXIR PROPRIETATIS *Stahl*i.

℞. Aloës Succotrinæ,  
Myrrhæ ana unciam unam:  
In pulverem tenuissimum tritis affundantur

Bilis bovinæ recentis uncia duæ:  
Mixtis exacte & leniter siccatis denuoque tritis addantur

Terræ foliatæ Tartari uncia una,  
Crocī uncia dimidia,  
Spiritus Vini rectificati uncia duodecim:

Digerantur leni calore per biduum & filtrentur.

*Egregias vires Resolventes continet. Salutifere dabitur in Obstructionibus abdominalibus, sed ab eodem sibi caveant Hemorrhoidibus obnoxii. Dosis est ad parvum usque Cochlear.*

ELIXIR AMARUM *Hærne*.

℞. Radicum Zedoariæ drachmam unam,  
Rhabarbari drachmas duas,  
Gentianæ unciam semis,

Crocī orientalis drachmam semis,  
Aloës Hepaticæ unciam unam,

Myrrhæ unciam semis,

Agarici drachmam unam:

Theriacæ *Andromachi* drachmas duas:

Spiritus Vini unciis triginta sex,

Incisa infundantur cum

Per aliquot dies in Balneo Mariæ postea filtrentur.

*Laudatur maxime contra Tæniam.*

ELIXIR ANTHELMINTICUM *Suecorum*  
ESSENTIA CATHOLICA PURGANS  
*Rothii*.

℞. Radicum Jalappæ uncias quatuor,  
Seminum Carthami uncias duas,  
Scammonei unciam semis,

Gummi guttæ drachmas duas,  
Incisis, contusis, in pulverem tritis affundantur,

Spiritus Vini rectificati uncia viginti quatuor,

Per quatrimum Digesta fortiter per colum exprimantur, Liquor deinde filtretur.

*Valide Alvus inde ducitur, cum autem citra Ventris dolores vires suas exserere vix possit, & periculosa semper sint solutiones resinarum in Spiritu Vini, eo quod hæ ab humoribus Primarum Viarum facile dejiciantur & plicis illarum adherendo Hypercatharses excitent; ego quidem hujus medicamenti usum commendare non audeo. Dosis ad drachmas duas præscribitur.*

## ELIXIR ANTHARTHRITICUM

*Caribæum.*

℞. Gummi Guajaci uncias duas.

Taffia uncias nonaginta sex,  
Digerantur leni calore per octiduum,  
Liquor filtretur.

*Egregii inde effectus in Arthritide inveterata fuerunt observati. Omni mane Cochlear unum hauritur.*

ELIXIR ANTICOLICUM  
CROCATUM.

Videatur Elixir de Garus.

## ELIXIR ANTIPODAGRICUM

*Guldenkleë.*

℞. Radicum Artemisiæ uncias duas,  
Rhapontici Moscovitici,  
Aristolochiæ rotundæ ana  
unciam unam,

Herbæ Chamædryos,

Florum Centaurii minoris,

Hyperici ana drachmas quinque,

Seminis Petroselini Macedonici drachmas sex,

Incisa & contusa infundantur cum

Spiritus Vini Tartarifati unciis viginti quatuor:

Digerantur per aliquot dies, ita obtenta Tinctura filtretur, & Abstracta inde Libra una Spiritus Vini, concentratur.



ELIXIR ANTISCORBUTICUM AMARUM *Brandeburgensium* correctum.

℞. Radicum Enulæ drachmas duas,  
Filicis unciam semis,  
Herbæ Absynthii drachmas tres,  
Corticum Aurantiorum immaturorum  
drachmas duas,  
Tamarisci drachmas sex,  
Incisis affundantur:

Sucorum expressorum Beccabungæ,  
Borraginis,  
Buglossi,  
Cochleariæ,  
Fumariæ,  
Nastrutii  
aquatici ana  
drachmæ  
duæ,

Spirituum Cochleariæ,  
Nastrutii ana uncia quatuor,

Digerantur per aliquot dies & exprimantur.

*Vires ex nomine patent; Dosis ad sexaginta guttas extenditur.*

ELIXIR ANTIVENEREUM *Viennensium*.

℞. Balsamorum Copaivæ unciam unam,  
Peruviani unciam semis,  
Resinæ Guajaci drachmas duas,  
Olei destillati Ligni Sassafras drachmam semis,  
Salis Tartari drachmas duas,  
Mixta dissolvantur in  
Spiritus Vini rectificatissimi unciiis sex,  
Filtrata asserventur.

*Hujus Medicamenti usus, in morbis Venereis, si Gonorrhæam excipias, nullus omnino mihi videtur, quin & in ipsa Gonorrhæa nonnisi cautissime erit administrandum, nec dosis ultra triginta Guttas extendenda.*

ELIXIR APERITIVUM *Glauderii*.

℞. Aloës Succotrinæ,  
Myrrhæ electæ ana uncias duas,  
Crocii orientalis unciam unam,  
Grosse contusis affundantur:

Salis Tartari uncia duæ, dissolutæ  
Aquarum Florum Sambuci,  
Cochleariæ,  
Nastrutii ana unciiis decē,  
Per duodecim horas Digesta filtrentur.  
*Contra morbos Putridos & ad Alvi Mensumque reversionem laudatur a Claudero, ad Obstructiones quoque Viscerum reserandas, Hypochondriacis præterea & Scorbuticis commendari solet.*

ELIXIR AURIFICUM *Rotrou*.

Est Tinctura Antimonii Tartarificata.

ELIXIR BALSAMICUM *Hoffmanni*.

℞. Radicis Zedoariæ drachmas tres,  
Herbæ Scordii manipulos tres,  
Florum Centaurii minoris manipulum unum,  
Myrrhæ electæ unciam semis,  
Ligni Aloës drachmam unam semis,  
Corticum Aurantiorum unciam unā,  
Crocii drachmam unam,  
Nucis Moschatæ drachmas tres,  
Succini drachmas tres:

Incisa, contusa, mixta Digerantur:  
Spiritus Vini Tartarificati unciiis quadraginta octo:

Filtratus addantur:

Spiritus Salis Ammoniaci uncia una,  
Oleorum Cardamomi,  
Caryophyllorum ana Gutta decem:

Misceatur.

*Laudatur ab egregio Auctore in notis ad Poterii Observ. Cent. II. cap. 39. ad Levitatem Intestinorum.*

ELIXIR BALSAMICUM PECTORALE  
*Pharmacopææ Edinburgensis Veteris.*

℞. Balsamorum Tolutani uncias duas,  
Peruviani unciam unā,  
Florum Benzoës,  
Crocii Angli ana unciam semis,  
Spiritus Vini rectificati uncias viginti quatuor,

Digerantur per triduum & filtrentur.  
*Hoc Elixir tam ad internos quam exter-*



nos usus commendare & dosin ad quadraginta guttas extendere solent.

### ELIXIR BALSAMICUM TEMPERATUM Hoffmanni.

℞. Corticum Aurantiorum recentium unciam unam,  
Salis Tartari drachmas duas,  
Vini Tockaviensis vel Canariensis uncias duodecim:

Digerantur per biduum.

Tinctura decantata dissolvantur

Extractorum Gentianæ,

Centaurii minoris,

Cardui Benedicti ana drachmæ duæ:

Filtrentur per filtrum tectum.

*Hujus medicamenti ab hæredibus Hoffmanni in arcanis habiti, ( teste Buchner ad Prælect. Schulz in Dispens. Brandeb. ) diversæ ob id ipsum in Dispensatoriis prostant descriptiones. Trado, hic, quod ipse Auctor in Med. Consult. P. III. Dec. 2. Cas. IX. præscribit, Medicamentum, ad restituendas vires Primarum viarum commendabile. Ejus Cochlear unum ante vel post prandium dari jubet.*

### ELIXIR BALSAMICUM Werlhofii.

℞. Radicum Costi drachmas duas,  
Corticis Chinæ electi unciam semis,  
Crocī Orientalis drachmam unam,  
Corticum Aurantiorum recentium unciam semis,

Myrrhæ electæ drachmas duas,

Salis Tartari unciam semis:

Incisis & contusis affundantur

Vini Canariensis uncia duodecim:

Digerantur per triduum, decantetur

Tinctura, in qua dissolvantur

Extractorum Cardui benedicti,

Centaurii minoris ana drachmæ duæ,

Filtrentur per filtrum tectum,

*Cum priori tam viribus quam modo utendi convenit.*

### ELIXIR CITRI PURGANS Pharmacopœe Argentoratensis Veteris.

℞. Flavedinis Corticum Citri recentium unciam unam semis,

Spiritus Vini rectificati uncias sex :  
Infundantur per horas viginti quatuor,  
In Spiritu decantato dissolvatur

Resinæ Jalappæ uncia una:

Filtrentur.

*Hoc Medicamentum improprie sane & ipsum Elixir nuncupatum spe est valde ambigua; quippe ab humoribus Primarum Viarum facile præcipitata inde Resina, plicisque Ventriculi vel Intestinorum adhærescens acerrima Tormina & vehementem solet excitare Hypercatharsin. Conferantur quæ ad Elixir Anthelminticum sunt annotata. Prudenti igitur consilio in nova Editione est omissum. Interim vulgus vel nimium ei assuetus crebro adhuc eo utitur. Ad drachmam unam vel scrupulos quatuor, qualicumque Syrupu edulcoratum, exhibetur. Drachma una continet Resinæ grana decem.*

### ELIXIR CITRI Sennerti.

℞. Flavedinis Corticum Citri recentium uncias octodecim,

Spiritus Vini simplicis uncias septuaginta duas:

Per aliquot dies Macerata Destillantur usque dum Phlegma apparuerit, tunc addantur

Succi Citri recentis uncia novem,

Sacchari albiissimi in Aquæ Rosarum unciis novem dissoluti uncia quinque:

Filtrentur.

*Hoc præparatum nomine tantum Elixir vera Claretum esse nemo non videt.*

### ELIXIR de Garus.

℞. Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Nucum Moschatarum ana scrupulum unum,

Myrrhæ electæ unciam dimidiam,

Aloës Hepaticæ unciam unam,



Spiritus Vini uncias quadraginta octo,  
Aquæ fontanæ uncias duodecim:  
Destillentur inde uncia quadraginta octo:  
Spiritu destillato addantur:

Syrupi Capillorum Veneris uncia quadraginta octo,

Aquæ Florum Aurantiorum uncia quatuor,

Reponantur usque dum Liquor clarus evaserit.

*Hoc Claretum juvanda Digestionis causa ad Cochlear unum pro dosi datur.*

ELIXIR JUNIPERUM seu MALVATICUM JUNIPERINUM Argentoratensium.

Rx. Rob Juniperi uncias quatuor:  
Diluantur

Vini Malvatici unciis duodecim:  
Colentur per linteum.

*Scopo Carminativo & Diuretico ad Cochlear unum pro dosi exhibetur.*

ELIXIR PECTORALE Ringelmanni vulgo Regis Daniæ.

Rx. Succu Liquiritiæ uncias sex:  
Dissolvantur in

Aquæ Fœniculi unciis duodecim:  
Filtrentur; & addantur

Spiritus Salis Ammoniaci Anisati uncia triginta sex,

*Egregium sane Medicamentum in morbis Pectoris pituitosis. Datur ad parvum Cochlear pro dosi.*

ELIXIR PECTORALE Wedelii.

Rx. Radicum Enulæ,  
Althææ,  
Ireos Florentinæ,  
Squillæ præparatæ ana unciam unam,

Liquiritiæ unciam dimidiam,

Ligni Santali rubri unciam unam,  
Herbæ Roris Solis unciam unam semis,

Benzoës drachmas sex,

Myrrhæ,

Seminis Anisi ana unciam semis,

Gummi Ammoniaci drachmas duas,  
Croci drachmas tres:

Incisa, contusa Digerantur cum  
Spiritus Vini unciis quatuor & viginti:

Filtrentur.

*Spirituosa in Pectoris affectibus esse periculosa, cum nostra ætate nemo sanus dubitet, minime mirum est, hoc Medicamentum Resolvendi gratia creberrime olim adhibitum sensim evilesce.*

ELIXIR POLYCRESTUM Halensium.

Rx. Extracti Panchymagogi unciam unam:  
Dissolvatur

Spiritus Vini rectificati unciis sex,  
Vitrioli drachmis tribus:

Filtrentur.

*Suum Elixir Polychrestum nunquam publici juris fecerunt Halenses: Quod hic secundum Trillerum exhibeo, ad centum usque guttas commendatur scopo Purgandi. drachma una novem circiter grana Extracti Panchymagogi continet. Purgantia resinsa in Spiritu Vini dissoluta usque quaque displicent.*

ELIXIR PROPRIETATIS ALBUM Helmontii.

Rx. Aloës Succotrinæ,

Myrrhæ electæ,

Croci orientalis ana unciam unam:

Incisis, confusis affundantur

Aquæ Cinnamomi uncia duodecim:  
Digerantur calore fortiore per aliquot dies, omnisque dein liquor Destillatione eliciatur.

*Hoc Medicamentum ab Helmontio Alchemico stylo descriptum. Licet multum ab Auctore suo laudetur, nostris tamen temporibus cum Humores vehementer commoveat, in Febribus, ad quas ejus usus speciatim spectabat, vix adhiberi solet.*

ELIXIR PROPRIETATIS SINE ACIDO le Mort, sive DULCE.

Rx. Aloës Succotrinæ,

Myrrhæ electæ,

Cro-



Croci Orientalis ana unciam unam:  
Pulverifata redigantur cum  
Olei Tartari per Deliquium quanti-  
tate sufficiente in  
Consistentiam pultis, cui addantur  
Spiritus Vini rectificatissimi unciae se-  
decim:

Digerantur per aliquot dies & filtrentur.

*Efficax remedium in morbis Ventriculi a  
causa frigida oriundis, ad Aluum stimulan-  
dam promovendamque Digestionem. Caven-  
dum tamen, ne nimius ejus usus Sanguinem  
exagitet. Dosis ad guttas sexaginta exhibetur.*

### ELIXIR PROPRIETATIS Paracelsi. ELI- XIR ALOETICUM Suecorum.

Rx. Aloës Succotrinæ,  
Myrrhæ electæ,  
Croci ana unciam unam:  
Affundantur in pulverem redactis,  
Spiritus Vitrioli unciae duæ,  
Vini rectificati unciae qua-  
tuordecim,

Post Digestionem per triduum filtrentur:

*Hoc medicamentum more suo thrafonico  
describit Paracelsus Antidox. L. VIII. Men-  
struum cum reticuerit, varii circa illud in-  
dicandum varie fuerunt occupati, Boërhave  
Acetum præcipit, vulgo solent Crollium se-  
qui, qui Oleum Sulphuris & Spiritum Vi-  
ni præscribit. Qui Paracelso fidem adhi-  
bent, tantum non miracula inde expectant  
& immortalitatem. Doleo etiam Boërha-  
vium magnifice nimis de eodem sentire;  
Ventriculum roborare, Digestionem juvare,  
Vermes necare, Menses & Hemorrhoides  
movere observatum ferunt, sed probe omni-  
no notandum, ejus usus Sanguinem, illum  
maxime, qui per vasa Hemorrhoidalia mo-  
vetur, exagitari.*

### ELIXIR PROPRIETATIS RHABARBA- RINUM Kalde.

Rx. Aloës Succotrinæ,  
Myrrhæ electæ ana unciam unam,  
Rhabarbari electi unciam unam se-  
mis,  
Croci,  
Salis Tartari ana drachmas duas:

Pulverifata digerantur cum  
Vini Malvatici unciis duodecim:  
Colentur.

*Scopo Purgandi & Hepar reserandi e-  
tiam reliquis præferendum esse putatur.*

### ELIXIR STOMACHICUM sive TIN- CTURA AMARA Edinburgensium.

Rx. Radicis Gentianæ uncias duas,  
Flavedinis Corticum Aurantiorum  
unciam unam,  
Canellæ albæ unciam semis,  
Coccionellæ drachmam semis,  
Incisa, contusa Infundantur per quatri-  
duum cum  
Spiritus Vini unciis viginti quatuor:  
Filtrentur.

*Vires ex titulo patent. Ad aliquot parva  
cochlearia pro dosi datur. TINCTURA  
AMARA LONDINENSIS in eo dif-  
fert, quod loco Canellæ albæ Carda-  
momum minus recipiat, & Coccionel-  
lam omittat.*

### ELIXIR STOMACHICUM Rosenstein.

Rx. Corticum Aurantiorum recentium se-  
qui unciam:  
Contundantur in pulvem, digerantur cum  
Vini Hispanici unciis quatuor & vi-  
ginti:  
Colatura dissolvatur  
Extracti Gentianæ uncia una:  
Filtrentur.

*Datur Cochlear unum cum Aqua Cinna-  
momi.*

### ELIXIR STOMACHICUM Stoughton.

Rx. Radicum Gentianæ drachmas sex,  
Rhabarbari semunciam,  
Herbarum Absynthii,  
Chamædryos,  
Flavedinis Corticum Aurantiorum  
ana drachmas sex.  
Corticum Cascarillæ,  
Aloës Succotrinæ ana drachmā unam:  
Incisa, contusa infundantur in  
Spiritus Vini rectificati unciis vigin-  
ti & quatuor: Filtrentur.



*Ad vitia Digestionis, quibus Obstructiones Hepatis junctæ sunt, laudatur. Dosis est ad Guttas viginti.*

### ELIXIR UTERINUM Crollii correctum.

℞. Castorei uncias tres,  
Crocī unciam unam,  
Herbæ Artemisiæ uncias sex,  
Terræ foliatæ Tartari unciam dimidiam:

Incisa Digerantur per quatrīdium  
Spiritus Vini unciis triginta:

Filtratis addantur

Oleorum Destillatorum Angelicæ,  
Anisi,  
Succini ana  
drachma  
una:

Misceantur optime.

*Ad malum Hystericum, Catamenia reseranda, Fluorem album curandum olim laudabatur; medicamento multum exastuante hodie rarius utimur. Dosis est ad guttas quadraginta.*

### ELIXIR VISCERALE Roseen.

℞. Flavedinis Corticum Aurantium  
unciam unam,

Rhabbarbari veri drachmas decem,  
Terræ foliatæ Tartari uncias duas:

Incisa, trita infundantur per quatrīdium  
frigide in vase probe clauso cum

Vini albi generosi unciis sedecim:

In Colatura dissolvantur:

Extractorum Centaurii minoris  
uncia una,

Cascarillæ uncia semis,

Oleorum Destillatorum Chamomillæ,  
Millefolii ana  
scrupulus  
unus:

Filtrentur.

*In impedita Digestione & aliis morbis a vitio succorum Chylopoieticorum natis magno cum successu adhibetur. Dosis est Cochlear parvum.*

### ELIXIR VITÆ Matthioli correctum.

℞. Radicum Galangæ minoris,  
Zinziberis,

Zedoariæ ana unciā semis,  
Calami Aromatici,

Herbarum Majoranæ,  
Menthæ,  
Thymi,  
Serpilli,  
Rorismarini,  
Salviæ,

Florum Rosarum pallidarum ana  
drachmas duas,

Seminum Anisi,

Fœniculi ana drachmam  
unam,

Cinnamomi acuti unciā unam semis,  
Caryophyllorum,

Nucis Moschatæ,

Macis ana unciam dimidiam,

Cubebæ,

Lignorum Santali citrini,

Aloës,

Cardamomi minoris ana drachmas  
duas,

Corticum Citri recentium unciam  
unam semis:

Incisa & contusa Digerantur per tri-  
dium cum

Spiritus Vini rectificati unciis septua-  
ginta duabus:

Addantur:

Aquæ fontanæ uncia viginti duæ:

Destillentur lento igne uncia circiter  
octoginta:

Matthioli descriptio, quæ occurrit in Com-  
ment. in Dioscorid L. V. Cap. 7. in com-  
pendium redacta, prouti vulgo in Dispen-  
satoriis legitur, hic exhibetur. Cuilibet pa-  
tet, Spiritum aromaticum admodum incon-  
grue nomine Elixir insigniri, & hoc medi-  
camentum potius Aquis Cephalicis, quibus  
sibi superioribus seculis multum placuerant  
medici homines esse, adscribendum. Sed in  
ipso quoque suo Elixir laudando nimis est,  
Thrasonemque agit Auctor l. c. Scopo Ro-  
borandi potest ad Cochlear unum exhiberi.  
Qui potu spiritoso delectantur, blandimen-  
tum inde suæ gulæ parare solent. Quantitati  
hic præscriptæ adjici solet.

Ambraæ Gryseæ,

Moschi ana scrupulus unus:

Quo factō ELIXIRIUM VITÆ Matthioli  
COMPLETUM cognominatur.



ELIXIR VITRIOLI *Mynsichti* correctum.

℞. Radicum Galangæ minoris unciam  
unam semis,  
Calami Aromatici unciam  
unam,  
Herbarum Menthæ crispæ,  
Salviæ ana unciam dimi-  
diam,  
Cinnamomi,  
Caryophyllorum,  
Zinziberis ana drachmas tres,  
Nucum Moschatarum,  
Cubebarum,  
Corticum Citri ana drachmas duas:  
Incisa, contusa infundantur per octiduum  
cum  
Olei Vitrioli unciis tribus &  
Alcoholis Vini unciis viginti quatuor:  
Liquore colato dissolvantur  
Sacchari albissimi uncia quatuor:  
Filtrentur.

*Pessime præeunte Mynsichto Dispensato-  
ria vulgo jubent digestionem per aliquod tem-  
pus solo Acido Vitriolico institui, quo omnes  
partes oleosæ penitus comburerentur. Trille-  
rus huic medicamento Stomachico egregias  
tribuit virtutes, Frigidis præsertim Pituitosis  
& Flatuosis convenire appetitumque excitare  
docet. Egregius Haen in Rat. Med. T. XII.  
Cap. VI. §. V. plures profert observationes, qui-  
bus hoc medicamentum cum magno successu  
contra Phtisin Pulmonalem fuisse adhibitum  
probatur. Dosis est ad guttas quadraginta.*

ELIXIR VITRIOLI ACIDUM  
*Edinburgensium.*

℞. Spiritus Vini rectificati uncias duo-  
decim,  
Olei Vitrioli uncias tres:  
Misceantur secundum artem & Dige-  
rantur per triduum:  
Tunc addantur  
Cinnamomi drachmæ sex,  
Zinziberis uncia semis,  
Herbæ Menthæ Piperitidis drachmæ  
duæ:  
Digerantur per sex dies & Filtrentur.  
*Egregium Medicamentum Stomachicum,*

*quod & in morbis Putridis cum successu da-  
ri poterit. Dosis est ad guttas duodecim.*

ELIXIR VITRIOLI DULCE  
*Edinburgensium.*

℞. Cinnamomi drachmas sex,  
Seminum Cardamomi minoris un-  
ciam unam,  
Angelicæ drachmas tres,  
Piperis longi drachmas duas,  
Liquoris Anodynæ Mineralis *Hoffmanni*  
uncias quatuor & viginti:  
Contusa Macerentur per octiduum,  
dein  
Filtrentur.

*Stomacho roborando & pellendæ imprimis  
Colicæ flatulentæ egregie inservit; Dosis ad  
guttas usque viginti augeri potest.*

## EMPLASTRA.

*Canones.*

I. Emplastrum est medicamentum ex-  
ternum, digitis non adhærescens, calo-  
re emolliendum & ductile, corporibus,  
quibus applicatur, se agglutinans.

II. Ubi vehiculum, cujus ministerio  
applicatur, eodem utrinque illinitur, di-  
citur *Sparadrapum*, *Tela Emplastica*. In  
formam vero cylindraceam ita convo-  
lutum Emplastrum ut ejus superficies to-  
ta lævis, eaque crassitie sit, ut Urethræ  
immitti possit, *Cereolus*, *Candeola*, *Bon-  
gie* appellatur.

III. Distinctio inter *Emplastra* & *Ce-  
rata* a recentioribus merito negligitur.  
Aluta Emplastro obducta Capitiq; im-  
posita *Peau divine* dicitur.

IV. Consistentia spissa Emplastris *Re-  
sinarum* aut *Ceræ* ope datur, quæ cum  
ipsis colliquefiant. Nimia siccitati *Te-  
rebinthina* præcipue cavendum. Quibus  
applicantur partibus, ut tenacius adhæ-  
reant, *Pice* obtinetur.

V. *Resinæ* & *Gummi Resinæ* cum *Te-  
rebinthina* colliquantur, Oleis commi-  
scentur, eisq; deinde reliqua sicca in  
pulverem redacta adjiciuntur & conti-  
nua agitatione commiscentur.



VI. Volatilia non nisi omnibus refrigeratis, admiscenda.

VII. Calces Saturninæ Olei iusta ratione dissolutæ Emplastri consistentiam induunt. Requirit autem hæc dissolutio maiorem paulo calorem, qui quo minus excedat Oleumque amburat affusa Aqua impediendum est. Hæc aqua ebullitionis, quæ durante operatione observatur, causa est, illa evaporata ebullitio cessat, tenuioresque vapores exhalant. Quod si acciderit, sedulo cavendum, ne nova aqua affundatur, illa enim ab Oleo fervente in halitus reduceretur, huiusque partem aliquam ex lebeti non sine magno artificis periculo projiceret; continuatus autem calor, reliquum Oleum nulla aqua temperatum adureret. Itaque per totam operationem pro ea ratione, qua aqua evaporat, nova subinde est adjicienda. Simul atque omnem in auras abiisse ex traditis signis apparet, lebes illico ab igne removendus, refrigeratoque demum Oleo nova aqua affundenda est. Ipsa etiam materies inter operationem spatula lignea continuo agitari debet, ne quid Olei lebetis parietibus accrescat, inque fundum ne residueat Calx metallica. In ea ratione, qua Oleum partes metallicas recipit, vapores difficilius transmittuntur, bullæ surgunt majores, totaque massa valde intumescit.

VIII. Emplastrum postquam parata sunt, super asseri ope manuum in bacillos formantur, quos *Magdaleones*, ipsum vero hunc laborem *Malaxare* dicunt.

#### EMPLASTRUM *Abbatis de Grace*.

Videatur Emplastrum album coctum.

#### EMPLASTRUM ADHÆSIVUM *Edinburgensium* POLYCHRESTUM *Suecorum*.

Rx. Emplastri Diachyli simplicis uncias duodecim,

Picis Burgundicæ uncia sex,  
Colliquefiant.

*Ad partes continendas nec non ad levia*

*Vulnera a sordium illapsu defendenda adhibetur. Æqual vires EMPLASTRI STICTICI Plenck.*

#### EMPLASTRUM ALBUM COCTUM *Celsi*.

Rx. Cerussæ Venetæ uncias quadraginta,  
Olei Olivarum uncias triginta:

Coquantur sub perpetua, ope spatulæ, lignæ agitatione, & crebra aquæ affusione usque dum aliquot guttæ aquæ frigidæ instillatæ Emplastri consistentiam arguant.

*Exsiccat, Refrigerat, Discutit, ad membra Ambusta valet, Intertrigines sanat, Cicatricem inducit. In, Arthritide vero, Erysipelate, Rheumatismis ne adhibeatur, cautio est. Mammis induratis quoque imponitur. Potest substitui EMPLASTRO Abbatis de Grace.*

#### EMPLASTRUM de AMMONIACO *Danorum*.

Rx. Cere citrinæ,  
Resinæ Pini,  
Terebinthinæ ana uncias quatuor,  
Gummi Ammoniaci uncias octo:  
Colliquantur & per stupam colentur.

*Variis, quæ apud Auctores prostant, compositionibus hanc, scilicet simpliciore, præferendam esse duxi. Emollit, Discutit, Maturat, Resolvit.*

#### EMPLASTRUM de AMMONIACO cum MERCURIO *Londinensium*.

Rx. Argenti vivi uncias tres,  
Balsami Sulphuris Rulandi drachmam unam:

Terantur probe usque dum omnes globuli Mercuriales disparuerint, dein immisceantur sensim sub perpetua agitatione

Gummi Ammoniaci uncia duodecim,  
liquatæ.

Terebinthinæ unciis tribus.

*In Glandularum indurationibus cum successu adhiberi posse videtur.*



## EMPLASTRUM.

### EMPLASTRUM ANGLICUM. EMPLASTRUM ADHÆSIVUM *Widstock.*

℞. Ichthyocollæ uncias duas,  
Benzoës,  
Styracis electæ ana drachmam unam,  
Spiritus Vini rectificatissimi uncias  
viginti quatuor,  
Immittantur Cucurbitæ & calore deti-  
neantur, usque dum omnia fuerint dis-  
soluta, solutioque refrigerata consisten-  
tiam gelatinæ induat. Oblinatur penicil-  
li ope serico tenso. Antequam prius  
fuerit exsiccatum non inducatur alterum  
stratum, eademque sub cautela fiat stra-  
torum iteratio, usque dum requisita cras-  
sities surrexerit.

*Celebratum hoc Emplastrum sub nominibus  
THE LADY'S BLACK STICKING  
PLAISTRE, T'AFFETAS D' ANGLE-  
TERRE, ENGLISCHER T'AFFET in  
creberrimo usu est ad Solidanda leviora  
Vulnera.*

### EMPLASTRUM ANODYNUM in CANCRO *Decher.*

℞. Emplastri Diapompholygos unciam  
unam,  
Fuliginis splendentis scrupulos qua-  
tuor,  
Opii pulverisati drachmam unam,  
Salis Volatilis Ammoniaci scrupulos  
duos:

Mixta Malaxentur cum  
Olei Solani quantitate sufficiente.  
*Virtutes ex nomine patent.*

### EMPLASTRUM ANODYNUM *Wildegansii.*

℞. Emplastri Saponati,  
Cerae citrinæ ana uncias quatuor:  
Colliquatis & semi refrigeratis addantur  
Olei Tartari foetidi drachmæ quinque,  
Opii in pulverem redacti uncia semis,  
Camphoræ drachmæ tres, dissolutæ in  
Olei Seminis Hyoscyami drachmis  
quinque:

Misceantur probe.

## EMPLASTRUM.

71

*Ad morbos Articulares commendatur.*

### EMPLASTRUM ANTAPOPLECTICUM *Hanckenii.*

℞. Olei Nucum Juglandum uncias duo-  
decim,  
Terebinthinæ,  
Resinæ communis ana uncias quatuor,  
Colophonii uncias duodecim,  
Cerae Citrinæ uncias sexaginta qua-  
tuor:

Colliquatis addantur

Pulverum Succini,  
Tacamahacæ,  
Carannæ,  
Sandaracæ ana uncia una  
semis,  
Olibani,  
Mastyichis,  
Storacis,  
Benzoës ana uncia una,  
Radicum Cyperi rotundi,  
Pyrethri,  
Angelicæ,  
Iridis Florentinæ ana un-  
cia semis:

Probe mixtis & pene refrigeratis com-  
misceantur

Axungia Castorei,  
Camphoræ ana drachmæ duæ,  
Oleorum destillatorum Macis,  
Majoranæ,  
Caryophyllo-  
rum,  
Ligni Rhodii,  
Lavendulæ  
ana scrupu-  
li duo,  
Salviæ,  
Rorismarini,  
Chamomillæ,  
Succini ana  
guttæ duo-  
decim:

Mixta efformentur in Emplastrum Ve-  
sicæ commissum asservandum.

*Applicatur Capiti raso tam arcendæ quam  
curandæ Apoplexiæ causa.*



## EMPLASTRUM ATTRAHENS

*Londinensium.*

℞. Resinæ,  
 Cera ana uncias sedecim,  
 Sevi Ovilli uncias octo  
 Liquefiant & per colum trajiciantur.  
*Ad Suturas siccas adhibetur.*

## EMPLASTRUM E BACCIS LAURI

*Mesue correctum.*

℞. Cera Citrinæ uncias octo,  
 Resinæ vulgaris,  
 Olei Laurini,  
 Terebinthinæ ana uncias duas:  
 Liquatis admisceantur  
 Pulverum Baccarum Lauri uncia qua-  
 tuor,  
 Radicum Cyperi rotundi,  
 Corticis VVinterani,  
 Olibani,  
 Mastichis,  
 Myrrhæ ana uncia una:

Probe misceantur.

*In Hydrope & affectibus a Flatibus ortis  
 Abdomini, in Cephalalgia Capiti imponitur.*

## EMPLASTRUM de BELLADONNA

*Brunsvicensium.*

℞. Succ recentis Foliorum Belladonnæ,  
 Olei Lini ana uncias novem:  
 Coquantur ad consumptionem humidita-  
 tis, tunc addantur  
 Cera Citrinæ uncia sex.  
 Terebinthinæ Venetæ drachmæ sex:  
 Liquatis admisceantur  
 Pulveris Foliorum Belladonnæ un-  
 ciæ duæ.

*Testantur Brunsvicenses, hoc Emplastrum  
 egregie Emollire ac Dolores sedare, inpri-  
 mis ad Mammarum vel Scroti Tumores  
 duos aut Resolvendos aut ab bonam Sup-  
 purationem perducendos cum successu in usum  
 tractum fuisse.*

## EMPLASTRUM de BETONICA

*Zvvælfseri.*

℞. Cera flavæ,  
 Resinæ Pini,  
 Terebinthinæ ana uncias duas:  
 Liquefactis addantur  
 Pulverum Betonicæ,  
 Mastichis,  
 Olibani,  
 Mumia ana uncia una:

Probe misceantur.

*Raso Capite imponitur ipsius Vulneribus  
 & Contusionibus, nec non in Cephalalgia  
 & morbis Catarrhalibus, qua efficacia ego  
 non disquiram; id saltem addere non du-  
 bito, ad grave Syncipitis Vulnus, cujus S.  
 Pauti in Quadripart. Botanic. p. 223. me-  
 minit, sanandum; hoc Emplastrum ne hilum  
 quidem contribuisset.*

EMPLASTRUM ad BUBONES  
VENEREOS Boerhave.

℞. Florum Sulphuris uncias duas,  
 Mercurii vivi drachmas duas:  
 Probe terantur usque dum omnes glo-  
 buli Mercuriales disparuerint, tunc ad-  
 dantur  
 Sacchari Saturni drachmæ tres,  
 Mixta ingerantur sub non intermissa agi-  
 tatione,  
 Emplastrorum de Meliloto,  
 Cumino,  
 Galbano,  
 Emplastrorum de Ammoniaco,  
 Sagapeno ana un-  
 ciæ dimidiæ:

Liquando commixtis & semirefrigeratis.  
*Testatur Trillerus se in pluribus agrotis  
 expertum esse, hujus Emplastri ope Bubones  
 Venereos inveteratos, adeoque tenacissimos  
 potenter fuisse solutos & dissipatos, nec non  
 ingentes Testiculos Venereos detumuisse.*

EMPLASTRUM CAMPHORATUM  
*Stablii.*

℞. Olei Olivarum uncias duodecim,  
 Minii uncias octo,



Coquantur ad Consistentiam Emplastri, cui refrigerato addantur

Camphoræ, paululum Olei Olivarum dissolutæ, unciaë duæ.

*Refrigerans, Resolvens atque Anonydina virtus huic Emplastro adscribitur, Ambustis & Excoriatis partibus cum successu imponitur: Optime substituitur EMPLASTRO DOMUS MISERICORDIÆ et EMPLASTRO de MINIO.*

### EMPLASTRUM CATAGMATICUM, *seu ad FRACTURAS Danorum.*

℞. Colophonii uncias viginti quatuor, Terebinthinæ uncias sex:

Liquatis adjiciantur

Pulverum Radicum Bistortæ,  
Symphyti,  
Tormentillæ ana  
unciaë tres:

*Compositionem Medicamenti, quod nomini suo minime respondere inter omnes constat, simpliciore, reliquis in Dispensatoriis passim obviis præferendam esse duxi.*

### EMPLASTRUM CEPHALICUM *Danorum.*

℞. Tacamahacæ,  
Carannæ,  
Styracis Calamitæ,  
Mastichis ana unciam unam,  
Terebinthinæ Argentoratensis drachmas duas,

Leni igne Liqueantur, pene refrigeratis addantur

Opii pulverisati scrupuli quatuor,  
Balsami Peruviani semuncia,  
Olei Succini drachma una:

Misceantur probe.

*In Capitis doloribus partis affectæ; in Odontalgia Temporibus applicatur. Substitui potest EMPLASTRO ad DOLORES DENTIUM, et EMPLASTRO ad TEMPORA.*

### EMPLASTRUM de CICUTA CUM GUMMI AMMONIACO *Schræderi* correcta.

℞. Cereæ flavæ uncias duodecim,  
Olei Hyoscyami uncias quatuor:  
Tom. II.

Colliquatis addantur

Succi Cicutæ inspissati unciaë sex,  
Gummi Ammoniaci pulverisati,  
Pulveris Cicutæ ana unciaë octo:

Probe misceantur.

*Ad Scirrhus & præcipue Lienis Hepatisque Tumores enixe commendatur, id quod Schulzius quoque Prælect. in Dispens. Observatione probat. EMPLASTRI SPLENETICI vices supplet; imponitur quoque Carcinomatibus.*

### EMPLASTRUM CITRINUM *Augustanorum.*

℞. Resinæ uncias sedecim,  
Cereæ Citrinæ,  
Sevi cervini ana uncias decem,  
Terebinthinæ uncias tres:

Colliquatis & colatis addantur

Pulveris Curcumæ drachmæ tres.

*Ad Ulcera & Vulnura maturanda valet, imponitur quoque levibus Vulneribus. ab illapsu sordium tuendis. Vices sustinet EMPLASTRI TETRAPHARMACI.*

### EMPLASTRUM AD CLAVOS PEDUM *Argentoratensium.*

℞. Emplastri Diachyli unciam semis,  
Picis navalis unciam unam:

Colliquatis addantur

Pulverum Galbani unciaë duæ,  
Viridis Æris,  
Salis Ammoniaci ana scrupuli duo:

Probe misceantur,

*Vires ex nomine patent, vices EMPLASTRI VIRIDIS explet.*

### EMPLASTRUM COMMUNE *Londinensium.*

Videatur Emplastrum Diachylon.

### EMPLASTRUM de CRUSTA PANIS *Augustanorum.*

℞. Cereæ Citrinæ uncias sex,  
Oleorum Mastichis,  
Cydoniorum,  
Terebinthinæ ana unciam  
unam:



Colliquatis addantur

Crustæ Panis tostæ, in pulverem tritæ  
unciæ duæ,

Pulverum Tacamahacæ uncia una,  
Mastychis,  
Caryophyllorum,  
Nucis Moschatae,  
Herbæ Menthæ ana uncia  
semis:

Probe misceantur & Emplastrum asser-  
vetur Vesicæ inclusum.

*Stomachi roborandi gratia, præcipue in  
Vomitu, regioni Epigastricæ imponitur.*

EMPLASTRUM de CUMINO Londinen-  
sum. EEMPLASTRUM STOMACHI-  
CUM sive EBACCIS LAURI Suecorum.

R. Cerae citrinæ,  
Emplastri Diapalmæ,  
Olei Olivarum ana uncias sex:

Colliquatis & semirefrigeratis addantur  
Pulveris Seminis Cumini uncia sex,

Baccarum Lauri uncia duæ,

Olei destillati Cumini drachma una.

Probe misceantur & Emplastrum asser-  
vetur Vesicæ inclusum.

*Ad Flatus Discutiendos imponitur Umbi-  
lico. Laudatur quoque ad Tumores durio-  
res, Mammarum maxime, Resolvendos.*

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RU-  
BRUM Danorum.

R. Lithargyrii uncias duodecim,  
Olei Olivarum uncias viginti qua-  
tuor;

Coquantur ad Lithargyrii dissolutionem;  
tunc addantur

Cerae Citrinæ,  
Terebinthinæ Venetæ,  
Pulveris Olibani ana uncia duæ:

Colliquatis admisceantur  
Colcotharis Vitrioli uncia tres.

*Hoc Emplastrorum genere Veteres Afflu-  
xum Humorum ad partes constringendo Va-  
sa morari & impedire conati sunt, ne vi-  
tium cuidam parti inherens ulterius se dif-  
fundat. Plures horum Emplastrorum descri-  
ptiones prostant; hodie rarius in usum tra-  
huntur.*

## EMPLASTRUM DIABOTANUM

*Blondii.*

R. Radicum & Foliorum Bardanæ,  
Petasitidis,  
Calendulæ,  
Chamæpiteos,  
Levistici,  
Valerianæ,  
Angelicæ,  
Enulæ,  
Armoraciæ,  
Cucumeris sil-  
vestris,  
Scrophulariæ,  
Sedi minoris,  
Chelidonii  
majoris,  
minoris,  
Gratiolæ ana  
uncias sex:

Incisa coquantur cum

Aquæ unciis mille:

Ad dimidias, colatis cum expressione  
addantur

Succorum Cicutæ,  
Chelidonii majoris,  
Hormini ana uncia sexa-  
ginta quatuor,  
Sedi minoris uncia fede-  
cim:

Bulliant paululum colentur & evaporen-  
tur ad consistentiam Extracti, hujus  
Extracti unciis sedecim commisceantur

Gummi Galbani,  
Ammoniacy,  
Opoponacis,  
Sagapeni ana uncia qua-  
tuor,

In Aceto Scillitico dissoluta & ad confi-  
sistentiam Extracti evaporata, probe  
mixta addantur

Lithargyrii unciis triginta duabus,  
Oleorum Olivarum unciis sedecim,  
Catellorum,  
E Mucilaginis ana unciis  
octo:

Secundum artem coctione dissolutis: ad-  
jiciantur.

Florum Sulphuris,



# EMPLASTRUM.

Ceræ Citrinæ,  
Storacis liquidæ,  
Picis ana uncia sedecim:  
Colliquefactis commisceantur  
Pulverum Radicum Ireos Florentinæ,

Cyclaminis,  
Ranunculi,  
Coronæ Imperialis,  
Serpentariæ,  
Hellebori albi  
ana drachmæ  
sex,  
Sigilli Salomonis,  
Ari ana uncia una,  
Aristolochiæ  
longæ,  
rotundæ,  
Clematitidis ana  
drachmæ duæ,  
Asari uncia tres:

Probe agitentur, usque dum semirefrigeratæ fuerint; tunc adjiciantur

Pulverum Baccarum Lauri,  
Florum Meliloti ana uncia  
dimidia,

Seminum Angelicæ,  
Nasturtii ana  
drachmæ sex,  
Cumini uncia  
tres,

Fimi Columbini uncia una,  
Gummi Asphalti,

Olibani,  
Mastychis ana  
uncia octo,

Tacamahacæ un-  
ciæ duodecim,

Bdellii,

Myrrhæ ana un-  
ciæ tres,

Euphorbii uncia  
una:

Agitentur usque dum omnia refriguerint, tunc immisceantur adhuc

Camphoræ tritæ uncia una semis,  
Oleorum destillatorum Caryophyllo-

rū uncia una,  
Philosophorū  
uncia duæ  
cum dimidia:

# EMPLASTRUM.

75

Formentur Magdaleones.

*Theriacalis hæc compositio olim magnifiebat in Gallia ad Resolvendos Tumores Glandularum & Viscerum, hodie evilesceere cæpit.*

## EMPLASTRUM DIACHALCITEQS.

Videatur Emplastrum Diapalmæ.

## EMPLASTRUM DIACHYLON CUM GUMMI Vigonis correctum. EMPLASTRUM GUMMOSUM Suecorum.

Rx. Emplastri Diachyli simplicis uncias  
viginti quatuor,

Ceræ flavæ uncias quatuor:

Colliquatis addantur

Terebinthinæ Venetæ,

Pulverum Gummi Ammoniæ,

Galbani,

Opopanacis,

Sagapeni ana un-  
uncia una:

Semirefrigeratis immisceantur:

Pulveris Croci drachmæ duæ.

*Digerendi & Maturandi scopo frequenter usurpatur.*

## EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX Mesue.

Rx. Mucilaginum Radicis Althææ,

Seminum Lini,

Fœnugræci  
ana uncias  
duodecim,

Olei Olivarum uncias triginta sex:

Coquantur ad consumptionem humiditatis, tunc addantur

Lithargyrii uncia viginti quatuor:

Coquantur ad consistentiam Emplastri.

*Proxime ad Emplastrum Adhæsivum accedit. Londinenses Mucilagines omittendo, quæ utique hic parum efficaces sunt, EMPLASTRUM COMMUNE parant; neque etiam male substituitur EMPLASTRO DE LAPIDE CALAMINARI Pomphylus dicto.*



EMPLASTRUM DIAPALMÆ *vel* DIA-  
PHOENICON *Galenī correctum*, *vel*  
DIACHALCITEOS.

℞. Oleorum Palmarum uncias sex,  
Olivarum uncias sexaginta  
sex,  
Foliorum Quercus tenello-  
rum uncias octo:

Coquantur ad consumptionem humidita-  
tis; addantur

Lithargyrii uncia quadraginta octo:  
Coquantur secundum artem ad confi-  
scentiam Emplastri, in Aqua, præcaven-  
dæ adustionis gratia affundenda, dissol-  
vantur

*Exsiccantes & Discutientes vires edit,  
Ulcerebus imponitur nec non Vulneribus clau-  
dendis.*

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM  
*Mynsichti.*

℞. Cerae flavæ uncias undecim,  
Colophonii uncias quatuor,  
Terebinthinæ uncias duas:

Colliquatis addantur

Pulverum Succini uncia tres,

Gummi Bdellii uncia qua-  
tuor,

Ammoniacy unc-  
ia duæ,

Galbani,

Sandaracæ ana  
uncia una,

Mastychis,

Olibani ana un-  
cia semis:

Probe misceantur.

*Roborandi & Discutiendi fine adhibetur,  
maxime contra Oedemata laudatur; Luxatis  
imponitur.*

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS  
*Nicolai.*

℞. Olei Solani uncias triginta quatuor,  
Cerussæ uncias decem:

Coquantur secundum artem ad solutio-  
nem usque Cerussæ tunc

Addantur

Cerae uncia triginta quatuor,  
Colliquatis adjiciantur,

Plumbi usti uncia sex,

Pulverum Pompholygos,

Olibani ana uncia quatuor:

Misceantur agitando.

*Refrigerat, Exsiccant, Discutit, Cicatricem  
iaducit. Potest EMPLASTRO SATURNINO  
substitui.*

EMPLASTRUM DIASULPHURIS  
*Rulandi.*

℞. Balsami Sulphuris *Rulandi* uncias sex,  
Cerae citrinæ uncias duas,

Colophonii uncias sex,

Colliquatis admisceantur,

Pulveris Myrrhæ uncia novem,

*Ad Ulcera mundanda & solidanda, di-  
scutiendos Tumores, Strumas maxime haud  
vulgariter laudatur; in Fistula Ductus Sa-  
livalis egregias inde vires vidit Buchner  
apud Schulz Prælect. in Dispens. 190.*

EMPLASTRUM DIVINUM *Nicolai*  
*correctum.*

℞. Lithargyrii uncias sedecim,

Olei Olivarum uncias triginta duas,

Viridis Æris unciam unam,

Coquantur secundum artem ad Dissolu-  
tionem Metallorum, tunc collipientur  
cum

Cerae flavæ unciis octo;

Addantur sub perpetua agitatione

Pulverum Gummi Galbani,

Myrrhæ,

Bdelli ana uncia  
duæ,

Ammoniacy uncia  
tres,

Olibani,

Opoponacis,

Mastychis,

Radici Aristolochiæ rotun-  
dæ ana uncia una,

Lapidis Magnetis uncia  
una semis.

*Valentiores quam Diachylon cum Gum-  
mi*



## EMPLASTRUM.

mi hoc Emplastrum edere vires temere creditur. Viride Æris, quod sexagesimam circiter ejus partem constituit, quem effectum edet? & in Magnete tot Oleis & Resinis obducto, quæ spes est fore, ut Tela aut alia frustra Ferri ex Vulneribus extrahat? Non male substituitur EMPLASTRO MANUS DEI & EMPLASTRO OPODELDOCH.

### EMPLASTRUM ad DOLORES DENTIIUM.

Videatur Emplastrum Cephalicum.

### EMPLASTRUM EPISPASTICUM.

Videatur Emplastrum Vesicatorium.

### EMPLASTRUM ad FONTICULOS.

Videatur Ceratum Refrigerans Galeni.

### EMPLASTRUM FRIGIDUM Riedlini.

℞. Cerae Citrinæ uncias duodecim,  
Resinæ albæ,  
Sevi Hircini ana uncias sex,  
Terebinthinæ Venetæ uncias quinque,  
Emplastri Diachyli uncias sedecim,  
Oleorum Lini unciam unam semis;  
Liliorum alborum,  
Lumbricorum terrestrium,  
Chamomillæ ana unciam  
dimidiam:

Colliquatis addantur

Pulverum Gummi Myrrhæ,  
Olibani,  
Mastichis,  
Galbani,  
Opoponacis, ana  
drachmæ duæ,  
Florum Sambuci,  
Chamomillæ,  
Seminum Anisi,  
Fœniculi,  
Fœnugræci ana  
uncia semis,  
Fabarum,  
Radicum Althææ,  
Symphyti ana  
drachmæ duæ,  
Curcumæ drach-  
mæ decem:

## EMPLASTRUM.

77

Probe agitando misceantur; refrigeratis immisceatur,

Olei destillati Terebinthinæ uncia una.  
Expertissimo quondam nostratum Chirur-  
gorum hoc Emplastrum Digerendi & Resol-  
vendi scopo frequenti in usu fuit, egregios  
quoque ejus effectus celebrat Von Lindern  
Venus Spiegel C. 12.

### EMPLASTRUM ad FUNGOS ARTICULORUM Klein.

℞. Picis navalis uncias tres,

Cerae,

Terebinthinæ Venetæ ana unciam unam:  
Colliquatis addantur sub perpetua agi-  
tatione

Pulverum Radicis Pyrethri,  
Salis communis decrepitati,  
Gummi Euphorbii ana un-  
ciæ duæ,  
Ammoniacy,  
Galbani,  
Mastichis,  
Olibani ana un-  
cia una.

Vires ex nomine patent.

### EMPLASTRUM ad GANGLIA.

Brandeburgensium.

℞. Gummi Galbani,  
Opoponacis,  
Ammoniacy ana unciam unam  
semis:

Dissolvantur liquando

Terebinthinæ Venetæ uncia una se-  
mis:

Addantur deinceps

Pulverum Sagapeni,  
Myrrhæ ana uncia una se-  
mis,  
Sulphuris vivi,  
Vitrioli Romani,  
Salis Ammoniacy ana dra-  
chmæ duæ,  
Euphorbii Drachma una:

Prope agitando misceantur, semirefri-  
geratis addantur

Olei Laurini,  
Spiritus Vini ana uncia semis:

Con-



Continuetur agitatio usque dum omnia refrigeruerint.

*Testatur Buchner apud Schulz in Dispens. Bassium observasse, hoc Emplastro Ganglia emolliiri, manu Chirurgi postea eo facilius dissipanda: Klein Select. Medicam. p. 77. valit Hemorrhoidum Veneream post Antimonii & Mercurii usum remanentem, tandem hoc Emplastro Capiti superimposito victam fuisse atque dispulsam.*

### EMPLASTRUM de GALBANO CROCATUM Mysichti.

Rx. Emplastrorum de Meliloto,  
Diachylis simplicis  
ana uncias tres,

Ceræ Citrine uncias duas,  
Terebinthinæ unciam unam,  
Pulveris Gummi Galbani uncias sex:  
Colliquata agitentur donec pene refrigeruerint:

Deinceps addantur

Pulveris Croci drachmæ sex:  
Continuetur agitatio, usque dum omnia in spissitudinem Emplastri coagula-verint.

*Tumores duros Resolvit; cum successu imponitur Mammis induratis.*

### EMPLASTRUM GRISEUM seu DE LAPIDE CLAMINARI VVecker.

Rx. Ceræ uncias tres,  
Sevi Cervini uncias quatuor,  
Terebinthinæ sesquiunciam:

Colliquatis addantur

Pulverum Lapidis Calaminaris,  
Lithargyrii ana sesquiun-  
cia,

Tutæ,

Mastychis,

Olibani ana uncia semis:

Agitentur usque dum semirefrigeruerint, tunc addatur

Camphoræ, pauxillo Olei tritæ, dra-  
chma una,

*Eosdem ac Emplastrum Diapompholigos  
matiores tamen effectus edit.*

### EMPLASTRUM ad HERNIAS Zuvrellffer.

Rx. Ceræ flavæ uncias quatuor,  
Terebinthinæ uncias sex:

Colliquatis addantur

Pulverum Succi Acaciæ,  
Hypocistidis,

Mastychis,

Myrrhæ,

Olibani,

Radicis Symphyti ana un-  
ciam unam,

Aluminis crudi,

Sanguinis Draconis ana  
drachmas sex,

Nucum Cupressi,

Lapidis Hæmatitis,

Seminis Perfoliatæ,

Vitrioli de Cypro ana un-  
ciam semis:

Probe misceantur.

*Satis hodie est evictum, Annulis contenta  
Abdominis elabi passis robur reddi Adstrin-  
gentibus extus applicatis nequaquam posse.  
Prudentes Chirurgi totum negotium Naturæ  
relinquunt.*

### EMPLASTRUM de HYOSCYAMO Ludovici.

Rx. Olei expressi Hyoscyami uncias sex,  
Succi Hyoscyami uncias duodecim:  
Coquantur ad consumptionem humidita-  
tis; addantur

Ceræ uncia quatuordecim,

Terebinthinæ uncia duæ:

Liquatis & semirefrigeratis admisceantur  
dum

Pulveris Herbae Hyoscyami uncia duæ.

*Ad Dolores Rheumaticos & Tumores  
Glandularum & Viscerum laudatur. Ludo-  
vici ejus eximium in Hydrocele effectum  
vidit. Trillerus quoque egregium ejus usum  
contra Perniones, Clavos pedum, & Hæ-  
morrhoides cacas haud semel est expertus.*

### EMPLASTRUM INCOGNITUM.

Videatur Emplastrum Santalinum.



## EMPLASTRUM.

### EMPLASTRUM ISCHIADICUM.

*Danorum.*

℞. Resinæ albæ uncias quatuor;  
Terebinthinæ drachmas sex:  
Colliquatis adjiciatur  
Pulveris Euphorbii drachma una se-  
mis.

*In malo Ischiadico parti affecta Resolvendi  
causa imponitur.*

### EMPLASTRUM ad LUPIAM Viennensium.

℞. Resinæ uncias quatuor,  
Terebinthinæ uncias duas,  
Gummi Galbani uncia unam:  
Colliquatis commisceantur  
Farinæ Frumenti,  
Pulverum Gallorum Turcicarum,  
Viridis Æris ana uncia una:  
Misceantur probe.

*Testatur Cl. Plenck se hoc Emplastro,  
singulo octiduo renovato, aliquot Lupias in  
Geni curasse.*

### EMPLASTRUM MAGNETICUM

*Angeli Salæ correctum.*

℞. Gummi Galbani,  
Ammoniaci ana uncias tres,  
Cera,  
Terebinthinæ ana uncias quinque:  
Colliquatis addantur  
Gummi Sagapeni,  
Magnetis Arsenicalis subtilissime triti  
ana uncia tres,  
Colcothar Vitrioli,  
Olei destillati Succini ana uncia una:  
Misceantur exacte.

*Maxime laudatur ad curandos Bubones  
Pestilenciales, sed evictum est, Arsenici  
usum etiam externum maxime suspectum esse.*

### EMPLASTRUM MAMILLARE.

Videatur Emplastrum de Spermate Ceti.

### EMPLASTRUM de MELILOTO.

℞. Florum Meliloti uncias duodecim,  
Sevi bovini uncias sedecim,

## EMPLASTRUM.

79

Coquantur ad consumptionem humidi-  
tatis; colatis addantur

Resinæ albæ uncia viginti quatuor,  
Cera uncia duodecim:

Colliquefiant.

*Emplastri de Meliloto Andromachi ex  
Roborantibus maxime & Discussantibus com-  
positi mentionem facit Galenus. Ex illo  
tempore plurimæ Emplastri a Meliloto de-  
nominati compositiones in Dispensatoriis oc-  
currunt. Cum hoc Emplastrum propter vires  
Emollientes vulgo commendetur, præscriptio-  
nem Parisinam exhibeo, quæ nequæ Aro-  
mata, neque Gummi ferulacea vehit. Sub-  
stitui potest EMPLASTRO MALACTICO.*

### EMPLASTRUM MERCURIALE.

Videatur Emplastrum de Ranis cum  
Mercurio.

### EMPLASTRUM de MINIO Vigonis correctum.

℞. Minii uncias duodecim,  
Olei Rosarum uncias viginti quatuor:  
Coquantur secundum artem ad disso-  
lutionem Minii:  
Addantur

Cera uncia tres:  
Colliquatis & semirefrigeratis commi-  
sceantur.

Camphoræ, cum paululo Olei trita,  
drachmæ duæ.

*Laudantur ad Dissipandas Inflammationes,  
ideoque Fracturis & Ambustis imponitur,  
nec non Rheumatismis. Vices exsequitur  
EMPLASTRORUM DOMUS MISE-  
RICORDIÆ, NORICI, TRIAPHAR-  
MACI.*

### EMPLASTRUM MIRACULOSUM.

Videatur Emplastrum Saponatum Bar-  
bette.

### EMPLASTRUM de NICOTIANA le Mort.

℞. Foliorum Nicotianæ uncias quatuor,  
Olei Olivarum uncias duodecim,  
Vi-



Vini rubri uncias quinque:  
Coquantur ad consumptionem humiditatis:

Expressis addantur:

Ceræ,

Colophonii ana uncia duodecim,  
Colliquatis & colatis admisceantur de-  
mum

Pulverum Gummi Tacamahacæ,

Elemi,

Myrrhæ,

Aloës ana uncia una,

Olei destillati Tabaci uncia duæ:

Misceantur.

*Spleniticis commendatur: Trillerus Abdo-  
mini impositum referare Alvum expertus docet.*

### EMPLASTRUM NIGRUM *Bechholzii.*

Rx. Cinerum Clavellatorum uncias qua-  
tuor,

Salis Ammoniaci unciam unam,

Olei Terebinthinæ uncias octo:

Digerantur per mensem in Cucurbita:  
Tunc addantur

Florum Sulphuris drachmæ sex:

Digerantur denuo per mensem; dein  
admisceantur

Ceræ flavæ unciis duodecim,

Colophonii unciis quatuor,

Terebinthinæ drachmis sex,

Pulverum Gummi Ammoniaci,

Bdellii,

Galbani,

Sagapeni ana dra-  
chmis septem,

Myrrhæ,

Olibani ana dra-  
chmis sex:

Colliquatis & semirefrigeratis adjiciatur  
tandem,

Camphoræ, pauxillo Olei solutæ, un-  
cia semis.

*Partibus Gangrenosis in Sphacelum prope-  
rantibus imponitur. Mortuæ separationem a  
viva parte felicissime inde secundari asse-  
verant.*

### EMPLASTRUM NORICUM.

Videatur Emplastrum de Minio.

### EMPLASTRUM OPODELDOCH

*Paracelsi.*

Videatur Emplastrum Divinum.

### EMPLASTRUM OXYCROCEUM

*Nicolai.*

Rx. Ceræ uncias sedecim,

Picis,

Colophonii ana uncias duodecim,

Terebinthinæ uncias quatuor:

Colliquatis & colatis addantur

Pulverum Gummi Galbani,

Ammoniaci,

Myrrhæ,

Olibani,

Mastichis ana un-  
cia quatuor:

Agitentur & semirefrigeratis addatur

Pulveris Croci uncia una.

*In Luxationibus vim Resolvendi nec non  
Paregoricam habet admodum efficacem. Schulz  
l. c. egregium ejus effectum refert.*

### EMPLASTRUM POLYCHRESTUM

*Hoffmanni.*

Videatur Emplastrum Saponatum *Barbette.*

### EMPLASTRUM de RANIS *Vigonis.*

Rx. Olei Olivarum,

Lithargyrii ana uncias duodecim:

Coquantur secundum artem ad dissolu-  
tionem Lithargyrii:

Affundatur durante coctione Decoctum ex  
Ranarum viventium numero decem,  
Lumbricorum terrestrium viventium  
unciis quatuor,

Herbarum Schoenanthi,

Matricariæ,

Florum Stoechados Arabicæ ana un-  
cia dimidia,

Radicum Enulæ,

Ebuli ana unciis tribus,

Vini albi unciis viginti quatuor,

Aceti Vini unciis octodecim:

Ad dimidias coctis & colatis; addantur:

Terebinthinæ,

Ce-



# EMPLASTRUM.

Ceræ ana unciaë duæ:  
 Colliquatis superingerantur,  
 Pulveris Olibani drachmæ sex,  
 Euphorbii drachmæ quinque:  
 Agitatis & semirefrigeratis tandem ad-  
 dantur  
 Olei Laurini unciaë duæ,  
 Styracis liquidæ,  
 Pulveris Croci ana uncia semis:  
 Misceantur:

*Commendatur ad Emolliendos Tumores frigidos.*

Ejus unciis duodecim si addideris un-  
 cias unam Mercurii habebis.

## EMPLASTRUM de RANIS cum MERCURIO.

*Quod cum summo successu non modo Tu-  
 moribus Venereis, sed & quibuscumque Glan-  
 dulis induratis imponitur. Pro varia in-  
 dicatione Medici duplum, triplum, imo qua-  
 druplum rationis Mercurii hic notati solent  
 recipere. Optime aliis Emplastris Mercu-  
 rialibus substituitur.*

## EMPLASTRUM SANTALINUM vel INCOGNITUM *Augustanorum.*

Rx. Ceræ,  
 Resinæ ana uncias quatuor:  
 Colliquata colentur, eisque addantur  
 Pulverum Gummi Olibani,  
 Mastichis,  
 Myrrhæ,  
 Aluminis ana drachma una  
 semis,  
 Ligni Santali rubri uncia  
 una semis:

Semirefrigeratis commisceantur  
 Pulveris Croci drachmæ duæ.

*Frustra hoc Emplastrum ad referendas He-  
 patis Obstructiones, contra quas olim com-  
 mendabatur, adhberi facile patet. Ad Lu-  
 xationes & Sugillationes vulgo in usum trahi  
 solet, sed hoc quoque respectu Emplastrum  
 Oxycroceum ipsi merito præfertur.*

# EMPLASTRUM.

81

## EMPLASTRUM SAPONATUM *Barbette* *vel Tachenii vel SATURNINUM* *Digby.*

Rx. Olei Rosarum uncias duodecim,  
 Minii,  
 Cerussæ ana uncias sex:  
 Coquantur secundum artem ad consi-  
 stentiam:

Tunc addantur

Saponis Veneti rasi unciaë quatuor:  
 Agitentur usque dum pene refrigerint,  
 tunc ipsis adhuc immisceatur

Camphoræ, paululo Olei dissolutæ,  
 uncia dimidia.

*Commendatur ad leniendos Dolores Rheu-  
 maticos & Arthriticos, Tumores frigidos quo-  
 que Resolvere dicitur. Substituitur EM-  
 PLASTRO MIRACULOSO & POLY-  
 CHRESTO Hoffmanni.*

## EMPLASTRUM SATURNINUM *Goulard.*

Rx. Ceræ Citrinæ uncias novem,  
 Olei Olivarum uncias octo:  
 Liquatis immisceantur  
 Extracti Saturni uncia semis,  
 Camphoræ grana decem,  
*Inungitur alutæ, quæ Membra Rheumatica  
 involvuntur.*

## EMPLASTRUM SATURNINUM *Mynsichti.*

Videatur Emplastrum Diapompholygos.

## EMPLASTRUM de SPERMATE CETI *Mynsichti. EEMPLASTRUM Filii Zacha- riæ.*

Rx. Gummi Galbani,  
 Terebinthinæ ana unciam unam:  
 Leni igne liquentur & colentur:  
 Cum colatis colliquantur  
 Ceræ albæ unciaë quatuor,  
 Spermatis Ceti unciaë duæ,  
 Olei Amygdalarum dulcium uncia  
 semis.

*Non modo Mammarum Tumoribus me-  
 de-*



*detur, sed & Contusis & Sugillatis salubriter imponi potest.*

### EMLASTRUM *di* SPERMATE RANARUM *Noricorum* correctum.

Rx. Olei Spermatis Ranarum uncias sexaginta,

Cerussæ uncias octoginta:

Coquantur secundum artem, aquam ipsis affundendo, in qua dissoluta sint,

Aluminis uncia sex,

Ubi ad consistentiam Emplastri coagula-verint, removeantur ab igne & semirefrigeratis commisceantur

Camphoræ, paulo Olei solutæ, uncia duæ:

*Vires Emplastri Albi Cocti æquiparat, quin & eodem ad Discutiendas Inflammationes efficacius est.*

### EMLASTRUM SPLENITICUM.

Videatur Emplastrum de Cicuta.

### EMLASTRUM STICTICUM *Grollii* correctum.

Rx. Lithargyrii,

Minii,

Oleorum Lini,

Olivarum ana uncias duodecim:

Coquantur secundum artem ad consistentiam Emplastri:

In aqua, quæ sub coctione adjicitur, dissolvantur

Vitrioli albi uncia quatuor:

Coctis colliquantur

Colophonii,

Ceræ ana uncia viginti quatuor,

Terebinthinæ uncia duodecim,

Colatis addantur

Pulverum Gummi Ammoniacy,

Galbani,

Bdellii,

Myrrhæ,

Aloës Hepaticæ,

Mumiæ,

Radici Aristolochiæ longæ,

Sanguinis Draconis,

Lapidis Hæmatitæ ana uncia duæ:

Olei Laurini uncia duodecim:

Probe misceantur.

*Ad Ulcera vetusta æque ac ad recentia Vulnèra olim adhibebatur, hodie fere obsolescit.*

### EMLASTRUM STICTICUM *Plenck.*

Videatur Emplastrum Adhæsivum.

### EMLASTRUM *de* TACAMAHACA *Schræderi* correctum.

Rx. Cerae uncias octo,

Terebinthinæ unciam unam:

Colliquatis & semirefrigeratis commisceantur

Pulveris Tacamahacæ uncia quatuor,

Balsami Peruviani,

Oleorum destillatorum Menthæ ana drachmæ duæ,

Caryophyllorum drachmæ duæ,

*In Vomitu, Diarrhœa & Flatibus regioni Epigastricæ imponitur.*

### EMLASTRUM *ad* TEMPORA.

Videatur Emplastrum Cephalicum.

### EMLASTRUM TRIAPHARMACUM *Mesue.*

Videatur Emplastrum de Minio.

### EMLASTRUM VESICATORIUM *Hoffmanni.*

Rx. Emplastri de Meliloto uncias tres:

Liquatis commisceantur

Pulveris Cantharidum uncia una semis,

Camphoræ, paulo, Olei solutæ drachmæ duæ.

*Ex innumeris, quæ prostant, hujus Emplastri præscriptionibus, simpliciores reliquis prætuli. Ubi cum delicatioribus & sensibilibus res est, ratio Emplastri de Meliloto augetur.*



EMPLASTRUM VIRIDE *Oribasii*  
correctum.

Videatur Emplastrum ad Clavos pedum.

## E M U L S I O N E S.

*Canones.*

I. Nuclei cortice privati contunduntur & agitantur cum aqua, sensim sensimque affundenda; agitatid demum parata Emulsio colando depuratur.

II. Ubi Emulsiones Spuriæ parandæ sunt, substantia ex aqua suspendenda suo teritur sapone, donec tota sit per istum diffusa. Aqua guttatim adjicitur, usque dum omnem massam receperit.

III. Emulsiones cum ætatem non ferant, tunc demum parandæ sunt, cum in usum sunt recipiendæ.

EMULSIO ARABICA *Fuller* correctæ.

℞. Amygdalarum dulcium unciam unam:  
Amararum drachmam unam,

Pulveris Gummi Arabici unciam feminis,

Redigantur in Emulsionem cum  
Aquæ unciis viginti quatuor:

Colaturæ addantur

Syrupi Althææ uncie tres.

*Commendatur præcipue contra Ardorem Urinæ.*

EMULSIO BALSAMICA *Fuller* correctæ.

℞. Balsami Tolutani drachmas tres,  
de Meccha guttas octo:

Terantur cum

Amygdalarum dulcium excorticatarum uncia dimidia:

Probe subactis adjiciantur

Decocti Hordei uncie octodecim,

Sacchari albi drachmæ sex.

*Observat Triller hanc Emulsionem apte Phtisicis præscribi; inde Acre demulceri, Putredinem deleri, Tubercula discuti.*

EMULSIO CAMPHORATA *Richard.*

Videatur Emulsio simplex.

EMULSIO NITRATA *Richard.*

Videatur Emulsio simplex.

EMULSIO SIMPLEX *Richard.*

℞. Amygdalarum dulcium numero sedecim,

Seminum quatuor frigidorum majorum unciam semis:

Fiat secundum artem Emulsio cum  
Ptisanæ communis unciis octodecim:  
Addatur

Sacchari albi uncia una.

*Refrigerandi, Demulcedi, Sopiendi scopo exhibetur. Ejus unciis sex si addideris Camphoræ grana duo, surget EMULSIO CAMPHORATA, NITRATA autem, Nitri depurati granis sex adjectis.*

EMULSIO VIOLATA *Mynsichti.*

℞. Amygdalarum dulcium unciam unam,  
Seminum Violarum drachmas duas,  
Papaveris albi drachmam unam,

Aquarum Violarum uncias sex,  
Nymphææ,

Lactucæ ana uncias tres:

Misceantur & fiat lege artis Emulsio, edulcoranda

Julepi Violati uncia una.

*Vi Refrigerante & Sopiante vulgo commendatur, quam quidem vim cum reliquis Emulsionibus veris communem habet.*

ENS VENERIS *Boyle.*

Videantur Flores Salis Ammoniaci Martiales.

## E S S E N T I Æ.

*Canones.*

I. Essentia dicitur Spiritus Vini substantiis Animalibus vel Vegetabilibus digestus atque tinctus.



II. Patet hinc ad Essentias illas modo substantias recipiendas esse, quarum vis medicata pendet a principiis Spiritu Vini dissolubilibus.

III. Essentiarum vires compositæ sunt ex Extrahendorum & Spiritus Vini viribus.

IV. Essentiæ simplices recepto Spiritu abstractio loco Spiritus Vini simplicis ut plurimum evadunt efficaciares.

V. Ad parandam Essentiam simplicem Extrahendo comminuto cucurbitæque immisso affundatur Spiritus Vini; instituat per aliquot dies Digestio in Balneo arenæ; mane & vespera agitetur Essentia.

VI. Herbis triplum, Radicibus & Corticibus quintuplum, Gummi resinis, Resinis, Succis Animalium inspissatis sextuplum Spiritus Vini recipitur.

VII. Spiritus Vini, quo minus est rectificatus, eo plures recipit partes gummosas.

VIII. Ope Alkali, Extrahendis adiciendi, Essentiam obtineri efficaciorum frequens opinio est, quæ maxime circa Essentias ex Animalibus versari solet.

IX. Essentias, quæ Alkali continent extus ad Vulnere aut Ulcera adhiberi non posse, notum jam est ex Chirurgicis.

#### ESSENTIA ALEXIPHARMACA *Stablii.*

R. Radicum Angelicæ,  
Imperatoricæ,  
Helenii ana unciam unam,  
Carlinæ unciam semis,  
Vincetoxici,  
Pimpinellæ albæ ana unciam unam semis,

Herbæ Scordii uncias sex:

Incisa infundantur per noctem cum Spiritu Vini rectificati unciis viginti quatuor:

Filtrentur.

*Illa ætate, qua morbos Exanthematicos Calidis tractare mos erat, hæc Essentia in frequenti usu fuit, hodie meliora edocti Medici homines, quæcunque Sanguinem exagitant, in morbis Febrilibus prorsus exulare jubent. In affectibus Catarrhalibus Phlegmaticorum poterit forsan conducere. Datur ad quadraginta guttas.*

#### ESSENTIA ALEXIPHARMACA TEMPERATA *Stablii.*

R. Essentiarum Vincetoxici,  
Essentiarum Pimpinellæ albæ ana unciam unam,  
Scordii uncias duas:

Misceantur.

*Minus quidem quam antecedens exagitat Sanguinem, sed eadem cautio in qualicumque Februm genere adhiberi debet.*

#### ESSENTIA AMARA *Trilleri.*

R. Radicum Gentianæ,  
Caryophyllatæ ana unciam unam,  
Corticum Aurantium viridium,  
Herbarum Absynthii,  
Fumariæ,  
Cardui benedicti,  
Trifolii fibrini,  
Millefolii,  
Florum Chamomillæ,  
Summitatum Centaurii minoris ana unciam semis:

Incisa Digerantur

Spiritu Vini rectificati unciis quatuor & viginti:

Filtrentur

*Plures Essentias amaras ad imitationem ejus, quæ Hala preparata, auctoritate Sectæ Stabliæ in magna fama fuerat, Medici Germani præscripserunt. Earum omnium vires, quæ hic exhibetur, sustinet. Teste Auctore vires habet Stomachicas, Carminativas, Anthelminticas, & in vitiis Systematis Biliarii, Chlorosi, Fluore albo, in Febris quoque intermittentibus conducit. Dosis est ad triginta guttas.*

#### ESSENTIA AMBRÆ *Hoffmanni.*

R. Ambre Gryseæ,  
Salis Alkali ana drachmas duas:  
Probe trita immittantur Cucurbitæ, affundanturque

Spiritu Rosarum Tartarificati uncia octo:  
Coquantur usque dum Ambra sit dissoluta.



*Inter Medicamenta Nervos roborantia ab Holstunno Obs. Chyr. 18. L. L. cum laude refertur. Datur ad triginta guttas.*

ESSENTIA AMBRÆ SICCA  
*Augustanorum correcta.*

℞. Ambrae Gryseae drachmani unam,  
Sacchari albißimi unciam unam:  
Misceantur terendo in pulverem.

*Medicamentum incongrue Essentia denominatum vires Ambrae habet. Dosis est ad sesquidrachmam.*

ESSENTIA ANODYNA *Edinburgensium.*

℞. Extracti Opii Aquosi unciam unam:  
Dissolvatur

Aquæ Cinnamomi unciis novem:  
Filtretur.

*Vires Opii habet. Dosis ad guttas quindecim.*

ESSENTIA ANTIMONII *Huxhami.*

Videatur Aqua Benedicta.

ESSENTIA BALSAMICA *Gmelini*  
*correcta.*

℞. Spiritus Salis Ammoniaci Vinosi uncias duodecim,

Oleorum destillatorum Cinnamomi,  
Nucis Moschatæ ana scrupulum unum,  
Caryophyllorum scrupulum dimidium,

Quintæ Essentiæ Corticū Aurantiorū,  
Citri ana drachmas duas:

Misceantur.

*Hanc solutionem, quæ vel ex tempore parari potest, longe prolixiori apparatus, quem Dispensatorium Wurttembergense præscribit, præferendam esse duxi. Conducit ad vitia Digestionis, quæ a debilitate vel obstructione Viscerum Chylopoieticorum oriuntur. Dosis est ad triginta guttas.*

ESSENTIA BEZOARDICA *Malensium.*

℞. Radicum Angelicæ,  
Imperatoriaæ,  
Pimpinellæ albæ,  
Carlinæ,  
Helenii,  
Vincetoxici,  
Dictamni albi,  
Contrayervæ,  
Valerianæ ana unciam unam:

Incisa infundantur per triduum cum  
Spiritus Vini rectificati unciis viginti:  
Expressa filtrentur.

*Quæ de Essentia Alexipharmaca dicta sunt, hæc quoque pertinent.*

ESSENTIA CALAMI COMPOSITA  
*Stablii.*

℞. Radicis Calami Aromatici,  
Seminis Coriandri ana uncias duas:  
Incisa & contusa infundantur cum  
Spiritus Vini rectificati unciis viginti quatuor:

Filtrentur.

*Stomachico & Carminativo Scopo ad guttas triginta exhibetur.*

ESSENTIA CAMPHORÆ *Quercetani.*

Videatur Spiritus Vini Camporatus.

ESSENTIA CARMINATIVA *Trilleri.*

℞. Herbarum Millefolii,  
Menthæ,  
Melissæ,  
Rorismarini,  
Salviæ,  
Florum Chamomillæ vulgaris,  
Romanæ ana unciam semis:

Flavedinis Corticum Aurantiorum uncias tres,

Cardamomi excorticati ana uncias duas,

Seminum Fœniculi unciam unam,

Carvi,  
Cumini ana unciam semis:

In-



Incisa & contusa infundantur cum

Spiritus Vini unciis quadraginta octo:  
Filtrentur.

*Dicit Auctor, hanc Essentiam suavissimam ac jucundissimam eximia virtutis esse in omnibus morbis Ventriculi & Intestinorum a causa præsertim frigida ac Flatibus exitum frustra molientibus obortis. Dosis antecedentium.*

### ESSENTIA CARMINATIVA Wedelii.

℞. Radicum Zedoariæ uncias quatuor,  
Carlinæ,  
Calami Aromatici,  
Galangæ ana uncias duas,  
Florum Chamomillæ Romanæ,  
Seminum Anisi,  
Carvi ana unciam unam,  
Caryophyllorum Aromaticorum,  
Baccarum Lauri ana drachmas sex,  
Macis unciam semis,  
Corticum Aurantiorum drachmas duas:

Incisa & contusa infundantur cum  
Spiritus Corticum Citri unciis sex &  
quingenta,  
Nitri unciis tribus:

Filtrentur.

*Multum olim inter Germanos celebratum Medicamentum, eo quod Humores valide commovet, nostra ætate obsolescere cæpit. Dosis ad guttas viginti.*

### ESSENTIA CASTOREI CARMINATIVA Helvetica.

℞. Castorei optimi uncias duas,  
Crocii Austriaci unciam unam:  
Minutim incisa infundantur per viginti quatuor horas cum  
Liquoris Anodynæ Mineralis unciis duodecim:

Expressa filtrentur.

*Exhibetur in Vomitu, Colica & Affectibus Hystericis ad guttas triginta.*

### ESSENTIA CATHOLICA PURGANS Rothii potius Hamburgensis.

Videatur Elixir Anthelminticum Saccorum.

### ESSENTIA CHINÆ sive TINCTURA ALEXIPHARMACA CORTICIS PERUVIANI Huxhami.

℞. Corticis Peruviani uncias duas,  
Flavedinis Corticum Aurantiorum fcsquiunciam,  
Radiciæ Serpentariæ Virginianæ drachmas tres,  
Crocii optimi scrupulos quatuor,  
Coccionellæ scrupulos duos,  
Spiritus Vini Gallici uncias viginti:  
Incisa infundantur per quatuor dies & dein filtrentur.

*Illustris Auctor in Observat. de Aere & Morbis Epidem. Mens. Jul. 1740 & in Libro de Febris Cap. 8. hoc Medicamentum roborare Fibras atque justam fluidorum constitutionem restituere, neque tamen morbose Humoris exitum per Cutim inhibere annotat, testaturque se eo non in Febris solum intermittentibus, lentis & nervosis, sed in putridis quoque pestilentialibus & petechialibus in eorum præcipue decremento salubriter usum esse. Dosis est ad guttas sexaginta ter aut quater de die.*

### ESSENTIA DULCIS Halensium.

Videatur Tinctura Antimonii Acris.

### ESSENTIA FULIGINIS Glauderii.

℞. Cinerum Clavellatorum depuratorum uncias sex,  
Salis Ammoniaci unciam unam:  
Committantur vitro, affundantur  
Aquæ fontanæ uncia triginta sex:  
Statim probe claudatur vitrum, & aliquoties agitetur, usque dum Salia sint dissoluta, tunc adjiciantur:  
Fuliginis e camino splendentis & pulverisatæ uncia duæ:

Vitro denuo probe clauso digerantur per aliquot dies & filtrentur.

*Quamvis in omnibus, quas huic Essentie adscribit, virtutibus adeo non subscribam Glaudero de Balsamat. Cap. 7. ut potius in morbis calidis eam esse nocituram Cartheusero Pharmacop. p. 341 libens concedam; attamen cum ejus indoles sit eviden-*  
ter



## ESSENTIA.

*ter saponacea, vltres utique Resolventes & Aperientes polliceri, neque sine successu in Quartana, Ictero &c. adhiberi posse liquido videtur.*

### ESSENTIA HYSTERICA *Durietz.*

Rx. Asæ foetidæ drachmas duas,  
Opii,  
Salis Volatilis Cornu Cervi ana drachmam semis,  
Essentiæ Castorei uncias tres,  
Digerantur per aliquot dies & filtrentur.  
*In Paroxysmis Hystericis ad guttas viginti datur.*

### ESSENTIA LIGNORUM *Hamburgensium.*

Rx. Radicum Sarsaparillæ,  
Helenii,  
Chinæ ana unciam unam,  
Rhabarbari unciam dimidiam,  
Lignorum Quajaci,  
Sassafras ana unciam unam,  
Santalirubri drachmas sex,  
Semmitatum Fumariæ unciam unam:  
Incisa infundantur per octiduum cum  
Spiritus Vini unciis viginti quatuor:  
Filtratis addantur  
Spiritus Salis unciæ trës.  
*Medicamenti, quo tanquam Polychresto ad quasunque Humorū corruptiones olim frequentissime utebantur, hanc apponere præscriptionem, quam vulgo receptam Michælianam consultius duxi. Dosis est ad guttas triginta.*

### ESSENTIA STOMACHICA POLYCHRESTA *Gundelsheimeri.*

Rx. Piperis longi,  
Nigri,  
Albi ana drachmas duas,  
Hispanici unciam unam:  
Contusis affundantur  
Liquoris Terræ foliatæ Tartari,  
Spiritus Salis Ammoniaci Vinosi ana unciæ sex:  
Digerantur & filtrentur.  
*Valide omnino Resolvit, in Glutinoso &*

## ESSENTIA.

87

*in Cachexia conducit, sed in Temperie frigida modo locum habet. Datur ad guttas triginta.*

### ESSENTIA STOMACHICA ad METHODUM *Hoffmanni Argentoratensium.*

Rx. Radicum Calami Aromatici,  
Angelicæ,  
Galangæ minoris,  
Zedoariæ ana drachmas tres,  
Herbarum Cardui benedicti,  
Menthæ,  
Millefolii,  
Trifolii fibrini,  
Summitatum Centauri minoris,  
Florum Chamomillæ Romanæ ana drachmas duas,  
Corticum Cascarillæ unciam semis,  
Aurantiorum,  
Citri ana drachmas duas,  
Costi veri scrupulos quatuor,  
Macis,  
Nucis Moschatæ,  
Seminum Anisi,  
Fœniculi ana drachmam unam,  
Salis Tartari drachmas sex:  
Incisa, contusa infundantur cum  
Vini Malvatici unciis quatuor & viginti:  
Filtrentur.  
*Hæc Essentia minus, quam quæ Spiritum Vini recipiunt, calida ad roborandum Ventriculum frequentius usurpatur. Datur ejus Cochlear parvum pro dosi.*

### ESSENTIA SUCCINI *Hoffmanni.*

Rx. Succini subtilissime triti,  
Salis Tartari ana uncias duodecim:  
Infundantur per aliquot dies cum  
Spiritus Vini rectificatissimi unciis viginti quatuor:  
Abstrahatur deinde Spiritus & affundatur  
Succini subtilissime triti unciis octo cum  
Olei Tartari per Deliquium quantitate sufficiente; in pastam tritis & exsiccatis

Per



Per octiduum calore Balnei digesta filtrentur.

*Nervina & Anticatatarrhalis esse censetur.  
Dosis est ad guttas viginti.*

### ESSENTIA TRAUMATICA Wadellii.

℞. Radicis Tormentillæ unciam semis,  
Florum Rosarum rubrarum  
Hyperici ana drachmas duas,  
Ligni Santali rubri,  
Mumiæ,  
Sanguinis Draconis ana unciam unam,  
Terræ Japonicæ,  
Myrræ rubræ ana unciam semis,  
Nucis drachmam unam:

Incisa infundantur cum

Spiritus Vini Tartarificati uncis viginti:  
Filtrentur.

*Laudatur ad sistendas Hæmorrhagias; quo merito? Medicis intelligentibus facile patebit. Funestos inde effectus vidit & affert Trillerus.*

### EXTRACTA.

*Canones.*

I. In partibus ne Resinosi an Gummosi hæreat virtus, quam de substantia Extrahenda desiderant, Medicorum est nosse, & pro hac ratione Menstruum determinare.

II. Aqua quidem Resinas dissolvere nequit, sed partes Resinosæ Gummosi ut plurimum adeo arcte immixtæ esse solent, atque implicite, ut cum his ipsam aquam subeant.

III. Extractum Gummosum a Resina liberum qui habere cupiunt aquam quæ Extractionem peregit, per aliquod tempus coquant, frigidam ipsi adjiciant, & aliquantisper in quiete relinquunt, ita maxima saltem Resinæ portio ad fundum secedit, unde dein decantatur liquor partibus Gummosis factus.

IV. Liquor, qui Extractionem peregit, citra ebullitionem ad consilientiam Syrupi tenuioris est perducendus, dein super discos effundendus, & justo calore evaporandus.

### EXTRACTUM.

V. Vulgaris Extracta mollia parandi ratio ea est, qua ipsis semper Emphyreuma affricatur.

VI. Vinum parandis Extractis, quibus quippe varia suorum principiorum nunquam non immiscet, minus idoneum est.

VII. In Vasis metallicis Extracta, quippe acido nunquam non imprægnata pessime asservantur.

VIII. Plurima Extracta cum humiditatem ex aëre attrahant, in vasis probe clausis condenda sunt.

IX. Omnes Succi inspissati substantiæ unde parantur, vires proprias habent, sed & hic probe cavendum ne adurantur.

X. Succu inspissati Cicutæ, Aconiti, Chelidonii Majoris, Cochleariæ, Hyoscyami, Nicotianæ, Stramonii, Belladonnæ & Taraxaci sub nomine Extractorum prostant.

### EXTRACTUM CATHOLICUM

*Paracelsi sive Rudii.*

℞. Radicum Hellebori nigri,  
Agarici optimi,  
Scammonei ana unciam unam,  
Pulpæ Colocynthis unciam unam  
semis,

Aloës optimæ uncias duas,  
Spiritus Vini uncias triginta:

Infundantur per aliquot dies, deinde exprimantur & colentur, Abstrahatur postea Spiritus Vini.

*Refert VVepfer Observat. Medic. Præst. Obs. 46. Eustachium Rudium Medicum Italum hoc Extractum enixe commendasse & pro suo venditasse. Omnia Medicamenta Venterum Catholica cum Viscera Abdominalia admodum conturbent, rarissime hodie usurpantur.*

*Dosis est ad grana decem.*

### EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI

*Bacheri.*

Radices Hellebori nigri tenuissime comminute vasi cerreo virgato committuntur, irrorate Spiritu Vini alcalizzato per duodecim horas relinquuntur, quo temporis intervallo aliquoties agitata iterum



## EXTRACTUM.

rum irrorantur, Vino deinde Rhenano bonæ notæ ad eminentiam sex digitorum illis affuso digeruntur per biduum & cum Radices Vinum imbiberint, novum adjicitur, ita ut semper ea, quæ dicta est, Menstrui ratio obtineat; crebro quoque spatulæ lignæ ope Radices cum Vino commiscentur; tum coquantur per dimidiam horam valideque exprimuntur; residuis Radicibus tantundem Vini affunditur, & reliqua omnia, ut antea facta sunt, eadem methodo iterantur. Jam ambobus liquoribus expressis & colatis ferventis Aquæ duplum adjicitur, evaporatioque instituitur usque ad consistentiam Syrupi; addita postmodum Spiritus Vini nona parte evaporatio continuatur, usque dum Terebinthinæ consistentia surrexerit.

*Hoc Extractum Pilularum Tonicarum infra describendarum basin constituit, utrum vero illud, quod vulgari ratione paratur, reapse superet nec ne, experientia iudice sed caute & prudenter instituta decernendum est. Preparatio ipsa varia videtur habere superflua, sed circa Medicamenti novi & tan-  
topere laudati dosin quidquam mutare nolui.*

**EXTRACTUM LIQUIRITIÆ GUM-  
MOSUM** Argentorat. **GELATINA LI-  
QUIRITIÆ, SACCHARUM GLY-  
CYRRHIZATUM** Helvetorum, **RE-  
GLISSE ROYALE, LIQUIRITIALU-  
CIDA** Danorum, **GLUTEN PECTO-  
RALE.**

℞. Radicis Liquiritiæ rasæ & contusæ  
unciam unam:

Infundantur per viginti quatuor horas  
in aquæ calidæ unciis centum & viginti:  
In colatura dissolvantur

Gummi Arabici albißimi uncia sex-  
xaginta.

Sacchari Canariensis uncia quadra-  
ginta:

Dissoluta colentur & brevi coctione in  
consistentiam Gelatinæ reducantur; tunc  
effundatur liquor in exiguæ altitudinis  
modulos metallicos pauxillo Olei Amyg-  
dalarum illitos, lenique fornacis calore  
exsiccentur.

Tom. II.

## EXTRACTUM.

89

*Suave æque ac efficax remedium ad si-  
stendam Tussim ab Irritatione ortam. Ejus  
frustum, Drachmam circiter æquans, ore li-  
quatur.*

## EXTRACTUM MAROCOSTINUM

*Minderi.*

℞. Aloës Succotrinæ uncias duodecim:  
Dissolvantur

Succorum Absynthii,

Apii,

Fœniculi ana unciis tribus,

Cichorei,

Fumariæ,

Pimpinellæ ana unciis octo,

Rosarum,

Citri ana unciis viginti:

Solutio clara decantatur & ad consisten-  
tiam Mellis evaporetur, tunc addantur:

Extractorum Rhabarbari drachmæ sex,

Croci drachma semis,

Gummi Ammoniacy pulverisati un-  
cia una semis,

Aceti Scillitici uncia quatuor:

Evaporent ad consistentiam Extracti,  
cui exacte immisceantur

Pulverum Mari veri uncia semis,

Costi veri drachmæ sex.

*Vulgo tanquam basis Pilularum præscribi-  
tur. Ejus Dosis ad grana viginti & ultra  
determinatur.*

## EXTRACTUM OPII.

Opium dissolvitur aqua, colatur & leni  
calore ad consistentiam  
Extracti evaporatur.

## EXTRACTUM OPII CYDONIATUM

*Langelotti.*

℞. Opii optimi uncias duodecim:  
Solvantur

Succi Cydoniorum,

Aquæ fontanæ ana unciis sexaginta:

Stent in loco temperato per aliquot dies,  
tunc colentur:

Colaturæ addantur

Sacchari albi uncia quatuor:

Omnis massa relinquatur Fermentatio-

M

ni;



ni; quæ per plures menses durare solet, quo temporis intervallo baculo ligneo sæpius est agitanda, donec omnis motus intestinus cessaverit; trajiciatur postea liquor per pannum & evaporetur ad consistentiam Extracti.

*Opium Fermentatione vi nocendi privari, medendi contra augeri putarunt varii Auctores, atque hoc Extractum reliquis omnibus Opium adhibendi rationibus anteposuerunt; sed in ipso hoc Extracto vim Opii esse imminutam, neque maximo labore quicquam eo obtineri, præterquam quod grandior ejus dosis sit exhibenda, siquidem medicatas inde cupiamus experiri vires, evicit Illustris Tralles Usus Opii Sect. I. Cap. VII. §. 14.*

### EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM *Augustanorum.*

Rx. Scammonei unciam unam,  
Seminis Ebuli drachmas sex,  
Colocynthidis drachmas decem,  
Agarici drachmas septem,  
Turpethi albi drachmas quinque,  
Spiritus Vini uncias triginta:  
Digerantur per aliquot dies; addatur deinceps Infusum ex  
Rhabbarbari drachmis sex,  
Hermodactylorum drachmis quinque,  
Hellebori nigri uncia semis,  
Foliorum Sennæ unciis duabus,  
Aloës Succotrinæ unciis tribus, cum  
Aquæ fontanæ unciis viginti quatuor  
maceratis & expressis:  
Abstrahatur Spiritus Vini, residuum ad  
consistentiam Extracti evaporetur.

*Inconcinnam compositionem Medicamenti valde irritantis ideo apposui, quia haud pauci Medicorum illud adhuc in Pilulas recipe-re solent. Dosis ad grana quindecim.*

### EXTRACTUM Rudi.

Videatur Extractum Catholicum.

### EXTRACTUM SATURNI Goulard.

Rx. Minii uncias quinque,  
Aceti uncias nonaginta:

Coquantur sub perpetua agitatione per horam in vase terreo:

Liquor ad Mellis consistentiam redactus, decantatus asservetur.

*Hoc Extractum omnium egregii Chirurgi remedium, suis locis descriptorum basin constituit.*

Lithargyrio vix non semper Ære inquinato, Minium substituo, nec majorem Aceti rationem recipio, quam quæ ab Aceto potest dissolvi.

### FARINÆ EMOLLIENTES Plenck.

Rx. Farinarum Seminum Lini,  
Fœnugræci ana  
partes æquales.

*Epithematis vel Cataplasmatibus forma applicantur.*

### FARINÆ RESOLVENTES Plenck.

Rx. Farinarum Fabarum,  
Hordei,  
Tritici,  
Secalis ana partes æquales.  
*Applicantur ut antecedentes.*

### FEBRIFUGUM Cranii.

Videatur Regulus Antimonii Medicinalis.

### FECULA Libavii.

Radix recens contunditur cum modica Aquæ portione, prelo inde exprimitur Succus, id quod ex isto ad fundum residet colligitur & probe Aqua ablutum edulcoratur.

Hac ratione cum sive pars amylacea Radicis obtineatur, quæ undecunque colligatur semper eadem est; sive si ista carent Radices nonnisi partes terrestres Feculam efformant, hinc Feculæ eviuerunt.

### FLORES ANTIMONII Basil. Valentini.

Rx. Reguli Antimonii uncias octo,  
Salis Ammoniaci uncias sedecim:  
Tri-



Trita sublimentur ex Retorta excipulo instructa; colligantur Flores.

*Validissimum hoc Drastrictum hodie usu suo fere plane destitutum videmus.*

### FLORES BENZOES Schræder.

Benzoës optime pulverisata committatur Cucurbitæ, cujus collum ampliori orificio gaudet; immittatur Balneo arenæ; lenis subministretur calor; orificio cucurbitæ imponatur cucullus chartaceus, cui Flores accrescant; refertus Floribus removeatur, Flores inde decutiantur; imponatur denuo cucullus & hæc repetantur, usque dum Flores appareant tincti, tunc enim ab ulteriore labore est desistendum,

*Hi Flores ob virtutem Incidentem ad affectus Pulmonum commendari solent. Dantur ad grana octo.*

### FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES Isaaci Hollandi.

#### SAL AMMONIACUM MARTIALE Suecorum.

℞. Salis Ammoniaci uncias sedecim:

Limaturæ Martis unciam unam semis:

Probe mixta committantur Retortæ, & hæc Balneo arenæ; subministretur ignis, & Flores eo magis colorati surgent, quo sunt inferiores; refrigerato vase omnes desumantur, cum residuo terantur, & denuo sublimentur. Liquor penetrantissimus, qui sub hoc labore obtineatur, seorsim asservandus est. Residuum per deliquium liquatum OLEI seu LIXIVII MARTIS Londinensium nomine vulgo venit.

*Hi Flores cum sint ipse Sal Ammoniacus aliqua Ferri portione imbutus, vires Aperientes omnino possident, & in Obstructionibus Viscerum Abdominalium morbisque inde oriundis cum successu exhibentur. Hinc maxime iis, qui Febri laborant, commendantur; nec audiendi sunt, qui præeunte Mauritio Hoffmanno Prol. 43. §. 9. aliquid Narcotici iis inesse suspicantur. Dosis est ad drachmam semis. Spiritus vinosus, qui sub*

*hoc labore obtinetur, respectu virtutis medicatæ cum Spiritus Salis Ammoniaci Calce viva parati convenit. Oleo Martis vix utuntur Medentes, cum medicamentum sit rodens.*

### FLORES SULPHURIS Geber.

Obtinentur pulverem Sulphuris in cucurbita Alembico testâ, Balneoque arenæ commissa sub calore urgendo, ita moderato ne Sulphur fluat.

Hic autem labor cum sit admodum tædiosus, Floresque id genus in propriis hominum huic negotio destinatorum officinis magna copia parentur, Pharmacopæi inde sibi eos comparare ut plurimum consultius ducunt.

*Vires in Materia Medica recensentur.*

### FLORES VIRIDIS ÆRIS.

Viride Æris digeratur Aceto, Acetum probe tinctum filtretur, leni evaporetur ad cuticulam, & crystallisationi relinquatur.

*Pictoribus potius quam Medicis hæc Crystalli, improprie sane Flores dictæ, inseruiunt.*

### FLORES ZINCI Glauberi.

Zincum committatur Crucibulo, fundatur, fusum stylo agitetur, flamma viridi ardebit, & sub forma Florum tam parietibus Crucibuli, quam operculo sive metallico sive lapideo, Crucibulo imposito, accrescet. Hi Flores collecti asservantur.

Glauber in Philosoph. Ofen. P. I. C. 38. hos Flores describit eorumque extus adhibitorum vires Exsiccantes in Ophthalmia quoque efficaces laudat, Ophthalmicas Barbette Prax. Cap. 4. & Decker in Notis, iterata sæpius experientia nixi commendant. Quin etiam intus assumptos ad grana duodecim Sudorem, interdum quoque Vomitum & Alvum movere Glauber aliique post eum asseverant, nescio, qua experientia ratione ducti. Illustris Gaub in Advers. Hart in Dissert. de Zinco; Duncan in Medical.



*Comment. by a Society in Edinburg. passim exempla proferunt Epilepsie aliquot granis pro Dosi datis felicissime fugatæ.*

FOMENTATIO FRIGIDA *Schnucker.*

*Rx.* Aquæ fontanæ uncias centum & viginti,  
Aceti optimi uncias duodecim,  
Nitri depurati unciam semis,  
Salis Ammoniaci uncias duas:  
Misceantur.

*Clarissimus. Auctor hoc Fomento frigide applicato cum summa efficacia usus est ad Vulnere Capitis cum Cerebri commotione Humorumque effusione juncta. Gl. Plenck illud ad Hernias quoque incarceratas laudat.*

FOMENTUM ANODYNUM *Richard.*

*Rx.* Foliorum Althææ manipulos quatuor,  
Papaveris hortenſi manipulum unum,  
Hyoscyami pugillos duos:  
Incisa coquantur cum  
Aquæ fontanæ unciis quadraginta octo, ad uncias quadraginta residuas:

FOMENTUM ad ERYSIPELAS *Richard.*

*Rx.* Florum Sambuci manipulum unum:  
Infundantur cum  
Aquæ fontanæ unciis sedecim per noctem:  
Colatura dissolvantur  
Spiritus Vini Camphorati uncia una,  
Sacchari Saturni drachma una.  
*Ante applicationem probe concutiendum est.*

FOTUS ad GANGRÆNAM *Richard.*

*Rx.* Corticis Chinæ grossæ contusi unciam unam:  
Coquatur ex  
Aquæ fontanæ unciis quadraginta octo,  
Ad uncias triginta duas residuas:  
Addantur  
Florum Chamomillæ Romanæ,  
Tanacetii ana uncia semis:  
Post aliquot ebullitiones coletur liquor;

Addantur

Spiritus Vini Camphorati uncia duæ,  
Salis uncia una:

Misceantur.

GARGARISMA ACETOSUM *Plenckii.*

*Rx.* Aquæ fontanæ uncias duodecim,  
Aceti Rosarum uncias duas,  
Mellis Rosacei uncias unam:  
Misceantur.

*In Anginæ Inflammatoriæ adhibetur.*

## GARGARISMA ADSTRINGENS

*Richard.*

*Rx.* Corticum Granatorum unciam unam,  
Florum Balauſtiorum unciam semis:  
Incisa coquantur per dimidiam horam in  
Aquæ fontanæ quantitate sufficiente  
ad residuum unciarum sedecim:  
Colatura dissolvantur  
Aluminis drachma semis:  
Syrupi de Rosis ficcis uncia una.  
*Cruentationibus Oris opponitur.*

## GARGARISMA ANTISCORBUTICUM

*Richard.*

*Rx.* Decocti Antiscorbutici uncias sedecim,  
Spiritus Cochleariæ unciam unam,  
Salis drachmas duas:  
Oxymellis Simplicis uncias duas:  
Misceantur.

GARGARISMA DETERGENS *Richard.*

*Rx.* Hordei integri unciam unam:  
Coquatur in  
Aquæ fontanæ unciis duabus & triginta  
ad residuum unciarum sedecim:  
Addantur  
Foliorum Agrimonie,  
Rubi ana pugilli duo:  
Post aliquot ebullitiones colentur & in  
colatura dissolvantur  
Mellis Rosati uncia una,  
Nitri depurati drachma una.  
*Adhibetur Ulceribus Faucium apertis.*



GARGARISMA EMOLLIENS *Richard.*

℞. Radicis Althææ unciam unam,  
 Caricarum unciam semis:  
 Incisa coquantur ex  
 Aquæ fontanæ unciis viginti quatuor  
 ad residuum unciarum sedecim:  
 Colatura dissolvatur  
 Oxy mellis simplicis uncia una.  
*Ad Oris & Faucium Abscessus adhibetur.*

GARGARISMA MERCURIALE *Plenck.*

℞. Mercurii vivi drachmam dimidiam,  
 Gummi Arabici drachmas tres,  
 Syrupi Diacodii unciam semis,  
 Mercurii dulcis grana sex:  
 Probe terendo subactis addantur  
 Herbae Flammulæ Iovis uncia semis,  
 cum Aquæ unciis viginti sex  
 paululum decoctæ,  
 Mellis Rosacei uncia una,  
 Essentiæ Myrrhæ drachma una.  
*Ulcera Faucium Venerea sanat in Ozena  
 Venerea saluberrime Naribus injicitur.*

GARGARISMA ad PITUITAM *Kleinii.*

℞. Aquarum Radicis Angelicæ,  
 Hyssopi ana uncias sex,  
 Spirituum Cochleariæ unciam semis,  
 Salis Ammoniaci scrupulos quatuor,  
 Pulveris Seminis Sinapeos drachmam  
 unam,  
 Mellis Rosacei uncias quatuor:  
 Misceantur.

GARGARISMA cum SPIRITU SALIS  
AMMONIACI *Plenckii.*

℞. Radicum Althææ,  
 Caricarum ana drachmas sex:  
 Incisa coquantur cum  
 Lactis Vaccini unciis sedecim ad un-  
 cias duodecim residuas:  
 Colaturæ addatur  
 Spiritus Salis Ammoniaci uncia semis.  
*Anginas Inflammatorias, quos Gargarisma  
 Acetosum non Resolvit, huic cedere Illustris  
 Pringle observavit.*

## GELATINÆ.

## Canones.

I. Quando partes animales aqua co-  
 quantur, Decoctum proprie Juris nomi-  
 ne venit.

II. Ab hoc vero jure si jam maxima  
 pars aquæ ad decoctionem adhibitæ erit  
 evaporata, tunc partes ex animali ex-  
 tractæ, cessante calore, in consistentiam  
 spissam & tremulam digitis non adhæ-  
 rentem cocunt, & GELATINÆ nomen  
 acquirunt.

III. Hæc rursus Gelatina si sub con-  
 tinua agitatione penitus erit exsiccata  
 GLUTEN sive GELATINA SICCA di-  
 citur.

IV. Gelatinæ animales cum ætatem  
 non ferant, usus demum tempore pa-  
 rari debent.

V. Nostra ætate plura Rob. genera,  
 quæ consistentiam tremulam & pellucen-  
 tem induunt, GELATINÆ, GELATA.  
 GELATINE, GELE'ES appellantur.

GELATINA ANALEPTICA *Helvetorum.*

℞. Rasuræ Cornu Cervi uncias quatuor,  
 Eboris uncias duas,  
 Femorum Gallinæ annosæ contusorum  
 numero tria,  
 Carnis Bovinæ, ex Femore desumptæ,  
 uncias viginti quatuor,  
 Aquæ fontanæ uncias centum & vi-  
 ginti:

Coquantur lento igne ad residuum un-  
 ciarum triginta:

Tunc adjiciantur

Cinnamomi acuti drachma una,  
 Caryophyllorum Aromaticorum scrup-  
 ulus unus,  
 Pomi Citri dimidium:

Coquantur adhuc per quadrantem horæ,  
 tentetur liquor, num refrigeratus in Ge-  
 latinam concreascit:

Tunc addantur

Sacchari albi uncias quatuor:  
 Clarificentur Albumine Ovi.

*Hæc Gelatina ad Cochlear unum datur  
 Tabidis & a morbis revalescentibus.*



## GELATINA CORNU CERVI AMYGDALATA Klein.

℞. Rasuræ Cornu Cervi uncias octo,  
 Aquæ fontanæ uncias centum:  
 Coquantur lento igne usque dum ex par-  
 va decocti portione refrigerata consisten-  
 tiam Gelatinæ surrexisse appareat, tum  
 coletur liquor, & cum eodem fervido  
 Emulgeantur secundum artem

Amygdalarum dulcium excorticata-  
 rum unciae quatuor:

Emulsioni colatæ addantur

Pulveris Sacchari albißimi unciae sex:  
 Refrigerata trahatur in usum.

*Demulcendi, Refrigerandi, Nutriendi gra-  
 tia ejus Cochlear unum in uncis quatuor  
 Juris Carnium diluitur. Eadem Flavedinis  
 Citri recentis & Aquæ Florum Naphæ mo-  
 dica portione addita, gratum edulii genus para-  
 tur, quod Blanc Manger appellare solent.*

GELATINA CORNU CERVI  
CITRATA Klein.

℞. Rasuræ Cornu Cervi uncias sex,  
 Aquæ fontanæ uncias septuaginta duas:  
 Decoquantur ad residuum unciarum qua-  
 draginta octo:  
 Tunc addantur

Vini albi generosi unciae quatuor,  
 Coquantur ad consistentiam Gelatinæ,  
 cui ope Albuminis Ovi clarificatæ adji-  
 ciantur

Succi Citri uncia una:

Syrupi Citri ex toto unciae duæ,

*Tabidis nec non Acrimonia laborantibus  
 cum successu præscribitur.*

## GELATINÆ FRUCTUUM.

℞. Succi ex fructu aqua suffuso expressi  
 & per Manicam colati,  
 Sachari albißimi ad consistentiam Ta-  
 bulandi cocti ana uncias sedecim:  
 Coquantur leni igne ad consistentiam  
 Gelatinæ, fervens adhuc trajiciatur per  
 pannum laneum; reponatur in ollis le-  
 viter tectis, elapsis demum aliquot die-  
 bus curatius obturandis.

## GELATUM.

Videatur Rob.

GILLA Theophrasti.

Est Vitriolum album solutione & filtra-  
 tione depuratum.

*A Medicamento Æneis & Plumbeis  
 principiis instructo, & cujus infida prorsus  
 operatio est prudenti sane consilio Medici ab-  
 stinent.*

## GLOBULI CARMINATIVI Utechtii.

℞. Saponis Veneti uncias quatuor,  
 Fellis Tauri unciam unam semis,  
 Nitri crudi unciam semis,  
 Sacchari Thomæi uncias duas:  
 Misceantur & formentur in Globulos di-  
 versæ magnitudinis.

## GLOBUS ad ERYSIPELAS Plenckii.

℞. Terræ sigillatæ albæ uncias duas,  
 Cerussæ,  
 Cretæ ana unciam unam,  
 Pulverisata  
 Spiritus Vini Camphorati quantum  
 fatis  
 Formentur in Globum.  
*Chartæ cerulea hoc Globo illita, imponi-  
 tur Erysipelati.*

GLOBULI MARTIALES Willisi.  
TARTARUS MARTIALIS Suecorum.

℞. Limaturæ Martis subtilissime tritæ  
 uncias sex,  
 Tartari albi pulverisati uncias duo-  
 decim:  
 Coquantur cum  
 Aquæ uncis octoginta ad siccitatem:  
 Hic Pulvis cum  
 Spiritus Vini idonea quantitate for-  
 metur in globos, qui ovi Co-  
 lumbini fere figuram & magni-  
 tudinem habeant.

*Suspenduntur ex Spiritu Vini vel Aqua  
 usque dum horum Menstruorum color sit probe  
 sa-*



*faturatus, tunc splendorum ope Vulneribus applicantur, vel intus quoque, ubi indicatio usum Martialium suadet, exhibentur.*

## GLOBULI MOSCHATI.

℞. Sacchari albi uncias duodecim,  
Amyli albi unciam semis,  
Radicum Ireos Florentinæ drachmas  
duas:

Pulverisata redigantur cum  
Mucilaginis Tragacanthæ quantitate  
sufficiente

In globos. variæ magnitudinis.

*Tanquam Suppositoria exhibentur. Ceterum Medicamento, Ano destinato odoramenta adjicere, absurdum mihi videbatur, ideoque Moschum & Zibethum omisi.*

## GLUTEN PECTORALE.

Videatur Extractum Liquiritiæ Gummosum.

## GUTTÆ ANGLICÆ CEPHALICÆ.

℞. Spiritus Serici uncias quatuor,  
Olei destillati Lavendulæ drachmam  
unam,

Spiritus Vini unciam unam:

Per aliquot dies digesta Destillantur usque dum guttæ Olei appareant.

*Quod Carolus Secundus Rex Angliæ a quodam Chemico emit Medicamentum, Lister Tournefortio communicavit. Oleum Spiritui Serici adjiciendum proprie Cinnamomi non Lavendulæ est. Laudatur contra Affectus soporosos & Deliquia animi, tam intus ad guttas quadraginta dandum, quam Naribus admovendum.*

## GUTTÆ Generalis de la Motte.

℞. Auri fulminantis drachmam unam:  
Dissolvatur

Spiritus Nitri unciis duabus:

Addantur

Spiritus Vini rectificatissimi uncia duæ  
& triginta:

*Cordiales & Cephalicæ huic Medicamento ascribuntur Vires.*

## GUTTÆ Generalis de la Motte ALBÆ.

Sunt Spiritus Nitri Dulcis.

HEPAR ANTIMONII *Basil. Valentini.*  
CROCUS ANTIMONII *Londinensium.*

℞. Antimonii crudi uncias decem,  
Salis Tartari uncias triginta:  
Mixta fundantur in Crucibulo.

*Huic Medicamento, cum debeat esse Antimonium per Alkali reclusum, Antimonium calcinatum & per se fusum, aut Beaumé Chymie. II. pag. 323. placet, pessime substitui, patet. Medici eo tanquam insigni drastico, nisi ad parandum Crocum Metallorum, non utuntur. Mulomedicis in usu est.*

## HYDROMEL pro POTU Richard.

℞. Ptisanæ communis uncias quadraginta octo,

Mellis optimi uncias tres:

Misceantur.

*In affectibus Pectoris ad potum ordinarium præscribitur.*

## INFUSUM AMARUM Richard.

℞. Herbarum Cardui benedicti,  
Chamædryos,  
Chamæpityos ana unciam  
semis,

Florum Centaurii minoris,  
Hyperici,

Lupuli ana drachmas duas

Incisa infundantur per horam in  
Aquæ bullientis unciis quinquaginta  
sex:

Colatura trahatur in usum.

*Roborandis Primis viis uncia sex adhibentur pro Dosi.*

Si adjeceris Spiritus Vitrioli drachmas quinque, habebis *Acidulatum.*

## INFUSUM ANGELICUM.

Videatur Aqua laxativa Angelica.

## INFUSUM LAXATIVUM.

Videatur Aqua laxativa *Viennensium.*

IN-



INFUSUM *Malti Macbride.*

Rx. Malti crasso modo comminuti uncias  
duodecim:

Infundantur per sex horas cum  
Aquæ ebullientis unciis sex & triginta:  
Colentur.

*Scorbuticis & morbis Putridis laborantibus  
datur ad uncias quadraginta octo de die.*

INFUSUM vel AQUA PICIS *Berckley.*

Rx. Picis liquidæ uncias duodecim,  
Aquæ communis uncias quadragin-  
ta octo:

Crebro agitentur bacillo ligneo; Aqua  
decantata trahatur in usum.

*Conferantur ad Picem dicta P. I.*

INJECTIO AURICULARIS  
DETERGENS *Plenckii.*

Rx. Herbarum Rutæ manipulum unum,  
Aquæ fontanæ uncias sex:

Infundantur per noctem, colaturæ ad-  
dantur

Essentiæ Myrrhæ drachma semis,  
Mellis Rosacei drachmæ sex:

Misceantur.

*In Ulceribus Meatus Auditorii Saniem  
fundentibus hujus Liquoris tepidi bis quoti-  
die, quantum cavum Auriculare capere po-  
test, injicitur & per aliquot minuta custoditur.*

INJECTIO BALSAMICA *Plenckii.*

Rx. Balsami Copaivæ unciam dimidiam:  
Solvatur Vitello ovorum.

Solutioni addantur:

Aquæ Calcis uncia sex,  
Mellis Rosacei uncia tres:

Misceantur probe.

*Ad claudenda Ulcera sinuosa injicitur.*

INJECTIO DETERGENS *Plenckii.*

Rx. Aquæ Calcis uncias duodecim,  
Unguenti Ægyptiaci unciam unam:  
Misceantur.

*Ulceribus fistulosis detergendis injicitur.*

INJECTIO MERCURIALIS *Plenckii.*

Rx. Mercurii vivi drachmam unam,  
Gummi Arabici drachmas tres,  
Syrupi Diacodii unciam semis:

Probe tritis addantur

Aquæ fontanæ uncia duodecim,  
Rutæ uncia duæ:

Misceantur.

*Adhibetur contra Gonorrhæam & Fluo-  
rem album habituales.*

JULEPUS ACIDULATUS *Richard.*

Rx. Ptisanæ communis uncias quatuor &  
viginti,

Spiritus Nitri dulcis scrupulum unum,  
Syrupi Limonum uncias duas:

Misceantur.

*In omni genere Februm cum fructu exhi-  
betur.*

JULEPUS ROSARUM *Mesue* JULA-  
PIUM REGIUM SYRUPUS REGIUS  
vel ALEXANDRINUS.

Rx. Sacchari albissimi uncias triginta:  
Dissolvantur

Aquæ Rosarum unciis viginti:

Colatura fervetur.

*Edulcorandis variis Potionum generibus  
adhibetur.*

JULEPUS VIOLARUM *Mesue.*

Paratur ut antecedens, substituendo  
Aquæ Rosarum, Aquam Violarum.

*Exsolvit.*

KERMES MINERALE *Liger* PULVIS  
CARTHUSIANORUM, SULPHUR  
ANTIMONII TARTARISATUM *Au-  
striacorum.*

Rx. Antimonii crasse contusi uncias tri-  
ginta duas,

Nitri fixi uncias octo,

Aquæ quantum satis.

Bulliant per quatuor horas, fervidus li-  
quor filtretur; ex refrigerato qui secef-  
serit Pulvis probe edulcoretur.

Si-



## LAPIS.

Si liquor defusus residuo Antimonio denuo affunditur, & ratione indicata tractantur, denuo Kermes obtinetur; idem labor vel creberrime repetitus nunquam non hoc Medicamentum largietur.

*Ex Experimentis Geoffroy patet in una Kermes drachma contineri ad septendecim grana Reguli, quatuordecim grana Alkali, unum & quadraginta grana Sulphuris. Ad dimidium unum, usque adhibetur; pertinet maxime ad spissitudinem Mucosam & Phlogisticam Resolventia Medicamenta. Majori dosi datum Vomitus, Nauseas, Secessus abvi efficit.*

## LAC SULPHURIS *Austanorum.* SULPHUR PRÆCIPITATUM *Suecorum.*

℞. Cinerum Calcis vivæ uncias duodecim,  
Calcis vivæ uncias viginti duas,  
Aquæ fontanæ uncias ducentas:  
Calce dilapsa coquantur paululum, colentur per pannum linteum; massa in panno remanens adhuc bis cum nova aqua coquatur, & coletur; omnes liquores colati evaporatione reducantur ad uncias triginta; his in fervente lebetè bullientibus sensim adjiciantur

Florum Sulphuris uncia decem:  
Bulliant per dimidiam horam; solutio evaporata & aliquot libris Aquæ diluta præcipietur

Spiritus Vitrioli quantum satis,  
Pulvis præcipitatus edulcoretur.

*Hoc Præparatum, cum sit Sulphur ad ultimam tenuitatem redactum ad usum internum Floribus Sulphuris videtur esse præferendum.*

## LAC VIRGINIS.

Aquæ instillentur aliquot guttæ Tincturæ Benzoës.

## LAPIS CAUSTICUS, CAUTERIUM POTENTIALE *Juncken.*

℞. Calcis vivæ uncias duodecim,  
Salis Tartari uncias quatuor,  
Coquantur cum  
Aquæ uncia centum ad residuum unciarum quinquaginta;  
Colatura evaporetur ad siccitatem us-  
Tom. II.

## LAPIS.

97

que, liquetur calore & effundatur in modulum lapideum.

*Olim ad inurendos Fonticulos usurpabatur, hodie raro in usum trahitur.*

## LAPIS DIVINUS vel OPTHALMICUS *St. Yves.*

℞. Aluminis crudī,  
Vitrioli cœrulei,  
Nitri ana uncias quatuor:  
Contusa liquentur, liquatis addatur  
Camphoræ tritæ drachma semis:  
Mox effundatur super tabulam lapideam, & dum adhuc mollis erit, dissecetur in parva quadrata.

*Adhibetur ad Collyria contra Ophthalmias; ejus drachma una in Aquæ unciis octo dissoluta constituit Collyrium Helvetii.*

## LAPIS INFERNALIS *Angeli Salæ.* CAUSTICUM LUNARE *Londinensium.*

℞. Argenti purissimi unciam unam,  
Aquæ fortis uncias duas:  
Dissolvatur leni calore; in frigore ubi solutio in Cryсталlos concreverit hæc a LUNA denominantur; denuo calore liquetur; omnis solutio in vase vitreo ad siccitatem reducatur; committatur sal exsiccatu Crucibulo, & quam primum fluxerit, effundatur in modulum Oleo prius inunctum.

Ne Argentum quidem cupellatum gaudet ea puritate quam hoc Præparatum requirit, quod omni labe Venerea immune, nigerrimum esse & in Aere siccitatem suam penicillissime fervare debet

*Usurpatur tanquam Causticum polychrestum, ubicunque Carnes absumendæ sunt; Causticum medicamentum nunquam intus exhibendum est.*

## LAPIS MARTIALIS.

Videantur Globuli Martiales.

## LAPIS MEDICAMENTOSUS *Crollii* correctus.

℞. Colcotharīs,  
Aluminis ana uncias duodecim,  
N Ni-



Nitri crudi,  
 Salis communis,  
 Tartari ana uncias tres,  
 Aceti vulgaris uncias centum:  
 Coquantur per dimidiam horam:  
 Tunc addantur  
 Cerussæ Venetæ uncia octo,  
 Boli Armenæ pulverisatæ uncia quatuor:

Sub non intermissa agitatione instituat  
 evaporatio ad siccitatem usque.

*Laudatur ad Ulcera sordida & Fistulas  
 abstergendas & consolidandas, quem in finem  
 duodecuplo aquæ dissolvitur, filtratur & par-  
 ti affectæ tam ope linteorum imponitur, quam  
 per syringam injicitur.*

### LAPIS MEDICAMENTOSUS Geoffroy.

℞. Limaturæ Ferri,  
 Lapis Hæmatitis pulverisati ana un-  
 cias tres,

Cremeris Tartari uncias sex:  
 Redigantur cum  
 Spiritus Vini quantum fatis,  
 in pastam, quæ exsiccata denuo ope  
 Spiritus Vini in consistentiam mollem  
 reducatur, operatioque aliquoties repe-  
 tatur; postrema pasta exsiccata redu-  
 catur in pulverem, eique addantur

Pulverum Mastichis  
 Croci ana uncia dimidia,  
 Aloës,  
 Myrrhæ ana uncia una,

Vini albi uncia quadraginta quatuor:  
 Stent per aliquot dies in digestionem,  
 tunc evaporentur ad siccitatem, & Spi-  
 ritus Vini ope reducantur in globos.

*Efficacior est priore.*

### LAPIDUM PRÆPARATIO Valerii Cordi.

Videatur Crystallus montana præparata.

### LAPIS seu SAL PRUNELLÆ Hartmanni. CRYSTALLUM MINERALE.

℞. Nitri depurati uncias octodecim:  
 In Crucibulo fluentibus per vicem in-  
 geratur  
 Florum Sulphuris uncia semis;

Massa fluens affundatur super lapidem.  
*Adhibetur ad Gargarismata, sed Nitrum  
 depuratum nullo peregrino Acido inquinatum  
 huic profecto præferendum est.*

### LAUDANUM LIQUIDUM Sydenhami. TINCTURA THEBAICA Londinen- sum.

℞. Opii uncias duas,  
 Croci unciam unam,  
 Cinnamomi,  
 Caryophyllorum ana drachmam unā:  
 Incisa infundantur per triduum cum  
 Vini Hispanici unciis duodecim:  
 Filtrentur.

*Qualibet drachma habet scrupulum di-  
 midium Opii. Ob magnam Auctoris famam  
 vel hodie adhuc creberrime usurpatur, licet  
 evictum sit, Opio minus congrue calida adjici.  
 Datur ad guttas quindecim.*

### LAUDANUM OPIATUM.

Variis quæ de eo prostant compositio-  
 nibus, Extractum Opii Aquosum merito  
 præfertur.

### LILIUM Paracelsi.

Videatur Tinctura Metallorum.

### LIMATURA MARTIS ALCOHOL.

Videatur Chalybs præparatus.

### LIQUIRITIA COCTA ALBA *Würtembergensum.* BACULI PECTORALES Schræderi correcti.

℞. Gummi Arabici,  
 Specierum Diaireos,  
 Diatragacanthæ ana un-  
 ciam semis,  
 Radicum Liquiritiæ,  
 Amyli ana unciam unam,  
 Sacchari albi uncias duas & triginta:  
 Omnia in tenuem pulverem trita ex-  
 cipantur  
 Mucilaginis Tragacanthæ sufficiente  
 copia, ut possint formari bacilli:  
*Lin-*



*Lingebantur olim a Tussientibus ; hodie fere obsoleverunt.*

LIQUIRITIA COCTA CITRINA LI-  
QUIRITIA TORNATA Th. Hoffmann.

Rx. Radicis Liquiritiæ unciam unam,  
Ireos Florentinæ,  
Amyli albi ana unciam semis,  
Croci scrupulum unum,  
Sacchari albissimi uncias duodecim:  
Omnia tenerrime pulverisata reducan-  
tur cum

Mucilaginis Tragacanthæ idoneo quan-  
to in Massam; unde formentur Bacilli,  
*Conveniunt virtute sua cum antecedentibus.*

LIMONADA MINERALIS.

Videatur Ptisana acidulata.

LIMONADA SICCA Beaumé.

Est Pulvis refrigerans Suecorum, ad  
quem Sal Acetosellæ loco Salis Essen-  
tialis Tartari recipitur.

LINIMENTUM ALBUM.

Videatur Linimentum Cereum.

LINIMENTUM ALCALINUM Plenckii.

Rx. Lixivii Saponariorum uncias duas,  
Olei Olivarum uncias quatuor,  
Vitellorum Ovorum numero duo:  
Misceantur, usque dum coeant.

*Cl. Auctor asseverat Rhagades manuum  
hoc Linimento fuisse curatas.*

LINIMENTUM ANTIPLEURITICUM  
Richard.

Rx. Saponis Veneti uncias duas,  
Olei Laurini unciam unam:  
Liquefiant leni calore; refrigeratis ad-  
misceantur

Balsami Tranquillantis uncia una,  
Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce  
viva drachmæ duæ.

*Vires ex nomine patent.*

LINIMENTUM CEREUM  
*Edinburgensium.*

LINIMENTUM ALBUM *Londinensium.*

Rx. Olei Olivarum uncias tres,  
Spermatis Ceti drachmas tres,  
Ceræ albæ drachmas duas:  
Leni igne liquefacta perpetuo agitentur,  
donec penitus refrigererint.

*Ad Fissuras Labiorum & Papillarum nec  
non ad Excoriationes usurpatur.*

LINIMENTUM VOLATILE Plenck.

Rx. Olei Amygdalarum dulcium unciam  
unam,  
Spiritus Salis Ammoniaci drachmas  
duas:

Agitentur in Phiala, usque dum coierint.  
*Collo inungitur in Angina, ad ictus quo-  
que Serpentum cum successu applicatur.*

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS  
*Hoffmanni.*

SPIRITUS VINOSUS VITRIOLICUS  
*Rosforum.*

SPIRITUS ÆTHEREUS VITRIOLA-  
TUS *Suecorum.*

Rx. Spiritus Vini rectificatissimi uncias  
triginta duas:

Committantur Cucurbitæ; affundantur  
per vices

Olei Vitrioli unciae sedecim:

Immittatur Cucurbita in Balneum Are-  
næ, imponatur ei Alembicus & jungatur  
vas recipiens; ambo ope Vesicæ coër-  
cenda; subministretur lenis admodum  
ignis, usque dum liquori destillanti alius  
liquor ejusdem cum ipso pelluciditatis  
supernatare videatur, qui inde infundi-  
buli ope separandus est, & sub nomine  
ÆTHERIS sive NAPHTHÆ VITRIO-  
LI asservandus. Residuum largiori aquæ  
quantitate diluatur, filtretur, libero aëri  
exponatur, & iusta rectificatione in Oleum  
Vitrioli concentretur.



*Liquor valde levis motum Fluidi nervei compescit; in omni Dolorum, Spasmodum, Convulsionum genere cum successu adhibetur. Datur ad guttas quindecim, Æther vero, eodem adhuc validior, ad guttas decem.*

## LIQUOR ANODYNUS TOPICUS

*Triller.*

℞. Aquæ Anhaltinæ uncias duas,  
Spiritus Salis Ammoniaci,  
Essentiarum Croci,  
Castorei ana drachmas  
duas,  
Olei destillati Nucistæ guttas triginta:  
Misceantur.

## LIQUOR ANODYNUS TOPICUS

*ALTER Ejusdem.*

℞. Aquæ Anhaltinæ uncias quinque,  
Essentiarum Succini,  
Castorei ana drachmas  
tres,  
Anodynæ drachmas duas,  
Spirituum Lumbricorum,  
Formicarum ana drach-  
mam unam:

Misceantur.

*Dicit Venerandus Auctor, utrumque li-  
quorem velut incantamentum, si quidem  
alterutro leniter tepesfacto partes dolentes fo-  
veantur, sævissimos sopire Dolores Rheuma-  
ticos, Arthriticos, Ischiadicos, monetque  
cum priore liquore scilicet mitiore antea pe-  
riculum esse faciendum, quam alter adhi-  
beatur; in Podagra vero hos liquores adhi-  
bere se ausum non esse fatetur.*

## LIQUOR ANODYNUS VOLATILIS

*Vicat.*

℞. Spiritus Vini unciam unam,  
Salis Ammoniaci vinosi un-  
ciam semis,  
Opii scrupulos duos,  
Camphoræ scrupulum unum;  
Mixta digerantur frigide per tres dies,  
Phialam sæpe agitando, Colentur.

*Traditur miræ virtutis ad sopiendos Ca-  
pitis vel Dentium dolores esse, dum guttæ  
quatuor vel quinque vola manus exceptæ*

*naribus attrahuntur. Aliquot guttæ Gossypio  
instillato committuntur quoque Denti Carioso.*

## LIQUOR ANTIPODAGRICUS

*Hoffmanni.*

℞. Spiritus Sulphuris volatilis Beguini  
unciam unam,  
Camphoræ, Pineis tritæ, drachmam  
unam,  
Misceantur.

*Commendatur ab egregio Auctore Observ.  
Phys. Chym. L. II. Obs. 31. ad laborantium  
pedes crebrius eo inungendos.*

LIQUOR APERITIVUS *Argentoratensium*

## LIQUOR SALINUS LAXATIVUS

*Würtembergensium.*

℞. Salis Epsomensis,  
Tartari solubilis ana unciam unam,  
Vitriolati unciam semis:

Dissolvantur

Aquæ fervidæ unciis decem:

Filtrentur.

*Incidendi, Aperiendi, Urinam ducendi  
causa aliquoties de die ad cyathum datur.  
Optimæ substituitur LIQUORI APERI-  
TIVO Hoffmanni.*

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINA-  
TUS *Michaelis.*

℞. Spiritus Cornu Cervi rectificati, quan-  
tum lubet:

Saturetur

Salis Succini albi quanto sufficiente:

Filtretur Liquor,

*Propter Vires Antispasmodicas & Dia-  
phoreticas laudatur.*

*Datur ad guttas triginta.*

LIQUOR DIGESTIVUS *Suecorum.*

Salis Tartari depurato instilletur

Aceti Vini quantum satis ad satu-  
rationem:

Liquor filtretur.

*Medicamentum hoc pretiosiori Liquori Ter-  
ræ foliatæ Tartari utique erit præferendum;  
plures enim partes Oleosas habet, ideoque  
magis Saponaceum est.*

*Datur ad parvum Cochlear pro Dosi.*



LIQUOR LITHONTRIPTICUS *Jurin.*

Videatur Lixivium Causticum.

LIQUOR MENINGUM *Schmucker.*

Rx. Aquæ Vulnerariæ uncias duas,  
Balsami Commendatoris drachmas  
duas,  
Mellis Rosarum unciam semis:  
Misceantur.

*Celeberrimum Auctorem hunc Liquorem  
ope plumaceolorum ad Vulnere Dura Ma-  
tris & Cerebri adhibere testatur Clarissimus  
Plenck.*

## LIQUOR NITRI FIXI.

Videatur Nitrum fixum.

LIQUOR PROBATORIUS *Mæglingii.*

Rx. Calcis vivæ unciam unam,  
Auripigmenti unciam semis,  
Aquæ fontanæ uncias sex:  
Coquantur ad dissolutionem Auripigmen-  
ti; filtretur Solutio.

*Hic Liquor, nigredine, quam Plumbo man-  
gonisato Vini affusus affricat, hoc ipso signo  
manganium patefacit.*

LIQUOR SIPHYLITICUS *Turneri.*MIXTURA MINERALIS *Suecorum.*

Rx. Mercurri Sublimati grana duodecim:  
Dissolvantur

Spiritus Vini unciis viginti quatuor:  
Misceantur.

*Medicamentum ex Sibiria in Europam  
allatum van Svvieten potissimum auctorita-  
te frequentius in usum tractum, hodie tan-  
quam polychrestum contra contagium Vene-  
reum usurpatur. Illustris Richard quatuor  
granis Camphoræ & una Syrupi Papaveris  
Rhexados uncia adjecta nomen ei LIQUORIS  
SIPHYLITICI sive CONTRA LUEM  
VENEREAM imponit. Apud nos & quidem  
non sine fontica causa Spiritui Vini Aquam  
substituunt. Dosis est ad Cochlear unum.*

LIQUOR SPLENETICUS *ex TARTARO*  
*Schræderi.*

Rx. Tartari crudi,  
Nitri crudi ana uncias duodecim:  
Mixta detonentur in Crucibulo, deinde  
dissolvantur

Aquæ fontanæ unciis triginta sex:  
Solutione fervente dissolvantur

Pulveris Tartari crudi unciae duo-  
decim:

Liquor filtratus servetur.

*Medicamentum Tartaro Solubili analo-  
gum, aliquoties de die ad duas drachmas,  
dum Viscera abdominalia referanda sunt, ex-  
hibetur.*

LIQUOR STYPTICUS *Veberi.*

Rx. Vitrioli Hungarici,  
Aluminis crudi ana uncias sex,  
Aquæ fontanæ uncias quadraginta octo:  
Solutioni filtratæ addantur

Olei Vitrioli unciae quatuor,  
*Linteis quintuplicatis exceptus vasis San-  
guinem fundentibus applicatur.*

LIQUOR TERRÆ FOLIATÆ *Tartari.*

Videatur Terra foliata Tartari.

## LIQUOR VEGETO-MINERALIS

*Richard.*

Est Aqua Vegeto-Mineralis Goulard, omis-  
so Spiritu Vini.

LITHONTRIPTICUM *Tulpii.*

Rx. Pulveris Cantharidum,  
Cardamomorum minorum excorti-  
catorum ana drachmam unam,  
Spiritus Vini rectificati unciam unam,  
Nitri unciam semis:

Infundantur frigide in vase leviter tecto  
per sex dies, quibus dilapsis filtrentur.

*Hoc Medicamentum magna olim famæ  
Homberg publicavit. Dantur ejus gut-  
te quindecim mane in cyatho aquæ unæ,  
post assumptum jusculum hora, usque Me-  
dicamenti per quatrimum continuatur.*



LIXIVIUM CAUSTICUM, LIXIVIUM  
SAPONARIORUM.

Est Casticum potentiale non inspissatum.

*Ad usus externos adhibetur. Ejus scrupulus unus sufficienti aquæ quantitate dilutus & ter interdum sumtus constituit LIQUOREM LITHONTRIPTICUM* Jurin, quem in Calculo viarum Urinarum egregium se præstare attestatur in *Practical Essays on Medical Subjects* p. 57.

## LOCH ALBUM Geoffroy.

℞. Radicis Liquiritiæ minutim incisæ scrupulum unum,

Aquæ fontanæ uncias quatuor:  
Infundantur per horæ intervallum:

Colatura emulgeantur

Amygdalæ dulces numero viginti:  
Denuo colatis addantur

Pulveris Gummi Tragacanthæ grana sedecim:

Probe commixtis ingerantur sensim sub Perpetua agitatione

Syruporum Papavuris albi,  
Althææ ana uncia semis;

Olei Amygdalarum dulcium uncia una:  
Omnibus optime commixtis adjiciantur

Aquæ Florum Aurantiorum drachmæ duæ:

Misceantur.

*Gratum hoc Eclegma in morbis Pectoris Relaxandi & Demulcendi causa cum successu adhibetur.*

## LOCH ad ASTHMA Manlii.

℞. Radicum Scillæ præparatarum unciam semis,

Iridis Florentinæ drachmas duas,

Herbarum Marrubii,

Hyssopi ana drachmam

unam,

Myrrhæ,

Croci ana drachmam semis:

Pulverisata excipantur

Mellis despumati unciis sex:

Misceantur.

*In affectibus Pectoris mucosis resolvendi gratia præscribitur, & exhibetur ad parvum Cochlear pro Dosi.*

## LOCH BALSAMICUM Richard.

Videatur Loc Leniens.

## LOCH de FARFARA Valerii Cordi.

℞. Radices Farfaræ recentes:

Coquantur ad mollitiem, & exprimantur Pulpa per cribrum: Pulpæ addatur Mellis crudi duplum:

Coquantur ad consistentiam Mellis.

*Demulcendi ergo Tussientibus exhibetur.*

## LOCH LAPONICUM Fuller.

℞. Terræ Japonicæ drachmas duas,  
Albuminis Ovi conquassati drachmas sex,

Syropi de Symphyto unciam unam:  
Misceantur.

*Hæmopticis præcipue commendatur.*

## LOCH LENIENS Richard.

℞. Pulveris Gummi Tragacanthæ grana sedecim:

Redigantur cum Ptisanæ pectoralis uncia semis in Mucilaginem, cui sensim sub perpetua agitatione adjiciantur

Olei Amygdalarum dulcium,

Syropi Althææ ana uncia una:

Probe mixta diluantur

Ptisanæ pectoralis unciis tribus cum semisse,

*Viribus cum Loch albo convenit, Dysentericis laudatur.*

*Abstergendi autem consilio adjicitur*

Terebinthinæ Venetæ, Vitello Ovi dissolutæ, scrupulos unus,

Diciturque jam LOCH BALSAMICUM.

## LOCH de PULMONE VULPIS Mesue.

℞. Pulverum Pulmonum Vulpis,

Succi Liquiritiæ,

Herbæ Capillorum Veneris,

Semen Anisi,

Pul-



## LOCH.

Pulverum Seminum Fœniculi ana unciam unam,  
Sacchari clarificati uncias quindecim:

Misceantur.

*Hoc inconcinno prorsus Medicamento Tussientibus & Phtisicis vulgo etiamnum exhiberi solito, Medicorum prudentiores non amplius utuntur.*

LOCH SANUM et EXPERTUM Mesue correctum.

Rx. Radicis Liquiritiæ,  
Herbarum Hyssopi,  
Capillorum Veneris,  
Calaminthæ montanæ ana unciam semis,  
Seminum Anisi,  
Fœniculi ana drachmas duas,

Incisa & contusa coquantur paululum cum Aquæ fontanæ unciis viginti quatuor: Decocto colato emulgeantur,  
Amygdalarum excorticatarum,  
Pinearum mundatarum,  
Seminis Papaveris albi ana uncia una: Colaturæ addantur

Pulverum Liquiritiæ,  
Gummi Tragacanthæ albæ, Arabici,  
Amyli,  
Ireos Florentinæ ana drachmæ sex,

Sacchari albi unciæ quadraginta,  
Aquæ Cinnamomi unciæ duæ:  
Misceantur.

*Ad Relaxandas Stricturas & Demulcendam Acrimoniam Tussi sicca laborantibus commendatur.*

LOCH SAPONATUM Pharmacopææ Edinburgensis Veteris.

Rx. Saponis officinalis drachmam unam,  
Olei Amygdalarum unciam unam,  
Syrupi Capillorum Veneris unciam unam semis:

Misceantur exaacte.

Illustris Richard Syrupo Capillorum uncias Mellis duas substituit.

## MAGISTERIUM.

103

*In Asthmate & Tussi quoque Hypochondriaca, nec non in affectibus Renum exhibetur,*

LOTUS sive LITUS ad HAEMORRHOIDES Richard.

Rx. Ungentis Populei unciam unam,  
Balsami Tranquillantis unciam semis,  
Olei Ovorum drachmas duas:

Misceantur,

*Vires nomen indicat.*

LOTUS ad RHEUMATISMUM Richard.

Rx. Spiritus Vini Camphorati uncias sex,  
Salis,  
Olei Terebinthinæ ana unciam unam:  
Misceantur.

*Vires ex nomine patent.*

LOTUS SAPONACEUS Plenckii.

Rx. Aquæ fontanæ destillatæ uncias duodecim,  
Balsami Vitæ externi drachmam unā:  
Misceantur.

*De Viribus mentio jam facta est sub Balsamo Vitæ.*

LOTUS ad TINEAM Fuller.

Rx. Calcis vivæ uncias duodecim,  
Picis navalis uncias octo,  
Aquæ fontanæ uncias septaginta & duas:

Coquantur ad dimidias, dein colentur.  
*Capiti Tineoso lavando commendatur.*

MAGISTERIUM MARCASITÆ Thibaut COSMETICUM Clavii.

Rx. Bismuthi unciam unam:  
Per vices injiciatur  
Spiritus Nitri unciis duabus:

Solutio clara instilletur guttatim  
Aquæ unciis quadraginta octo,  
Calx albißima edulcoretur.

*Cosmeticos ad usus exhibent, sed Cutim fœdare observatum est.*



MAGISTERIUM SATURNI *Crollii*.

℞. Aceti Lithargyrii quantum lubet ;  
Plumbum inde præcipitetur ope  
Salis communis aqua dissoluti:  
Edulcoratum fervetur.

*Usui Cosmetico perinde ac antecedens in-  
servit, sed Cutim etiam & quidem citius  
fædat; sanitati quoque perniciosus est ejus  
usus; dolendum sane ipsos Medicos eo im-  
prudentiæ prolabi, ut illud ad usus internos  
commendare non dubitent.*

## MAGISTERIUM SULPHURIS.

Videatur Lac Sulphuris.

MAGNES ARSENICALIS *Hartmann*.

℞. Arsenici albi,  
Antimonii crudi,  
Sulphuris flavi ana partes æquales:  
Pulverisata fundantur in Retorta vitrea.

*Venenum hoc remedio ad instar Magnetis  
Ferrum trabentis ex Bubonibus Pestilentiali-  
bus extrahi olim credebant. Arsenicalia ut  
ad alios morbos ita ad Pestem pessime adhi-  
beri hodie est evictum.*

MAGNESIA ALBA *Black*,

℞. Salis Epsonensis uncias sexaginta qua-  
tuor:

Dissolvantur

Aquæ fontanæ unciiis centum vigin-  
ti octo:

Affundatur

Cinerum Clavellatorum depuratorum  
in duplo Aquæ dissolutorum, quantum  
requiritur, ut omnis inde terra dejecta-  
tur; tunc affundantur

Aquæ ebullientis uncia quingentæ:  
Terra optime edulcorata fervetur, quæ  
si calcinata desideratur, in Crucibulo  
candente servanda est rubens per duas  
horas.

Medicamentum, in Italia primum ce-  
lebratum, dein, ad modum a *Stærog*  
traditum, semper ex Lixivio Nitri pa-  
ratum, semper Calce erat inquinatum.

Cl. *Black* præeunte illud jam purum ob-  
tinemus.

*Reliquis Absorbentibus omnino præstat;  
minus enim Ventriculum gravat, præsertim  
si calcinata exhibetur, cum Acido Primarum  
Viarum in Salem medium abit mite Ca-  
tharticum, & Humores adeo non ad Pu-  
tredinem, ut reliqua Absorbentia, disponit,  
ut potius evidenter viribus Antisepticis sit  
instructa.*

*Dosis est ad drachmam unam usque.*

MANNA LIQUIDA *Kiefer*.

℞. Cremori Tartari drachmas duas:  
Dissolvantur

Aquæ bullientis unciiis quinque:  
Addantur

Mannæ Siciliensis uncia duæ:  
Facta dissolutione colentur.

*Una hauritur.*

MANNA TABULATA *vel* TARTA-  
RISATA *Schræderi*.

℞. Mannæ Siciliensis uncias quatuor,  
Cremoris Tartari unciam semis:  
Coquantur cum

Aquæ unciiis decem,  
Ad consistentiam & lege artis in for-  
mam Morsulorum redigantur.

*Scopo Eccoprotico exhibentur.*

MASSA ad FURNACEM *Argentoratensium*.

℞. Pulverum Gummi Benzoes electi,  
Storacis Calamitæ  
ana uncias qua-  
tuor,  
Ladani unciam  
unam,

Oleorum destillatorum Cinnamomi  
guttas

Lignis Rho-  
dii ana gut-  
tas viginti,

Balsami Peruviani drachmas tres:  
Subigantur in mortario calido; ut in  
unam massam cocant; quæ in bacillos  
panno lanco lævigandos cogenda est.

*Affricatur fornaci, ut conclavis Aerem  
odori suavitate perfundat.*



## MATERIA PERLATA.

Videatur Antimonium Diaphoreticum.

MEL ANTHOSATUM *Mesue*.

Rx. Herbae Rorismarini uncias octo,  
Mellis despumati uncias viginti qua-  
tuor:

Digerantur in vase clauso per aliquot  
dies, deinde colentur.

*Ad Enemata recipitur.*

MEL DESPUMATUM *Gelsi*.

Rx. Mellis uncias quadraginta octo,  
Aquaе fontanae uncias duodecim;  
Bulliant per quadrantem horae, spuma  
& cochlearis & coli ope inde auferatur.

MEL MERCURIALE *Colonienſium*.

Rx. Succi Herbae Mercurialis uncias tri-  
ginta sex,  
Mellis crudi uncias viginti quatuor:  
Coquantur ad consistentiam Mellis.  
*Alvi Emolliendae gracia Glysmatibus adji-  
citur.*

MEL ROSARUM *Oribasii*.

Rx. Florum Rosarum rubrarum,  
Aquaе fontanae ferventis ana uncias  
septuaginta duas:  
Digerantur per viginti quatuor horas,  
exprimantur & colentur:  
Addantur  
Mellis crudi unciae nonaginta sex:  
Coquantur ad consistentiam Mellis &  
tunc colentur:

*Ad Ulcera Oris Abstergenda frequentis-  
simo in usus est.*

## MERCURIUS DIAPHORETICUS

*Kleinii.*

Videatur Pulvis Alterans *Plummer*.

## MERCURIUS DULCIS.

Rx. Mercurii Sublimati uncias triginta  
duas,

Vivi uncias viginti quatuor:

Per plures horas, donec omnes glo-  
buli Mercuriales disparuerint, exactis-  
sime trita, committantur Cucurbitae, &  
Balnei arenae ope sublimentur; diffracta  
Cucurbita, rejiciatur substantia laxa,  
quae superiora colli Cucurbitae occupat,  
Sublimatum superiori Cucurbitae ventri  
adhærens, si nondum satis compactum  
fuerit, teratur in pulverem & denuo  
sublimetur; quod, si laminae ferreae ma-  
defactae affricatum nullam maculam ni-  
gram relinquit, Aqua contra Calcis im-  
missum nigrum evadit, indicio est, Mer-  
curium rite dulcificatum esse.

*Egregium Medicamentum, quod in omni-  
bus morbis a Spissitudine Humorum tenuio-  
rum oriundis, cum successu datur. Catharticos  
quoque effectus edit, secure infantibus quoque  
potest exhiberi, & vanus est omnino eorum  
metus, qui, ubi Acrimonia in Primis Viis  
obtinet, noxas inde metuunt. Datur Scopo  
Cathartico ad quindecim grana pro Dosi.*

MERCURIUS GUMMOSUS *Plenck*.

Rx. Mercurii revificati drachmam unam,  
Pulveris Gummi Arabici drachmas  
tres:

Terantur probe, donec omnes globuli  
Mercuriales disparuerint;

Tunc addatur

Syrupi Diacodii uncia semis,  
Misceantur.

*Hoc Medicamento unciis octo Aqua di-  
luta & ad aliquot Cochlearia interdiu dato  
Clarissimus Auctor vidit morbos Venereos  
felicissime fugari. Extus quoque eodem ad  
Lotiones utitur.*

## MERCURIUS LIQUIDUS.

AQUA MERCURIALIS *Charras*.

Rx. Mercurii revificati unciam unam,  
Dissolvatur

Spiritus Nitri uncia una semis:



Solutioni adjiciantur

Aquæ fontanæ uncia triginta.

Guttatim exhibebatur; in ejus locum *LI-  
QUOR SIPHYLITICUS* successit.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS

*Hartmann.*

MERCURIUS COSMETICUS *Suecorum.*

℞. Mercurii vivi uncias quatuor:

Dissolvantur

Spiritus Nitri unciis sex:

Solutio præcipitetur

Salis communis, in aqua dissoluti,  
quantitate sufficiente:

Mox defundatur liquor & Mercurius præ-  
cipitatus edulcoretur.

*Externe ad Ulcera Venerea adhibetur.*

MERCURIUS PRÆCIPITATUS  
FLAVUS.

Videatur Turpethum minerale.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS

RUBER. *Basil. Valentini.*

℞. Mercurii vivi uncias sex,

Dissolvantur

Spiritus Nitri unciis duodecim:

Abstrahatur Acidum a Mercurio ex Re-  
torta; pulvis qui remanet ruber Calci-  
netur in patella terrea, usque dum ru-  
berrimus evaserit; qui sicum pari pon-  
dere Salis Tartari teritur, & super edul-  
coratum aliquoties Spiritus Vini deflagra-  
tur, *Arcani Corallini, Libavii, Mercurii  
Corallini Londinensium* nomine venit.

*A Medicamenti rodentis usu interno om-  
nino abstinendum. Externe ad Unguenta  
mundantia adhibetur. Arcanum Corallinum,  
mitius quidem est, quam Mercurius præci-  
pitatus ruber, sed ne ipsum quidem tuto  
intus datur.*

MERCURIUS SACCHARATUS

*Vvedelii.*

℞. Mercurii rectificati unciam unam,

Sacchari albissimi uncias duas:

Probe terantur in mortario lapideo usque  
dum omnes globuli Mercuriales dispa-  
ruerint.

*Contra Vermes, Obstructiones Glandularum  
Mesaraicarum aliosque morbos, ubi Mercurii  
usus indicatur, cum successu exhibetur.*

*Dosis est drachma una aliquoties de die sumta.*

MERCURIUS SUBLIMATUS *Rhases.*

MERCURIUS CORROSIVUS ALBUS

*Suecorum.*

℞. Mercurii vivi uncias sedecim:

Dissolvantur

Spiritus Nitri unciis viginti quatuor:

Abstrahatur inde Acidum, Sali residuo  
commisceantur

Vitrioli ad albedinem calcinati,

Salis communis ana uncia octo:

Sublimentur ex Cucurbita vitrea.

*Validissimum Medicamentum rodens neque  
extus neque intus nisi larga liquoris diluentis  
quantitate mitigatum est adhibendum.*

MERCURIUS VITÆ *Paracelsi.*

PULVIS *Algaroti.*

℞. Butyri Antimonii quantum lubet:

Instilletur largæ quantitati aquæ, & pul-  
vis præcipitatus probe edulcoretur.

*Validissimum Drastrictum ad aliquot modo  
grana datum fortissime Primas Vias exagitat;  
ideoque hodie non amplius usurpatur.*

MIVA CYDONIORUM *Mesue.*

℞. Succi Cydoniorum per subsidentiam  
depurati uncias centum & vi-  
ginti,

Sacchari albi uncias quadraginta:

Coquantur ad consistentiam Rob.

*Datur roborandi Ventriculi causa.*

MIVA CYDONIORUM AROMATICA.

CONDITUM de CYDONIIS *Mesue.*

Ex Miva Cydoniorum suspendatur fac-  
culus, cui immittantur

Pulverum Cinnamomi acuti,

Cardamomi ana drachma  
una semis,

Croci,

Caryophyllorum,

Zinziberis,



## MIXTURA.

Pulverum Mastichis,  
 Macis ana scrupulus unus:  
 Probe misceantur.  
*Ad sistendos Vomitus & Alvi fluxus ad-*  
*hibetur.*

## MIXTURA ASTHMATICA Trilleri.

Rx. Aquarum Tussilaginis,  
 Pulmonariæ,  
 Hyssopi,  
 Veronicæ,  
 Fœniculi ana unciam unam,  
 Elixir Pectoralis Wedelii drachmas  
 duas,  
 Essentiarum Pimpinellæ,  
 Liquiritiæ ana drachmam  
 unam,  
 Extractorum Cascarillæ,  
 Enulæ ana scrupulum  
 unum,  
 Syrupi Althææ Fernelii unciam unam,  
 Oxymellis Scillitici unciam semis:  
 Misceantur.

*Testatur Venerandus Auctor, in Tussi fe-*  
*rina, Asthmate & Catarrho suffocativo sibi*  
*sæpe præstantissimo auxilio hoc Medicamentum*  
*fuisse.*

## MIXTURA SIMPLEX, AQUA vel SPIRITUS de TRIBUS Schræderi.

## MIXTURA DIATRION Suecorum.

Rx. Spiritus Tartari uncias sex,  
 Vitrioli uncias duas,  
 Aquæ Theriacalis Camphoratæ uncias  
 decem:  
 Misceantur.

*Diaphoresin excitat, Putredinem arcendi*  
*causa olim contra Febres continuas in fre-*  
*quenti usu erat. Dosis drachma una.*

## MIXTURA SALINA VOLATILIS Suecorum.

Videatur Spiritus Mindereri.

## MIXTURA TONICO NERVINA Stablii.

Rx. Spiritus Cornu Cervi unciam unam,  
 Tincturæ Antimonii acri uncias duas:  
 Misceantur.

## MORSULI.

107

*Auctor omnesque ejus affectæ hoc Medi-*  
*camentum ad referendas Viscerum Abdomi-*  
*naliæ Obstructiones & restituendum ipsis*  
*Tonum adhibuerunt.*

*Dosis est ad guttas quinquaginta.*

## MORSULI.

I. Sacchari albissimi uncia sedecim  
 dissolvantur Aquæ unciis quatuor; co-  
 quantur: donec particula solutionis vel  
 spatula excepta inde defluendo filum  
 trahat, aut vi quadam per aerem traje-  
 cta floccos formet. Hoc *CONSISTEN-*  
*TIAM TABULANDI* dicunt:

II. Saccharum ad consistentiam Ta-  
 bulandi coctum ab igne remotus agite-  
 tur usque dum ad parietum vasis con-  
 sistere cœpit:

III. Adjiciantur, Condita quidem aut  
 Nuces in tenuia ramenta dissecta, Aro-  
 mata vero in crassum, reliqua in tenuis-  
 simum pulverem redacta, Olea denique  
 destillata addantur:

IV. Effundatur massa in modulum ex  
 tribus lignis aqua madefactis, ita con-  
 fectum, ut eorum unum basin, duo re-  
 liqua latera efforment. Cultri denique  
 ope dum adhuc calet in rectangula dis-  
 secetur.

## MORSULI ANTIMONIALES Kunkel.

Rx. Amygdalarum dulcium excorticata-  
 rum & secundum longitudinem  
 dissectarum unciam unam,  
 Pulverum grossorum Cinnamomi dra-  
 chmas duas,  
 Cardamomi mi-  
 noris drachmā  
 semis,

Pulveris tenerrimi Antimonii crudi  
 drachmas sex:

Commisceantur cum

Sacchari albi in Aqua Rosarum so-  
 luti & ad consistentiam Tabu-  
 landi cocti unciis septem:

Fiant Morsuli.

*Contra Acrimonias & Spissitudinem Lym-*  
*phæ & affectus Rheumaticos nec non Ar-*  
*thriticos cum successu exhibetur.*



MORSULI AROMATICI *Suecorum.*

Videantur Morsuli Imperatoris.

MORSULI CITRI *Jungkenii* correcti.

℞. Carnis Citri Conditæ incisæ,  
Flavedinis Corticis Citri recentis ana  
unciam unam,  
Quintæ Essentiæ Citri scrupulum unū,  
Succi Citri unciam unam:

Immisceantur

Sacchari Canariensis unciis sedecim  
in Aqua solutis ad consistentiam  
Tabulandi spissiore coctis &  
sub perpetua agitatione semire-  
frigeratis:

Conficiantur secundum artem Morsuli.

*Ad Gustum delectandum, Sitim fallendam  
Viresque refocillandas adhibentur.*

## MORSULI IMPERATORIS

*Hamburgenſium.*

℞. Conditorum Corticis Aurantiorum,  
Citrii,  
Carnis Citri ana unciam  
unam,

Amygdalarum dulcium cuticula pri-  
vatarum unciam unam semis:

Incidentur secundum longitudinem & ad-  
datur

Specierum Imperatoris uncia una:

Commisceantur cum

Sacchari unciis sedecim in Aqua Ro-  
sarum solutis & ad consisten-  
tiam Tabulandi: coctis, sub per-  
petua agitatione semirefrigeratis

Fiant lege artis Morsuli.

*Ventriculi roborandi causa dantur.*

## MORSULI PURGANTES

*Würtembergenſium.*

℞. Resinæ Jalappæ drachmam unam,  
Amygdalarum pellicula privatarum  
drachmas tres:

Probe tritis immisceantur

Sacchari in Aqua Rosarum soluti &  
ad consistentiam Tabulandi co-

## MUCILAGINES:

Et uncia septem semis:

Fiant lege Artis Morsuli.

*Purgandi scopo dantur, Uncia Morsulorum  
grana circiter octo Resinæ continet.*

MORSULI ad SCABIEM *Pharmacopœæ  
Helveticæ.*

℞. Florum Sulphuris unciam unam,  
Pulveris Antimonii,  
Specierum Imperatoris ana drachmas  
duas,

Amygdalarum dulcium excorticata-  
rum, secundo longitudinem se-  
ctarum unciam unam,

Sacchari albissimi Aqua Naphæ dis-  
soluti, ad consistentiam Tabu-  
landi cocti & sub perpetua agi-  
tatione refrigerati uncias octo:

In momento effusionis addantur

Quintæ Essentiæ Citri guttæ decem:  
Fiant lege artis Morsuli.

*Vires ex nomine patent, ter de die un-  
cia semis assumitur.*

## MORSULI contra VENTRUM

*Würtembergenſium.*

℞. Pulverū Seminis Cinæ,  
Musei Corallini ana unciam  
semis,

Cinnamomi drachmas duas,  
Æthiopis mineralis drachmas tres,  
Resinæ Jalappæ, Pineis exactissime  
tritæ, scrupulos duos:

Commisceantur cum

Sacchari albi, Aqua Rosarum soluti  
& ad consistentiam Tabulandi  
cocti, unciis septem:

Fiant lege Artis Morsuli.

*Vires ex nomine patent; uncia una quin-  
que circiter grana Resinæ vehit.*

## MUCILAGINES.

Parantur, dum Gummi pulverisata &  
Semina mucilagine foeta contusa cum  
iusta aquæ quantitate in mortario lapi-  
deo teruntur, usque dum aqua eviden-  
tem spissitudinem ad consistentiam Ge-  
latinarum accedentem induat. Radices



## NITRUM.

autem cum Aqua coquuntur, donec justam viscedinem acquisiverint. Mucilagines ita paratæ per colum premuntur.

### NAPHTA NITRI.

Videatur Spiritus Nitri dulcis.

### NAPHTA SALIS COMMUNIS.

Videatur Spiritus Salis dulcis.

### NAPHTA VITRIOLI.

Videatur Liquor Anodynus.

### NITRUM ANTIMONIATUM.

Videatur Antimonium Diaphoreticum.

### NITRUM DEPURATUM.

R. Nitri crudi quantum lubet.

Dissolvatur in

Aquæ quadruplo:

Filtratum evaporetur ad cuticulam & reponatur in loco temperato, usque dum CrySTALLI surgant, residuus liquor denuo paulum evaporetur & in CrySTALLOS cogatur; idem labor repetatur, quamdiu pulchræ CrySTALLIS prismaticæ surgunt.

*Nitrum non nisi hac ratione depuratum ad usus internos adhiberi debet.*

### NITRUM FIXUM Glauberi.

R. Nitri depurati quantum placet:

Fundatur in Crucibulo, fluenti ingeratur per vices Pulvis Carbonum, neque ante novus ingeratur, quam prior totus deflagraverit; Pulvere Carbonum Crucibulo injecto non amplius Detonante, rota massa probe agitetur, & per horæ quadrantem adhuc Calcinetur, refrigerata deinde dissolvatur aqua, trajiciatur per Filtrum, inspissetur.

Hic Sal aeri expositus deliquium patitur & tunc LIQUOR NITRI FIXI sive ALCHEST Glauberi audit.

*Nitrum Fixum cum sit ipsissimum Alkali vegetabile, easdem ac Sal Tartari & in*

## OLEA.

109

*Liquorem resolutum Olei Tartari per deliquium vires habet.*

### NITRUM TABULATUM.

Est Lapis Prunellæ, qui fusus tubi exiguo foramine terminati, ope, in exiguas Tabulas cogitur.

### OCULI CANCRORUM CITRATI.

Parantur ut CONCHÆ CITRATÆ.

*Idem de utrisque etiam judicium esto.*

### OCULI CANCRORUM PRÆPARATI.

Oculi Cancræ Aqua loti rediguntur in mortario ope pistilli in pulverem tenerimum; supra Porphyritem, affusa, aqua usque terendum, dum in pollinem abierit, qui inter digitos tritus omnis asperitatis expers sentiatur; pasta per infundibulum in parvas pyramides exprimitur.

### OFFA ALBA Helmontii.

R. Spiritus Salis Ammoniaci cum Sale Tartari uncias quatuor:

Instilletur ipsi

Alcoholis Vini quantum satis, ut Coagulum album oriat.

*Ad referandas Obstructiones laudatur. Ejus scrupulus unus cyatho aquæ dilutus exhibetur.*

### OLEA COCTA SIMPLICIA.

Vegetabile vel Animal recens comminutum cum Olei Olivarum æquis partibus coquitur, dum gutta Olei igni instillata non amplius crepitet, sed tacite flammescat, id quod ad consumptionem humiditatis coqui dicere solent; tunc demum Oleum prelio ope exprimitur & per subsidentiam depuratur.

### OLEA DESTILLATA.

Partes Vegetabilium indigenorum recentes comminutæ, quibus suboctuplum circiter Salis communis adjicitur, infunduntur cum Aquæ fere sextuplo per quatuor



tuor dies; Floribus brevius etiam tempus sufficit, Vegetabilia exsiccata per octiduum, Ligna & Cortices duriores adhuc dilutius infunduntur. Instituitur deinceps Destillatio ex Vesica lege ut statim sub initio validior ignis adhibeatur; continuatur tandium Destillatio quoad usque lacteo tincta calore aqua destillat; ab aqua destillata gossypii aut infundibuli ope oleum auferitur, residuo vegetabili aqua denuo affunditur, eademque operatio bis vel ter iteratur. Balsama & Resinae vel sine praevia infusione Destillantur.

## OLEA EXPRESSA.

Nuclei annotini contunduntur & committuntur sacco, qui inter laminas ferreas torcularis ponitur, adigitur torcular; quando nullum ulterius Oleum effluit, residuum ex sacco eximitur, denuo in pulverem reducitur, torcularique submittitur: Oleum per aliquod tempus quieti relictum a facibus, quas deposuit, defunditur.

Semina durior cortice instructa, antequam torculari submittantur, prius vapori aquae ebullientis sunt exponenda. Nuclei qui oleum in temperato aere solidescens vehunt, inter laminas calefactas sunt collocandi. Noces Cacao etiam antequam sacco committuntur, calore non admodum leni calefieri oportet. Id genus Olea, ut facies deponere possint, etiam post expressionem per aliquod tempus caloris ope conservari debent fluida.

Olea fragrantia CORTICUM AURANTIORUM, CITRI, FLORUM AURANTIORUM, quod a NEROLI denominatur, JASMINI, LAVENDULAE sub nomine QUINTAE ESSENTIAE optime ex Gallia Meridionali aut Italia accersuntur.

## OLEA INFUSA.

Parti Vegetabili vel Animali affunditur Olei Olivarum duplum; instituitur Infusio loco calido in vase clauso;

exprimitur Oleum ope torcularis & depuratur per subsidentiam.

OLEUM ACUSTICUM *Wepferi*.

℞. Ceparum minutim concisarum unciam unam,  
Millepedum vivorum numero sexaginta,  
Fellis Tauri drachmas duas,  
Olei Amygdalarum amarum unciam unam:

In vase virco bene clauso macerentur per biduum: tunc semel ebulliant: forti expressione obtento Oleo addantur

Oleorum destillatorum Rutæ,  
Majoranæ,  
Rorismarini  
ana guttæ tres:

Misceantur.

*Guttæ sex huius Olei gossypio exceptæ immittuntur Auri a causa serosa viscida afflictae.*

OLEUM ANIMALE *Dippelii*.

℞. Olei Cornu Cervi, quantum lubet:

Committatur Retortæ adhibita cautione, ne quid sive rostro sive hemisphaerii fornici accrescat, subministretur ignis lenis; Oleum instar aquae pellucidum destillans, quoties ejus drachma una circiter destillaverit, committatur ad summam plenitudinem vitro subere statim claudendo ac pice aut Cera sigillata probe obducendo. Simul ac vel vestigium coloris flavi in Oleo destillante apparet, ab ulteriori Destillatione est desistendum. Hac ratione omnia Olea Empyreumatica possunt rectificari.

*Specificum Medicamentum Antepilepticum cuius egregiam virtutem crebra experientia confirmavit.*

*Datur ad guttas quindecim pro dosi.*

OLEUM BEZOARDICUM *Wedelii*.  
OLEUM CAMPHORATUM *Suecorum*.

℞. Camphoræ drachmas duas:  
Dissolvantur



## OLEUM.

Olei Amygdalarum dulcium Radicibus, Alkannæ tincti, uncia una:  
Addatur  
Quintæ Essentiæ Citri scrupulos dimidijs:

Misceantur.

*Ad morbos Inflammatorios & Malignos laudatur, olim, in Germania præsertim, multum celebrabatur. Ad Fissuras Labiorum in Febris ardentibus, quin & ad necanda, quæ Meatum Auditorium subierunt, Insecta adhibetur.*

*Dosis intus ad guttas decem.*

## OLEUM CAMPHORÆ Lemery.

℞. Camphoræ uncias duas:  
Immittantur

Spiritus Nitri unciis tribus:

Hac ratione in Oleum versa Camphora separetur ab Acido.

*Ad Sarcomata fungosa & Ulcerum callosos margines adhibetur.*

## OLEUM CAPPARUM Manlii.

℞. Corticum Radicum Capparum unciam unam,

Tamarisci,

Cyperi ana drachmas duas,

Herbarum Ceterach,

Rutæ ana drachmā unam,

Seminis Agni casti drachmas duas:

Incisa, contusa infundantur cum

Vini albi unciis sex, per biduum:

Tunc addantur

Olei Olivarum uncia duodecim:

Coquantur ad consumptionem humiditatis, exprimantur & depurentur per subsidentiam.

*Laudatur contra Obstructiones Lienis.*

## OLEUM CARMINATIVUM Danorum.

℞. Oleorum destillatorum Chamomillæ,  
Menthæ ana  
uncias duas,  
Carvi,  
Cumini,  
Fœniculi ana  
drachmam  
semis:

Misceantur.

## OLEUM.

III

*Umbilico illinitur, Glysmatibus immiscetur, intus quoque ad sex vel octo guttas cum Saccharo aut Vitello ovi exhibetur.*

## OLEUM CARMINATIVUM

*Würtembergensium.*

℞. Herbarum recentium Anethi,

Menthæ,

Absynthii,

Pulegii,

Florum Chamomillæ vulgaris ana

uncias quatuor:

Incisa coquantur cum

Olei Olivarum unciis viginti quatuor, ad consumptionem humiditatis:

Expressis addantur

Olei Laurini Unciæ tres:

Depurentur per subsidentiam.

*Vires ex nomine patent. Præcipue laudatur Abdomini tenellorum Terminibus laborantium, inungendo.*

## OLEUM CATELLORUM Parisiensium.

℞. Catellorum recens natorum incisorum numero tres:

Coquantur cum

Olei Olivarum unciis quadraginta octo, ad consumptionem humiditatis:

Colato addantur

Herbarum Origani,

Serpylli,

Pulegii,

Hyperici,

Majoranæ ana uncia duæ:

Insolentur per quindecim dies, exprimantur & depurentur.

*Hoc oleum in membris Contractis curandis & Rheumatismo pellendo multis laudibus celebratur, quæ, si vel maxime ei debentur, certe Catellis omnium minime referenda erunt acceptæ.*

## OLEUM COLOCYNTHIDIS Grulingil

correctum.

℞. Herbarum Absynthii,

Rutæ ana uncias quatuor,

Pul-



Pulpæ Colocynthis uncias duas,  
 Radicis Hellebori nigri unciam unam:  
 Incisa & contusa coquantur cum  
 Olei Olivarum unciis quadraginta  
 octo,  
 Vini albi unciis sex,  
 Fellis bubuli unciis sedecim:  
 Ad consumtionem humiditatis:  
 Exprimantur & per subsidentiam depu-  
 rentur.  
*Anthelmintico scopo Alvique ducendæ cau-  
 sa Abdomini illinitur.*

OLEUM HYPERICI *Munlii.*

Rx. Florum Hyperici cum calicibus un-  
 cias triginta sex,  
 Vini albi uncias sex,  
 Olei Olivarum uncias triginta sex:  
 Coquantur ad consumtionem humiditatis;  
 Expressio addantur  
 Terebinthinæ Venetæ uncia duodecim,  
 Croci, minutim concisi, drachmæ duæ:  
 Elapsis viginti quatuor horis coletur.  
*Creberrimo in usu est. ad Vulnera clau-  
 denda.*

## OLEUM MUCAGINUM

*Amstelodamensium.*

Rx. Radicum Althææ recentium, uncias  
 duas cum dimidia,  
 Scillæ recentium unciam fe-  
 mis,  
 Seminum Lini,  
 Fœnugræci ana uncias duas:  
 Extrahatur inde, ope coctionis cum aquæ  
 quantitate sufficiente,  
 Mucilago, cui addantur  
 Oleorum infusorum Anethi,  
 Chamomillæ,  
 Liliorū alborum  
 ana uncia fe-  
 decim,  
 Coquantur ad consumtionem humiditatis;  
 Colentur.  
*Emolliendi scopo adhibetur.*

OLEUM MYRRHÆ *per DELIQUIUM  
Costæi.*

Albumina ovorum, aqua ebulliente in-  
 durata, dissècantur secundum longitu-  
 dinem; unius cavum repletur Pulvere  
 Myrrhæ, huic alterum superimponitur,  
 ambo hemisphæria fili ope continentur  
 & suspenduntur eo consilio, ut in vas  
 ipsis suppositum destillet Myrrha Albu-  
 mine dissoluta.

*Laudatur tanquam Medicamentum balsa-  
 micum ad Fissuras Cutis. Cum vero valde  
 proclive sit ad putredinem, consultius est,  
 ipso usus tempore, Myrrham in Albumine  
 dissolvere.*

OLEUM PHILOSOPHORUM *Mesue.*

Hoc nomine quaecunque Oleum ungui-  
 nosum per se destillatum potest exhi-  
 beri.

*Resolvendi ergo adhibetur. Ejus inunctio-  
 ne Tympaniticum fere conclamatum perfe-  
 cte curatum recenset Spindler Obs. Med.  
 N. 53.*

OLEUM SCARABÆORUM *Parisiensium.*

Rx. Scarabæorum fimariorum uncias octo:  
 Contusi infundantur cum  
 Olei Laurini unciis sedecim:  
 Coquantur ad exhalationem humida-  
 tis, colentur & depurentur per subsi-  
 dentiam.

*Laudatur Resolvendi & Nervos roboran-  
 di fine.*

OLEUM *Stolani.*

Rx. Olei Olivarum uncias septuaginta  
 duas,  
 Catellorum numero duos,  
 Ranarum numero duodecim,  
 Lumbricorum terrestrium uncias fe-  
 decim,  
 Aquæ Juniperi uncias triginta sex:  
 Incisa coquantur ad consumtionem hu-  
 miditatis:  
 Expressis addantur



## OLEUM.

Axungiarum Humanæ,  
 Muris Alpini,  
 Oleorum Scorpionum,  
 Amygdalarum amararum  
 ana uncia sex,  
 Oculorum Populi recentium uncia  
 triginta sex,  
 Florū recentiu Primulæ Veris,  
 Tussilaginis  
 Betonicæ,  
 Genistæ,  
 Chamomillæ Romanæ,  
 Violarum,  
 Liliorum Convallium,  
 Lavendulæ,  
 Sambuci,  
 Anethi,  
 Salviæ,  
 Cheiri,  
 Rutæ,  
 Thymi,  
 Rorismarini,  
 Centaurei minoris,  
 Origani,  
 Tanacetii,  
 Ligustri,  
 Agrimonie,  
 Pulegii,  
 Meliloti,  
 Verbasci,  
 Absynthii,  
 Rosarum Damascena-  
 rum ana manipulus  
 unus,  
 Hyperici manipuli  
 quatuor:

Insolentur per totam æstatem; tunc co-  
 quantur per aliquot horas, exprimantur;  
 Oleum depuretur per suosidentiam.

*Hildanus Oper. 657. hoc Oleum tanquam  
 egregium Medicamentum contra omnes affe-  
 ctus Nervorum frigidos maxime, nec non  
 ad alios graves morbos commendat. An vero  
 inconcinna hæc, imo monstruosa compositio  
 promissis respondeat? doceat experientia.*

## OLEUM STOMACHICUM Zuvælfæri.

Rx. Olei infusi Absynthii uncias duodecim,  
 Mastichis electæ unciam unam:  
 Dissolutis addantur  
 Tom. II.

## OPIATA.

113

Oleorum destillatorū Absynthii,  
 Caryophyllorum,  
 Ligni Rhodii, ana  
 drachma semis,  
 Nucis Moschatæ,  
 Macis ana scru-  
 puli duo:

Misceantur.

*Inungitur Regioni Epigastricæ.*

OLEUM TARTARI per DELIQUIUM.  
LIXIVIUM TARTARI Londinensium.

Salis Tartari quantum lubet in patina  
 vitrea leviter tecta exponitur aërei; li-  
 quor in quem resolvitur, per filtrum  
 trajicietur.

*Ejus aliquot guttæ multa aqua dilutæ dan-  
 tur in Acrimonia acida, nec non ad reseran-  
 das Obstructiones abdominales.*

## OLEUM VITRIOLI Basil. Valentini.

Vitriolum viride ad albedinem calcina-  
 tum immittitur Retortæ terreæ, cui for-  
 naci reverberatoriæ commissæ jungitur  
 Argillæ ope excipulum vitreum; accen-  
 ditur ignis, per gradus ad summum  
 usque augendus & usque continuandus,  
 donec ex cessante, quæ semper in exci-  
 pulo conspicitur, nebula, nullos ulterius  
 prodire vapores appareat, tunc omnibus  
 refrigeratis, excipulum a Retorta solvi-  
 tur; liquor obtentus denuo ex Retorta  
 vitrea destillatur; SPIRITUS SULPHU-  
 RIS qui prior destillat, seorsim asserva-  
 tur: remanens autem in Retorta Acidum  
 Vitrioli Concentratum vasi vitreo, probe  
 claudendo committitur.

*Acidum fortissimum interdum a Chirurgis  
 Sanguini sistendo adhibetur; intus non nisi ma-  
 gna aquæ quantitate dilutum usurpari potest.*

Rarissime a Pharmacopolis paratur,  
 sed ab artificibus propriis accessitur. Pro-  
 batur pondere, incallescencia cum aqua,  
 nec non pennæ sive lintei ipsi immissi  
 subita corrosione.

## OPIATA ADSTRINGENS Richard.

Rx. Corticum Cascarillæ unciam unam,  
 Granatorum unciam semis,  
 P Ter-



Terræ Japonicæ unciam unam,  
Nucum Cupressi unciam semis,  
Rob Juniperi uncias quatuor:  
Pulverisata Misceantur.  
*Vires ex nomine patent; datur ad Avel-  
lanæ magnitudinem.*

## OPIATA DETERSIVA Richard.

Rx. Pulverum Myrrhæ electæ,  
Olibani electi ana unciam  
semis,  
Spermatis Ceti drachmas duas:  
Vitello ovi probe subactis addantur  
Mellis optimi uncia sex,  
Pulveris Radicis Liquiritiæ quantum  
fatis:  
Misceantur.  
*Exhibetur Phthisicis.*

## OPIATA DYSENTERICA Richard.

Rx. Boli Armenæ uncias tres,  
Pulveris Gummi Arabici unciam se-  
mis,  
Theriacæ Andromachi,  
Diascordii Fracastorii ana uncias duas:  
Misceantur.  
His si adjiciuntur  
Balsami Locatelli uncia duæ,  
Surgit OPIATA DYSENTERICA  
BALSAMICA Richard.  
*Prior ad sistendam simplicem Dysenteriam,  
hæc ad ulceratam adhibetur.*

OPIATA FEBRIFUGA PURGANS  
Richard.

Rx. Pulverum Corticis Chinæ uncias qua-  
tuor,  
Radicum Jalappæ,  
Nitri depurati ana drach-  
mas tres,  
Conservæ Rosarum rubrarum uncias  
duas,  
Syrupi Cichorii cum Rhabarbaro quan-  
tum fatis:  
Misceantur.  
*Leniter alvum ducit.*  
*Ubi Radix Jalappæ omittitur, surgit OPIA-  
TA FEBRIFUGA SIMPLEX Richard.*

## OXYCRATUM Galeni.

Rx. Aceti fortis,  
Aquæ fontanæ ana partes æquales:  
Misceantur.  
*Ad Inflammationes & Sugillationes dis-  
sipandas adhibetur.*

## OXYMEL CHLYBEATUM Fuller.

Rx. Aceti chalybeati,  
Mellis crudi ana partes æquales:  
Coquantur ad consistentiam Syrupi &  
colentur.  
*Laudatur Resolvendi scopo.*

## OXYMEL COLCHICUM Starck.

Rx. Aceti Colchici uncias sedecim,  
Mellis optimi uncias triginta duas:  
Leni igne coquantur ad consistentiam  
Mellis.  
*Scopo Resolvendi & Urinam ducendi ad  
aliquot drachmas pro dosi, aliquoties de die  
exhibetur.*

## OXYMEL PECTORALE Danorum.

Rx. Radicū Helenii unciam unam,  
Iridis Florentinæ uncia semis,  
Incisæ coquantur ex  
Aquæ fontanæ unciis triginta sex, ad  
residuum unciarum viginti qua-  
tuor:  
Colaturæ, subsidentia depuratæ, ad-  
dantur  
Mellis optimi uncia sedecim,  
Gummi Ammoniacy in octuplo Ace-  
ti soluti uncia una:  
Coquantur ad consistentiam Mellis.  
*Cochleatim exhibetur Tussientibus & Asth-  
maticis.*

## OXYMEL SCILLITICUM Præpositi.

Rx. Mellis optimi uncias triginta duas,  
Aceti Scillitici uncias sedecim:  
Coquantur ad consistentia Mellis.  
*Egregium Medicamentum ad Resolvendum  
Mucum. Asthmaticis morbisque Pituitosis  
la-*



*laborantibus cum successu cochleatim exhibetur.*

### OXYMEL SIMPLEX *Hippocratis.*

℞. Mellis optimi uncias duodecim,  
Aceti Vini uncias sex:  
Coquantur ad confidentiam Mellis.  
*Valide Resolvit, in Febribus præcipue Inflammatoriis salubriter datur, ad Gargarismata quoque recipitur.*

### OXYSACCHARUM EMETICUM *Schræder.*

℞. Pulveris Vitri Antimonii unciam unā,  
Aceti Vini uncias duodecim:  
Infundantur per viginti horas, liquori filtrato addantur  
Sacchari albi unciae octo:  
Coquantur ad consistentiam Syrupi.  
*Datur ad unciam unam pro dosi.*

### PANACEA HOLSATICA.

Videatur ARCANUM DUPLICATUM.

### PANACEA MERCURIALIS *Lemery.* ANTIQUARTIUM *Riverii.* CALOMELAS.

Est Mercurius dulcis septies vel pluries sublimatus, quem quidem cum Spiritu Vini adhuc digeri jubent.

*Sunt qui contendunt, iteratis Sublimationibus Mercurium dulcem vi Alvi ducendi privari, aptioremque reddi ad excitandum Ptyalismum.*

### PANES SACCHARATI PURGANTES.

℞. Farinæ Triticæ,  
Pulveris Sacchari albi ana uncias quatuor,  
Vitellorum Ovorum numero tres:  
Probe agitentur, dein distribuuntur in orbiculos, quibus singulis determinatum Resinæ Jalappæ, Pineis tritæ, pondus adjicitur; Coquantur dein modo apud dulciarios usitato.  
*Exhibentur Pueris.*

### PASSULÆ & PRUNA LAXATIVA *Bergamensum.*

℞. Foliorum Sennæ uncias quatuor,  
Cinnamomi drachmas duas,  
Zinziberis albi drachmam unam semis:  
Incisa infundantur per biduum cum  
Aquæ ferventis unciis decem:  
Colatura dissolvantur  
Sacchari albi unciae duodecim:  
Post unciam ebullitionem denuo coletur liquor & superfundatur  
Passularum minorum vel Prunorum Damascenorum cum aqua ad mollitiem coctorum unciis duodecim.  
*Quibus Alvus tarda est ad unciam unam comedenda præbentur.*

### PASTA ALTHÆÆ *Parisiensium.*

℞. Radicum Althææ incisarum uncias quatuor,  
Coquantur ex  
Aquæ fontanæ unciis sexaginta quatuor per octavam horæ partem:  
Colaturæ addantur;  
Gummi Arabici albissimi contusi unciae duæ & triginta:  
Hoc dissoluto adjiciantur  
Sacchari albi unciae duæ & triginta:  
Coletur liquor & evaporetur sub continua agitatione ad consistentiam spissi Syrupi;  
Tunc addantur  
Albuminum Ovorum numero sex cum  
Aquæ Naphæ unciis quatuor conquassatorum:  
Evaporentur sub perpetua & valida agitatione, donec in massam abierint, quæ dorso manus applicata eidem non adhæreat: tunc effundantur super laminam metallicam, Amylo conspersam.  
*Tussientibus in ore liquanda exhibetur, ut acre vias aereas irritans demulceat.*

### PASTA AMYGDALATA COSMETICA.

℞. Farinæ Fabarum uncias sedecim,  
Oryzæ,  
Amyg-



Amygdalarum excorticatarum ana uncias octo,  
Myrrhæ electæ uncias duas,  
Camphoræ sesqui unciam,  
Saponis Veneti uncias viginti,  
Reducantur in Pulverem tenerrimum.  
*Ad scopos Cosméticos adhibetur.*

## PASTA DEPILATORIA Plenck.

Rx. Calcis vivæ uncias sedecim,  
Amyli uncias decem,  
Auripigmenti unciam unam:  
In pulverem tritis affundatur sensim  
Aquæ quantum fatis:  
ad consistentiam Pastæ  
*Inunguntur hac Pasta loca pilosa, & dum  
coeperit siccescere, pars aqua illico est ab-  
luenda.*

## PASTA LIQUIRITIÆ FUSCA

*Parisiensium.*

SUC de REGLISE de BLOIS.

Rx. Gummi Arabici electi uncias triginta  
duas:

Dissolvantur

Aquæ fontanæ quantitate sufficienti:  
Colatura dissolvantur

Succi Liquiritiæ uncia novem,

Sacchari albi uncia sedecim:

Evaporentur lento igne ad consistentiam  
Syrupi spissioris;

Tunc addantur

Pulverum Radicum Enulæ,  
Ireos Florentinæ  
ana uncia semis:

Continuetur evaporatio, usque dum mas-  
sa refrigerata digitis non adhæreat, tunc  
addantur

Olei destillati Anisi scrupuli duo:

Effundatur Pasta super marmor Oleo A-  
mygdalarum dulcium inunctum, exten-  
datur ope cylindri lignei eodem Oleo  
inuncti, tunc in parva quadrata dis-  
secetur.

*Usurpatur ut Pasta Althææ, cui siquidem  
Tussis a Muco spisso originem trahit, etiam  
preferenda videtur.*

## PASTA ad NÆVOS Plenck.

Rx. Saponis Veneti,  
Calcis Vivæ ana partes æquales,  
Terantur in pastam.

*Suadet Auctor vicinas partes Emplastro  
quodam adhæsivo, foramine Nævum tran-  
smittente perforato, defendere, & Nævo  
hanc pastam imponere: asserit intra duodecim  
horas Nævum in Escharum transiturum &  
succeedente Suppuratione secessurum.*

## PASTILLI MERCURIALES Parisiensium.

Rx. Cinnabaris factitiæ lævigatæ drachmas  
duas,

Succini præparati drachmam unam:  
Mixa formentur cum Mucilaginis Tra-  
gacanthæ idoneo quanto in Pastillos.

*Adhibentur pro Fumigatione Mercuriali.*

## PILULÆ ÆTHIOPICÆ BATEI.

Rx. Æthiopis mineralis unciam unam;  
Pulverum Reguli Antimonii Medi-  
cinalis,

Gummi Guajaci ana un-  
ciam semis,

Misceantur & formentur in Massam Pi-  
lularum.

*Resolvendi & Sanguinem depurandi ergo  
adhibentur, Scabiosis, Hydropicis, Ulceribus  
malignis laborantibus laudantur; Dantur ad  
semidrachmam.*

## PILULÆ ALUMINOSÆ Richard.

Videatur Alumen tinctum.

## PILULÆ de AMMONIACO Quercetani.

Rx. Extracti Aloës aquosi uncias duas,  
Pulverum Gummi Ammoniaci un-  
ciam unam semis,

Myrrhæ;  
Mastychis,  
Benozoes,

Rhabarbari ana drachmas  
duas,

Croci scrupulos duos,  
Salis Absynthii drachmam  
unam.



Misceantur in Massam Pilularum.

*Resolvendi sine Hypochondriacis, Asthmaticis, Quartanariis &c. commendantur. Dantur ad drachmam dimidiam.*

PILULÆ ANGELICÆ *Augustanorum.*

℞. Aloës Succotrinæ uncias duodecim:  
Dissolvantur

Succorum Cichorei,  
Endiviæ,  
Fumariæ,  
Rosarum Damascenarum  
ana unciis duodecim:

Colatura depuretur per subsidentiam & evaporetur ad consistentiam Syrupi; addantur

Pulverum Rhabarbari uncia una,  
Agarici uncia semis,  
Cinnamomi drachmæ duæ:

Misceantur in Massam.

*Leniter alvum ducunt, & Obstructiones Viscerum abdominalium oppugnant. Dantur ad drachmam semis.*

PILULÆ ANTHELMINTICÆ

*Hoffmanni.*

℞. Pulverum Gummi Sagapeni,  
Asæ foetidæ,  
Rhabarbari electi,  
Mercurii dulcis ana drachmam unam:

Misceantur & fiant cum

Essentiæ Gentianæ quantitate sufficiente, Pilulæ grani unius ponderis.

*Vires ex nomine patent.*

PILULÆ ANTIMONIALES *Kleinii.*

℞. Pulveris Antimonii unciam unam,  
Gummi Guajaci drachmas duas,  
Extracti Fumariæ unciam semis;

Misceantur & redigantur secundum artem in Massam.

*Sanguinem depurandi ergo cum successu dantur aliquoties de die ad drachmam semis.*

PILULÆ APERIENTES *Stablii.*

℞. Extractorum Aloës Gummosi unciam unam,  
Panchymagogi unciam semis,

Alcohol Limaturæ Martis drachmas duas:

Misceantur.

*Quibus segnior Alvus est, commendantur ad quindecim grana.*

PILULÆ BALSAMICÆ *Wolffi.*

℞. Rasuræ Saponis officinalis unciam unam,  
Terebinthinæ coctæ unciam semis,  
Resinæ Jalappæ præparatæ,  
Extractorum Aloës aquosi,  
Centaurei minoris,  
Gentianæ ana drachmas tres:

Misceantur & fiant Pilulæ Granorum duorum ponderis.

*Abstergunt, Resolvunt, Alvum ducunt. Dosis ad quadraginta usque potest extendi.*

PILULÆ BALSAMICÆ *Mortoni.*

℞. Pulverum Millepedum drachmas tres,  
Gummi Ammoniacy,  
Florum Benzoes ana drachmam unam,

Extracti Croci,  
Balsamorum Peruviani ana scrupulum semis,

Sulphuris Anisati quantitatem sufficientem:

Fiat Massa Pilularum.

*In metu Tuberculorum Pulmonis dantur ad scrupulum dimidium.*

PILULÆ CÆRULEÆ *Edinburgensium.*

Videatur Specificum Antepilepticum *Weismann.*

PILULÆ CATARRHALES *Danorum.*

℞. Extracti Panchymagogi uncia unam,  
Mercurii dulcis unciam semis,  
Re-



Resinæ Jalappæ, Pineis tritæ, drachmam unam,

Quintæ Essentiæ Corticum Aurantiorum guttas triginta:

Misceantur in Massam.

*Ad educendum & attenuandum Serum exhibentur. Dantur ad scrupulum unum pro dosi.*

### PILULÆ CEPHALICÆ Danorum.

℞. Massæ Pilularis de Succino,  
Extractorum Rhabarbari,

Panchymagogi,

Resinæ Jalappæ, Pineis tritæ, ana unciam semis:

Misceantur in Massam.

*Evacuandi ergo dantur in affectibus Capitis serosis. Dosis est ad drachmam semis.*

### PILULÆ COCHIÆ Rhasis.

℞. Specierum pro Hiera picra drachmas decem,

Pulverum Trochiscorum Alhandal scrupulos decem,

Diagrydii drachmas duas semis,

Stœchadis Arabicæ,

Radicum Turbith ana drachmas quinque,

Syrupi Stœchados quantum satis:

Misceantur & formentur in Massam.

*Ad Caput Pituita evacuandum olim adhibebantur. Dantur ad drachmam semis vel scrupulos duos.*

### PILULÆ COMMUNES.

Videantur Pilulæ Rufi.

### PILULÆ de CYNOGLOSSO Manardi.

#### CATAPOTIA ad CATARRHOS

*Mesue.*

℞. Pulverum Radicis Cynoglossi,  
Seminis Hyoscyami,  
Opium depurati ana unciam semis,  
Myrrhæ electæ drachmas sex,

Pulverum Olibani drachmas quinque,  
Styracis Calamitæ,  
Caryophyllorum,  
Cinnamomiana drachmas duas,

Croci fefqui drachmam:

Misceantur & fiat cum Syrupi Violarum idoneo quanto Massa.

*Olim a Stablianis maxime Sopiendi scopo ad grana quinque usque pro Dosi dabantur. Drachma una de Opio & de Semine Hyoscyami grana octo continet.*

### PILULÆ DEPURANTES Richard.

℞. Sulphuris Aurati Antimonii,  
Mercurii dulcis ana drachmas duas,  
Gummi Guajaci unciam semis:

Pulverisatis addatur

Balsami Copaibæ drachma una:

Misceantur & formentur in Massam.

*Depurandis Humoribus dantur ad scrupulum semis aliquoties de die.*

### PILULÆ FOETIDÆ VVbytt.

℞. Asæ foetidæ drachmas tres.

Aloës,

Vitrioli Martis ana drachmam unam:

Misceantur, Fiat Massa Pilularum.

*Hujus Scrupuli duo aliquoties de die Hypochondriacis & Hystericis dantur.*

### PILULÆ HYDRAGOGÆ Helvetii.

℞. Granorum Tigliorum,

Gummi guttæ,

Diagrydii Sulphurati ana unciam semis,

Radicum Jalappæ,

Rhabarbari ana drachmas duas,

Macis drachmam unam,

Rob Sambuci unciam semis,

Misceantur in Massam Pilularum.

*Valide Evacuant. Drachma una granorum Tigliæ Gummi guttæ & Diagrydii de singulis undecim circa grana continet; quapropter Dosis ad scrupulum unum est limitanda.*



PILULÆ HYDROPICÆ Bontii.

℞. Aloës Succotrinæ drachmas quinque  
Gummi guttæ,  
Ammoniaci ana drachmas  
tres:

In pulverem redacta formentur in Massam.

*Hydropicis resolvendi causa ad grana quindecim, evacuandi autem sine ad drachmam semis dantur.*

PILULÆ HYDROPICÆ Richard.

℞. Aloës Succotrinæ unciam semis,  
Gummi Ammoniaci drachmas duas:  
Guttæ,

Diagrydii,  
Arcani duplicati ana drachmas tres,  
Pulverifata reducuntur cum

Oxymellis Scillitici quantitate sufficiente in Massam Pilularem,  
*Prioribus validiores dantur eadem dosi.*

PILULÆ HYSTERICÆ Parisiensium.

℞. Gummi Opoponacis unciam unam,  
Ammoniaci,  
Galbani,  
Sagapeni ana unciam semis,  
Myrrhæ drachmas duas,  
Asæ foetidæ,

Castoreis Russici ana drachmas tres:  
In pulverem redactis immisceatur  
Olei destillati Succini scrupulus unus,  
Mithridatii quantitate sufficiente:  
Fiat Massa pilularis.

*Scopo aperiendi adhibentur; Hystericis præcipue commendantur; dosi est ad drachmam semis.*

PILULÆ MAJORES Hoffmanni.

℞. Mercurii sublimati drachmam unam:  
Dissolvatur

Aquæ destillatæ quanto sufficiente:  
Hac solutione imbuantur

Micæ Panis drachmæ novem:  
Fiant Pilulæ grani unius pondere,  
*Liquoris Siphylitici vires habent, eo com-*

*mendabiles, quod nullo sapore metallico molestæ sunt, & cum sensim modo in Ventriculo solvantur, nulla inde irritatio metuenda. Quatuor aut quinque Pilulæ exhibentur ter de die.*

PILULÆ MARTIALES Sydenhami.

℞. Alcohol Limaturæ Martis uncias duas,  
Extracti Absynthii quantum satis ad  
formandam Massam Pilularem.

*Hypochondriacis & Hystericis conducunt. Auctor illas in Dissertatione Epistolari describit. Dantur bis de die ad scrupulum unum pro dosi.*

PILULÆ MASTICHINÆ Petri Aponensis.

℞. Aloës electæ drachmas decem,  
Mastychis electæ unciam semis,  
Agarici optimi drachmas tres:  
Reducuntur in Massam Pilularem.

*Ventriculo roborando inserviunt; dantur ad drachmam semis.*

PILULÆ MERCURIALES Barbarossæ à Lemery correctæ.

℞. Hydrargyri drachmas sex:  
Extinguantur  
Terebinthinæ quantitate sufficiente:  
Addantur

Pulverum Aloës drachmæ sex,  
Agarici albi uncia semis,  
Rhabarbâri electi drachma  
una:

Misceantur & formentur in Massam Pilularem.

*In morbis Venereis & Lymphæ exhibentur ad drachmam unam pro dosi.*

PILULÆ MERCURIALES Belloste à Baumé correctæ.

℞. Mercurii vivi e Cinnabari revificati  
unciam unam,

Cremoris Tartari unciam semis:  
Triturentur usque dum globuli Mercuriales disparuerint:  
Tunc addantur



Diagrydii,  
Pulveris Jalappæ ana uncia una:  
Mixa formentur cum Syrupi Capil-  
lorum Veneris quantitate sufficiente in  
Massam pilularem.

*Viribus cum prioribus conveniunt, dantur  
ad drachmam semis.*

### PILULÆ CONTRA OBSTRUCTIONES *Stablii.*

℞. Extractorum Panchymagogi drach-  
mam unam,  
Aloës gummosi drach-  
mas duas,  
Alcohol Limaturæ Martis drachmam  
semis:

Mixa formentur in Massam Pilularem.

*Frequenti olim in usu apud Germanos ma-  
xime fuerunt in reserandis Visceribus Abdo-  
minalibus. Dosis est ad grana decem, per  
plures dies continuanda.*

### PILULÆ OPHTHALMICÆ *Schmucker.*

℞. Gummi Galbani,  
Sagapeni,  
Saponis officinalis ana drachmam  
unam,  
Pulveris Rhei electi drachmam unam  
semis,  
Succi Liquiritiæ drachmam unam,  
Tartari Emetici grana sedecim:  
Misceantur & formentur Pilulæ grani  
unius ponderis.

*Mane & vesperi sumantur quindecim Pi-  
lulæ per sex septimanas contra Suffusionem.*

### PILULÆ Plumerii.

℞. Mercurii dulcis,  
Sulphuris Aurati Antimonii ana dra-  
chmas sex,  
Extracti Gentianæ unciam semis:  
Probe mixta formentur in Massam Pi-  
lularem.

*Multum celebrantur in Morbis Venereis  
& Lymphæ. Dantur ad drachmam dimidiam  
vel scrupulos duos pro dosi.*

### PILULÆ POLYCHRESTÆ BALSAMI- CÆ ad mentem *Becheri & Stablii.*

℞. Extractorum Aloës,  
Myrrhæ aqua frigida  
paratorum ana uncias  
duas,  
Absynthii unciam unam  
semis,  
Centaurii minoris un-  
ciam unam,  
Cardui benedicti unciam  
unam semis,  
Fumariæ unciam unam,  
Cochleariæ unciam unam  
semis,  
Rhabbarbari,

Terebinthinæ Venetæ ana unciam  
unam:

Misceantur in Massam Pilularem.

*Non levem quæstum cum his Pilulis varii  
Germaniæ Medici fecerunt. Ad reserandas  
Viscerum Abdominalium obstructions, ut &  
Mensium præcipue commendantur. Dantur  
ad drachmam semis.*

### PILULÆ POLYCHRESTÆ *Starckey.*

℞. Saponis Chemici cum Oleo Tere-  
binthinæ parati uncias quatuor,  
Extracti Opii aquosi unciam unam,  
Pulveris Radicis Hellebori albi un-  
cias duas:

Probe mixta formentur in Massam Pi-  
lularem.

*Medicamentum inconcinnum, Alchemicis  
commentis superstructum omnino a re Medi-  
camentaria removendum videtur; quo vero  
qui uti voluerit, non ultra tria grana dosim  
extendat.*

### PILULÆ RESOLVENTES *Darelii.*

℞. Saponis officinalis uncias duas cum  
semisse,  
Pulveris Gummi Ammoniaci,  
Pulverum Tartari Vitriolati,  
Bilis bovinæ inspissatæ,  
Rhabbarbari:

Extracti Absynthii ana drachmas sex:  
Misceantur cum Syrupi Absynthii quan-  
to convenienti in Massam Pilularem.



*Inimicæ maxime feruntur Ictero; dosi exhibentur eadem, qua SAPONATÆ, quarum superant etiam efficaciam.*

## PILULÆ Rûsi correctæ.

Rx. Extractorum Aloes gummosi unciam unam,

Myrrhæ gummosi unciam semis,

Pulveris Croci drachmas duas:  
Misceantur cum Succo Limonum quanto conveniente in Massam Pilularum.

*Ad reserandas Obstructiones Abdominales faciunt; laudantur quoque adversus Pestem. Dosis ad drachmam semis excurrit.*

## PILULÆ SAPONATÆ Kleinii.

Rx. Saponis officinalis unciam unam,  
Gummi Ammoniaci depurati,  
Extracti Centuarii minoris ana unciam semis:

Olei destillati Succini guttas decem:  
Misceantur in Massam.

*Aperiendi scopo ad drachmam semis aliquoties de die dantur.*

## PILULÆ SCILLITICÆ Edinburgensium.

Rx. Scillæ præparatæ,  
Gummi Ammoniaci depurati ana unciam semis,

Reducantur in pulverem; addantur  
Millepedum præparatorum uncia semis,

Saponis officinalis uncia una:  
Reducantur cum Oxymellis Scillitici idoneo quanto in Massam Pilularum.

*Egregie resolvunt & aperiunt: in Obstructionibus Viscerum Abdominalium, & mucosis Pectoris morbis; ter de die ad scrupulum unum exhibentur.*

## PILULÆ de STYRACE Schræderi correctæ.

Rx. Styracis Calamitæ unciam semis,  
Succi Liquiritiæ drachmas tres,  
Olibani,  
Tom. II.

Benzoes,  
Mastichis,  
Extracti Opii aquosi ana drachmas duas,

Croci Orientalis drachmam unam:  
Pulverisata reducantur cum Essentiæ Succini quanto conveniente in Massam pilularem.

*Drachma una septem cum dimidio grana Opii continet. Dantur Tussientibus sopiendis ad grana duodecim.*

## PILULÆ de SUCCINO Gratonis.

Rx. Succini præparati unciam unam semis,  
Pulverum Mastichis unciam unam,  
Agarici optimi drachmas sex,

Radicis Aristolochiæ rotundæ veræ drachmas duas,  
Aloes Succotrinæ uncias duas semis:

Misceantur & formentur cum Essentiâ Succini in Massam:

*Olim frequens earum usus erat in Affectibus Capitis atque Catarrhis. Ad drachmam semis pro Dosi dabatur.*

## PILULÆ TARTAREÆ Schræderi.

Rx. Aloes Succotrinæ unciam unam,  
Gummi Ammoniaci drachmas tres,  
Vitrioli Martis,  
Extractorum Croci ana drachmam unam,  
Gentianæ drachmam unam semis;

Terræ foliatæ Tartari drachmas duas:  
Mixta reducantur secundum artem cum Tinctura Tartari in Massam pilularem.

*Hæc Pilularum Tartarearum compositio reliquis quorumcunque Auctorum omnino præferenda est. Resolvit & roborat, quapropter aperiendi causa in morbis ab obstructis Visceribus Abdominalibus oriundis ad drachmam semis pro dosi datur.*

## PILULÆ de TEREBINTHINA Richard.

Rx. Boli Armenæ præparatæ,  
Offis Sepiæ ana unciam semis,



Succini præparati,  
 Mastiches ana drachmas duas,  
 Rhei electi drachmam unam,  
 Terebinthinæ coctæ unciam unam &  
 semis:

Reducantur in pulverem & Syrupo Balsamico formentur in Massam Pilularum.

*Ad sistendam Gonorrhæam scrupulus unus ter de die exhibetur.*

#### PILULÆ TONICÆ Bacher.

Rx. Extracti Hellebori nigri vinosi,  
 Myrrhæ aquosi ana uncia unā,  
 Pulveris Cardui benedicti drachmas tres & scrupulum unum:  
 Misceantur & inde formentur Pilulæ grani dimidii ponderis.

*Hydropicis multum laudantur, dantur ad decem ter de die, quæ vero dosi pro ratione effectus augeri minuique potest.*

#### PILULÆ contra VARIOLAS Rosen.

Rx. Pulverum Gummi Guajaci grana sedecim

Mercurii dulcis grana duodecim,

Camphoræ, Pineis tritæ, grana octo,  
 Extracti Aloes grana duodecim:

Misceantur in Massam pilularem.

*Dantur tam prophylactico scopo quam corporis ad Inoculationem præparandi gratia. Dosis pro ratione ætatis augetur, addita iusta Resinæ Jalappæ portione ad scopum quoque Catharticum aptatur.*

#### PLUMBUM USTUM Celsi.

Plumbum in patina terrea liquatum agitur usque dum in calcem gryseam abierit.

*Vires adstringentes & exsiccantes exserit; ad usus potissimum externos adhibetur.*

#### POSCA Galeni.

Rx. Aquæ partes tres,  
 Vini partes tres:

Paulum coquantur.

*In morbis Malignis vires roborantes putredinique resistentes prodit.*

#### POTIO ADSTRINGENS Richard.

Rx. Succi Hypocistidis drachmam unam,  
 Sanguinis Draconis,  
 Aluminis ana drachmam semis:

Pulverisatis adjiciantur

Ptisana adstringentis uncia quatuor,  
 Syrupi de Myrtho uncia una:

Misceantur.

*Vires nomen indicat.*

#### POTIO AMMONIACA Ricard.

Rx. Gummi Ammoniacy drachmas duas:  
 Dissolvantur in

Oxymellis Scillitici uncia una semis,  
 Ptisana communis unciis duodecim:

Misceantur.

*Dantur Asthmaticis ad Cochlearia duo alternis horis.*

#### POTIO ANTISEPTICA Richard.

Rx. Corticis Chinæ,  
 Radicis Serpentariæ Virginianæ ana drachmas tres:

Incidentur & coquantur cum

Aquæ unciis sedecim ad octo residuas uncias:

Sub finem addantur

Florum Chamomillæ Romanæ drachma una:

Colaturæ addantur

Spiritus Nitri dulcis drachma semis,  
 Aquæ Cinnamomi vinosæ,

Syrupi Limonum ana uncia una:

Misceantur.

*Exhibetur in morbis Malignis per cyathos.*

#### POTIO ad ASTHMA Fuller.

Rx. Millepedum vivorum centum & viginti:

Contusis sensim affundantur

Aquæ Pulegii uncia octo:

In liquore fortiter expresso dissolvantur  
 Pulveris Gummi Ammoniacy drachma tres,

Spiritus Salis Ammoniacy drachmae duæ,

Syrupi Balsamici uncia una.

*Egre-*



*Egrevium prorsus Medicamentum ad Asthma pituitosum & flatulentum, aliquoties de die cochleatim exhibendum.*

POTIO CONFORTANS ACIDULATA  
*Richard.*

Rx. Confectionum de Hyacintho,  
Alkermes ana drachmam unam,  
Liquoris Anodynæ mineralis Hoffmanni scrupulos duos,  
Syrupi Acetositis Citri unciam semis,  
Vini rubri,  
Aquæ communis ana uncias duas:  
Misceantur.  
*In morbis Malignis exhibetur cochleatim.*

POTIO CRETACEA *Edinburgensium.*

Rx. Cretæ præparatæ,  
Pulverum Gummi Arabici ana unciam unam,  
Sacchari unciam semis,  
Aquæ fontanæ uncias viginti quatuor,  
Spiritus Nucis Moschatæ uncias duas:  
Misceantur.  
*Dantur per Cyathos contra Sodom.*

POTIO OLEOSA *Ricard.*

Rx. Olei Amygdalarum dulcium,  
Syrupi Althææ ana unciam unam,  
Ptisanæ pectoralis uncias tres:  
Misceantur.  
*Relaxandi, demulcendi, nec non Antispasmodico scopo exhibetur. In finem diureticum adduntur*  
Nitri depurati grana octo,  
Spiritus Nitri dulcis guttæ duodecim.

POTIO SISTENS *Richard.*

Rx. Confectionis de Hyacintho drachmas tres,  
Syrupi Cydoniorum unciam unam,  
Decocti Corticum Aurantiorum uncias quatuor:  
Misceantur.  
*Fluxibus Alvi laborantibus cochleatim præbetur.*

PRAEPARATA

Dicuntur Lapides Terræ Ossæ in pulverem redacta, super marmore, vel quod utique melius est, super porphyrite ope aquæ in Massam coacta, in qua nec oculis nec digitis sensibilis ulla, relinquatur asperitas; ope anserini denique calami per infundibulum in exiguas pyramides efformata & exsiccata.

PTISANA

Veteribus Medicis dicebatur Decoctum Hordei mundati, hodie pro Decocto, quod potus ordinarii vicem sustineat, usurpatur.

PTISANA ACIDULATA seu LIMONADA MINERALIS *Richard.*

Rx. Ptisanæ communis uncias quatuor & sexaginta,  
Spiritus Vitrioli quantum satis ad gratam aciditatem,  
Quintæ Essentiæ Citri guttas quatuor,  
Pulveris Sacchari uncias duas:  
Misceantur.  
*Fallendæ siti, in morbis præcipue Biliosis inservit.*

PTISANA ADSTRINGENS *Richard.*

Rx. Radicis Tormentillæ drachmas sex:  
Coquantur per dimidiam horam cum Aquæ fontanæ centum & quadraginta quatuor unciis:  
Sub finem addantur  
Radicum Consolidæ majoris drachmæ sex:  
Glycyrrhizæ uncia semis:  
Colentur.  
*Nomen ab ipsa virtute desumptum.*

PTISANA COMMUNIS *Richard.*

Rx. Hordei integri unciam unam,  
Radicis Graminis incisæ unciam semis:  
Coquantur per dimidiam horam cum Aquæ fontanæ unciis quatuor & sexaginta:



Sub finem addantur

Radicis Liquiritiæ drachmæ duæ:  
Colentur.

Huic Ptisanæ si adjicitur

Nitri depurati drachma semis,  
Evadit PTISANA NITRATA *Richard.*

PTISANA PECTORALIS *Richard.*

℞. Radicum Althææ unciam semis,  
Liquiritiæ drachmas tres,  
Caricarum pinguium drachmas duas,  
Florum Papaveris Rhœados scrupulum unum:

Incisa coquantur paululum cum  
Aquæ fontanæ unciis quatuor & sexaginta.

### PULPÆ.

Parantur ex Radicibus aut Fructibus ficcis, quæ cum aqua coquantur, usque dum mollescant, dein cribro imponuntur & ope spatulæ ligneæ, per ejus foramina Pulpa transprimitur. Radices bulbosæ & Fructus carnosæ sine prævia cum aqua coctione in mortario lapideo aut ligneo contunduntur & deinde per cribrum trajiciuntur.

PULPA CASSIÆ *Valerii Gordi.*

Ex filiquis Cassiæ Fistulæ instrumenti lignei ope ipso usus tempore optime separatur, per cribrum trajecta a feminibus aliisque quæ ipsi adherent, quifquiliis commode purgatur. In Officinis, quæ prostat, dicta quidem ratione ex filiquis separatur, sed ut tota obtineatur, filiquas præterea cum aqua eluunt aquæ deinde Pulpæ additæ & mixtim per cribrum coactæ quartam Sacchari partem adjiciunt & cuncta coquunt, usque dum consistentia Electuarii surgat.

*Datur ad uncias duas & ultra scopo Cathartico.*

PULPA CASSIÆ pro CLYSTERIBUS  
*Viennensium.*

℞. Herbarum quinque Emollientium uncias tres,

Florum Chamomillæ unciam unam:  
Incisa coquantur paululum cum

Aquæ fontanæ unciis triginta sex:  
Decocto eluatur Pulpa filiquarum Cassiæ; Liquor colatus evaporetur ad consistentiam Electuarii, cujus uni parti immisceatur.

Sacchari Thomæi pars una semis:  
*Aliquot uncie dissolvuntur in aqua pro uno Clystere.*

### PULPA TAMARINDORUM.

Paratur ex Tamarindis ratione sub  
PULPA CASSIÆ indicata.

### PULTICULA de MANNA.

Videatur Electuarium de Manna.

### PULTICULA SAPONACEA.

℞. Saponis Officinalis drachmam semis,  
Dissolvatur

Aquæ Menthæ drachmis tribus:  
Addantur

Vitelli Ovi drachma una,  
Magnesiæ albæ scrupuli duo,  
Pulveris Rhabarbari scrupulus unus,  
Syruporum Althææ *Fernelii*,  
Chamomillæ ana drachmæ duæ:

Misceantur.

*Cum successu contra Tormina Infantum adhibetur.*

### PULVERES.

#### Canones.

I. Parantur substantias solidas in mortario pistilli opetundendo & triturando; partes in justam tenuitatem redactæ a reliquis ope cibri sericei segregantur.

II. Tenaciores Vegetabilium & Animalium partes, ut friabiles evadant, prius calori sunt exponendæ; quin etiam instrumentis scindentibus, secantibus &c. comminui solent, ante quam ietibus pistilli exponantur.

III. Mortaria & pistilla metallica facile labem aliquam Pulveribus affricant.

IV. Du-



IV. Duriore lapides, ut in pulverem comminui possint, ignitione & subsequente extinctione efficitur.

V. Sicca nec tenacia, ubi in tenerimum pulverem pistilli & mortarii ope fuerint comminuta, in pastam insuper aquæ ope super Porphyrite rediguntur & teruntur, usque dum nec oculis conspicua nec digitorum apicibus sensibilis ulla amplius asperitas remaneat; quo facto per infundibulum in parvas pyramides transmittuntur, & *Preparatorum* nomine insigniuntur.

VI. Quodsi vero acria in pulverem sunt redigenda, mortarium aut cribrum operculo ligneo aut coriaceo exacte tegendum est, ne pulvere in auras disperso lædatur operator.

VII. Aliquanto majori vegetabilis in pulverem comminuendi quantitati subinde aliquot aquæ guttæ sunt affundendæ, quibus nimia pulveris disturbatio caveatur.

VIII. Majori parte per cribrum transmissa, quæ remanent fragmina tanquam rejectamenta relinquuntur.

XI. Corticum, Lignorum, Radicum resina turgentium, qui posterius obtinentur pulveres prioribus sunt efficaciores; reliquis omnino virtute præstant. Peracta igitur pulverisatione omnes demum pulveres successive obtenti quam curatissime misceri debent.

X. Nuclei, nisi ipsis sicca adjiciantur, in pulverem redigi nequeunt.

XI. Resinæ & Gummi Resinæ non nisi hyeme in pulverem teri possunt; paucæ earum portiones, in compositiones magistrales recipiendæ, ope Sacchari aut Nucleorum in formam pulveris coguntur.

XII. Omnia mollia & liquida, si quidem ipsis iusta siccorum ratio adjicitur, in pulveres possunt recipi.

XIII. Pulveres, qui ab aëre læduntur, in vitris probe obturatis aservari debent.

#### PULVIS ABSORBENS *Vedelli.*

R. Vitrioli Martis drachmas sex,  
Concharum preparatarum uncias duas  
semis,

Coralliorum rubrorum,  
Antimonii Diaphoretici,  
Cinnabaris factitiæ ana drachmas  
decem,

Extracti Opii aquosi,

Olei destillati Caryophyllorum ana  
drachmam unam.

Misceantur. Fiat Pulvis.

*Acrimoniam acidam tollit, ejus causas profligat, Dolores & alia symptomata inde orta curat. Dosis est ad drachmam semis.*

#### PULVIS ALTERANS *Plummer sive Edinburgensium.*

R. Panacæ Mercurialis,

Sulphuris Aurati Antimonii *Mendert*  
ana partes æquales:

Misceantur triturando exactissime per  
quadrantem horæ.

*Ad curandos morbos Cutaneos egregie conducit, quin cum successu etiam contra Miasma venereum exhibetur. Dosis est ad grana octo bis de die. Camphora si additur, surgit MERCURIUS DIAPHORETICUS Klein.*

#### PULVIS ANODYNUS *Doveri.*

R. Nitri,

Tartari Vitriolati ana uncias duas:

Injiciantur in crucibulum candens ibique relinquuntur, donec omnis scintillatio cessaverit; sat refrigeratus redigatur in pulverem, cui addantur

Pulverum Opii,

Liquiritiæ,

Ipecacuannæ ana uncia una:

Misceantur exacte.

*Ad sistendos Alvi fluxus & Hemorrhagias ad drachmam unam exhibetur.*

#### PULVIS ANTARTHRITICUS PURGANS *Perard.*

R. Seminum Carduibenedicti,

Carthami,

Diagrydii,

Radicum Salsaparillæ

Chinæ,

Ligni Quajaci ana unciam semis,

CrySTALLORUM Tartari,



Foliorum Sennæ sine stipitibus ana unciam unam,  
Cinnamomi drachmas duas:  
Reducantur in Pulverem & misceantur.

*Matériem Podagricam evacuare putatur, si singulis mensibus versus Novilunium ejus drachma una assumatur.*

**PULVIS ANTARTHRITICUS** *Ducis Portlandiæ sive Mirandolæ, ARTHRITICUS AMARUS* *Parisiens.*

℞. Radicum Aristolochiæ rotundæ,  
Gentianæ,  
Summitatum Chamædrys,  
Chamæpytis,  
Centauri minoris ana partes æquales:

Mixta redigantur in Pulverem.

*Medicamentum jam sub initio superioris seculi usitatum majorem in modum in morbis Rheumaticis & Arthriticis, in Podagra maxime laudatur. Ejus drachma una quotidie mane exhibetur.*

*Rhedingius & VVirslung Radicem Rhabarbari Monachorum addunt. Grato formulæ præscriptæ duplum Ligni Quajaci adjicit.*

**PULVIS ANTHELMINTICUS** *Geoffroy.*

℞. Pulverum Corallinæ,  
Corticis Mori ana drachmam unam,  
Radicum Rhabarbari electi,  
Filicis,  
Summitatum Tanacetii ana drachmam semis,

Æthiopis mineralis drachmas duas:  
Probe misceantur.

*Datur ad drachmam unam aliquoties de die.*

**PULVIS ANTIFEBRILIS** *Triller.*

℞. Corticis Chinæ unciam semis,  
Lapidum Cancrorum citratorum drachmas duas,  
Concharum præparatarum drachmam unam,  
Diaphoretici Martialis,  
Nitri depurati ana drachmam semis:  
Misceantur; fiat Pulvis.

*Triller hunc Pulverem in omnis generis Febris Intermittentibus Medicis commendat, ejusque usum innumeris fere ægrotis saluberrimum, nec nisi in uno vel altero fallacem expertum esse asseverat. Datur ad drachmam unam pro dosi.*

**PULVIS ANTIHECTICUS** *Fordyce.*

℞. Salis Pulychrestii scrupulum semis,  
Rhabarbari veri grana sex;  
Misceantur; Fiat Pulvis.

*Hunc Pulverem per quatuordecim dies usurpatum egregios in curanda Hæctica & Rachitide effectus edidisse, Auctor ipse expertus testatur.*

**PULVIS ANTILYSSUS** *Comitis Isenburg.*

℞. Cornu Cervi usti præparati unciam unam,  
Coralliorum rubrorum præparatorum drachmas duas,  
Margaritarum Occidentalium præparatarum drachmam unam,  
Succini albi præparati drachmam semis,  
Foliorum Auri numero quinque,  
Argenti numero duo:  
Misceantur.

**PULVIS ANTILYSSUS** *Mead.*

℞. Lichenis cinerei terrestris uncias duas,  
Piperis nigri unciam unam:  
Misceantur & redigantur in Pulverem.  
Datur ad scrupulos quatuor.

**PULVIS ANTILYSSUS** *Palmarii sive Jacobi Sylvani Domini de Pyrou.*

℞. Herbarum Rutæ,  
Verbenæ,  
Salviæ,  
Plantaginis,  
Polypodii,  
Absynthii,  
Menthæ,  
Artemisiæ,  
Melissophylli,  
Betonicæ,



## PULVIS.

Summitatum Hyperici,  
Centaurii minoris ana  
partes æquales:

Misceantur & reducantur in Pulverem.

*Multum imo nimium celebratus hic Pulvis quotidie ad Drachmam dimidiam exhiberi jubetur.*

## PULVIS AMTILYSSUS Tunquinsium.

℞. Moschi optimi grana sedecim,  
Cinnabaris præparatæ grana duo & triginta:

Misceantur; Fiat Pulvis subtilissimus.

*Datur pro dosi, a Canis rabido morsus, una, alternis etiam horis repetenda; in Morbis Exanthematicis, Variolis maxime ad scrupulum unum, Maniacis ad scrupulos duos cum dimidio, ad grana duodecim in Singultu, qui Febribus inflammatoriis accedit.*

*Cum hodie inter omnes constet, tantopere a multis celebrata Specifica contra Morsum Canis rabidi, quam exiguae sint efficaciae, plura congerere nolui.*

## PULVIS ANTISEPTICUS Plenck.

℞. Pulverum Corticis Peruviani,  
Rutæ ana uncias duas,  
Camphoræ, Spiritu Vini tritæ, uncias tres:

Misceantur.

*Inspergitur partibus Gangrænosis.*

## PULVIS ANTISPASMODICUS

*Rosensteinii.*

SEDATIVUS Suecorum.

℞. Opii depurati scrupulum semis,  
Nitri depurati scrupulos quinque,  
Sacchari albissimi unciam unam:  
Misceantur & redigantur in Pulverem.

## PULVIS ANTISPASMODICUS Stablii.

℞. Nitri depurati,  
Tartari Vitriolati ana uncias duas,  
Cinnabaris rectificatæ drachmam unā  
semis,

Misceantur & cogantur in Pulverem tenerrimum.

## PULVIS.

127

*Propter virtutem Sanguinis æstum temperandi Spasmosque sistendi magnopere commendatur. Datur ad drachmam semis.*

## PULVIS ARI COMPOSITUS.

Videatur Pulvis Stomachicus Birckmanni.

PULVIS AURATUS Dresdensis sive Germanorum.

Videatur Pulvis Cordialis Cellensi

PULVIS BEZOARDICUS ANGLICUS  
seu Comitissæ de Kent, seu Gasconii.

℞. Apicum nigrorum Chelarum Cancrorum marinorum uncias duas,  
Margaritarum præparatarum,  
Coralliorum rubrorum præparatorum,  
Oculorum Cancrorum citratorum,  
Cornu Cervi usti ana unciam unam,  
Lapidis Bezoar Orientalis  
Terræ Læmniæ ana unciam semis,  
Cerussæ Antimonii uncias duas,  
Ambrae gryseæ parum Sacchari tritæ  
drachmam unam semis:

Misceantur & reducantur in Pollinem.

*Gasconium quendam hunc Pulverem Episcopo Vigoniæ ter centum libris Anglicis vendidisse tradunt. Seculi quo primum usurpabatur, genus spirat.*

## PULVIS BEZOARDICUS Ludovici.

℞. Cornu Cervi sine igne præparati uncias tres,  
Terræ sigillatæ albæ,  
Unicornu fossilis ana unciam unam  
semis:

Misceantur; Fiat Pulvis.

*Hoc pulvere vulgus in morbis Exanthematicis utitur. Cum hodie ex saniore Praxi Pulveres Bezoardici exulare jubeantur, plures colligere nolui.*



PULVIS CACHECTICUS *Quercetani.*

℞. Limaturæ Martis unciam unam,  
 Radicum Ari,  
 Coralliorum rubrorum præparatorum,  
 Matris Perlarum præparatæ ana drachmas duas,  
 Cornu Cervi sine igne præparati,  
 Succini præparati,  
 Cinnamomi ana scrupulos quatuor,  
 Ambra gryseæ drachmam unam semis,  
 Sacchari albi ad pondus omnium:  
 Misceantur, Fiat Pulvis.

*Hunc Pulverem, quem Auctor in Pharmacop. Dogmat. restituit. L. I. Cap. 15. describit, post usum Incidentium & Resolventium per quindecim continuos dies adbiberi jubet. Dosis est ad quatuor Scrupulos: INCOMPLETUS, id est, omiſſa Ambra vulgo proſtat. —*

PULVIS. CARMINATIVUS *Nynſichti.*

℞. Seminum Cumini,  
 Carvi,  
 Anisi ana uncias tres,  
 Radicum Zinziberis drachmas ſex,  
 Macis drachmas tres,  
 Croci drachmam unam:  
 Misceantur; Fiat Pulvis.

*Drachma una ad pellendos Flatus adhibetur.*

PULVIS CONTRA CASUM  
*Auguſtanorum.*

℞. Terræ figillatæ,  
 Sanguinis Draconis,  
 Mumia ana unciam ſemis,  
 Spermaris Ceti drachmas duas,  
 Rhabarbari drachmam unam:  
 Misceantur; Fiat Pulvis.

*Medicamentum minime ad ſcopum faciens quibuſdam in locis in gratiam vulgi aſſervatur, qui illud lapſis ad ſcrupulos duos exhibet.*

## PULVIS CARTHUSIANORUM.

Videatur Kermes Minerale.

PULVIS E CERUSSA *Londinenſium.*

℞. Ceruſſæ Venetæ uncias quinque,  
 Gummi Sarcocollæ unciam unam ſemis,  
 Tragacanthæ unciam ſemis:  
 Misceantur, Fiat Pulvis.  
*Ad ſiccanda Ulcera & curandum Eryſipelas extus adhibetur.*

PULVIS COMITIS de *Warwick.*

Videatur Pulvis Cornachini.

PULVIS Comitiffæ de *Kent.*

Videatur Pulvis Bezoardicus Anglicus.

PULVIS AD CONDIENDUM COR  
*Parienſium.*

℞. Cinnamomi,  
 Myrrhæ ana uncias octo,  
 Aloes,  
 Ladani,  
 Benzoës,  
 Caryophyllorum,  
 Nucis Moſchatæ ana uncias quatuor:  
 Misceantur; Fiat Pulvis ſubtiliſſimus.

PULVIS ad CONDIENDA INTRANEAE  
 & CAVITATES IMPLENDAS *Parienſium.*

℞. Myrrhæ,  
 Aloës ana uncias ducentas ſex & quinquaginta,  
 Bituminis Judaici uncias centum & ſexaginta,  
 Salis marini decrepitati uncias ſex & nonaginta,  
 Radicum Angelicæ,  
 Imperatoriæ,  
 Acori,  
 Afari,  
 Iridis Florentinæ,

Zin-



PULVIS.

Zinziberis ana uncias octo  
& quadraginta,  
Lignorum Sassafras,  
Santali citrini,  
Juniperi,  
Rhodii,  
Abietis ana uncias triginta  
& duas,  
Summitatum Lavendulæ,  
Sabinæ,  
Menthæ,  
Thymi,  
Rorismarini,  
Salviæ,  
Stœchados,  
Absynthi ana uncias se-  
decim:  
Misceantur; Fiat Pulvis.

PULVIS ad CONDIENDAS & IMFAR-  
CIENDAS CARNES *Parisiensium*.

Rx. Cinnamomi,  
Corticis VVinterani,  
Cassie Caryophyllatæ,  
Costi,  
Amomi,  
Piperis nigri,  
Radicum Enulæ,  
Iridis Florentinæ,  
Cyperi longi,  
Calami aromatici,  
Caryophyllorum,  
Nucis Moschatæ ana uncias octo,  
Myrrhæ,  
Aloës ana uncias octo & quadraginta,  
Bituminis Judaici,  
Benzoës,  
Tacamahacæ,  
Ladani,  
Olibani ana uncias duas & triginta,  
Foliorum Lauri,  
Majoranæ,  
Thymi ana uncias sedecim,  
Florum Lavendulæ uncias duas &  
triginta,  
Misceantur; Fiat Pulvis tenuis.

PULVIS CONTENT dictus.

Rx. Sacchari Canariensis uncias duodecim,  
Tom. II.

PULVIS.

129

Oryzæ uncias octo,  
Cinnamomi unciam unam semis,  
Caryophyllorum drachmam semis,  
Vanigliæ drachmam unam semis:  
Redigantur in pulverem & Misceantur.  
*Substituatur Chocolate.*

PULVIS CORDIALIS *Gellensis*.

Rx. Sacchari finissimi, in tenerrimum  
pulverem redacti, uncias duas,  
Cinnabaris præparatæ drachmas sex,  
Olei destillati Cinnamomi veri scru-  
pulos duos:  
Misceantur exacte.  
*Vires Cardiacas & Nervinas edit. Da-  
tur ad Scrupulum unum.*

PULVIS Cornachini seu Comitum de VVar-  
nick, seu CERBERUS TRICEPS.

Rx. Diagrydii,  
Antimonii Diaphoretici,  
Cremoris Tartari ana partes æquales:  
Misceantur exactissime.  
*Pulvis qui per multam annorum seriem  
tanquam Purgans polychrestum in frequenti  
usu fuit, nostra ætate, cum parcius Resino-  
sis utamur, minus crebro usurpatur. Dosis  
ad drachmam semis.*

PULVIS COSMETICUS ad MANUS  
*Viennensium PATE D'AMANDES*.

Rx. Amygdalarum excorticatarum uncias  
duodecim,  
Spermatum Ceti unciam semis:  
Probe tritis admisceantur  
Pulverum Oryzæ,  
Iridis Florentinæ ana un-  
ciae duæ,  
Benzoës,  
Salis Tartari ana uncia se-  
mis,  
Oleorum destillatorum Ligni Rhodii,  
Lavendulæ,  
Caryophyllorū  
ana guttæ  
quindecim:

Misceantur probe.



PULVIS DENTIFICUS *Brunsvicensium*.

℞. Lapidis Pumicis uncias duas,  
 Ossium Sepiæ Medullæ unciam unam,  
 Cremoris Tartari,  
 Radicis Ireos Florentinæ ana unciam  
 semis,  
 Olei destillati Caryophyllorum gut-  
 tas quatuor:  
 Misceantur, Fiat Pulvis tenerrimus.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS  
*Noricorum*.

℞. Radicum Pæoniæ exteriori cuticula  
 privatorum, uncias tres,  
 Visci Querni,  
 Rasurarum Eboris,  
 Ungularum Alcis,  
 Cornu Cervi,  
 Eboris usti,  
 Coralliorum alborum,  
 rubrorum,  
 Margaritarum ana drachmas sex:  
 Misceantur; Fiat Pulvis, cui addantur  
 Foliorum Auri, in exiguas molecu-  
 las dissectorum, numero viginti.  
*Vulgatissimo in usu est hic Pulvis in om-  
 nibus morbis Spasmodicis tam arcendis quam  
 curandis.*  
 Plures congerere Pulveres Epilepticos  
 hac ætate, qua Specificorum Antepilep-  
 ticorum auctoritas tantopere cecidit,  
 supervacaneum duxi.

PULVIS ERYSIPELATODES *Mynsichti*.

℞. Farinæ volatilis e molendinis uncias  
 sex,  
 Plumbi usti,  
 Boli rubræ ana uncias duas,  
 Mastiches electæ,  
 Olibani,  
 Cerussæ ana unciam unam:  
 Misceantur, Fiat Pulvis subtilissimus.  
*Inspergitur parti affectæ & charta cærulea  
 retinetur.*

PULVIS FUMALIS *Brunsvicensium*:

℞. Mastiches,  
 Olibani ana uncias quatuordecim,  
 Succini citrini uncias octo,  
 Ladani uncias tres semis,  
 Sandaracæ,  
 Styracis Calamitæ,  
 Benzoes ana uncias septem,  
 Lignorum Santali citrini,  
 Rhodii,  
 Cassiæ Caryophyllatæ ana uncias duas  
 semis,  
 Florum Rosarum rubrarum,  
 Lavendulæ ana uncias qua-  
 tuor,  
 Corticis Cascarillæ uncias duas:  
 Misceantur; Fiat Pulvis crassus:  
*Ejus suffitus tam odoris gratia, quam ad  
 discutiendos Rheumatismos & Catarrhos ad-  
 hibetur.*

## PULVIS Gasconii.

Videatur Pulvis Bezoardicus Anglicus.

## PULVIS de GUTTETA.

℞. Visci Querni,  
 Radicum Dictamni albi,  
 Pæoniæ,  
 Seminum Pæoniæ ana unciam unam,  
 Atriplicis,  
 Coralliorum rubrorum præparatorum  
 ana unciam semis,  
 Ungularum Alcis unciam unam:  
 Misceantur; Fiat Pulvis subtilis.  
*Hic Pulvis eandem, quam Epilepticis  
 Marchionis in Germania habuit, in Gallia  
 nactus est famam.*

## PULVIS Haly contra PHTHISIN.

℞. Seminum Papaveris albi drachmas  
 decem,  
 Portulacæ,  
 Cicerum,  
 Malvæ ana unciam se-  
 mis,  
 Cucurbitæ,



Seminum Cucumeris,  
 Citrulli,  
 Cydoniorum ana drachmas  
 septem,  
 Amyli drachmas sex semis,  
 Gummi Arabici,  
 Tragacanthæ,  
 Cornu cervi usti,  
 Succu Liquiritiæ,  
 Eboris usti ana drachmas tres :  
 Misceantur : Fiat Pulvis.

*Inconcinnam hanc, ac mentione vix dignam compositionem eo tantum apposui, quod a nonnullis adhuc usurpatur. Certe scopo accommodatius semina sub forma Emulsionis, reliqua Pulveris nomine adhibentur.*

PULVIS HEPATICUS RUBER  
*Dresdensis.*

Rx. Cremoris Tartari uncias quatuor,  
 Sandali rubri,  
 Rosarum rubrarum ana unciam semis:

Misceantur : Fiat Pulvis irrorandus  
 Spiritus Vitrioli drachmis duabus.  
*Olim ejus usus in æstu Sanguinis compe-  
 scendo & Appetitu excitando admodum fre-  
 quens fuit.*

PULVIS INCRASSANS *Fuller.*

Rx. Radicis Althææ,  
 Gummi Arabici,  
 Sanguinis Draconis,  
 Glycyrrhizæ ana partes æquales:  
 Misceantur : Fiat Pulvis.

*Contra Hæmoptysin, Tussim acrem &  
 Ardorem Urinæ exhibetur ad drachmam  
 semis.*

PULVIS pro INFANTIBUS *Rosden.*

Rx. Magnesiæ unciam semis,  
 Pulverum Seminis Cumini drachmas  
 tres,  
 Radicis Ireos drachmas  
 duas :  
 Croci drachmam semis :  
 Misceantur.

*Contra Infantum Tormina datur.*

PULVIS INFANTUM *Danorum.*

Videatur Pulvis Puerorum Citrinus.

PULVIS MANUALIS *Brunsvicensium.*

Rx. Amygdalarum amararum excortica-  
 tarum uncias duodecim,  
 Farinæ Oryzæ uncias septem cum di-  
 midia,  
 Fabarum uncias sex,  
 Radicis Ireos Florentinæ,  
 Cretæ albæ ana unciam semis,  
 Salis Tartari drachmas duas,  
 Olei Jasmini drachmam unam,  
 Ligni Rhodii guttas decem:  
 Misceantur : Fiat Pulvis.  
*Ad usus Cosméticos adhibetur.*

PULVIS MASTICATORIUS *Wepfer.*

Rx. Radicum Imperatoriæ,  
 Corticum Sambuci ana unciam se-  
 mis,  
 Foliorum Lauri drachmam unam se-  
 mis,  
 Seminum Sinapi,  
 Staphidis agriæ ana drach-  
 mam unam,  
 Caryophyllorum Aromaticorum scru-  
 pulos quatuor,  
 Myrrhæ electæ drachmas sex:  
 Misceantur : Fiat Pulvis crassus.

*Scrupulus unus linteo obvolutus per ali-  
 quot horæ minuta masticatur in Capitis mor-  
 bis serosis, Paralyfi linguæ, Aphonia &c.*

PULVIS PANNONICUS RUBER  
*Augustanorum.*

Rx. Boli Armenæ uncias tres,  
 Terræ Lemniæ uncias duas,  
 Coralliorum alborum drachmas sex,  
 rubrorum unciam se-  
 mis,  
 Margaritarum drachmas quinque,  
 Lapidum Hyacinthi,  
 Smaragdi,  
 Rubini,  
 Sapphiri,



Cornu Cervi sine igne præparati ana  
unciam semis,  
Rasuræ Eboris drachmas tres,  
Eboris ad albedinem calcinati dra-  
chmas quinque,  
Cinnamomi drachmas duas,  
Caryophyllorum,  
Croci ana drachmam unam,  
Seminis Acetosæ,  
Sandali rubri ana drachmas duas,  
albi,  
Corticum Citri ana drachmam unam  
semis:  
Misceantur: Fiat Pulvis tenerrimus, cui  
admisceantur  
Foliorum Auri, in exiguas moleculas  
cultro dissecandorum, numero vigin-  
ti quatuor:  
*Ineptum hoc Medicamentum, creberrime  
olim apud Germanos in morbis Exanthema-  
ticis usurpatum, haud immerito exolevit.*

PULVIS ad PALPITATIONEM  
CORDIS.

Videatur Pulvis Cordialis Cellensis.

PULVIS PECTORALIS *Danorum.*

℞. Radicum Ireos Florentinæ,  
Liquiritiæ ana. drachmas  
sex,  
Florum Sulphuris unciam semis,  
Florum Benzoës drachmam unam,  
Sacchari Candi albi uncias duas,  
Oleorum destillatorum Anisi,  
Fœniculi ana  
guttas de-  
cem:

Misceantur: Fiat Pulvis.

*Resolvendi ergo in morbis Pectoris pitui-  
tosis adhibetur.*

PULVIS PUERORUM CITRINUS  
*Danorum INFANTUM Eorundem.*

℞. Magnesiæ albæ drachmas sex,  
Radice Ireos Florentinæ,  
Seminis Anisi,  
Sacchari albi ana drachmas duas,  
Croci drachmam unam:

Misceantur: Fiat Pulvis.

*Ad tormina infantum sedanda præscri-  
bitur.*

PULVIS PUERORUM EVACUANS  
*Berolinensium.*

℞. Resinæ Jalappæ drachmas tres:  
Terantur in pulverem tenerrimum cum  
Amygdalarum sesqui drachma:  
Addantur  
Mercurii dulcis uncia una,  
Cinnabaris optimæ drachma una,  
Sacchari albissimi uncia semis:  
Misceantur: Fiat Pulvis.

*Drachma una sex circiter grana Resinæ &  
viginti grana Mercurii dulcis vehit. Scopo  
Anthelmintico & Sanguinem depurandi er-  
go exhibetur.*

PULVIS contra QUARTANAM  
*Hoffmanni.*

℞. Pulveris Corticis Peruviani drachmas  
tres,  
Regulis Antimonii medicinalis dra-  
chmas duas,  
Mercurii dulcis,  
Croci Martis aperitivi *Stahl*i.  
Arcani duplicati ana drachmam unā,  
Olei destillati Menthæ guttas tres:  
Misceantur: Fiat Pulvis.  
*Egregii usus esse in Quartana, quæ altas  
in Viscerum penetralibus egit radices, testa-  
tur Auctor in Med. Rat. system. Datur ad  
drachmam semis.*

PULVIS REFRIGERANS *Suecorum.*

℞. Salis essentialis Tartari unciam semis,  
Sacchari albissimi uncias sex,  
Quintæ Essentiæ Citri guttas sex:  
Mixta redigantur in Pulverem.  
*Hujus Pulveris una uncia duodecim li-  
bris aquæ dissolvenda LIMONADA extem-  
pore.*



PULVIS RESOLVENS *Stablii.*

℞. Concharum præparatarum,  
Antimonii Diaphoretici,  
Nitri depurati ana partes æqua-  
les :

Misceantur: Fiat Pulvis.

*Spissitudini humorum adversatur. Maxi-  
mus ejus usus est in Febris.*

PULVIS SCILLÆ COMPOSITUS  
*Stablii.*

℞. Pulverum Radicis Scillæ præparatæ  
uncias duode-  
cim,  
Vincetoxici un-  
cias quatuor :

Misceantur.

*Egregium Medicamentum Resolvens in  
morbis præcipue Asthmaticis ad scrupulum  
unum pro Dosi exhibetur.*

PULVIS SEDATIVUS *Suecorum.*

Videatur Pulvis Antispasmodicus *Rosen-  
steinii.*

PULVIS STERNUTATORIUS  
*Noricorum.*

℞. Herbarum Pulegii,  
Herbarum Majoranæ,  
Rorismarini,  
Salviæ ana unciam unam  
semis,  
Nicotianæ,

Radici Ellebori albi,  
Seminis Nigellæ ana unciam unam,  
Moschi grana quinque:

Misceantur; redigantur in Pulverem.  
*Virtus ex nomine cognoscitur.*

PULVIS STERNUTATORIUS  
*Parisiensium.*

℞. Herbarum Majoranæ,  
Betonicæ ana unciam  
unam,  
Asari unciam dimidiam,

Florum Lili Convallium unciam  
unam :

Misceantur: Fiat Pulvis.

PULVIS STERNUTATORIUS  
*Trilleri.*

℞. Herbarum Majoranæ,  
Betonicæ,  
Pulegii,  
Basilici,  
Mari veri ana drachmas  
duas,

Florum Lili Convallium,  
Tunicæ,  
Lavendulæ,  
Anthos,  
Rosarum rubrarum ana dra-  
chmam unam,

Castorei optimi drachmas tres,

Sacchari Canariensis unciam unam:

Misceantur: Fiat Pulvis subtilissimus.

*Venerandus Auctor quadraginta annorum  
experientia nixus hunc pulverem ad Caput  
roborandum, Sensus acuendos, Memoriam  
firmandam, Vertiginem profligandam, Dolo-  
res capitis mitigandos & sedandos insultus  
Hystericos maximopere commendat.*

PULVIS STOMACHICUS *Birchmanni.*

℞. Radicum Ari uncias duas,  
Calami aromatici,  
Pimpinellæ ana unciam unā,  
Oculorum Cancrorum unciam semis,  
Cinnamomi drachmas tres,  
Salis Tartari drachmas duas:

Misceantur: Fiat Pulvis.

Cum Saccharo si desideratur, Saccha-  
rum ad pondus omnium adjicitur.

*Egregium Medicamentum Incidens, non  
solum in turbata Digestione, sed in aliis quo-  
que morbis Viscido oriundis cum successu datur.*

PULVIS ad STRUMAS *Villanovani.*

℞. Spongiarum marinarum combustarum,  
Pilarum marinarum,  
Offis Sepiæ,  
Piperis longi,  
nigri,



Zinziberis,  
Cinnamomi,  
Salis Gemmæ,  
Radicum Pyrethri,  
Fructuum Cupressi,  
Gallarum,  
Spongiarum Rosarū ana uncias duas:  
Misceantur; Fiat Pulvis, cui, Sacchari  
si quid desideratur, uncia sex adjician-  
tur.

*Experientia docuit, hunc pulverem Stru-  
ma laborantibus efficaciter exhiberi. Datur  
ejus drachma una mane & ante somnum  
nocturnum.*

### PULVIS TEMPERANS Richard.

Videatur Pulvis Antispasmodicus Stahlī.

### PULVIS TEMPERANS Unzeri.

℞. Tartari Vitriolati,  
Nitri depurati,  
Lapidum Cancrorum præparatorum  
ana partes æquales.  
Reducantur in Pulverem & misceantur.  
*Contra Orgasum Sanguinis & Acrimo-  
niam acidam facit.*

### PULVIS ad TORMINA INFANTUM Roséen.

℞. Saponis officinalis drachma unam,  
Lapidum Cancrorum unciam semis,  
Rhabarbari drachmam semis,  
Seminum Anisi,  
Cumini ana scrupulum unū,  
Crocī grana quatuor,  
Sacchari albi drachmas tres:  
Misceantur; Fiat Pulvis.

### PULVIS contra VERMES Fuller.

℞. Corallinæ in pulverem redactæ un-  
ciam dimidiam,  
Æthiopis mineralis drachmas duas,  
Olei destillati Absynthii scrupulum  
dimidium:

*Ex immensa farragine Pulverum contra  
Vermes in Dispensatoriis diversantium hunc  
tanquam efficaciorē selegimus, & ut tutius*

*infantibus adhiberi possit, Olei omissionem  
suademus; mane & vespera per aliquot dies,  
quantum cultri cuspide capi potest, infanti-  
bus propinetur.*

### PULVIS contra VERMES PURGANS Fuller.

℞. Scammonei, Pineis triti, grana sex,  
Pulveris Rhabarbari grana quatuor,  
Mercurii dulcis grana quinque:  
Misceantur.

*Hæc dosis est pro puero sexenni.*

### REGLISSE ROYALE.

Videatur Extractum Liquiritiæ gummo-  
sum.

### REGULUS ANTIMONII MARTIALIS Basil. Valent.

℞. Clavorum Ferri uncias duodecim:  
In Crucibulo probe ignitis addantur  
Antimonii crudi uncia sedecim:  
Valido igne fundantur, ut penitus fluant;  
dein adjiciantur

Cinerum clavellatorum uncia duæ:  
Effundantur in Conum fusorium Sebo  
illitum, & posteaquam refrixerint, mal-  
lei ictu Regulus a scoria separetur.

Quamvis Sulphur Ferrum in scoriam  
vertat, hujus tamen quantulacunque por-  
tio metallo Antimonii nunquam non  
manet immixta. Quapropter hic Re-  
gulus; cum semper Ferro plus minusve  
sit adulteratus, ad labores, qui purum  
Regulum requirunt, recipi nequit.

### REGULUS ANTIMONII MEDICINA- LIS Mats.

℞. Antimonii uncias decem,  
Salis Alkali uncias duas:  
Mixta fundantur, fusa effundantur, &  
scoria hac ratione orta contundatur in  
pulverem.

*Scopo Resolvendi laudatur in Febris  
acutis, Arthritide, Hydrope. Exhibetur ad  
drachmam semis.*



## REGULUS ANTIMONII SIMPLEX

*Basil. Valent.*

℞. Antimonii uncias sedecim,  
Tartari crudi uncias decem,  
Nitri uncias quinque:  
Mixta successive detonentur; fundantur; effundantur in conum fusorium; mallei ictu Regulus a scoria separetur, quæ tanquam *HEPAR ANTIMONII* aservari potest.

*Regulus Antimonii, cum eximie drasticus sit, nunquam intus datur, paratur in officinis ad alia præparata inde conficienda.*

RESINA JALAPPÆ *Augustanorum.*

℞. Radicum Jalappæ crasse contusarum, quantum lubet:

Affundatur

Spiritus Vini rectificatissimus ad eminentiam quatuor digitorum, digerantur calore justo per biduum; Spiritus tinctus defundatur; affundatur novus, qui de novo digestus & tinctus priori adjiciatur; quo labore ter iterato ultima tinctura una cum Radicibus sacco commissa exprimatur torculari. Universa deinde tinctura immittatur Curbitæ, Spiritusque dodrans destillationis ope inde eliciatur; residuum catino committatur, jam, ut secedat Resina, aqua affundatur factaque secessione defundatur, nova rursus Resinæ affusa, accedat calor, fiat utriusque agitatio; atque hic alternus tinctam defundendi & puram aquam affundendi continuetur labor, donec aqua cum Resina agitata turbare desinat. Tunc demum Resina dum calet, in bacillos tortos efformetur.

*Hoc Medicamentum cum Primas vias irritando vires Catharticas edat, per longum temporis intervallum tanquam Purgans polychrestum usurpabatur. Noxæ, quas ejus usui tribuerunt Observatores, abusu potius sunt adscribendæ. Non nisi Saponi cuidam junctum exhiberi debet; ita demum ab Humoribus Primarum viarum excipi, & e corpore eliminari poterit. Dosis pro adultis ad grana usque quindecim augeri potest. Infan-*

*tibus ad octavum usque annum tot Resinæ dantur grana, quot annorum est ætas.*

## RESINA JALAPPÆ PRÆPARATA

*Stablit.*

℞. Resinæ Jalappæ,  
Amygdalarum dulcium ana partes æquales:

Mixta terantur in pulverem tenerrimum.

*Hac ratione præparata Resina citra torminum aut Hypercatharsis metum exhiberi poterit.*

Ea ratione, qua ex Radicibus Jalappæ paratur Resina, ex aliis quoque substantiis obtinetur, ut *RESINA SCAMMONI, LIGNI GUAIACI* &c.

ROOB ARABUM, GELATUM, sive  
GELATINA *Recentiorum.*

Manibus exprimatur ex Fructibus lintheo involutis Succus; turbidus si fuerit sive per subsidentiam depuretur, sive Albumine ovorum clarificetur, quo facto dissolvatur in succo

Sacchari albissimi dodrans:

Coquatur ad consistentiam tenuioris Gelatinæ, immittatur ollæ, exhalato demum omni calore obturandæ.

Ex fructibus Cynosbati, unde semina fuerunt ablata, Pulpa per cribrum exprimitur.

*Ob vim saponaceam omnino, ut plurimum etiam voluptatis causa commendatur.*

ROOB NUCUM *Mesue*, DIACARYON.

Paratur ex Succo putaminum Nucum immaturarum cum æquis Melli partibus ad justam consistentiam cocto.

*Hoc extus unice adhibetur ad Ulcera Oris, Gargarismatibus quoque admiscetur.*

## ROTULÆ vel TABULÆ.

*Canones.*

I. Tabularum, quæ ex Succis desiderantur, parandarum modus optimus is esse videtur, cum succi quantitas, Saccharo cale-



calefacto, adjicitur ea, quæ ad obtinendam consistentiam tenuioris Electuarii requiritur. Drachmæ decem Succi sufficiunt ut plurimum ad octo Sacchari uncias, Miscela dein spatulæ ope super laminam ferream per exiguas portiones ita effunditur, ut Rotularum formam guttæ induant.

II. Ex Pulveribus parant Rotulæ, dum Saccharo ad consistentiam tabulandi cocto Pulvis celeri manu admiscetur; ad unam Sacchari unciam drachma Pulveris una recipi potest.

III. Volatilia, Rotulis si immiscenda sunt, ipso demum materiei in Rotulas efformandæ momento immisceantur.

IV. Mos Rotulas Oleo inungendi, vel Auri Argentive folia ipsi imprimendi, exsolevit.

### ROTULÆ MANUS CHRISTI

*Bergamensium.*

℞. Sacchari albißimi quantum vis:  
Calefacto addatur

Aquæ Rosarum quantum satis:  
Fiant lege artis Rotulæ.

*Quæ infantibus dulcedinis causa exhibentur.*

### ROTULÆ ex SUCCO & ELÆOSACCHARO CITRI *Argentoratensium.*

℞. Sacchari albißimi uncias sedecim:  
Calefactis adjiciantur

Succi Citri uncia duæ cum semisse  
Probe mixtis addantur

Elæosacchari Citri uncia quatuor:  
Fiant lege artis Rotulæ.

*Gratum fallendæ sitis remedium.*

### ROTULÆ contra VERMES *Lentilii.*

℞. Sacchari, cum succo Berberum ad  
consistentiam redacti, unciis qua-  
tuor

Adjiciantur

Mercurii dulcis drachmæ duæ:  
Probe mixta effundantur in Rotulas.

*Ex copiosis Præscriptionibus hanc tam suavitatem quam virtute reliquas superantem selegi.*

### SACCHARUM GLYCYRRHIZATUM

*Helvetorum.*

Videatur Extractum Liquiritiæ Gummosum.

### SACCHARUM CANDUM.

Dissolvatur Sacchari in aqua, evaporetur ad consistentiam Syrupi, asserventur, quæ inde oriuntur, Crystallis. Saccharum quo fuerit depuratius, eo candidus evadet Saccharum Candum. *RUBRUM* surgit ex Saccharo Thomæo.

A conditoribus parari dudum consuevit.

### SACCHARUM HORDEATUM.

℞. Hordei uncias octo:

Coquantur cum

Aquæ fontanæ uncis centum per horæ  
spatium,

Decocto, colato addantur

Sacchari uncia sedecim:

Coquantur donec a spatula defluens  
filum sponte rumpatur, effundatur dein  
in tabulam marmoream Oleo Amygdalarum  
leviter unctam: massa adhuc scindatur,  
& torqueatur in bacillos.

Hordeum, cum pelluciditati officiat,  
vulgo omitti solet.

### SACCHARUM LACTIS *Bartoleti.*

Lactis Vaccini plures libræ

Relinquantur in loco calido, donec  
in suas partes secesserit Lac. Serum tam  
a Cremore, quam a Caseo separetur;  
filtratum coquatur in vase terreo ad decimam  
circiter partem residuam; denuo  
filtratum reponatur ad crystallifandum:  
Crystalli ab ortu flavæ iteratis in aqua  
dissolutionibus, filtrationibus, crystalli-  
factionibus reddantur albißimæ.

Hodie rarius in Pharmacopoliis, fre-  
quentius in montibus, a rusticis operas  
lactarias exercentibus paratur, inde ipsas  
officinas intrat.

*Demulcendi & Relaxandi vim habet.*

SAC.



SACCHARUM PENIDIUM *de Augustis.*

Saccharum coquatur cum Aqua ad consistentiam tabulandi; semirefrigeratum suspendatur ex unco & trahatur perpetuo, quoad albissimum omnisque pelluciditatis expers evaserit; tunc torqueatur in bacillos.

Hoc quoque vulgo a Conditoribus paratur.

SACCHARUM ROSATUM *Mesue.*

Est Conserva Rosarum rubrarum, quod si siccum desideratur, recipi solet CONSERVA ROSARUM SOLIDA *Lemery*, quæ quidem paratur unciis sedecim Sacchari ad consistentiam tabulandi coquendis Pulveris Florum Rosarum rubrarum uncia una adjicienda: ex qua mistura Rotulæ efformantur.

SACCHARUM SATURNI *Hollandi.*

SAL SATURNI *Suecorum.*

Cerussa vel Minium infundatur cum Aceto destillato per aliquot dies in vase clauso; Acetum filtratum leni calore ad cuticulam evaporetur; id in locum temperatum in Crystallos concrescet.

Quamvis a quibusdam ad usus internos commendetur, prudentiores tamen a medicamento maxime ancipiti abstinent. In Aqua solutum vires Aceti Saturni habet, & ad usus externos potest adhiberi.

Rarissime a Pharmacopolis paratur.

SAL ACETI ESSENTIALE *Batei.*

Residuum Aceti destillati aqua solutum & filtratum evaporatur ad cuticulam, & ut in Crystallos concrescat reponitur.

Cum hac ratione nil nisi Tartarus oriatur, hæc preparatio prorsus est superflua, una illa quæ preparari jubetur.

SAL ACETI FIXUM *Batei.*

Quod est ipse Sal Tartari.

Tom. II.

SAL ACETI VOLATILE *Beaumé.*

Exiguæ crystallis Tartari Vitriolati committantur vasi vitreo, irrorentur Aceto concentrato, & vitrum epistomio vitreo exactissime claudatur.

Excitandi ergo naribus Syncopticorum admoveatur.

SAL ACETOSELLÆ *Angeli Sala.*

Exprimatur succus ex largiori copia Herbarum Acetosellæ; clarificetur Albumine Ovi; evaporetur ad quartam partem residuam; reponatur in loco frigido; colligantur crystalli, liquor residuus de novo paulum evaporetur, & sic iteretur operatio, usque dum reliquus succus nullas ulterius crystallos sistat; Crystalli omnes iteratis in aqua solutionibus & filtrationibus reddantur albissimæ.

A quibusdam in vitiis Digestionis aliis medicamentis Stomachicis admisceri solet. Vires ejus medicatæ cum viribus Crystallorum Tartari convenire videntur.

## SAL ALCALI MINERALIS

SAL ALCALI *Seignette.*

R. Sodæ Hispanicæ quantum lubet:

Elixivetur cum aquæ ebullientis quantum sufficiente:

Lixivium secundum artem reducatur in Crystallos.

Easdem vires medicatas edit ac Sal Alkali Vegetabilis.

## SAL CAUSTICUS.

Videatur Lapis Causticus.

SAL CORNU CERVI *Schræder.*

Cornu Cervi in minores partes diffractum aut lima comminutum immittatur Retortæ terreae & adhibeatur ignis apertus; ita obtinetur Spiritus & Oleum; lateribus autem excipuli accrescit Sal, qui oleo mistus, dissolvatur in aqua, filtretur & aqua inde leni calore evaporatur.



*Humores attenuat, Sudorem & Urinam movet, Sanguinem concitat; in usum tamen, nisi sit albissimus, minus fausto omine trahitur. Datur ad scrupulum semis.*

Hunc in modum omnia Salia Volatilia ex partibus Animalium parantur.

### SAL DIGESTIVUS *vel* FEBRIFUGUS *Sylvii.*

### SPIRITUS SALIS MARINI GOAGULATUS *Londinensium.*

Est Sal, qui remanet a destillatione Spiritus Salis Ammoniaci cum Sale Tartari, dissolutione in aqua facta & iusta evaporatione coactus in crystallos.

### SAL *de* DUOBUS.

Videatur Arcanum Duplicatum.

### SAL *per* INCINERATIONEM PARATUS *Tachenii.*

Vegetabili sicco applicatur ignis; dum ardet, probe cavetur, ne flamma furegat, suffocanda, si surrexerit, vel admoto operculo, vel ipsius vegetabilis additamento; cineres hac ratione nati per cribrum transmittuntur; remanentes carbonēs denuo igniuntur, & inde orti cineres prioribus adjiciuntur. Jam vero frigida ipsi affunditur, cum cineribus crebro per vices agitanda; defunditur dein Lixivium; cineres cum nova aqua agitantur, idque continuatur, donec recens affusa aqua nullum amplius inde saporem contrahit; omne hac ratione obtentum Lixivium in vase vitreo leni igne ad ficcitatem evaporatur; Sal ita paratus calcinatur, usque dum albus evadat, in vase probe clauso asservandus.

Cum Medicorum nonnulli inepte fane Sulphur super cineribus deflagrari jusserint, Salem inde Alcalinum in Tartari Vitriolati speciem mutarint, eoque in morem venerit, ut Salia Alcalia sub crystalloꝝ forma in officinis asservarentur, vulgo jam his salibus *ARCANUM DUPLICATUM* solent substituire. Quapropter Medicis Salem Alkali-

num præscripturis ut Salem Tartari jubent recipere, suadendum videtur.

*Ridendi sunt, quotquot de Sale ex planta combusta obtento integras plantæ vires específicas expectant.*

### SAL MARTIS.

Videatur Vitriolum Martis.

### SAL MERCURIALIS ACETOSUS *Vitet.*

℞. Mercurii per Alkali fixum ex Acido Nitri præcipitati & probe edulcorati uncias duas,  
Aceti destillati uncias centum octo & viginti:

Digerantur per triduum in Balneo Mariæ; agitentur crebro; tunc reponantur in locum frigidum & surgentes inde crystallos asserventur.

*Hic Sal in Trochiscos redactus vices PASTILLORUM SIPHYLLITICORUM Keyser commode exsecuturus esse videtur.*

### SAL MERCURIALIS TARTARISATUS *Vitet.*

℞. Mercurii Alkali fixo ex Acido Nitri præcipitati & probe edulcorati uncias duas,

Cremoris Tartari uncias quatuor:  
Triturentur per quatuor horas in mortario lapideo, dein coquantur cum

Aquæ fontanæ unciis octo & quadraginta:

Evaporentur ad lenem cuticulam & hac ratione obtentæ crystallos asserventur.

*Ambo hæc Salia scopo Antisiphylitico ad decem usque grana pro dosi sive aqua soluta, sive Syrupo quodam recepta exhibentur: Vomitum, interdum Ptyalismum excitasse observatum est.*

### SAL MIRABILIS *Glauberi.* SODA VITRIOLATA *Rofforum.*

Est Residuum a destillatione Spiritus Salis aqua solutum & in crystallos coactum.

Ex quo constat, plurimas Aquas, quibus



bus Sal communis excoquitur, Salem vel ipsi saltem analogum largiri, quidquid ejus in officinis prostat indidem excitur. A plerisque Salinis perinde ac ab Aqua marina Sal mirabilis Magnesia prægnans obtineri potest. Salinæ Lotharingicæ purissimum suppeditant.

*Ad aliquot drachmas datus egregie incidit; ad unciam unam aut duas datus Alvum movet, sed tanta dosi ubi exhibetur, larga aquæ copia diluendus est.*

### SAL POLYCHRESTUS Glaferi.

℞. Nitri depurati,

Florum Sulphuris ana partes æquales: Probe mixta ingerantur per vices in crucibulum candens; nova portio, nisi priore detonata, non ingeratur; omnis massa postquam penitus detonaverit, valido igne delineatur, & crebrius ne Sulphur remaneat non destructum agitur, dissolvatur deinde, filtretur & in Crystallos reducat.

*Sal hic minus apte a Lemery denominatus, ratione virium medicatarum Tartaro Vitriolato est simillimus.*

### SAL POLYCHRESTUS Seignette. SODA TARTARISATA vel ALCALI MINERALE TARTARISATUM Sue- corum.

CrySTALLIS Tartari in aqua dissolutis & bullientibus affundatur Lixivium Sodæ aqua frigida factum, usque dum nulla ab affuso surgat amplius effervescentia; Liquor saturatus & filtratus cogatur in crystallos.

*Sali Vegetabili analogus Sal, gustui vero gravior, scopo Alvum ducendi ad sesqui unciam usque exhibetur.*

### SAL SEDATIVUS Hombergii. SAL ACIDUM BORACIS Suecorum.

Boraci in larga aquæ quantitate dissoluto adjiciatur Spiritus Vitrioli, donec Liquor Syrupum Violarum rubro colore infecerit; evaporet, usque dum spicula salina in eodem natare observentur; re-

ponatur tunc in locum frigidum, & colligantur crystallos; evaporatione repetita adhuc aliquid Salis Sedativi, tandem Sal mirabilis Glauberi obtinetur.

*Sali, a Becchero primum annotato, ab Hombergio ad usus medicatos applicato, communi Medicorum consensu vires Anodynæ tribuuntur; quas tamen ego ab istis, quippe erronea veterum Chymicorum theoria deceptis, affectas potius huic sali, quam ab ipsa experientia assertas crediderim.*

### SAL SEDATIVUS MERCURIALIS de Morveau.

Solutioni Mercurii vivi in Acido Nitri dissolutæ, multa aqua dilutæ & filtratæ adjicitur Solutio Boracis, donec nihil ulterius inde præcipitetur; pulvis flavus, qui ad fundum secesserit, probe edulcoretur.

*Ejus Solutio in aqua, cum incommoda unguinosorum non edat, commendatur ad Frictiones, datur quoque interne ad grana duo pro dosi, quotidie augenda. Conferatur Journal de Physique T. IX. p. 348.*

### SAL SUCCINI Agricola.

Rasura Succini committitur Retortæ vitreæ, cujus non ultra dodrantem repleat; applicetur excipulum; instituaturs destillatio ex Balneo Arenæ, obtinetur ita Spiritus & Oleum; parietibus autem excipuli & rostro Retortæ adhærebit Sal; Oleum aqua diluatur, filtretur, & ab Oleo separata aqua lentissimo calore destilletur unde denuo aliquid Salis obtinebitur.

Hic Sal larga copia in Borussia paratur. Ab Oleo ipsi adhærente penitissime depuratur, dum aqua dissolvitur, filtratur, & ut in crystallos abire possit, lenta inde evaporatione aqua dispergitur.

*Hunc Salem Diureticorum & Antihysteriæ principem appellat Boerhave; Incidendo & Resolvendo agere videtur quo magis Oleo est imprægnatus, eo efficacius solida commovet. Datur ad scrupulum dimidium pro Dosi.*



SAL TARTARI *Lullii*.

Sive Residuum a destillatione Tartari, sive Tartarus ipse, in fornace Figuli calcinatus, ope aquæ elixivatur, Lixivium filtratum vel cauto calore in crystallos cogitur, vel inspissatur & in vasis probe clausis asservatur.

*Easdem cum Salibus per incinerationem paratis vires habet; Acrimoniam acidam corrigit; Viscidum resolvit; Obstructa reseruat, Drastica cicurat. Datur ad scrupulum unum multa aqua dilutum.*

SAL TARTARI ESSENTIALIS *Retzii*.  
ACIDUM TARTARI CRYSTALLISATUM *Rosforum*.

Creta in pulverem trita coquatur per semi horam cum larga aquæ quantitate, agiturque crebro spatula; continetur ebullitio, Cremor Tartari per vires adjiciatur, donec prorsus cessaverit effervescentia; refrigeratus liquor decantetur caute; residuo sedimento nova aqua affundatur, agitur, & una cum residuo priori adjiciatur. Hæ aquæ rite evaporatæ largiuntur *TARTARUM SOLUBILEM*. Sedimento eluto & vitro commisso affundatur sensim Spiritus Vitrioli, usque dum novus adjectus nullam ulterius excitet effervescentiam; detineatur mixtura in calore, agitur sæpius per diem; decantetur liquor, residuumedulcoretur; priori liquori adjiciatur aqua; omnis humor leni calore evaporetur ad justum terminum, & crystallos inde oriundæ asserventur.

*Acidum Tartari hac ratione multis partibus oleosis privatum in frigida evadit solubile, linguamque ferit aciditate vividior, quapropter ad usus medicatos præ Cremore commendandum videtur.*

SAL VOLATILE ANGLICUM SIC-CUM *Württembergensium*.

℞. Salis Tartari drachmas sex,

Ammoniaci drachmas duas:

Conterantur & cito includantur vitro epistomio exactissime obturando.

Olei cujuscunque odorati fragrantis admiscere aliquot guttas cui libuerit, licebit.

*In animæ Deliquiis excitandi ergo Nariibus admoveatur.*

## SAL VOLATILE OLEOSUM

*Brandeburgensium.*

℞. Oleorum destillatorum Anisi,

Caryophyllo-  
rum,

Cinnamomi  
ana drach-  
mam semis,

Macis scrupu-  
lum unum,

Zedoariæ,

Succini ana  
scrupulum  
semis:

Mixta digerantur in Cucurbita per tri-  
dum cum

Salis Tartari unciiis sex,

Spiritus Vini unciiis octodecim:

Addantur

Salis Ammoniaci uncia sex:

Destillentur inde uncia decem Liquoris:

*Berolinenses SYLVIVUM præparationem hujus medicamenti in arcanis habuisse, nec nisi cum suis heredibus communicatam voluisse; a quodam vero hærede agonisante manu propria ex autographo exscriptam eam atque proditam esse dicunt. Dum Secta Syl-  
viana floruit, id genus medicamenta magni fiebant; Sal suum Volatile Auctor potissimum ad ciendos Menses laudavit; scopo Carminativo & Resolvente cum Successu datur ad guttas viginti.*

## SAPO CHEMICUS, TARTAREUS

*Starckey.*

℞. Lapidis Caustici unciam unam:

Fundatur igne lenissimo; fuso adjiciantur  
Olei destillati Terebinthinæ uncia  
tres:

Agitentur probe, usque dum Sal omne  
Oleum receperit.

*Absurdissime quidem huic medicamento vi-  
res tribuuntur Drastrictorum & Narcoticorum  
correctrices, unde Correctoris etiam nomen*



accepit, sed cum haud spernendarum virium Resolvendi & Aperienti spem facere videatur, earum a Medicis prudentibus, ut rite fiat periculum, optandum est. Dosis non ultra aliquot grana erit extendenda; neque, qui in locum irritantis multum Olei Terebinthinae aliud mitius substituerit, oleum perdidisse & operam censendus erit.

## SAPO MEDICATUS.

Rx. Salis Caustici unciam unam,  
Butyri Cacao lenissimo calore liquati uncias quatuor: probe terantur.

Cum eximiarum virium sapo sit ad morbos praesertim ab obstructione Viscerum Abdominalium Oriundos, oleum praeterea, quod ad ipsum recipitur, plurimum non ad saporis solum gratiam, sed virium quoque efficaciam conferat, Pharmacopolis utique incumbit, ut illum pro usibus saltem internis ipsi sibi parent.

## SERUM LACTIS Hippocratis.

Rx. Lactis Vaccini uncias octo & quadraginta,  
Ebullientibus adjiciatur

Cremoris Tartari sesqui drachma:  
Liquor coli ope depuratus clarificetur secundum artem, unius ovi albumine, clarificatum filtretur,

*Polychrestum remedium Abstergens, Demulcens, Attenuans datur per cyathos.*

Serum Lactis, in quo Ferrum candens aliquoties fuerit extinctum, CHALIBEATUM appellari & inde Roborantes vires expectari solent.

## SCILLÆ PRÆPARATIO Dioscoridis.

Bulbus Scillæ involvatur pasta ex farina, aqua subacta; coquatur in clibano; tunc rejecta pasta squammæ a se invicem separentur & exsiccentur.

## SIEF ALBUM Rhases.

Rx. Gummi Tragacanthæ drachmam unā,  
Sarcocollæ drachmas tres,  
Cerussæ drachmas decem,

Opīi drachmam semis:

Misceantur & terantur in Pulverem tennerrimum.

*Sief Arabibus Collyrium denotat. Hoc medicamentum lacte aut aqua dilutum in Ophthalmia a Lippitudine acri oriunda Oculo instillari vulgo solet; sed cum veteres æque ac recentiores Medici Opīi usum in Ophthalmia perniciosum esse viderint, illud prudenti consilio omittitur.*

## SOLUTIO MERCURII Plenck.

Rx. Mercurii dulcis uncias duas,  
Aquæ fontanæ uncias triginta sex;  
Coquantur in vase vitreo per horas quadraginta octo:

Filtretur Liquor:

*Laudatur ad Ulcera Venerea purificanda.*

## SOTIRELLA PARVA Mindereri.

Rx. Olei expressi Nucis Moschatæ drachmas duas,  
Opīi Thebaici,  
Specierum Diambrae ana drachmam unam,  
Camphoræ, Pineis tritaë,  
Extracti Croci ana grana duodecim,  
Olei destillati Caryophyllorum guttas triginta:

Misceantur probe.

*Forma pilulae immittitur denti carioso.*

## SPARADRAPUM ALBUM seu TELA Gualterii.

Rx. Emplastrorum Diapalmæ,  
Diachyli ana uncias octo,  
Albi cocti uncias quatuor:

Liquatis immisceantur

Pulveris Iridis Florentinae drachmæ sex, & immittantur linteo detrito ut totum massam Emplastica imbuatur.

*Ad Excoriationes, Lactis coagulati dissolutionem, nec non ad Fonticulos adhibetur.*



SPARADRAPUM *ad* CORPUS CON-  
DITUM INVOLVENDUM *Parisiensium*.

Rx. Cere albae uncias centum viginti & octo:

Liquatis & semirefrigeratis immisceantur

Oleorum Nucis Moschatae expressi unciae octo,

Citri,

Neroli,

Lavendulae,

Thymi ana unciae quatuor,

Ambrae gryseae, Saccharo tritae, grana quindecim,

Moschi grana octo,

Zibethi grana quatuor:

Immittatur linteam, ut fiat Sparadrapum.

SPARADRAPUM *Goulard*.

Rx. Cerae Citrinae uncias nonaginta sex,

Olei Olivarum uncias viginti octo:

Leni calore liquatis adjiciantur sub perpetua agitatione

Extracti Saturni unciae quatuor:

Tandem addatur

Camphorae paulo Olei solutae drachma una:

Fluidae adhuc massae immittantur lintea usu detrita.

*Multum laudatur a Goulard ad discutientes dolores Arthriticos.*

SPECIES.

Hoc nomine medio ævo comprehendebant varii generis Pulveres compositos. Hodie Ingredientia Decoctorum & Infusorum ita appellari solent.

SPECIES AROMATICÆ ROSATÆ

*Gabrielis*.

Rx. Florum Rosarum rubrarum unciam unam,

Radicum Liquiritiæ unciam semis.

Galangæ drachmam semis,

SPECIES.

Lignorum Aloës,

Santali citrini ana fessquidrachmam,

Cinnamomi acuti drachmas duas semis,

Caryophyllorum,

Macis,

Gummi Arabici,

Tragacanthæ ana scrupulos quatuor,

Nucis Moschatae,

Cardamomi minoris ana drachmam semis:

Spicæ Indicæ scrupulum semis:

Misceantur & reducantur in Pulverem.

*A gravioribus morbis convalescentibus Pani tosto, Vino emollito, inspersæ laudantur quidem; sed inconcinnum medicamentum evuluit.*

SPECIES *pro* CATAPLASMATE EMOL-  
LIENTE *Danorum*.

Rx. Herbarum Malvæ,

Althææ ana uncias sex,

Meliloti,

Florum Sambuci uncias octo,

Radicum Althææ uncias decem,

Seminum Fœnugræci,

Lini ana uncias quatuor:

& viginti:

Misceantur, incidantur & contundantur in pulverem crassum.

*Vires ex nomine patent.*

SPECIES CEPHALICÆ *pro* CUCUPHIS  
*Argentoratens*.

Rx. Radicis Ireos Florentinæ uncias tres,

Herbarum Lavendulae,

Majoranæ ana unciam unā,

Lignorum Rhodii,

Santali citrini ana drachmas sex,

Corticum Cinnamomi drachmas duas,

Aurantiorum unciam semis,

Citri unciam unam semis,

Caryophyllorum drachmas duas semis,

Benzoes,



## SPECIES.

Mastychis,  
 Storacis Calamitæ,  
 Succini Citrini ana unciam semis :  
 Mixta contundantur crasse, usufque tem-  
 pore cuiuscunque Olei odorati guttis ali-  
 quot irrorentur.

*Ad roborandum Encephalum adhibentur.*

SPECIES pro DECOCTO ANTINE-  
PHRITICO Foresti.

R. Radicum Petroselini,  
 Radicum Fœniculi ana uncias duas,  
 Liquiritiæ,  
 Iræos Florentinæ ana unciam  
 ucam semis,  
 Florum Malvæ,  
 Althææ ana drachmas sex,  
 Seminum Fœniculi,  
 Saxifragæ ana drachmas sex,  
 Cicerum uncias sex,  
 Jujubarum,  
 Caricarum ana numero triginta,  
 Hordei mundati uncias tres :

Incisa & contusa misceantur:

*Contra Nephritidem & Ardorem Urinæ  
 commendantur.*

SPECIES pro DECOCTO CARMINA-  
TIVO Augustanorum.

R. Radicum Liquiritiæ,  
 Florū Chamomillæ ana drachmas sex,  
 Passularum minorum uncias sex,  
 Seminum Anisi,  
 Dauci,  
 Cumini,  
 Carvi,  
 Fœniculi ana uncias duas,

Incisa & contusa misceantur:

Unciæ duæ decoquantur cum Aquæ un-  
 ciis quindecim.

*Pro Glysmate Flatus pellente.*

SPECIES pro DECOCTO [PECTORALI  
de Augustis.

R. Radicis Liquiritiæ,  
 Herbarum Capilli Veneris ana un-  
 ciam unam,  
 Hyssopi unciam semis,

## SPECIES.

143

Passularum minorum uncias duas,  
 Dactylorum uncias quatuor,  
 Caricarum uncias duas,  
 Siliquarum dulcium,  
 Jujubarum ana unciam unam semis,  
 Hordei mundati uncias duas:

Incisa misceantur.

*In affectibus Pectoris a stricture aut ab  
 acri oriundis cum successu ex aqua decoctæ  
 exhibentur.*

SPECIES pro DECOCTO pro POTU  
INFANTUM Argentoratensium.

R. Rasurarum Cornu Cervi uncias se-  
 decim,  
 Eboris uncias quatuor,  
 Radicum Liquiritiæ uncias duodecim,  
 Polypodii uncias quatuor,  
 Florum Tiliæ uncias duas,  
 Caricarum,  
 Siliquarum dulcium ana uncias octo,  
 Seminum Anisi,  
 Fœniculi ana uncias qua-  
 tuor:

Incisa, contusa misceantur:

*Olim in frequenti apud nos usu erat De-  
 coctum ex his Speciebus paratum; hodie,  
 haud spernendo consilio, infantibus parcius  
 exhibetur.*

SPECIES pro DECOCTO VULNERA-  
RIO.

R. Radicum Enulæ,  
 Symphyti,  
 Tormentillæ,  
 Vincetoxici ana unciam se-  
 mis,  
 Liquiritiæ drachmas sex,  
 Herbarum Alchymillæ,  
 Saniculæ,  
 Plantaginis,  
 Auriculæ muris,  
 Agrimonæ,  
 Sanguisorbæ,  
 Bugulæ,

Herbæ Virgæ Auræ,

Florum Hyperici,

Bellidis ana unciam semis,  
 Seminis Fœniculi drachmas sex:

In-



Incisa, contusa misceantur.

*Laudantur Roborandi scopo in morbis Pectoris.*

SPECIES DIACRETÆ *Aynsichti.*

℞. Cretæ albæ præparatæ unciam unam  
femis,

Nucum Moschatarum drachmas sex,  
Liquiritiæ,

Seminis Cydoniorum ana unciam fe-  
mis,

Boli Armenæ præparatæ,

Coralliorum rubrorum præparatorum  
ana drachmas duas,

Lapidum Carpionum,

Macis,

Mastychis electæ,

Croci Orientalis ana scrupulos qua-  
tuor,

Sacchari albissimi uncias fedecim:

Misceantur & redigantur in Pulverem  
subtilissimum.

*Dantur in ardore Stomachi, Soda dicto,  
ad Sesquidrachmam pro dosi.*

SPECIES DIAIREOS SIMPLICES

*Renodæi.*

℞. Radicum Ireos Florentinæ,

Sacchari candi albi,

Specierum Diatragacanthæ frigida-  
rum ana partes æquales:

Misceantur & redigantur in Pulverem.

*Muci incidendi & Acrimonie demulcen-  
dæ causa Tussi laborantibus exhibentur.*

SPECIES DIAMBRÆ *Mesue.*

℞. Radicum Doronici,

Galangæ ana drachmas tres,

Zinziberis sesqui-drachmā,

Foliorum Malabatri,

Cinnamomi,

Caryophyllorum,

Macis,

Nucis Moschatæ ana drachmas tres,

Spicæ Indicæ drachmam unam,

Cardamomorum minorum,

Lignorum Santali citrini,

Aloës,

Piperis longi ana drachmas duas:

Misceantur & reducantur in Pulverem;  
cui addantur

Ambraæ gryseæ drachma una,

Moschi drachma semis,

Sacchari parum trita:

Omnia probe misceantur.

*Capitis & Ventriculi Roborandi causa olim  
in frequenti usu fuerunt. Dosis ad drach-  
mam semis.*

SPECIES DIATRAGACANTHÆ

*Præpositi correctæ.*

℞. Gummi Tragacanthæ electæ uncias  
duas,

Arabici drachmas decem,

Amyli unciam semis,

Radici Liquiritiæ drachmas duas:

Misceantur; Fiat Pulvis.

*Cum Nicolaus calidas etiam Diatraga-  
canthæ Species præscripsit, in eorum di-  
scrimen hæ FRIGIDÆ dicuntur & in Af-  
fectibus Pectoris ab Acri Demulcendi gratia  
adhibentur.*

SPECIES DISCUTIENTES *Danorum.*

℞. Herbarum Majoranæ,

Menthæ,

Rutæ,

Salviæ,

Florum Lavendulæ,

Meliloti,

Baccarum Juniperi ana partes æquales:

Misceantur & contundantur in grossum  
Pulverem.

*Vires ex nomine patent; applicantur sub  
forma Fomentationis.*

SPECIES EMOLLIENTES *Viennensium.*

℞. Radicum Altææ uncias quatuor,

Herbarum Althææ,

Malvæ,

Acanthi,

Parietariæ,

Violarie ana uncias duas,

Florum Chamomillæ uncias tres:

Misceantur & reducantur in crassum Pul-  
verem.

*Ad Clysmata & Enemata adhibentur.*

SPE-



SPECIES pro EPITHEMATE CORDIS  
*Augustanorum & PULSUUM Argentoratensium.*

Rx. Herbarum Rorismarini,  
Majoranæ,  
Melissæ,  
Florum Cheiri,  
Tunicæ ana unciam semis,  
Lavendulæ,  
Rosarum ana drachmas sex,  
Lignorum Aloës,  
Rhodii,  
Macis,  
Nucis Moschatæ ana drachmas duas,  
Cinnamomi drachmas sex,  
Corticum Citri,  
Aurantiorum ana drachmas tres;

Misceantur & contundantur in grossum Pulverem.

*Roborandi ergo Sacculis ex sindone rubra confectis includebantur, Agonizantibus applicandæ.*

SPECIES pro FOTU AROMATICO  
*Parisiensium.*

Rx. Herbarum Rorismarini,  
Rutæ,  
Salviæ,  
Hyssoپی,  
Lavendulæ,  
Absynthii,  
Origani,  
Thymi,  
Foliorum Lauri,  
Florum Rosarum rubrarum,  
Chamæmeli,  
Meliloti,  
Sambuci,

Salis Ammoniaci ana partes æquales:  
Mixta redigantur in Pulverem crassum:

*Discutiendi ergo commoto Capiti forma Epithematis sicci, sive ex Vino coctæ, instar Fomentationis, imponuntur.*

SPECIES pro FOTU ad COLICAM  
*Palatinorum.*

Rx. Florum Chamomillæ uncias duas,  
Baccarum Juniperi,  
Lauri ana unciam unam,  
Seminum Anisi,  
Fœniculi,  
Carvi,  
Cumini,

Salis Ammoniaci ana unciam semis:  
Misceantur & redigantur in crassum Pulverem.

SPECIES IMPERATORIS *Augustanorum,*

Rx. Cinamomi optimi drachmas decem  
Zinziberis,  
Caryophyllorum ana unciam unam  
semis,  
Galangæ,  
Macis,

Nucis Moschatæ ana drachmas duas:  
Misceantur & redigantur in crassum Pulverem:

*Pro Roborando Ventriculo pani tosto Vinoque macerato insperguntur.*

SPECIES pro ODORAMENTO POT-  
POURRI.

Rx. Florum recentium Rosarum rubra-  
rum unciam se-  
mis,  
Lavendulæ dra-  
chmas duas se-  
mis

Ligni Rhodii unciam semis,  
Radici Ireos Florentinæ uncias duas,  
Herbarum recentium Basilici,

Calaminthæ  
montanæ,  
Majoranæ ana  
drachmas  
duas,  
Menthæ Pipe-  
ritis scrupu-  
los quatuor,  
Origani,  
Polii,

Her-



Herbarum recentium Salviæ,  
Saturejæ,  
Corticum Aurantiorum,  
Citri ana drachmas duas,  
Cinnamomi,  
Summitatum Rorismarini,  
Caryophyllorum,  
Macis ana drachmas tres,  
Foliorum Lauri unciam semis,  
Moschi, Saccharo triti, grana duo,  
Ambra gryseæ, Saccharo trita, grana quatuor:  
Contusa in Pulverem grossum misceantur:  
*Vires ex nomine patent.*

SPECIES RESOLVENTES *Danorum.*

Rx. Herbarum Absynthii,  
Melissæ,  
Menthæ,  
Origani ana uncias quatuor,  
Florum Chamomillæ,  
Sambuci ana uncias tres,  
Baccarum Lauri uncias duas:  
Misceantur & reducantur in Pulverem crassum.  
*Discutiendi scopo sub forma Epithematis vel Fotus applicantur.*

SPECIES TABACI *pro FUMO*  
*Camerarii.*

Rx. Styracis,  
Mastiches,  
Benzoës,  
Succini ana unciam semis,  
Olibani drachmas duas,  
Foliorum Tabaci uncias octo,  
Majoranæ unciam unam,  
Florum Lavendulæ,  
Cyani,  
Rosarum rubrarum,  
Calendulæ ana unciam semis,  
Liliorum convallium,  
Seminum Fœniculi,  
Anisi ana drachmas duas,  
Caryophyllorum Aromaticorum,  
Cubearum ana drachmas tres:  
Incidantur, contundantur & misceantur.

*Laudantur ad Defluxiones Catarrhales & Odontalgiam. Sola Tabaci Folia hodie illis præferuntur.*

## SPECIFICUM ANTEPILEPTICUM

*Welfmann.*

## CUPRUM AMMONIACUM

*Edinburgensium.*

Rx. Vitrioli de Cypro, quantum placet:  
Dissolvatur in aqua; solutio filtretur;  
affundatur

Spiritus Salis Ammoniaci cum Sale Tartari quantum satis ad Saturationem;  
tunc affundatur

Spiritus Vini rectificatissimus, usque dum Liquor totus turbidus evadat;  
CrySTALLI ad fundum secedentes charta bibula exsiccentur, & in vitro probe clauso asserventur.

*Edinburgenses inde ope Micæ Panis PILULAS CÆRULEAS formant.*

Pueris ad grana quatuor, adultis ad novem usque exhibetur & unicam dosin aliquot Epilepticos sanitati restituisse Auctor testatur *N. A. Nat. Cur. T. I. p. 279. & Medical. Comment. by a Society in Edinburg. Vol. VI. 30.*

SPECIFICUM ANTIFEBRILE *Grolii.*

Videantur Conchæ.

SPECIFICUM CEPHALICUM *Michaelis,*  
*ab Augustanis correctum.*

Rx. Cinnabaris factitiæ uncias tres,  
Radicum Pæoniæ unciam unam semis,  
Lapidis Smaragdi præparati drachmas duas,  
Ungulæ Alcis drachmam unam,  
Cranii humani,  
Coralliorum rubrorum,  
Cornu Cervi sine igne præparati ana scrupulos duos,  
Unicornu marini,  
Margaritarum,  
Succini ana scrupulum unum:  
Misceantur, redigantur in Pulverem tenuerrimum.

*Ad affectus Capitis, Spasmos, Convulsiones*



## SPIRITUS.

*nes præscribitur, quo vero successu? experti norunt prudentes.*

### SPECIFICUM FEBRIFUGUM Graanii.

Videatur Regulus Antimonii Medicinalis.

### SPECIFICUM JALAPPINUM Argentoratenſium seu SPECIES DIAJALAPPÆ Bartholini correctæ.

℞. Resinæ Jalappæ, nucleis Pineis tri-  
tæ, unciam unam semis, Cremoris  
Tartari uncias duas semis:

Misceantur exactissime.

*Radici Jalappæ, cujus incerta semper do-  
sis est, Resinam substituendam duximus, &  
hic saltem minus efficaci Tartaro Vitriolato  
Cremorem Tartari substituimus. Potest ad  
drachmam semis pro dosi dari.*

### SPIRITUS ABSTRACTITII SIMPLICES.

Parantur in modum Aquarum abstra-  
ctitiarum, loco Aquæ Spiritum Vini re-  
cipiendo & destillando usque dum Phleg-  
ma prodeat; ex tempore quoque sur-  
gunt, dum Oleum odoratum in Spiritu  
Vini rectificato dissolvitur; illius ratio-  
nem determinabit odor.

### SPIRITUS BALSAMI PERUVIANI

*Hoffmann.*

℞. Balsami Peruviani uncias duas,

Salis Tartari unciam unam:

Probe mixtis adjiciantur

Spiritus Rosarum unciae duodecim:  
Abstrahatur Spiritus.

*Hoffman Observat. Physic. Chym. L. I.  
Observ. 23. hunc Spiritum non modo a sa-  
poris gratia virtuteque Analeptica commendat,  
sed Diureticam quoque ejus virtutem laudat.*

### SPIRITUS BEZOARDICUS Buffii.

℞. Spiritus Eboris uncias duas,

Salis Ammoniaci Succinati un-  
cias duodecim,

Vini rectificati uncias trigin-  
ta & sex,

## SPIRITUS.

147

Olei de cedro drachmas duas:

Misceantur probe.

*Valide Sudorem & Urinam movet; olim  
multum ad promovendam Exanthematum  
eruptionem laudabatur; datur ad guttas tri-  
ginta.*

### SPIRITUS CARMINATIVUS Sylvii.

℞. Radicum Imperatoriæ,  
Galangæ ana drachmam  
unam semis,

Radiceis Angelicæ drachmam unam,

Herbarum Rorismarini,

Majoranæ,

Rutæ,

Basilici,

Florum Centauri minoris ana drach-  
mas duas,

Baccarum Lauri drachmas tres,

Seminum Angelicæ,

Levistici,

Anisi ana unciam semis,

Zinziberis,

Nucum Moschatarum,

Macis ana drachmam unam semis,

Cinnamomi drachmas sex,

Caryophyllorum,

Corticum Aurantiorum ana drach-  
mam unam semis,

Incisis & contusis affundantur

Vini albi generosi unciae quadragin-  
ta octo,

Spiritus Vini rectificati unciae duo-  
decim:

Digerantur per biduum, tunc destillen-  
tur ad dimidias.

*Ad discutiendos Flatus & dissipanda, quæ  
inde oriuntur, incommoda ad semiunciam  
exhibetur.*

### SPIRITUS CARMINATIVUS de TRIBUS.

Videatur Spiritus Nitri dulcis.



## SPIRITUS COCHLEARIÆ

*Parisiensium.*SPIRITUS COCHLEARIÆ COMPOSITUS *Brunsvicensium.*

℞. Foliorum recentium Cochleariæ uncias octoginta,  
Radicum Raphani rustici recentium uncias decem:

Minutim concisa infundantur per nyctemerum cum

Spiritus Vini unciis nonaginta sex :  
Instituatur destillatio, usque dum liquor albescent prodeat.

*Aqua temperatus hic Spiritus Collutorio scopo ad vitia Oris Scorbutica adhibetur.*

SPIRITUS CORNU CERVI *Mæbii.*

℞. Cornu Cervi in minora frusta comminuti quantum placet;

Immittatur in Retortam terream; cui juncto vesicæ ope excipulo, instituatur igne nudo destillatio. Hoc negotio Spiritus, Oleum, ac Sal Volatilis obtinebitur. Filtri ope Spiritus ab Oleo, ipsi innatante, curate separandus est.

*Dissolvendo humores & solida stimulando Excretiones promovet aquosas. Datur ad scrupulum unum.*

## SPIRITUS de TRIBUS.

Videatur Mixtura simplex.

SPIRITUS JASMINI *Beaumé.*

℞. Olei Jasmini uncias sedecim,  
Spiritus Vini rectificati uncias octodecim:

Misceantur; crebro concutiantur; exponantur frigori, quo Oleum consistat & supernatet Spiritui; Liquor defundatur.

*Ad odora menta exhibetur.*

SPIRITUS *Mindereri.*

## MIXTURA SALINA VOLATILIS

*Suecorum.*

℞. Spiritus Salis Ammoniaci cum Sale Tartari; cui instilletur

Aceti vulgaris quantum satis ad Saturationem:

Liquor filtretur.

*Resolvendi & Excretiones aquosas promovendi causa laudatur. Dosis ad drachmam dimidiam.*

## SPIRITUS NITRI.

Videatur Aqua fortis.

SPIRITUS NITRI DULCIS *Snellen.*

NAPHTA NITRI *Kunckell.*

SPIRITUS ÆTHEREUS NITRATUS

*Suecorum.*

℞. Alcoholis vini uncias quatuor:

Immittantur in vitrum amplum epistomio vitreo obturandum & glaciei immersum: affundantur tum

Spiritus Nitri fumantis uncia duæ:  
Claudatur vitrum; elapsis aliquot horis adjiciatur iterum

Spiritus Nitri fumantis uncia semis:  
Obturetur vitrum, negotiumque hoc repetatur post aliquot horarum intervalum, donec Naphta liquori supernatet, hæc ubi apparuerit, affundatur adhuc

Spiritus Nitri semiuncia:

Elapsis aliquot horis infundibuli ope Naphta a liquore, cui supernatat, separetur, larga aquæ copia diluatur, & adjecto ipsi Alkali, usque dum nulla ulterius effervescencia surgat, omne quod ipsi adhæret acidum inde auferatur. Distilletur tunc lenissimo igne aqua, quæ Naphtam habet, ex cucurbita, donec ista omnis in excipulum descenderit, & Naphta inde separata vitro optime clauso asservetur. Liquori acido, ex quo Naphta surrexerat, addatur Alcoholis quadrupulum & destilletur ex cucurbita, quoad liquor destillans acidum sapiat, & sub nomine SPIRITUS NITRI DULCIS asservetur.

*Respectu virium cum Liquore Anodyno convenit; multum scopo Carminativo laudatur; gratiæ ergo Julapiis adjicitur; datur ad drachmam semis; optime substituitur SPIRITUI CARMINATIVO DE TRIBUS.*



SPIRITUS NITRI FUMANS *Glauberi.*

℞. Nitri depurati uncias duas & triginta:

Retortæ immixtis per vices affundantur  
Olei Vitrioli unciae sedecim:

Instituatur destillatio ex Balneo Arenæ,  
Spiritus hac ratione obtentus vitro probe clauso asservetur. Residuum est *TARTARUS VITRIOLATUS* five *NITRUM VITRIOLATUM* *Londonensium.*

Paratur pro preparatione Spiritus Nitri Dulcis.

SPIRITUS ad PERNIONES *Darelii.*

℞. Spiritus Vini Camphorati uncias tres,  
Salis Ammoniaci unciam unā,

Petrolei nigri unciam unam semis:  
Misceantur.

*Vires ex nomine patent.*

SPIRITUS SALIS AMMONIACI TARTARISATUS. *Pharmacopæe Bateanæ.*  
ALCALI AMMONIACUM AQUOSUM  
*Suecorum.*

℞. Salis Ammoniaci uncias sedecim,  
Cinerum clavellatorum uncias quadraginta octo:

Mixta destillantur Retorta, excipulo veficæ opè munita;

Liquori obtento adjiciantur

Aquæ fontanæ unciae quadraginta & octo:

Asservetur cum Crystallis destillatione obtentis.

Si liquor urinosus diluitur,

Aquæ fontanæ unciis sedecim,

Spiritus Vini rectificati unciis triginta duabus,

Surgit *SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.*

Egregium medicamentum pro attenuandis Humoribus, Asthmaticis multum commendatur; Diureticos quoque & Diaphoreticos effectus edit, nec minus egregie a Vipera morsis conducit. In Odontalgia & qualicunque Animi deliquio naribus admoventur. Dosis est ad scrupulum unum.

## SPIRITUS SALIS AMMONIACI

*cum CALCE VIVA Glauberi.*

*SPIRITUS SALIS AMMONIACI CAUSTICUS Meyeri vel AMMONIACUM ALCALI VOLATILE CAUSTICUM Suecorum ALCALI FLUOR Rossorum.*

℞. Salis Ammoniaci uncias sedecim,  
Calcis vivæ pulverisatæ uncias quadraginta octo:

Celerrime mixta committantur Cucurbitæ Alembico & excipulo instructæ; ope caloris balnei eliciatur Spiritus, qui vulgo Aquæ unciis triginta dilui solet.

*Medicamentum antecedente multo vehementius rarissime interne datur; scopo quoque Excitandi priore longe efficacius, hinc non bene in officinis dilutum proflare jubetur.*

## SPIRITUS AMMONIACI OLEOSI.

Spiritus Salis Ammoniaci Vinosi unciae uni addatur

Olei odorati scrupulus dimidius,  
Spiritus Vini rectificati paululo dissolutus.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SUCCINATUS *Augustanorum. Eau de Luce.*

Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce viva uncias quatuor,

Olei destillati Succini grana octo, dissoluta

Spiritus Vini rectificatissimi uncia semis.

*Hic Spiritus præcipue contra affectus Capitis Catarrhales efficacior esse putatur, quam Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce viva simplex.*

Observetur quod Rosi Spiritus Salis Ammoniaci *LIXIVIA ALCALINA* appellant.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS *Basilii. Valentini.*

℞. Salis communis partem unam,  
Argillæ albæ partes tres:

Misceantur & destillantur ex Retorta terrea, igne nudo.



*Internus ejus usus rarissimus, externus ad Perniones commendabilis esse perhibetur.*

## SPIRITUS SALIS DULCIS.

Rx. Spiritus Salis fumantis uncias octo,  
Alcoholis uncias sex:  
Misceantur & destillentur ex cucurbita;  
liquor destillatus denuo ex Retorta len-  
nissimo igne destilletur & asservetur *NAPHTA SALIS COMMUNIS* quæ inde  
prodit: hujus uncia una misceatur cum  
Alcoholis unciis quatuor pro SPIRITUS  
SALIS DULCI.

*Qualicunque alia ratione parati Spiritus  
Salis dulcis eminet aciditas. Hoc vero me-  
dicamentum cum reliquorum acidorum dulci-  
ficatorum viribus congruit.*

## SPIRITUS SALIS FUMANS Glauberi.

Rx. Salis communis uncias triginta duas:  
Affundantur sensim

Olei vitrioli uncia sedecim, diluta  
Aquæ unciis duodecim:  
Instituatur destillatio ex Balneo arenæ,  
Paratur proxime præcedentis laboris ergo.

## SPIRITUS SAPONIS.

Rx. Saponis Veneti uncias quatuor,  
Salis Tartari uncias duas:  
Probe tritis adjiciantur  
Spiritus Vini rectificati uncia duo-  
decim,  
Quintæ Essentiæ Bergamotte drach-  
ma semis,  
*Discutiendi scopo multum laudatur.*

## SPIRITUS SUCCINI.

Videatur Sal Succini.

## SPIRITUS SULPHURIS.

Is cum sub destillatione Vitrioli ultro  
obtaineatur, cur potius per ambages &  
cum dispendio, Sulphur nimirum sub  
campana accendendo ortosque inde va-  
pores colligendo parari debeat, non  
video.

*Spiritus Vitrioli aqua dilutus, foetido huius  
medicamento prudenter substituitur.*

## SPIRITUS SULPHURIS VOLATILIS

*Beguini.*

Rx. Salis Ammoniaci uncias octo,  
Calcis vivæ uncias duodecim,  
Florum Sulphuris uncias quatuor:  
Misceantur, & destillatione inde elicitus  
Spiritus asservetur.

*Scopo medicato, quamvis ab Hoffmanno  
laudatus, non adhibetur. Detegendo Vini per  
Plumbum mangonio præcipue inservit.*

SPIRITUS TARTARI Lullii.  
ACIDUM TARTARI DESTILLATUM

*Suecorum.*

Paratur ex Tartaro eodem modo, quo  
Spiritus e lignis elici suo loco docui-  
mus.

## SPIRITUS VINI ALCALISATUS

*Libavii.*

Alcoholi quantæ libuerit copiae im-  
mittatur Sal Tartari, usque dum ulte-  
rius immixtus non liquetur.

*Ad extrahendas & solvendas Resinas ad-  
hibetur.*

## SPIRITUS VINI CAMPHORATUS

*Cordi.*

## ESSENTIA CAMPHORÆ Quercetani.

Rx. Spiritus Vini rectificati uncias se-  
decim,  
Camphoræ unciam unam,  
Solutio asservetur.

*Polychrestum medicamentum est, quo Di-  
scutiendi ergo solent uti.*

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS  
CROCATUS AQUA PESTILEN-  
TIALIS Hartmanni.

Rx. Spiritus Vini Camphorati uncias duo-  
decim,  
Essentiæ Croci scrupulum unum:  
Misceantur.



## SPIRITUS.

*Ratione virium ab antecedente vix differre videtur.*

### SPIRITUS VINI LOTUS Kunckelii.

Rx. Spiritus Vini Tartarifati,  
Aquæ fontanæ ana partes æquales:  
Destillatione eliciatur Alcohol sincerissimum.

### SPIRITUS VINI RECTIFICATUS *Hollandi.*

Spiritus Vini quantum lubuerit:  
Destilletur, donec lactescentes prodeant guttæ.  
Liquor residuus *PHLEGMA* dicitur.

### SPIRITUS VINI TARTARISATUS *Lemery.*

Est Spiritus Vini Alcalisatus ex Cucurbita destillatus.

### SPIRITUS VITRIOLI.

Rx. Olei Vitrioli partem unam,  
Aquæ fontanæ partes tres:  
Sensim sensimque misceantur.

### SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Videatur Liquor Anodynus.

### SPODIUM.

Videatur Ebur albumustum.

### SPONGIÆ PRÆPARATÆ Danorum.

Spongiæ finissimæ probe exsiccatae, in laminas sectæ immittantur Cera flavæ, igne liquata exprimat inde torcularis ope Cera excedens.

*Pro Turundis dilatatoriis adhibentur.*

### SUCCI EXPRESSI.

Vegetabile recens incisum & contusum immittatur sacco linteo, exprimat torculari succus, qui per subsidiam

## SPIRITUS.

151

defæcatus clarificetur Albumine ovorum & si per aliquod tempus sit asservandus, committatur vitro angustioris colli, superfusoque ipsi paululo olei Amygdalarum vitrum exactissime obturetur.

### SUCCI ANTISCORBUTICI Danorum.

Rx. Herbarum recentium Cochleariæ partes duas,

Beccabungæ,  
Nasturtii Aquatici,

Pedunculorum recentium Taraxaci,  
Pulpæ recentis Aurantiorum ana partem unam:

Incisa committantur prelo.

### SULPHUR AURATUM ANTIMONII *Basil. Valentini.*

Aqua, cujus ope Hepar Antimonii fuerit edulcoratum, reponatur per aliquot menses, defundatur ab impuro, quod ad fundum deposuit, *Sulphure*; affundatur ipsi Acetum, quoad istius ope nihil ulterius præcipitetur; pulvis ad fundum desidens probe edulcoratus servetur.

*Eximium medicamentum ad humorum Spissitudinem attenuandam. Datur ad granum unum.*

### SUPPOSITORIA Gaubii;

Rx. Salis communis unciam unam,  
Saponis Veneti uncias duas,  
Mellis ad consistentiam spissam cocti quantum satis:  
Formentur coni, basis rotundæ & variæ magnitudinis.

*Ad reserandam Alvum oleo inuncta intruduntur ano.*

## SYRUP I

*Canones.*

I. *Συρμα Actuarii*, qui ea barbare Syrupos dici monet, sunt liquores in spissitudinem minorem quam saparum, ope Sacchari sive Mellis condensati.

II. Pro



II. Pro parandis ex Succis, aliisque coctionem non admittentibus Syrupis, illis dissolvendum Sacchari purissimi duplum, paratusque hoc modo Syrupus colandus erit.

III. Syrupi Aromatici optime parantur Elæosacchara dimidio aquæ dissolvendo.

IV. Reliqui Syrupi Saccharo cum Decocto, quod *BRODIFUM* dicunt; ad justam consistentiam coquendo; Albumine deinde Ovorum clarificando perque pannum trajiciendo conficiuntur.

V. Optima ex Floribus parandi Syrupos ratio ea est, qua Floribus recentibus adjicitur Sacchari ad consistentiam tabulandi cocti duplum; cuncta per duodecim fere horas digestionem frigidæ relinquantur; leni dein calore foveantur; linteo immittuntur, torcularique denique exprimitur desideratus Syrupus.

#### SYRUPUS ALTHÆÆ *Fernelii.*

℞. Radicum Althææ,  
Graminis,  
Asparagi,  
Glycyrrhizæ,  
Herbarum Althææ,  
Parietariæ,  
Sanguisorbæ,  
Plantaginis,  
Rutæ murariæ,  
Capilli Veneris ana drachmas tres,

Passularum minorum unciam semis,  
Cicerum rubrorum unciam unam:

Incisa & contusa coquantur ex  
Aque fontanæ unciis quadraginta, ad residuum unciarum triginta:

In colatura dissolvantur

Sacchari uncia quinquaginta:

Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui Clarificatus asservetur.

*Proprie quidem contra affectus Nephriticos commendatur, sed Demulcentium quoque remedium vicem sustinet haud penitentiam.*

#### SYRUPUS AMYGDALINUS HORDEATUS *Parisiensium.* EMULSIVUS vulgo.

℞. Amygdalarum dulcium uncias decem,  
Amararum uncias sex,

Aquæ fontanæ uncias quatuor & quadraginta:

Paretur secundum artem Emulsio:

Addantur Sacchari albi uncia octoginta:

Instituatur coctio ad consistentiam Syrupi: Colato addantur

Aquæ Florum Naphæ uncia duæ.

#### SYRUPUS de AMMONIACO *Klein.*

℞. Gummi Ammoniacy uncias duas:

Dissolvantur in

Aquæ Hyssopi,

Vini albi ana unciis quinque:

Solutio colata misceatur cum

Sacchari albi ad consistentiam tabulandi cocti unciis sedecim:

Agitentur ad refrigerationem usque.

*Egregium Medicamentum Resolvens.*

#### SYRUPUS ANTISCORBUTICUS

*Parisiensium.*

℞. Succor. nō defæcat. Folior. Cochleariæ,  
Beccabungæ,  
Nasturtii aquatici,

Radicum Arinoraciæ  
ana uncias  
duodecim,

Aurantiorum amarorum  
uncias viginti,

Corticum Aurantiorum amarorum recentium unciam unam:

Misceantur & digerantur frigide in cucurbita probe clausa aliquoties succutienda, donec fæces subsederint, id quod ut plurimum duodecim demum horis elapsis accidere solet; liquor clarus filtretur, mensuretur, committatur denuo cucurbitæ;

Adjiciatur ipsi.

Sacchari albissimi duplum:

Solutione leni calore peracta adjiciantur  
Spiritus Cochleariæ,

Aquæ Cinnamomi ana uncia una:

A fæcibus denuo subsidentibus decantetur Syrupus & asservetur in Vitris probe clausis.



## SYRUPUS.

*Præter Antiscorbuticas, Diureticas quoque, Emenagogas, & Humores Depurantes vires edit.*

### SYRUPUS BALSAMICUS Hoffmanni.

℞. Julepi Rosarum uncias duodecim,  
Spiritus Balsami Peruviani drachmas  
tres;

Misceantur.

*Roborandi Ulcerumque internorum curan-  
dorum causa adhibetur.*

### SYRUPUS BALSAMI TOLUTANI Klein.

℞. Sacchari albi uncias triginta duas,  
Aque fontanæ uncias viginti:  
Brevi coctione ad spissitudinem reda-  
ctis, colatis & semi refrigeratis immi-  
sceantur, assidue agitando.

Balsami Tolutani drachmæ sex cum  
Sacchari albi sesquiuncia in pul-  
verem tritæ.

*Efficacia virium antecedenti par, gratia  
saporis superior est.*

### SYRUPUS BOYLEANUS.

℞. Radicis Symphyti recentis uncias sex,  
Herbæ Plantaginis majoris uncias tres:  
Ex contusis exprimatur torculari Succus,  
cui per subsidentiam depurato addatur  
Sacchari æquum pondus:

Coquatur ad consistentiam Syrupi, qui  
clarificatus & colatus fervetur.

*Commendatur maxime Hæmoptysi labo-  
rantibus, nec inefficax erit in aliis quoque  
Evacuationibus.*

### SYRUPUS BYZANTINUS Mesue.

℞. Succor. depurator. Apii,  
Endiviæ ana un-  
cias quatuor &  
viginti,  
Buglossi,  
Lupuli ana uncias  
duodecim,

Sacchari albi uncias octo & quadra-  
ginta:

Tom. II.

## SYRUPUS.

153

Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui  
clarificetur & coletur.

*Ad morbos ab obstructione Viscerum Ab-  
dominalium cum successu adhibetur; olim con-  
tra Febres pertinaces commendari solebat.*

### SYRUPUS CHINÆ Lemery.

℞. Corticum Chinæ crasse contusorum  
uncias quatuor,

Vini rubri uncias duas & triginta:  
Infundantur per biduum in vase probe  
clauso:

Liquore filtrato dissolvantur

Sacchari albi uncia sexaginta.

*Contra Febres & morbos Putridos in usus  
trahitur.*

### SYRUPUS CICHOREI CUM RHABAR- BARO. Poterii.

℞. Radicum Cichorei uncias duas cum  
semisse:

Coquantur cum

Aque fontanæ unciis octodecim,

Ad residuum unciarum duodecim:

In colatura infundatur per noctem,

Rhabarbari minutim incisi uncia una,  
Salis Tartari scrupulus unus:

Colaturæ adjiciantur

Sacchari albi uncia viginti duæ:

Denuo coletur.

*Infantibus maxime Evacundi scopo exhi-  
betur.*

### SYRUPUS CITRI E TOTO Dorncrellii.

℞. Flavedinis Corticum Citri recentium  
uncia duas semis:

Infundantur per noctem in

Succi Citri recentis unciis quatuor  
& viginti:

In colatura dissolvantur

Sacchari albi uncia quadraginta;

Colatus Syrupus fervetur.

*Ad fallendam Sitim, sedandum æstum,  
arcendam Putredinem merito commendabilis.*



SYRUPUS CORALLIORUM *Quercetani.*

℞. Coralliorum rubrorum in pulverem  
redactorum uncias duas,

Succi Berberum uncias duodecim:

Post digestionem aliquot dierum colentur:  
In colatura dissolvantur

Sacchari albi unciae viginti:

Colatura fervetur.

*Coralliorum nihil subit hunc Syrupum,  
SYRUPUS BERBERUM omnino postpo-  
nendum.*

## SYRUPUS CORTICUM CITRI

*Serapionis.*

℞. Flavedinis Corticum Citri recentium  
uncias quatuor,

Granorum Chemes drachmas tres,

Vini albi generosi uncias duodecim:

Macerentur per viginti quatuor horas  
in vase probe tecto:

Liquor filtratus commisceantur cum

Sacchari albillimi ad consistentiam Ta-  
bulandi cocti unciis octodecim.

*Refocillandi & Roborandi causa adhibetur.*

SYRUPUS DIACODII, DIACODIUM  
LIQUIDUM *Montani.*

℞. Capitum Papaveris uncias duas,

Siliquarum dulcium uncias duas semis:

Minutim incisa coquantur cum

Aquæ fontanæ unciis octodecim,

Ad residuum unciarum decem: sub fine  
coctionis addantur

Liquiritiæ recentis minutim incisæ  
uncia una semis:

In colatura dissolvantur

Sacchari albi unciae sedecim:

Coquantur ad consistentiam Syrupi; qui  
clarificatus asservetur.

*Sopiendæ Tussi conducit.*

SYRUPUS DOMESTICUS *vel de SPINA  
CERVINA Val. Cordi.*

℞. Succi baccarum Rhamni Cathartici  
depurati uncias viginti,

Sacchari albi uncia duas & triginta,

Zinziberis,

Cinnamomi,

Caryophyllorum ana drachmam unā  
semis,

Maſtychis,

Seminis Anisi ana drachmas tres:

Paulisper coquantur, clarificentur & fer-  
ventur.

*Alvum ducit, urinam ciēt, Hydropicis  
& Arthriticis datur cum ſucceſſu ad unciam  
unam pro doſi.*

SYRUPUS EMETICUS *Brandeburgensium.*

℞. Vitri Antimonii Hyacinthini drach-  
mas duas,

Vini albi generosi uncias duodecim:  
Stent in Digestione per triduum; filtratis  
dissolvantur

Sacchari albi unciae quatuor & vi-  
ginti:

Semel ebulliant & colentur.

*A drachmis ſex ad unciam pro doſi datur.*

SYRUPUS EMETICUS *Glauberi.*

℞. Florum Antimonii unciam unam,

Cremoris Tartari uncias duas,

Sacchari uncias ſex:

Coquantur per ſex horas cum

Aquæ fontanæ unciis octoginta:

Filtrentur & evaporentur ad consisten-  
tiam Mellis.

Addantur Spiritus Vini rectificati unciae  
ſedecim:

Per decem horas digerantur & leni igne  
evaporentur ad consistentiam Syrupi

*Scopo Emetico guttæ aliquot miſceantur  
cum aqua & ſingulo horæ dimidio repetun-  
tur, quoad deſideratus ſurgat, effectus.*

## SURUPUS EMULSIVUS.

Videatur Syrupus Amygdalinus.

SYRUPUS *de ERYSIMO Lobelii.*

℞. Radicum Enulæ recentium unciam  
unam,

Iræos Germanicæ uncias  
tres,

Ra-



# SYRUPUS.

Radicum Liquiritiæ,  
 Farfaræ ana unciam unam,  
 Herbarum Erysimi manipulos decem,  
 Borraginis manipulos septem,  
 Farfaræ,  
 Polytrichi,  
 Hyssopi recentis ana ma-  
 nipulos sex,  
 Endiviæ,  
 Borraginis,  
 Moldaviæ ana manipulos  
 quatuor,  
 Marrubii recentis,  
 Scabiosæ,  
 Cardui benedicti ana ma-  
 nipulos duos;  
 Chamædryos,  
 Violarie,  
 Betonicæ ana sesqui mani-  
 pulum,  
 Thymi,  
 Florum Violarum,  
 Borraginis,  
 Buglossi,  
 Rosarum,  
 Stæchados ana manipulum  
 unum,  
 Salviæ Pugillos duos,  
 Passularum minorum,  
 Caricarum ana uncias sex,  
 Baccarum Lauri,  
 Seminum Anisi,  
 Fœniculi,  
 Carvi,  
 Cumini ana unciam femis,  
 Hordei unciam unam:

Incisa & contusa coquantur cum  
 Aquæ unciis ducentis,  
 Ad residuum unciarum centum & quin-  
 quaginta:  
 Colatis adjiciantur  
 Succus Erysimi depurati,  
 Aceti ana uncia duodecim,  
 Mellis uncia sex & triginta,  
 Sacchari albi uncia nonaginta sex:  
 Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui  
 clarificatus asservetur.

*Magnopere laudatur pellendis affectibus  
 Pectoris Pituifosis; contra Raucedinem pecu-  
 liariter efficax fertur.*

# SYRUPUS.

155

## SYRUPUS GLYCYRRHIZÆ *Mesue.*

R. Radicum Liquiritiæ uncias duas.  
 Herbarum Capilli Veneris unciam unam,  
 Hyssopi unciam femis:  
 Incisa infundantur cum  
 Aquæ fervidæ unciis quatuor & vi-  
 ginti,  
 Colatis dissolvantur.  
 Mellis uncia octo,  
 Sacchari albi uncia sedecim:  
 Coquantur ad consistentiam Syrupi, cui  
 clarificato adjiciantur  
 Aquæ Rosarum uncia quatuor.  
*In morbis Pectoris adhibetur.*

## SYRUPUS HORDEATUS.

Videatur Syrupus Amygdalinus.

## SYRUPUS HYSSOPI *Zovæferi.*

## SYRUPUS SCILLITICUS *Suecorum.*

R. Squillæ præparatæ unciam unam,  
 Foliorum Hyssopi uncias duas,  
 Zinziberis unciam femis:  
 Incisa macerentur in vase clauso per  
 nycthemerum cum  
 Aquæ Hyssopi unciis sex & triginta.  
 Colatura expressa & per subsidentiam  
 depurata dissolvantur  
 Sacchari albissimi uncia sex & tri-  
 ginta.  
*Resolvendi ergo cum Successu ad morbos  
 Pectoris mucosos adhibetur.*

## SYRUPUS de JUJUBIS *Mesue.*

R. Jujubarum uncias tres,  
 Radicum Liquiritiæ,  
 Herbarum Capilli Veneris,  
 Hordei mundati ana unciam unam:  
 Incisa, contusa coquantur cum  
 Aquæ unciis quadraginta quatuor,  
 ad triginta sex uncias residuas:  
 Sub finem coctionis adjiciantur  
 Florum Violarum uncia quinque:  
 Colatura Emulgeantur  
 Seminum Malvæ uncia quinque,  
 Cydoniorum,



Seminum Papaveris albi,  
 Melonum,  
 Lactucæ ana drachmæ tres:  
 Colatura dissolvantur  
 Sacchari uncia viginti & quatuor,  
 Gummi Tragacanthæ drachmæ tres:  
 Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui  
 edulcoratus asservetur.  
*Conducit Demulcendo in Tussi sicca.*

## SYRUPUS LONGÆ VITÆ.

Videatur Syrupus Mercurialis.

## SYRUPUS de MANNA Echholdi.

℞. Radicum Polypodii drachmas sex,  
 Ireos Florentinæ unciam semis,  
 Passularum drachmas tres,  
 Mellis uncias quatuor,  
 Aquæ fontanæ uncias quatuor & viginti:  
 Incisa coquantur ad residuum unciarum  
 duodecim:  
 In Colatura infundantur per noctem  
 Florum quatuor Cordialium ana. pugillus unus,  
 Foliorum Sennæ sine stipitibus uncia  
 una semis,  
 Cinnamomi drachma semis:  
 Colatis dissolvantur  
 Mannæ Calabrinæ uncia tres,  
 Sacchari uncia duodecim:  
 Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui  
 clarificatus fervetur..  
*Datur infantibus scopo Purgandi, neque  
 perperam ad affectus Pectoris pituitosos ad-  
 hibetur.*

## SYRUPUS MERCURIALIS, PROPHYLACTICUS LONGÆ VITÆ.

*Zvvingeri.*

℞. Radicum recentium Gentianæ uncias  
 quatuor,  
 Ireos nostratis  
 uncias octo:  
 Incisæ infundantur cum  
 Vini albi unciis octo & quadra-  
 ginta,

Infundantur per quatuor & viginti ho-  
 ras:

Colaturæ addantur

Succorum Mercurialis uncia nona-  
 ginta,  
 Borraginis,  
 Buglossi ana uncia quatuor  
 & viginti,

Mellis albi uncia duæ & triginta:  
 Coquantur ad Syrupi consistentiam, qui  
 clarificatus fervetur.

*Zvvinger Acad. N. C. Dec. III. Vol. 7.  
 & 8. p. 18. hujus Syrupi in talia quam  
 maxime celebrati insignem sibi quoque pro-  
 batam efficaciam in præcavenda Vertigine,  
 Arthritide, Podagra, Hemicrania periodica,  
 Cardialgia, Dolore Ischiadico, Phthisi, Hy-  
 drope, Obstructionibus, Alvi constipationi-  
 bus aliisque morbis quam plurimis, maximo-  
 pere commendat, documentique loco duo re-  
 fert exempla hominum, qui ejus usu vitam  
 ultra centum annos extenderunt. Prophyla-  
 ctico scopo quotidie mane ejus cochlear unum  
 hauritur.*

## SYRUPUS de NICOTIANA Quercetani.

℞. Succi Nicotianæ uncias octo & qua-  
 draginta,  
 Oxymellis Simplicis uncias quatuor,  
 Hydromellis uncias duodecim:  
 Digerantur in loco tepido per quatuor  
 dies, liquor clarus a facie decantetur,  
 eique adjiciantur  
 Sacchari uncia octo & quadraginta.  
*Valide Mucum resolvit. In Astmate pi-  
 tuitoso ad unciam semis cum successu exhi-  
 betur;*

## SYRUPUS PAPAVERIS ALBI, CONFECTIO DIACODION. Galeni.

℞. Caputum Papaveris albi uncias octo,  
 Aquæ uncias octo & quadraginta:  
 Decoquantur ad dimidium:  
 Colaturæ addantur  
 Sacchari uncia quadraginta:  
 Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui  
 clarificatus fervetur.  
*Lene Anodynum medicamentum datur ad  
 unciam semis pro dosi.*



SYRUPUS RUBI IDÆI *cum ACETO*  
*Beaumé.*

℞. Succī Rubi Idæi uncias quadraginta,  
Aceti rubri uncias quatuordecim,  
Sacchari albi uncias centum:

Clarificatus Syrupus asservetur.

*Syrupus palato gratissimus fallendæ siti inservit. In morbis Inflammatoriis multum conducit.*

SYRUPUS SCELOTYRBATICUS *Foresti.*

℞. Succorum Nasturtii Aquatici,  
Beccabungæ ana uncias sex,  
Fumariæ,  
Lupuli ana uncias tres,

Sacchari albi uncias sedecim:

Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui asservetur clarificatus.

*Adhibetur ut plurimum ad medicamenta stomachica.*

SYRUPUS *de* SPINA CERVINA.

Videatur Syrupus Domesticus.

SYRUPO E SYMPHITO *Fernelii* optime substituitur SYRUPUS BOYLEANUS.SYRUPUS VIPERARUM *Parisiensium.*

℞. Viperarum, Capitibus & Caudis abscissis & Intestinis exsectis numero duodecimi,

Radicum Chinæ,

Sarsaparillæ ana unciã unã:

Incisa coquantur cum

Aquæ unciis quatuor & sexaginta,

Ad residuum unciarum triginta:

Colaturæ clarificatæ addantur

Liquoris unciæ decem, quæ priores prodeunt dum ex

Cucurbita abstrahuntur

Vini albi generosi,

Aquæ Florum Naphæ ana unciæ quatuor & sexaginta,

Ligni Santali citrini,

Cinnamomi ana uncia una,

Cardamomi minoris,

Nucis Moschatæ,

Ligni Aloës ana drachmæ tres:

In Liquoribus commixtis dissolvantur

Sacchari albissimi unciæ octoginta:

Syrupo refrigerato admisceatur

Tincturæ Ambre uncia una.

*Multum commendatur hic Syrupus ad refocillandas vires gravibus morbis aut abusu Veneris fractas.*

TABULÆ *vel* TABELLÆ.

Videantur ROTULÆ & TROCHISCI.

TABULÆ ALIMENTARIÆ *Beaumé.*

℞. Pedes Vitulinos quatuor,

Carnis de femore Bovis centum nonaginta & duas uncias Carnis de femore posteriore Vervecis centum & sexaginta uncias,

interno Vituli uncias quadraginta octo:

Incisa coquantur leni igne cum Aquæ quantitate sufficiente: Decoctum despumatur & exprimitur per pannum: caro quæ remanet iterum cum aquæ idonea quantitate coquitur, despumatur, exprimitur: Jus expressum priori additur; a jure refrigerato pinguedo aufertur eique adjicitur Salis quantitas, quæ sufficit: Colatur per pannum & leni calore ad consistentiam Gelatinæ spissæ evaporatur, quæ super lapidem effunditur & in tabulas secatur calore leniori exsiccandas, & in vitro probe clauso asservandas.

*Pro Jure ex tempore parando dissolvuntur aqua.*

TARTARUS CHALYBEATUS *Angeli*  
*Salæ.*

℞. Cremoris Tartari uncias sedecim,  
Limaturæ Ferri uncias quatuor:

Coquantur per integram horam cum

Aquæ fontanæ quantitate sufficiente:

Liquor filtratus redigatur in Crystallos.



*Aperiendi scopo datur ad scrupulum unum in largiore aqua copia dissolutus.*

TARTARUS EMETICUS *Macquer.*

## TARTARUS ANTIMONIALIS

*Suecorum.*

℞. Mercurii Vitæ uncias quatuor cum dimidia,

Cremoris Tartari uncias decem:

Coquantur in Vase vitreo cum

Aquæ unciis centum:

Solutio filtrata evaporetur ad siccitatem.

*Emeticum vulgatissimum, cujus Dosis ad grana tria extenditur.*

TARTARUS SOLUBILIS seu TARTARISATUS *Barchhusen.*ALCALI VEGETABILE TARTARISATUM *Suecorum.*

℞. Cremoris Tartari quantum placet:

Aqua dissoluto & ebullienti adjiciatur

Salis Tartari quantum satis ad saturationem:

Liquor filtratus evaporetur ad cuticulam, asserventur Crystalli.

*Ob indolem Saponaceam, qua gaudet, in attenuanda Spissitudine mucosa & aperiendis Obstructionibus reliqua quoque Salia media vincit. Datur hoc scopo ad drachmam unam, Purgandi autem sine ad unciam unam.*

## TARTARUS VITRIOLATUS

*Tachenii.*

ALGALI VEGETABILE VITRIOLATUM *Suecorum.*

Vitriolo viridi in larga Aquæ quantitate dissoluto adjiciatur

Solutio Cinerum clavellatorum, usque dum nova hujus Solutionis portio ex illo liquore nihil ulterius dejiciat, nec cum eo effervescat; defundatur liquor a Terra metallica, quæ inde secesserit; evaporetur ad cuticulam; filtretur; in locum frigidum reponatur; Crystalli hac ratione ortæ, si levissimum qualiscunque coloris vestigium habent, denuo fervi-

da dissolvantur, & affusa adhuc Solutione Cinerum clavellatorum ab omni, quod ipsis accreverit, heterogeneo liberentur.

Hoc labore Pharmacopœi commode superfedere possunt, quippe qui eundem omnino Salem sub nomine *Arcani duplicati* asservant.

*Incidendi & Excretiones aquosas permovendi ergo exhibetur.*

TERRA FOLIATA TARTARI *Lullii.*ARCANUM TARTARI *Zwælfser.*OXYTARTARUS *Suecorum.*TARTARUS REGENERATUS *Tachenii.*

℞. Salis Sodæ uncias duodecim:

Affundatur Aceti destillati quantum satis ad saturationem:

Evaporetur ad cuticulam; filtretur & redigatur in Crystallos: si recipiendus est Sal Tartari, liquor evaporetur ad consistentiam Syrupi, tunc exsiccetur leni calore, ut in formam Foliatam concrescat.

*Ob indolem Saponaceam inprimis inter Aperientia militat. Datur ad Drachmam unam.*

Medicamentum non minore tantum sui pretio, sed virium quoque præstantia commendandum auctore *Boerhaave* paratur Cineres clavellatos Aceto crudo saturando, liquorem filtrando & leni calore inspissando.

THERIACA *Andromachi.*

Videatur sub Electuariis.

THERIACA COELESTIS *Hoffmanni.*

℞. Myrrhæ electæ unciam semis,

Galbani,

Mastyches,

Opoponacis ana scrupulos duos,

Storacis drachmas tres,

Extractorum Cardui benedicti,

Centaurii minoris,

Scordii,

Tormentillæ,

Contrajervæ,



## TINCTURA.

Extractorum Angelicæ ana unciam  
femis,  
Opium drachmas sex,  
Croci,  
Vincetoxici,  
Valerianæ,  
Gentianæ,  
Aristolochiæ rotundæ  
ana drachmas tres,

Resinarum Ligni Aloës,  
Guajaci,  
Ladani ana drachmam  
unam,  
Bezoardici mineralis,  
Cinnabaris factitiæ,  
Succini præparati,  
Pulveris Viperarum ana  
unciam femis,  
Saliū Volatilium Succini,  
Cornu  
Cervi  
ana  
Drach-  
mam  
unam  
femis,

Oleorum destillatorum  
Cinnamomi,  
Zedoariæ,  
Cardamomi,  
Cubebarum,  
Macis,  
Caryophyllorum,  
Juniperi,  
Citri ana guttas  
duodecim,

Olei expressi Nucis Mos-  
chatae,  
Balsami Peruviani ana  
drachmas tres,  
Camphoræ,  
Ambrae gryseæ ana scrupulum unum:

Misceantur secundum artem in Massam digitis non adhærentem.

*Primus Quercetantis de medicamento famosæ Theriacæ analogo, & magis quidem concentrato sollicitus erat. Quæ sub Ejus nomine prostat, quæque post eum sunt divulgatæ descriptiones, una alteram absurditate vincunt. Quæ hic traditur, quamvis & ip-*

## TINCTURA.

159

*sa admodum inconcinna, reliquis tamen omnino præstat. A quibusdam albus scopo Antiseptico & Anodino usurpatur. Drachma una quatuor circiter grana Opium continet.*

## TINCTURÆ.

### Canones.

I. Tincturis Spirituosis simplicibus parandis affunduntur uncia uni substantiæ extrahendæ, comminutæ, cucurbitæque immixtæ Spiritus Vini rectificati uncia duodecim; cucurbitæ imponitur alembicus; continuatur per aliquot dies digestio calore Balnei Mariæ instituta; quæ quidem durante cucurbita aliquoties succutitur: Spiritus qui per Alembicum destillavit, cucurbitæ rursus committitur, & post sufficientem digestionem Tinctura per filtrum depuratur.

II. Pro Tincturis Aquosis requiruntur ad unciam Vegetabilis unam affundendæ Aquæ ebullientis uncia octo; Digestio fiat in vase clauso super cineribus calidis per noctem; liquori postridie mane filtrato adjiciantur Olei Vitrioli scrupuli duo; Tinctura tamen Rhabarbari hic excipienda, quippe quæ nullum Acidum admittit, atque ob id ipsum vix per aliquot dies asservari potest.

III. Tincturæ Resinosæ citra Resinæ turbationem, cum Aqua misceri non possunt. Resina, antequam Spiritus Vini ipsi affunditur, pauxillo Salis Tartari teritur.

## TINCTURA ALEXIPHARMACA

*Huxham.*

Videatur ESSENTIA CHINÆ.

TINCTURA AMARA *Londinensium.*

Videatur ELIXIR STOMACHICUM.

TINCTURA ANTIMONII ACRIS

*Hoffmann.*

R. Reguli Antimonii uncias quatuor,  
Nitri crudi uncias octo:

PUL-



Pulverifata detonentur; relinquantur in fusione per integram horam; effundantur in mortarium & cum constiterint, mox redigantur in pulverem, qui immittatur

Spiritus Vini rectificatissimi unciiis duodecim:

Digerantur per aliquot dies calore balnei arenæ, & filtretur Tinctura ruberrima.

Si Spiritus Vini prius Saponis unciiis duabus in lixivio Caustico solutis & de novo inspissatis per biduum digeritur, surgit TINCTURA ANTIMONII SAPONATA Schulzii & saturiore colore & majoribus viribus gaudens.

*Multum laudatur a Virtute Resolvente, sed in Spissitudine Humorū uti medicamento Alcohol continente, quod Humores serosos cogit, ego quidem non auderem.*

Cl. Dehne, laudanda omnino encheiresi, jubet ab hac Tinctura Spiritum usque ad consistentiam spissi Extracti abstrahere, & hoc deinde in Aqua dissolvere.

#### TINCTURA ANTIMONII TARTARIZATI Basilii Valentini.

℞. Pulveris Antimonii unciam unam, Cinerum clavellatorum uncias tres: Fundantur in Crucibulo; effundantur in mortarium, & quamprimum constiterint, redigantur in Pulverem, qui fervens adhuc immittatur in

Spiritus Vini rectificatissimi uncias quatuor & viginti: Post digestionem aliquot dierum filtretur Tinctura.

*Huic Tincturæ, uti verum Sulphur Antimonii inhaeret, ita efficacior, quam antecedenti virtus Resolvens inesse videtur. Sed quæ ad illam monuimus, huc quoque pertinent.*

#### TINCTURA ANTIVENEREA Falcbii.

℞. Mercurii sublimati scrupulum unum: Dissolvatur in

Spiritus Vini rectificati uncia una: Addantur

Balsami Canadensis,  
Gummi de Guajaco ana uncia una,  
Dissolutis in

Spiritus Vini Rectificati unciiis septem, & filtratis:  
Adjiciantur

Olei destillati Sassafras drachmæ duæ:  
Vitrum succutiendo dissolvendæ.

*Hoc Medicamento, cujus decem ad viginti guttæ in vehiculo aquoso mane & sub vesperam exhibentur, inveteratos etiam Venereos morbos felicissime curari Auctor monet, & illud contra alias quoque Acrimonias commendat.*

#### TINCTURA AURI Geoffroy. AURUM POTABILE Helvetii.

℞. Auri per Antimonium depurati drachmam unam,

Aqua Regis unciam unam:  
Solutioni affundantur

Olei destillati Rorismarini uncia duæ:

Relinquantur in quiete, quoad Aquæ Regis flavedo prorsus evanuerit, abforpta quippe ab Oleo ipsi supernatante:

Hoc jam dissolvatur

Spiritus Vini rectificatissimi unciiis octo.

*Cum Aurum nullius sit in Corpus humanum efficacie, quem alium hæc Tinctura quam Aquæ Regiæ Hungariæ valde concentratæ effectum edere possit, non video. Dissis est ad guttas decem.*

#### TINCTURA BEZOARDICA Michaelis.

℞. Radicum Zedoariæ Uncias duas,  
Angelicæ,  
Pimpinellæ,  
Valerianæ,  
Vincetoxici,  
Calami Aromatici ana unciam unam,  
Costi,  
Flavedinis Corticum Citri recentium,  
Baccarum Juniperi ana uncias duas,

Myr-



## TINCTURA.

Myrrhæ uncias tres,  
Herbarum Scordii,  
Melissæ,  
Millefolii,  
Rutæ ana unciam semis,  
Spiritus Vini simplicis uncias duas  
& septuaginta:  
Digerantur in Cucurbita per octiduum;  
tunc addantur  
Theriacæ Andromachi uncia fede-  
cim:  
Destillatione eliciantur Spiritus uncia  
quatuor & viginti, quibus addantur  
Spiritus Tartari uncia sex,  
Vitrioli uncia tres:

Dissolvatur his

Camphoræ uncia una.

*Ex copiosa, quæ apud Auctores occurrunt,  
Bezoardicum Tincturarum tribu, hanc unam  
produco, cui in Febris putridis locus esse  
subtile possit. Dosis est ad Drachmam di-  
midiam.*

## TINCTURA CORALLIORUM

*Kunrath.*

℞. Coralliorum rubrorum uncias duas:  
Dissolvantur

Aceti crudi quantitate sufficiente:  
Solutio leni calore inspissetur; Sali in-  
spissato affundantur

Spiritus Vini uncia sex:  
Digerantur per aliquot dies; Tinctura  
filtretur.

*Ex istis Corallii in hanc Tincturam ne-  
hilum quidem penetrare, ægrique somniis si-  
millimas esse miras, quæ inde Paracelsistæ  
olim ostentabantur virtutes, suo itaque me-  
rito nostra ætate ejus usum evulnise, quis  
non videt?*

## TINCTURA LACCE Danorum.

℞. Gummi Lacce a baculis abradi un-  
ciam unam,

Aluminis crudi sesqui drachmam,  
Aquarum Salviæ uncias tres:

Rosarum unciam unam fe-  
mis:

Coquantur ad Extractionem Tincturæ ru-  
bræ, quæ filtretur.

Tom. II.

## TINCTURA.

161

*Ad Laxitatem & Cruentationem Gingi-  
varum adhibetur.*

## TINCTURA MARTIS APERITIVA AROPH PARACELSI, Zuccolferi.

℞. Florum Salis Ammoniaci Martialium  
unciam unam;

Spiritus Vini rectificatissimi uncias  
quatuor:

Digerantur per quatuor & viginti ho-  
ras; filtrentur.

*Ejus Virtuti Aperienti sit sua laus; sed  
Flores Salis Ammoniaci Martiales citra ul-  
lam præparationem exhiberi eandem præsta-  
bunt.*

## TINCTURA MARTIS APERITIVA Glauberi.

℞. Vitrioli Martis uncias quatuor,  
Cremoris Tartari uncias octo:

Coquantur cum

Aquæ unciis centum

Ad consistentiam mellaginis; immittan-  
tur cucurbitæ & affundantur

Spiritus Vini simplicis uncia sexa-  
ginta,

Florum Papaveris Rhœados manipu-  
lus unus:

Post aliquot dies Digesta filtrentur.

*Vulgo a Ludovici solet denominari a  
Glaubero jam in Philosoph. Ofen. II. Cap.  
70. descripta. Tonico scopo a gravioribus  
morbis reconvalescentibus ad drachmam di-  
midiam cum Aqua Cinnamomi exhibetur.*

## TINCTURA MARTIS CYDONIATA, POMATA &c.

℞. Extracti Martis Cydoniati, Poma-  
ti &c. unciam unam:

Dissolvatur

Aquæ fontanæ unciis duodecim:

Filtrentur.

*Valide adstringit: datur ad drachmam  
unam pro Dosi.*



## TINCTURA MARTIS HELLEBORATA

*Vvedelii.*

℞. Tincturæ Martis Aperitivæ Glanberi  
uncias quatuor:

In quibus dissolvantur

Extracti Hellebori nigri drachmæ  
duæ:

Solutio filtrata fervetur.

*Ad aperienda Viscera Abdominalia datur  
ad drachmam unam pro Dosi.*

## TINCTURA MARTIS Zvælfæri.

℞. Terræ Foliæ Tartari nigræ uncias  
tres,

Vitrioli Martis uncias duas:

Redigantur cum

Aquæ quantitate sufficiente

In pastam, cui per aliquot dies asserva-  
tæ affundantur

Spiritus Vini uncia quatuor & vi-  
ginti:

Per tres dies in Balneo Mariæ digestæ  
filtrentur.

*Cum antecedente usu suo coincidit.*

## TINCTURA METALLORUM Mats.

℞. Reguli Antimonii Martialis uncias  
duas,

Cupri,

Stanni Anglici ana unciam unam:

Cupro in crucibulo fluenti adjiciantur  
duo reliqua Metalla: Metallum refrige-  
ratum redigatur in Pulverem & com-  
misceatur cum

Nitri unciis duodecim:

Detonentur & post detonationem per  
integram adhuc horam detineantur in  
fluxu; tunc effundatur massa, & quam  
primum constiterit, reducatur in Pulve-  
rem immittendum

Alcoholis Vini unciis viginti:

Ex Digestione calida orta Tinctura fil-  
tretur.

*Hoc medicamentum, cum suam virtutem  
perinde ac Tinctura Antimonii acris solum-  
modo Nitro caustico debeat, ejusdem plane  
cum ista tenoris esse censendum est.*

## TINCTURA RHABARBARI

INFUSUM RHEI SALINUM *Suecorum.*

℞. Aceti vulgaris uncias novem:  
Saturentur

Salis Tartari quantitate sufficiente:

Liquor saturatus digeratur cum

Rhabarbari minutim contusi uncia  
una:

Duodecim horis post filtretur.

*Egregium ad reserandas Obstructiones ab-  
dominales restituendamque Digestionem Me-  
dicamentum. Exhibetur ad unciam semis  
pro dosi.*

## TINCTURA SALINA Danorum.

℞. Corticum Aurantium recentium,  
Radicum Gentianæ ana uncias tres:  
Concisa infundantur

Aquæ fontanæ unciis sex & triginta,  
Salis Tartari unciis duodecim:

Digerantur per quatrimum; Colatis ad-  
dantur

Spiritus Vini rectificati uncia octo-  
decim:

Filtrentur.

*Aperiendi scopo in Obstructionibus Visce-  
rum Abdominalium ad drachmas duas pro  
dosi datur.*

## TINCTURA STOMACHICA Danorum.

℞. Radicum Calami aromatici,  
Gentianæ ana sesquiunciam,  
Corticum Chinæ uncias duas,

Aurantiorum recentium,

Herbæ Cardui benedicti,

Summitatum Centauri minoris ana  
unciam unam,

Limaturæ Martis in petia ligatæ un-  
cias duas:

Incisa digerantur frigide cum

Vini albi unciis centum:

Post triduum filtrentur.

*Ventriculi roborandi causa sumitur ad unum  
Cyathum, una ante prandium hora.*



TINCTURA STOMACHICA *Whytt.*

℞. Radicis Gentianæ,  
Corticum Aurantiorum ana fefqui-  
unciam,  
Chinæ Chinæ uncias qua-  
tuor:

Incifa digerantur per fex dies in Balneo  
arenæ cum

Spiritus Vini rectificati unciis octo &  
quadraginta:

Filtrentur.

*Hujus Tincturæ Cochlear unum, aquæ  
Cochlearibus fex dilutum, mane & vefperi  
exhibetur in languore Ventriculi. Contra Ar-  
thritidem quoque ufus ejus laudatur, per  
plures menses continuandus.*

TINCTURA SULPHURIS *Zwælfperi.*

℞. Florum Sulphuris unciam unam,  
Salis Tartari uncias duas:  
Mifceantur, fundantur & cum confite-  
rint, reducantur in Pulverem commit-  
tendum

Spiritus Vini rectificatiffimi unciis  
octo:

Post digeftionem aliquot dierum filtre-  
tur Tinctura.

*Commandatur adverfus Scabiem aliofque  
morbos ab Humoribus acribus oriundos. Datur  
ad guttas fexaginta.*

TINCTURA TARTARI *Raymundi  
Lullii.*

℞. Salis Tartari uncias octo,  
Calcis vivæ uncias tres:  
Fundantur in Crucibulo per integram  
horam; effundantur & fimulac confite-  
rint, reducantur in Pulverem commit-  
tendum

Spiritus Vini rectificatiffimi unciis  
quatuor & viginti:

Post Digeftionem aliquot dierum filtre-  
tur Tinctura.

*Viribus cum Tinctura Antimonii acri con-  
venit.*

TRAGEA ALBA *Argentoratensium.*

℞. Radicum Liquiritiæ,  
Ireos Florentinæ ana dra-  
chmas tres,  
Gummi Arabici unciam unam,  
Tragacanthæ unciam femis,  
Amyli uncias quinque,  
Sacchari uncias fedecim:

Mifceantur & reducantur in Pulverem.

*Demulcendi ergo in morbis ab Acrioriun-  
dis exhiberi potest. Olim frequens ejus apud  
noftates ufus erat in Torminibus infantum  
arcendis & curandis.*

## TRAGEA AROMATICA.

℞. Cinnamomi drachmas duas,  
Zinziberis drachmam unam,  
Caryophyllorum aromaticorum,  
Calangæ minoris,  
Granorum Paradifi,  
Macis,  
Nucis Mofchataæ ana drachmam fe-  
mis:

Mixta reducantur in Pulverem crassiu-  
sculum, cui admifceantur

Pulverum Santali rubri drachmas fex,  
Sacchari unciaæ fedecim.

*Ventriculum roborandi ergo pani tofto Vi-  
no rubro madenti infpergitur. Dofis. ad un-  
ciam dimidiam extenditur.*

TRAGEA GRANORUM ACTES  
*Wolffii.*

Succo baccarum Sambuci imbuatur Fa-  
rina Secalina, ex qua bene depfta for-  
mentur parvi panes in furno ad duri-  
tiem coquendi; cocti redigantur in pul-  
verem, iterum Succo baccarum Sambu-  
ci imbuendum, depfendum, in panes  
formandum, quibus coctis, in pulverem  
trititis, quin tertia etiam vice toto ne-  
gotio repetito, adjiciatur obrento deni-  
que pulveri ponderis ejus octava pars  
de Nuce Mofchata in pulverem trita.

*Olim hujus Medicamenti drachmæ duæ  
exhibebantur Dysentericis; hodie evuluit.*



TRAGEA OPHTALMICA *Heisteri.*

℞. Millepedum  
Seminum Anisi,  
Fœniculi ana unciam di-  
midiam,  
Radiciſ Valerianæ drachmas duas,  
Cinnamomi,  
Cubëbarum ana drachmam unam,  
Sacchari albi uncias duas:  
Redigantur in pulverem & misceantur.  
*Attenuandis Humoribus Oculorum adhibe-  
tur.*

## TROCHISCI.

Ex quocunque Pulvere formari pos-  
sunt, siquidem ipsi ea, quæ par est,  
quantitas Mucilaginis Tragacanthæ ad-  
jicitur, ut massa inde surgat digitis non  
adhærens. Hujus massæ particulæ in or-  
biculos formatæ, alterutri superficiëi qua-  
licunque signo impresso, appellantur *Tro-  
chisci* sive *Tabellæ*, in aliam qualemcum-  
que formam coactæ *Pastilli*.

TROCHISCI ALBI *Rhasis* vulgo COL-  
LYRIUM ALBUM *Rhases.*

℞. Cerussæ albæ drachmas decem,  
Sarcocollæ drachmus tres,  
Amyli drachmas duas,  
Tragacanthæ drachmam unam,  
Opii drachmam unam:  
Misceantur in Pulverem.  
*Parisini Opio Camphoram substituunt.  
Extus contra Ophthalmiam adhibetur.*

TROCHISCI ALHANDAL *Mesue.*

Ex Pulpa Colocyinthidis, cortice fe-  
minibusque rejectis addita Mucilagine  
Tragacanthæ Trochisci formantur. Hodie  
pulvis ipse hoc nomine asservatur, cum  
quæ a virulentia medicamentorum me-  
tuuntur noxæ, prudenti potius admini-  
stratione Medici, quam remediis cor-  
rigentibus sunt avertendæ.

TROCHISCI ALIPTÆ *Nicolai.*

Eis substituuntur TROCHISCI FUMALES.

## TROCHISCI ALKERMES

*Argentoratensium.*

℞. Confectionis Alkermes completæ dra-  
chmam una semis,  
Coccionellæ pulverisatæ grana quin-  
que,  
Salis Tartari grana tria,  
Sacchari albi uncias tres,  
Mucilaginis Tragacanthæ quantū fatis:  
Misceantur & fiant lege artis exigui Tro-  
chisci.

*Cardiaco & Cephalico scopo nec non ad  
corrigen- dum Oris factorem adhibentur.*

TROCHISCI sive TABULÆ ALTHÆÆ  
*Parisiensium.*

℞. Radicum Althææ unclam unam,  
Ireos Florentinæ drachmam  
unam;  
Sacchari albissimi uncias sedecim:  
Misceantur, redigantur in pulverem &  
Mucilaginis Tragacanthæ quantum  
fatis  
Fiant Trochisci.

*Cum Pasta Althææ quoad Vires conveniunt.*

TROCHISCI BECCHICI ALBI *Valeri  
Cordi.*

℞. Pulveris Radiciſ Ireos Florentinæ un-  
cias duas,  
Amyli uncias duas, semis  
Pulveris Sacchari albissimi uncias qua-  
tuor & viginti,  
Mucilaginis Tragacanthæ quantum  
fatis  
Fiant lege artis Trochisci.  
*Exhibentur Tussientibus.*

## TROCHISCI BECCHICI CITRINI

*Hamburgensium.*

℞. Radiciſ Liquiritiæ unciam unam,  
Crocī drachmam unam,

Sac-



## TROCHISCI.

Sacchari albissimi uncias sedecim:  
Pulveriscentur, misceantur & cogantur cū  
Mucilagini Tragacanthæ quanto suf-  
ficiente in Trochiscos.  
*Resolvendi vim habent majorem etiam,  
quam proxime prædicti.*

## TROCHISCI BECCHICI NIGRI *Hamburgensium.*

℞. Radicum Ireos Florentinæ uncias tres,  
Liquiritiæ,  
Seminum Anisi,  
Fœniculi ana uncias quin-  
que,  
Succi Liquiritiæ uncias novem,  
Styracis Calamitæ unciam unam,  
Sacchari albi uncias sex & nonaginta:  
Pulveriscentur, misceantur additaque  
Mucilagine Tragacanthæ  
In Trochiscos efformentur.  
*Supra prolatis omnibus efficaciares sunt.*

## TROCHISCI CYPHEOS *vulgo* CYPHOIDES *Galli.*

℞. Pulpæ Passularum uncias duas cum  
dimidia,  
Terebinthinæ Chiæ drachmas sex,  
Gummi Bdellii unciam semis,  
Myrrhæ,  
Ligni Aloës,  
Croci,  
Cinnamomi,  
Spicæ Indicæ,  
Cassie lignæ ana drachmam unam,  
Schoenanthi drachmas tres,  
Calami Aromaticis drachmas duas,  
Mellis uncias quinque,  
Vini Græci quantum satis:  
Misceantur.

*Hoc Medicamentum eo, quod in compo-  
sitiones, quæ a Veteribus ad nos descenderunt,  
etiamnum recipi solet, hic præterire nolui.*

## TROCHISCI ESCHAROTICI *Parisiensium.*

℞. Minii unciam semis,  
Mercurii sublimati corrosivi unciam  
unam,

## TROCHISCI. 165

Micæ panis recentis uncias quatuor:  
Optime mixta cogantur in Pastillos gra-  
num Avenæ æquantes.  
*Cathartico scopo a Chirurgis adhibentur.*

## TROCHISCI FUMALES *Schræderi.*

℞. Florum Rosarum rubrarum unciam  
unam,  
Ligni Rhodii drachmas sex,  
Caryophyllorum drachmas duas,  
Benzoës uncias sedecim,  
Styracis uncias septem,  
Sacchari uncias octo:  
Pulveriscentur, misceantur; fiant cum Mu-  
cilagine Tragacanthæ Trochisci.  
*Vires ex nomine patent.*

## TROCHISCI HEDYCHROI *Magni.*

℞. Radicum Calami aromatici,  
Phu,  
Costi,  
Asari,  
Schoenanthi,  
Cassie lignæ ana drachmas sex,  
Ligni Aloës sesquunciam,  
Cinnamomi,  
Cardamomorum excorticatorum ana  
uncias tres,  
Herbarum Majoranæ,  
Mari veri ana sesquiunciā,  
Spicæ Indicæ uncias duas,  
Foliorum Malabatri,  
Gummi Mastichis ana drachmas sex,  
Myrrhæ uncias tres,  
Croci sesquunciam,  
Balsami de Meccha drachmas sex,  
Vini Græci quantum satis pro for-  
mandis Trochiscis:  
*Ingrediuntur Theriacam.*

## TROCHISCI HERMETICI *Secretæ.*

℞. Mercurii dulcis drachmas quinque,  
Cinnamomi acuti grana quadraginta,  
Resinæ Jalappæ Pineis tritæ, grana  
quinque & septuaginta,  
Sacchari albi sesquiunciam:  
Exactissime trita redigantur cum  
Mucilagine Tragacanthæ in Trochi-  
scos centum.



*Scopo Anthelmintico dantur Infantibus, ut plurimum eorum ætati numero adequato, sed ultra decem non augetur numerus.*

### TROCHISCI sive MUSCERDÆ CATECHU.

*Rx.* Pulverum Terræ Catechu unciam unā,  
Sacchari unciam semis,  
Caryophyllorum scrupulum unum,

Quintæ Essentiæ Citri scrupulum semis:  
Misceantur & redigantur ope Mucilaginis Tragacanthæ in Pastillos teneros, oblongos.

*Detinentur sub lingua Fætori animæ aver-tendo.*

### TROCHISCI DE NITRO.

*Rx.* Nitri depurati unciam unam;  
Sacchari albi uncias sex,  
Succi Citri unciam unam:

Misceantur & cum Mucilagine Tragacanthæ redigantur in Trochisco.

*Cum summo successu ad sedandum Ardorem Sanguinis & mitigandam Tussim ad-bibentur.*

### TROCHISCI PECTORALES REGII Danorum.

*Rx.* Succi Liquiritiæ,  
Sacchari ana unciam unam,  
Extracti Opii grana quatuor:  
Pulverisentur; misceantur exactissime & formentur in Trochiscos granum Piperis æquantes.

*Egregie contra Tusses spasmodicas conducunt.*

### TROCHISCI seu ROTULÆ BECCHICÆ Parisiensium. CONFECTIO DE REBECHA.

*Rx.* Pulverum Ireos Florentinæ,  
Gummi Arabici ana unciam semis,  
Liquiritiæ unciam unam semis,  
Sacchari albillimi uncias octo & quadraginta:

Misceantur, additaque Mucilagine Tragacanthæ, ope Aquæ Florum Naphæ parata, fiant vel Trochisci vel Pastilli.

*A Tussientibus in usum trahuntur.*

### TROCISCI REFRIGERANTES.

*Rx.* Nitri depurati unciam unam,  
Salis Acetofellæ unciam semis,  
Sacchari albillimi uncias sex,  
Quintæ Essentiæ Citri scrupulum semis:

Misceantur & cum Mucilagine Tragacanthæ redigantur in Trochiscos.

*Apprime Refrigerant & Sitim sedant.*

### TROCHISCI DE SCILLA Damocratis.

Scillæ præparatæ, antequam ejus lamellæ exsiccatae fuerint, admisceatur Farinæ Ervi tantundem & formentur Pastilli.

*Ingrediuntur Theriacam.*

### TROCHISCI VIPERINI Andromachi.

Viperæ capite & cauda truncatæ, detracta cute & rejectis visceribus coquantur ex aqua, cui aliquantulum Foliorum Anethi & Salis cibarii fuerit immissum, usque dum caro a spina secefferit, hæc caro contusa cum Panis Siliginei ea, qua par est, quantitate in Trochiscos formetur.

*Recipiuntur in Theriacam.*

### TRYPHERA MAGNA Galeni.

*Rx.* Opii uncias duas,  
Cinnamomi,  
Caryophyllorum,  
Galangæ,  
Spicæ,  
Zinziberis,  
Costi,  
Styracis,  
Calami aromatici,  
Cyperi rotundi,  
Ireos Florentinæ,  
Nostratis,  
Peucedani,



## VINUM.

Mandragoræ,  
Lavendulæ,  
Rosarum,  
Piperis,  
Anisi,  
Apii,  
Fœniculi,  
Petroselinii Macedonici,  
Dauci,

Ocymi ana unciam unam:

Redigantur in Pulverem, misceantur & cum

Mellis quantitate sufficiente

Fiat Electuarium:

*A quibusdam scopo Anodyno, maxime contra Tormina, substituitur Theriacæ.*

**TURPETHUM MINERALE** *Crollii.*  
**MERCURIUS EMETICUS FLAVUS**  
*Londinensium.*

℞. Mercurii vivi uncias quatuor:  
Unde abstrahantur

Olei Vitrioli uncia sex:

Salis in Retorta remanenti affundatur aqua fervida; Pulvis citrinus, qui ad fundum seccedit, probe edulcoratus aservetur. Aqua evaporata gignit Salem, qui deliquium patitur, & Oleum Mercuriale nominari solet.

*Turpethum minerale ad quinque usque grana exhibebatur olim ad oppugnandum virus Venereum; recentiori ætate contra Hydrophobiam laudabatur; his vero nostris temporibus cum medicamenta Mercurialia tutiora existant, Drastico sursum & deorsum vehementius æquo purgante jure meritoque abstinemus. Oleum Mercuriale Vires rodentes edit.*

**VINUM AMARUM** *Edinburgensium.*

℞. Radicis Gentianæ uncias semis,  
Corticum Chinæ unciam unam,  
Aurantiorum recentium un-

ciam semis,

VVinterani drachmam unā:  
Infundantur calide cum  
Spiritus Vini simplicis unciis qua-

tuor:  
Refrigeratis addantur

## VINA.

167

Vini albi Hispanici uncia quatuor  
& viginti:

Post macerationem quatuordecim dierum  
filtretur liquor.

*Ad roborandum Ventriculum datur cochlea-*  
*tim.*

**VINUM ANTISCORBUTICUM**

*Dumorette.*

℞. Radicum recentium Raphani rusti-  
cani uncias duodecim,

Bardanæ uncias  
quinque,

Foliorum recentium Cochleariæ,  
Nasturtii aqua-  
tici,

Beccabungæ,  
Fumariæ,

Seminis Sinapi ana uncias sex,

Salis Ammoniaci uncias tres:

Incisa & contusa infundantur cum

Vini albi unciis tercentenis & octo-  
ginta per octiduum:

Expressa filtrentur.

*Datur per cyathos.*

**VINUM CHALYBEATUM** *Danorum.*

℞. Limaturæ Ferri uncias quatuor,  
Cinnamomi,

Macis ana unciam semis:

Crassiuscule contusa misceantur & in-  
fundantur cum

Vini Rhenani unciis octo & quadra-  
ginta:

Digerantur per mensem sub frequenti  
agitatione in vase clauso, deinde co-  
lentur:

*Ad roboranda Viscera Chylopoietica exhi-*  
*betur per cyathos.*

**VINA PER CONFERMATIONEM**  
**PARATA.**

Vegetabilis qualiscumque incisi uncia  
centum immittantur Musti recens ex-  
pressi unciis octingentis; finita fermenta-  
tione Vinum a facibus detractum as-  
servetur.



## VINUM EMETICUM.

Videatur *AQUA BENEDICTA Rulandi*.  
**VINUM HIPPOCRATICUM** *Alexandri*  
*Benedicti*.

℞. Cinnamomi uncias tres semis,  
 Zinziberis unciam dimidiam,  
 Caryophyllorum aromaticorum,  
 Cardamomorum minorum excortica-  
 torum,  
 Nucum Moschatarum ana drachmas  
 duas:

Contusa in pulverem crassum infundan-  
 tur per aliquot dies cum

Vini rubri unciis quadragenis &  
 quinquaginta:

Colentur per manicam Hippocratis; in  
 colatura dissolvantur

Sacchari albi unciae sex & nonaginta:  
 Colentur denuo.

*Tam voluptatis, quam Ventriculi robo-*  
*randi gratia bibitur per cyathos.*

**VITRIOLUM MARTIS** *Basilii Valentini*.  
**SAL MARTIS** *Londinensium*.

℞. Limaturæ Martis uncias octo,  
 Spiritus Vitrioli uncias triginta duas,  
 Aquæ uncias duodecim:

Peracta solutione, calore etiam adjuvan-  
 da, liquor redigatur in Crystallos.

*Tonum restituendi, Obstructiones reser-*  
*andi, Hemorrhagias sistendi, Vermes necandi*  
*causa exhibetur; Dosis ad octo grana exten-*  
*di potest.*

**VITRUM ANTIMONII** *Basilii Valentini*.

℞. Antimonii quantum lubet.  
 Ustuletur, usque dum nullos ulterius va-  
 pores Sulphur redolentes dimittat; calx  
 hac ratione parata fundatur per unam  
 circiter horam in crucibulo; quo facto  
 effundatur.

*Medicamentum olim ab Auctoribus non*  
*infimæ notæ ciendi Vomitus causa vel ad*  
*novem usque grana exhibitum, cum hodie*  
*constet æquo vehementius Primas irritare*  
*Vias, per se non amplius datur.*

**VITRUM ANTIMONII CERATUM**  
*Edinburgensium*.

℞. Cerae citrinæ drachmam unam:  
 Liquefactæ immittatur

Vitri Antimonii uncia una:

Sub perpetua agitatione detineantur per  
 dimidiam horam super ignem; effun-  
 dantur in chartam, materia refrigerata  
 redigatur in pulverem.

*In Dysenteria & Hemorrhagia Uteri egre-*  
*gios effectus præstitisse, egregii Auctores te-*  
*stantur.*

*Dosis a granis quinque ad decem usque*  
*extenditur.*

## UNGUENTUM ÆGYPTIACUM

*Hildani*.

**MEL ÆGYPTIACUM** *Londinensium*.

**OXYMEL ÆRUGINIS** *Suecorum*.

℞. Viridis Æris uncias quinque,  
 Aceti uncias septem,  
 Mellis uncias quatuordecim:

Mixta coquantur in consistentiam Un-  
 guenti.

*Medicamentum, improprie unguentum di-*  
*ctum, ad depuranda Ulcera sordida & fi-*  
*stulosa adhibetur.*

UNGUENTUM ALBUM *Montagnanæ*.

℞. Axungia Porcinæ uncias sedecim,  
 Cerussa albæ uncias octo:  
 Misceantur.

*Ad Ambusta & Intertriginem adhibetur.*

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM *Manlii*.

℞. Unguenti albi simplicis uncias duo-  
 decim,  
 Camphoræ drachmas tres:  
 Misceantur.

*Valet ad Refrigerandum levioresque Di-*  
*scutiendas Inflammationes.*

UNGUENTUM ALTHÆÆ *Præpositi*.

℞. Mucilaginum Radicum Althææ un-  
 cias sedecim,



## UNGUENTUM.

Seminum Foenugræci,  
Lini ana un-  
cias octo,

Butyri uncias quatuor & sexaginta:  
Coquantur ad consumptionem humiditatis:  
Addantur

Ceræ flavæ uncia sedecim,

Resinæ uncia sex,

Terebinthinæ uncia duæ:

Liquatis ingeratur

Pulveris Radicis Curcumæ uncia una:

Misceantur.

*Emolliendi & Resolvendi scopo adhibetur.*

## UNGUENTUM AD AMBUSTA

*Pharmacop. Charas 1753.*

℞. Foliorum Sambuci,  
Hyoscyami,  
Solani scandentis,  
Stramonei ana manipulum  
unum,

Axungia Porcinæ uncias duas & tri-  
ginta:

Coquantur ad consumptionem humiditatis  
& ferventur colata.

*Vires ex nomine patent.*

## UNGUENTUM ANODYNUM

*Brandeburgensium.*

℞. Radicum recentium Althææ uncias  
duas,

Herbarum recentium Anethi,  
Hyoscyami,  
Malvæ,

Florum recentium Meliloti,  
Verbasci ana un-  
ciam unam,  
Chamomillæ un-  
cias duas & tri-  
ginta,

Seminum Ligni,  
Foenugræcis ana drachmas  
tres:

Incisa & contusa coquantur cum  
Olei Olivarum unciis duabus & tri-  
ginta:

Ad consumptionem humiditatis, in co-  
latura colliquantur

T. m. II.

## UNGUENTUM.

169

Ceræ flavæ uncia quatuor:  
Misceantur.

*Relaxando vires Paregoricas edit,*

## UNGUENTUM APOSTOLORUM seu DODECAPHARMACUM Avicennæ.

℞. Lithargyrii unciam unam,  
Viridis Æris drachmas tres:

Dissolvantur coquendo cum

Olei Olivarum unciis sex & triginta

Aceti unciis duabus:

Liquentur in coctis

Terebinthinæ,

Resinæ,

Ceræ ana uncia duæ,

Addantur denique

Pulverum Aristolochiæ longæ,

Olibani,

Bdellii,

Myrrhæ,

Galbani ana uncia dimidia,

Oppoponacis drachmæ duæ

Misceantur.

*Detergendis Ulceribus adhibetur.*

## UNGUENTUM DE ARTHANITA

*Mesue.*

℞. Succorum Cyclaminis uncias sedecim,  
Cucumeris agrestis,

Butyri ana uncias quinque semis,

Olei Olivarum uncias undecim,

Polypodii uncias duas,

Pulpæ Colocynthidis unciam unam  
semis:

Coquantur ad consumptionem humiditatis:  
In colatura liquentur

Ceræ flavæ uncia duæ:

Addantur

Pulverum Aloës,

Baccarum Mezerai,

Colocynthidis,

Scammonei,

Turpethi ana drachmæ duæ  
semis,

Euphorbii scrupuli septem,

Salis Gemmæ,

Florum Chamomillæ,

Myrrhæ,

Piperis longi,

Y

Pul-



Pulverum Zinziberis ana drachma una  
femis,

Fellis Tauri inspissati,

Sagapeni ana drachmæ duæ :

Probe misceantur.

*Hujus Unguenti, Abdomini inungendi, laus in movenda Alvo puerorum, nec non eorum omnium ponitur, quorum palatum difficile hauriendis Purgantibus reluctatur, quin & ad necandos Vermes expellendasque Hydropicorum aquas adhiberi solet.*

UNGUENTUM BASILICUM *Mesue.*  
TETRAPHARMACON *Galen.*

Rx. Cerae,

Picis navalis,

Resinae ana uncias duodecim,

Olei Olivarum uncias octo & quadraginta:

Leni calore liquata colentur.

*Ad Digerendum Suppurationemque promovendam valet.*

UNGUENTUM BERNHARDINUM  
*Vecker.*

Rx. Axungia Porcinae uncias octodecim,

Olei Rosarum uncias sex,

Pulverum Sulphuri citrini uncia novem,

Caryophyllorum,

Granorum Paradisi,

Zinziberis ana unciam unam  
femis:

Probe misceantur.

*Scabiem prohibet.*

UNGUENTUM CONTRA CANCRUM  
APERTUM *Jacobi.*

Rx. Vitri Antimonii in tenerrimum Pulverem triti unciam unam:

Cogatur cum

Olei Vitrioli quantitate sufficiente  
in pastam:

Affundatur

Acetum gelu concentratum ad eminentiam trium digitorum:

Post digestionem calidam per triduum institutam filtratur liquor, ejusque ope

paretur, ratione suo loco dicta, Acetum Saturni; miscendum agitando cum duplo Balsami Sulphuris, parati ex Sulphure impuro, quod sub preparatione Sulphuris Aurati Antimonii obtinetur, cum Olei Papaveris octuplo cocto.

*Ulcus Cancrosum saluberrima hujus medicamenti vi felicissime extinctum fuisse asseverat Auctor N. A. N. C. T. I. p. 235.*

UNGUENTUM CARDIACUM  
*Schræderi.*

Rx. Herbarum recentium Cardiacæ,  
Chamædryos,  
Malvæ,  
Senecionis,  
Solani scandentis,  
Scabiosæ,  
Sempervivi,  
Alfines,  
Jaceæ ana manipulos duos:

Incisa coquantur cum

Butyri unciis centum & viginti octo  
ad consumptionem humiditatis;

Colatura fervetur.

*Olim in frequenti usu erat contra Cardiacum Infantum.*

UNGUENTUM CARMINATIVUM  
*Brandeburgensium.*

Rx. Summitatum recentium Abrotani,  
Hederæ terrestres,  
Menthæ crispæ,  
Tanaceti,

Florum recentium Meliloti ana manipulum unum,

Chamomillæ manipulos duos,

Baccarum Laurini unciam semis,

Seminum Cumini,

Levistici ana drachmas  
duas:

Incisa & contusa infundantur per quatordecim dies in

Oleorū Chamomillæ unciis duodecim,  
Anc-



## UNGUENTUM.

Anethi,  
 Ruthæ ana uncia semis,  
 Axungia porcinæ unciis duodecim:  
 Coquantur inde ad consumptionem humiditatis: colatura liquentur  
 Cerae uncia duæ:  
 Semirefrigeratis immisceantur  
 Oleorum destillatorum Anisi,  
 Menthae,  
 Carvi ana  
 drachma  
 una.  
*Illinitur Abdomini contra Intestinorum tormenta.*

## UNGUENTUM CLYSMATICUM

*Angustanorum.*

℞. Radicum recentium Althææ,  
 Liliorum alborum ana uncias  
 duas,  
 Herbarum recentium Parietariæ,  
 Malvæ,  
 Mercurialis ana  
 unciam unam  
 semis,  
 Althææ,  
 Violaria,  
 Florum recentium Chamomillæ,  
 Meliloti ana unciam unam:

Incisa coquantur cum  
 Butyri unciis duabus & triginta ad  
 consumptionem humiditatis;

Colatura fervetur.  
*Glysmatibus Emollientibus ad tres usque uncias adjicitur.*

## UNGUENTUM COMITISSÆ

*Varignana.*

℞. Radicis Tormentillæ,  
 Foliorum Pruni silvestris,  
 Quercus,  
 Plantaginis,  
 Equiseti,  
 Corticum Castanearum,  
 Quercus,  
 Glandium,  
 Calicum Glandium,

## UNGUENTUM.

171

Baccarum Myrti,  
 Gallarum,  
 Sorborum,  
 Mespilorum ana unciam semis:  
 Incisa coquantur cum  
 Succo Agrestæ unciis duabus,  
 Aquæ,  
 Vini rubri ana unciis duodecim,  
 Olei Myrtillorum unciis octodecim  
 ad consumptionem humiditatis;  
 In colatura liquentur  
 Cerae uncia octo semis:  
 Addantur  
 Olei Mastichini uncia octodecim,  
 Pulverum Corticum Quercus,  
 Sanguinis Draconis,  
 Nucis Moschatæ,  
 Succo Hypocistidis,  
 Baccarum Myrti,  
 Sorborum,  
 Succini,  
 Florum Balauftiorum,  
 Mastichis,  
 Gummi Laccæ ana uncia  
 semis:

Misceantur probe.

*Ad præcavendum Abortum facere Vari-  
 gnana & Schulz sunt experti; ad Hæmor-  
 rhagiam Uteri, nimias Hæmorrhoides, Ani  
 & Uteri Prolapsus, nec non ad Inconti-  
 nentiam Urinæ laudatur, inungendum Ab-  
 domini, Lumbis & Femoribus.*

## UNGUENTUM DIGESTIVUM

*Amburgensium.*

℞. Terebinthinæ Argentoratensis uncias  
 octo:

Subigantur cum  
 Vitellis ovorum numero quatuor

Addantur  
 Olei Hyperici uncia una semis,  
 Pulverum Olibani,  
 Myrrhæ ana drachmæ tres:

Misceantur.  
*Remedium polychrestum ad sustentandam  
 Suppurationem aptatum.*

## UNGUENTUM DODECAPHAR- MACUM.

Videatur Unguentum Apostolorum.



## UNGUENTUM ENULATUM

*Colonienſium.*

℞. Radicum Enulæ recentium uncias ſedecim:

In pultem contuſæ coquantur cum  
Axungia porcinae unciis octo,  
Olei Olivarum unciis quatuor, ad  
conſumptionem humiditatis;

Colatura liquentur

Ceræ,

Terebinthinæ ana uncia una.

Misceantur.

*Contra affectus Cutaneos adhibetur.*

UNGUENTUM FUSCUM *Parienſium.*

℞. Axungia Porci,

Butyri,

Sevi Vervecini ana uncias ſedecim,

Olei Olivarum uncias duas & tri-  
ginta:

In lebetes vivide ferventibus addantur  
Lithargyrii uncia ſedecim:

Sub perpetua agitatione coquantur, do-  
nec colorem induerint fuscum; quo fa-  
cto liquentur in eis

Ceræ uncia ſedecim.

*Hoc unguentum Gallis ſub nomine On-  
guent de la Mere venit, tam Digerendis  
Ulceribus adhibendum quam Abſtergendis.*

## UNGUENTUM HÆMORROIDALE

*Plenck.*

℞. Unguenti Nutriti drachmas ſex,  
Olei cocti Hyoſcyami drachmas duas,  
Pulveris Croci ſcrupulum unum,  
Camphoræ Oleo ſubactæ ſcrupulos  
duos:

Misceantur

*Hæmorrhoides cæcas diſcutit; Dolores ea-  
rum ſedat.*

UNGUENTUM DE LINARIA *Plenck.*

℞. Herbarum Linariæ uncias duodecim,  
Sempervivi uncias duas,  
Hyoſcyami unciam unam:  
Contuſa macerentur per aliquot dies cum

Butyri unciis octodecim:

Coquantur deinde ad conſumptionem hu-  
miditatis & exprimantur.

*Specifice commendatur contra Hæmorrhoi-  
des cæcas.*

## UNGUENTUM DE LIQUIRITIA

*Auguſtanorum.*

℞. Radicum Liquiritiæ recentium in pul-  
tem contuſarum,

Butyri ana uncias ſedecim:

Coquantur ad conſumptionem humiditatis:

Prelo expreſſis addantur

Pompholygos drachmæ ſex,

Ceruſſæ uncia tres,

Camphoræ, paululo Olei ſubactæ ſcu-  
puli duo:

Misceantur.

*Ad intertriginem, Excoriationes, Fiſ-  
ſuras Papillarum adhibetur.*

UNGUENTUM DE LITHARGIRIO,  
NUTRITUM, TRIAPHARMACUM*Meſue.*

℞. Lithargyrii uncias ſex,  
Olei Olivarum uncias octodecim,  
Aceti fortis uncias ſex:

In vaſe vitreato prunis ſuperimpoſito  
probe agitentur, donec penitus coierint.

*Laudatur ad Ambuſtiones, Excoriatio-  
nes &c.*

UNGUENTUM MARTIATUM *Nicolai.*

℞. Foliorum recentium Lauri uncias octo,  
Rutæ uncias quin-  
que,  
Majoranæ uncias  
quatuor,  
Roriſmarini un-  
cias tres,  
Myrti,  
Ebuli,  
Menthae,  
Baſilici ana un-  
ciam unam:

Incifa infundantur per aliquot dies cum  
Olei Olivarum unciis ſedecim,  
Butyri recentis,

*Axun-*



## UNGUENTUM.

Axungiarum Urſi,  
Gallinæ,

Medullæ Cervi ana drachmis ſex:  
Coquantur ad conſumptionem humidi-  
tatis; expreſſis & colatis liquentur

Ceræ unciz octo:

Refrigeratis adjiciantur

Pulverum Styrcis drachmæ quinque,  
Maſtyches uncia ſemis,  
Olibani drachmæ tres,

Miſceantur.

*Partibus debilitatis & Abdomini infan-  
tum Torminibus laborantium inungitur.*

## UNGUENTUM MATURATIVUM

*Reineſii.*

Vix differt ab Unguento Digestivo.

## UNGUENTUM MERCURIALE AL- BUM Plenck.

## UNGUENTUM AD SCABIEM Zelleri.

Rx. Mercurii præcipitati albi unciam ſe-  
mis,

Unguenti Roſati uncias tres ſemis:  
Probe miſceantur.

*Contra Scabiem & Herpetem commen-  
datur.*

## UNGUENTUM DE MINIO CAMPHO- RATUM Florentini.

Rx. Unguenti de Lithargyrio uncias quin-  
decim:

Cum his ſubigantur

Camphoræ drachmæ duæ:

Addantur

Minii uncia una ſemis,

Tutiæ præparatæ drachmæ duæ:

Miſceantur.

*Ambuſtis & ſerpentibus Ulceribus obni-  
titur.*

## UNGUENTUM MUNDIFICANS

*Poterii.*

Rx. Foliorum Nicotianæ manipulos ſex,  
Butyri uncias quatuor & viginti,  
Terebinthinæ uncias quatuor:

## UNGUENTUM. 173

Mixta inſolentur per octiduum, tum ex-  
primantur:

Denique immiſceantur ipſis

Pulverum Gummi Ammoniaci,

Galbani ana un-  
ciæ duæ,

Antimonii crudi,

Cinnabaris ana drachmæ  
tres,

Myrrhæ,

Olibani ana drachmæ duæ.

*In Ulceribus fiſtuſiſ ſanandis magnopere  
ab Auctore laudatur.*

## UNGUENTUM MUNDIFICANS

*Stablii.*

Rx. Mercurii vivi,

Plumbi ana unciam unam:

Fiat Amalgama ſecundum artem, quod  
probe teratur cum

Terræ Tripolitanae uncia una:

Hic pulvis permiſceatur penitiſſime cum  
Unguenti albi Camphorati unciis octo.

*Commendatur ad extinguendas Efflorescen-  
tias Cutis ſcabioſas ſiccas & pruriginoſas.*

## UNGUENTUM NEAPOLITANUM

*Parienſium.*

Rx. Axungia Porcinæ,

Mercurii vivi ana quantum libuerit:  
Probe terantur, donec omnes globuli  
Mercuriales diſparuerint.

*Adbibetur ad Frictiones, quæ, qua ſoler-  
tia ſint adminiſtrandæ, Chirurgia docet. Si  
Mercurio duplum aut quadruplum Axungia  
adjeceris, ſurgit UNGUENTUM CÆ-  
RULEUM FORTIUS ET MITTUS  
Londinenſium.*

## UNGUENTUM NERVINUM

*Suecorum.*

Rx. Sevi Ovilli uncias octo:

Leni calore liquatis addantur

Oleorum Laurini uncia duodecim;  
deſtillatorum Terebinthinæ

uncia una,

Succini uncia  
ſemis.

Su-



Subigantur probe.

*Roborandis Membris inungitur.*

### UNGUENTUM DE NICOTIANA

*Fouberti.*

Rx. Foliorum Nicotianæ incisorum uncias quatuor & viginti,

Succi Nicotianæ uncias quatuor cum semisse,

Axungie porcine uncias duodecim: Macerentur per noctem, deinde coquantur ad consumptionem humiditatis, & expressis liquentur

Resinæ uncia una semis;

Ceræ drachmæ sex:

Addatur

Pulveris Aristolochiæ rotundæ uncia una semis:

Misceantur.

*Pro pellendis, sanandis Scrophulis, Ulceribus, Tineis, Scabie, quoque, commendabile.*

### UNGUENTUM NIHILI Colonienfium.

Rx. Tutie preparatæ,

Nihili ubi ana unciam unam,

Coralliorum rubrorum præparatorum,

Marris Perlarum præparatæ ana unciam semis,

Pinguedinis porcine uncias duodecim:

Misceantur.

*Ophthalmiæ serosæ obsistit.*

### UNGUENTUM NUTRITUM.

Videatur Unguentum de Lithargyrio.

### UNGUENTUM OCULARE Pringle.

Rx. Unguenti albi drachmas quinque, Sacchari Saturni scrupulum unum, Balsami Commendatoris scrupulos duos:

Misceantur probe.

*Laudatur multum ad Palpebras excoriatas.*

### UNGUENTUM OCULARE Sloane.

Rx. Tutie preparatæ unciam unam,

### UNGUENTUM.

Lapidis Hamatitæ præparati scrupulos duos,

Pulveris Aloës grana duodecim,

Margaritarum præparatarum grana quatuor,

Axungie Viperarum quantum satis ad consistentiam Unguenti:

Probe misceantur.

*In Ophthalmia hujus Medicamenti quantum fert penicillum pictorium laboranti Oculo affricatur, hac lege, ut clausis illico Palpebris aliquamdiu retineatur. Adhibetur mane & vespera.*

### UNGUENTUM OPHTALMICUM

*Saintyves.*

Rx. Butyri costæ uncias tres,

Ceræ unciam semis:

Liquatis commisceantur

Tutie præparatæ drachma una,

Mercurii præcipitati rubri drachmæ duæ semis,

Camphoræ, paululo Olei Ovorum dissolutæ drachma semis:

Misceantur penitissime.

*Medicamentum egregie sanans Lippitudinem & corneæ Ulcuscula.*

### UNGUENTUM OPODELDOCH

est

Balsamum Saponaceum.

### UNGUENTUM PARALYTICUM

*Plenck.*

Rx. Saponis officinalis uncias sex:

Subigantur cum

Olei destillati Baccarum Juniperi uncia una,

Pulveris Seminis Erucæ drachmis sex:

Misceantur.

*Vires titulus indicat.*

### UNGUENTUM PECTORALE

*Augustanorum.*

Rx. Olei Amygdalarum dulcium uncias quatuor,

Chamomillæ,

Violarum ana uncias tres,

Bu-



## UNGUENTUM.

Butyri uncias sex,  
Axungiarum Gallinæ,  
Anatis ana uncias duas,

Ceræ albæ uncias tres:

Leni calore colliquatis addantur

Pulverum Ireos Florentinæ drachmæ  
duæ,

Croci drachma semis:

Misceantur.

*Ad Asthma & Tussim infantum adhibetur.*

## UNGUENTUM CONTRA PEDICU- LOS *Plenck.*

℞. Unguenti Neapolitani uncias octo-  
decim,

Pulverum Seminum Sabadilli,  
Staphis agriæ ana  
uncias duas,

Radiciſ Hellebori albi un-  
ciam unam,

Oleorum Lauri uncias novem,  
Spicæ unciam unam:

Misceantur.

*Exiguſ modo portionibus locis, quibus Pe-  
diculi insident, inungitur.*

## UNGUENTUM AD PERNIONES *Plenck.*

℞. Axungiæ porcinae,

Sevi Cervini,

Olei Laurini,

Ceræ ana uncias duas:

Colliquatis leni igne & refrigeratis ad-  
datur

Camphoræ uncia semis, dissoluta in  
Spiritus Vini rectificati uncia una:

Misceantur.

*Vires titulus docet.*

## UNGNENTUM POMATUM *Danorum.*

℞. Axungia Porcinæ, aqua Rosarum sæ-  
pius lotæ uncias duodecim:

Adjiciantur sensim sub perpetua agita-  
tione

Aquarum Rosarum uncia tres,  
Naphæ,

Spiritus Rosarum ana unciam semis,

## UNGUENTUM. 175

Oleorum Lavendulæ semidrachma,  
Ligni Rhodii,

de Cedro ana guttæ sedecim:

Exactissime mixta asserventur.

A Pomis, quæ superioribus seculis Un-  
guentis fragrantibus adjici moris erat,  
id genus Unguenta, re quidem subla-  
ta, nomen tamen hodieque servant.  
Quæ ex Floribus recentibus parantur,  
optime ex Gallia Meridionali aut Ita-  
lia accersuntur.

## UNGUENTUM DIAPOMPHOLYGOS *Amstelodamensium.*

℞. Olei Solani uncias sedecim,

Ceræ uncias quinque:

Liquatis leni igne addantur

Cerussæ uncia duæ,

Pompholygos præparatæ,

Plumbi uſti,

Pulveris Olibani ana uncia una:

Misceantur.

*Commendatur ad Ulcera sananda, nec  
non ad discutiendam Ophthalmiam.*

## UNGUENTUM POPULEUM *Præpositi.*

℞. Oculorum Populi recentium uncias  
quatuor & viginti,

Pinguedinis porcinae uncias quatuor  
& sexaginta:

Asserventur in illud tempus, quod se-  
quentia Vegetabilia subministrare valet  
recentia, nimirum

Summitatum Rubi,

Herbarum Papaveris fativi,

Hyoscyami,

Bardanae cum radicibus,

Solani,

Lactucæ virosæ,

Violaria ana uncia tres,

Sempervivi uncia quatuor,

Sedi acri uncia tres:

Incisa addantur Pinguedini, quæ Gem-  
mas Populi habent:

Coquantur ad consumptionem humidita-  
tis, exprimantur & colentur.

*Paregorico & Refrigeranti scopo Hemor-  
rhoidibus, Ambustis, Mammis induratis in-  
ungitur.*



UNGUENTUM PURPUREUM *Wurzii.*

℞. Radicum Scrophulariæ recentium,  
Herbarum Plantaginis recentis,  
Chelidonii majoris recentis ana drachmas tres:

Incisa macerentur per aliquot dies cum  
Aceti unciis quinque:

Colatura addantur

Capitis mortui Vitrioli edulcorati uncia duæ,

Viridis Æris drachmæ decem,

Mellis uncia octo:

Coquantur ad consistentiam Mellis.

*Cum Unguento Ægyptiaco quoad vires convenit.*

## UNGUENTUM ROSATUM

*Württembergensium.*

UNGUENTUM SIMPLEX *Londinensium.*

℞. Axungia Porcinæ uncias duodecim;  
Lavetur Aqua Rosarum, donec ejus odore fuerit imbuta; tunc addantur

Olei Ligni Rhodii guttæ sedecim:

Misceantur,

*Unguento Pomato substituitur, Demulcendi quoque virtute gaudet.*

## UNGUENTUM RUBRUM POTABILE

*Danorum,*

℞. Radicis Alkannæ uncias duodecim,  
Vini rubri uncias decem:

Macerentur per aliquot dies; tunc adjiciantur

Butyri uncia sexaginta:

Coquantur ad consumptionem humiditatis, exprimantur & colentur.

*Relaxandi & Emolliendi scopo olim usurpabatur.*

## UNGUENTUM SAMBUCINUM

*Præpositi.*

℞. Sevi ovilli uncias sex & triginta:

Olei Olivarum uncias duodecim:

Liquefactis committantur

Florum Sambuci uncia octo & quadraginta:

Relinquantur per aliquot dies; tunc lenissimo igne denuo liquata colentur.

*Laudatur maxime ad Ambusta.*

## UNGUENTUM SATURNINUM

*Edinburgensium.*

℞. Olei Olivarum uncias duodecim,  
Cerae albæ uncias tres:

Liquatis, partitis vicibus, sub perpetua agitatione adjiciatur

Sacchari Saturni Semuncia:

Probe misceantur.

*Cum Unguento Nutrito respectu virium convenit.*

## UNGUENTUM AD SCABIEM

*Parisiensium.*

UNGUENTUM CITRINUM *Suecorum.*

℞. Mercuri vivi uncias tres:

Dissolvantur

Spiritus Nitri unciis quatuor:

Solutio affundatur sensim

Axungia Porcinæ calore liquata unciis duabus & triginta:

Agitentur pistillo ligneo, probe mixta effundantur super chartam; refrigerata dissecantur in taleolas.

*Articulis Pedum & Manuum ad drachmarum duarum pondus affricatur; laudatur quoque ad efflorescentias Herpeticas.*

UNGUENTUM SOLANI *Bergamensium.*

℞. Succo ex foliis & baccis Solani expressi uncias sex & triginta,

Olei Olivarum uncias quatuor & quinquaginta,

Cerussæ uncias octodecim,

Lithargyrii uncias sex & triginta:

Coquantur ad Dissolutionem Calcium metallicarum;

Addantur deinde

Cerae albæ uncia sex,

Pulveris Olibani: uncia tres:

Misceantur.

*Adbibetur ad Ambusta, nec non ad consolidanda Ulcera.*



UNGUENTUM SPLENITICUM

*Wurtembergensium.*

℞. Radicum Filicis,  
Ari ana uncias duas,  
Herbarum Asari,  
Hyoscyami,  
Cicutæ,  
Nasturtii Aquatici ana un-  
ciam unam semis,  
Nicotianæ drachmas tres,  
Florum Camomillæ,  
Hyperici,  
Genistæ,  
Sambuci ana unciam unam:  
Contusa macerentur per aliquot dies cum  
Axungie Porcinæ unciis quatuor &  
viginti:

Coquantur deinde ad consumptionem hu-  
miditatis:

In expressis liquetur  
Ceræ uncia una semis:

Addantur

Pulverum Gummi Ammoniaci,  
Galbani ana dra-  
chmæ sex:

Refrigeratis adjiciantur

Oleorum destillatorum Cumini,  
Anethi,  
Ceræ ana dra-  
chma una:

Probe misceantur.

*Ad prohibendam duritiem Hypochondrio-  
rum, & pellendos Flatus adhibetur.*

UNGUENTUM STOMACHICUM

*Viennensium.*

℞. Oleorum Mastichis,  
Menthæ,  
Cydoniorum,  
Ceræ citrinæ ana uncias: octo:  
Liquatis & semirefrigeratis addantur  
Pulverum Ligni Aloës,  
Calami Aromatici,  
Caryophylloꝝ,  
Macis ana uncia una,  
Balsami Peruviani uncia semis,  
Oleorum destillatorum Caryophyllo-  
rum scrupuli duo,

Tom. II.

Oleorum destillatorum Anisi scrupu-  
lus unus:

Misceantur.

*Ad roborandum Ventriculum, sistendum  
Vomitum & Fluxus Alvi, regioni Epiga-  
stricæ & Umbilico inungitur.*

UNGUENTUM DE STYRACE *Lemery.*

℞. Olei Nucum uncias duodecim,  
Colophonii uncias quindecim,  
Gummi Elemi,  
Ceræ ana uncias octo:

Liquetur leni calore, liquatis & ab igne  
remotis addantur

Storacis liquidæ uncia decem:

Colentur per linteam; elapsis aliquot  
diebus cultri ope inde separentur sordes,  
quæ ad fundum seceserit.

*Scopo Antiseptico ad Ulcera putrida &  
Gangrænam adhibetur.*

UNGUENTUM DE UVIS

est

Unguentum ad Labia.

UNGUENTUM CONTRA VERMES

*Wurtembergensium*

℞. Radicum Filicis,  
Bryoniæ,  
Alii ana unciam unam se-  
mis,  
Herbarum Abrotani,  
Absynthii,  
Tanaceti ana drachmas  
duas,

Butyri uncias sedecim:

Incisa coquantur ad consumptionem hu-  
miditatis; in expressis liquetur

Ceræ uncia una semis:

Refrigeratis adjiciantur

Pulverum Aloës uncia una,  
Trochiscorum Alhandal uncia semis,  
Fellis Tauri inspissati uncia duæ:

Misceantur.

*Mitius agit, quam Unguentum de Ar-  
thanita, cujus in modum adhibetur.*



UNGUENTUM VIRIDE POTABILE  
*Wurtembergensium.*

℞. Herbarum recentium Abrotani,  
 Artemisiæ,  
 Bellidis,  
 Betonicæ,  
 Fœniculi,  
 Hyssopi,  
 Menthæ  
 Matrisylvæ,  
 Millefolii,  
 Majoranæ,  
 Plantaginis,  
 Veronicæ,  
 Verbenæ,  
 Salviæ,  
 Ruthæ ana un-  
 ciam unam,  
 Baccarum Juniperi viridum uncias  
 tres:

Incisa & contusa coquantur cum  
 Butyri unciis octo & quadraginta ad  
 consumptionem humiditatis:  
 Colentur & asserventur.

*Laudabatur ex Alii lapsis & Parturienti-  
 bus ad aliquot cochlearia; sed, inconcinna com-  
 positio merito evuluit.*

ZINZIBER COCTUM *Argentoratensium.*

℞. Cinnamomi electi drachmas duas,  
 Nucis Moschatæ drachmam unum:  
 Caryophyllorum scupulos duos:  
 Macis scrupulum unum:  
 Crasse contusis addantur  
 Pulveris Zinziberis drachmæ sex:  
 Mixtæ cum  
 Sacchari consistentiam tabulandi co-  
 cti unciis sedecim:  
 Formentur inde Morfuli.

*Cum successu ad morbos Capitis & Ven-  
 triculi a Mucro oriundos adhibetur.*

FINIS TOMUS SECUNDUS.











PHARMACOPŒA  
GENERALIS


EDITA

A

D. JACOBO REINBOLDO  
SPIELMANN.

*EDITIO PRIMA VENETA.*

TOMUS TERTIUS.



V E N E T I I S,

Sumptibus JOANNIS ANTONII PEZZANA.

---

M D C C L X X V I.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.







I C O N E S

P L A N T A R U M,

E T A N I M A L I U M.







# I C O N E S P L A N T A R U M E T A N I M A L I U M.

ÆROTANUM MAS.



ÆROTANUM FOEMI




AB.



ABSINTHIUM.



ABSINTHIUM PONTIC.



ABSINTHIUM MARIN.





ACACIA I.



ACACIA ALTERA.




ACANTHUS.



ACE-




ACETOSA.



ACETOSELLA, vel OXALIS MIN.



ACONITUM, vel NAPELLUS.





ACORUS ADULTER. vel PSEUDACORUS.

AGARICUS.



ADHATODA.




Tom. III.

ADIAN




ADIANTUM, vel TRICHOM.

ADIANTUM NIGRUM.



AGNUS CASTUS, vel VITEX.



AGRI-



AGRIMONIA, vel EUPATORIUM.

AGRIMONIA, vel EUPATOR. VULG.



ALCEA.






ALKANNA, vel ANCHUSA I.



ALKANNA, vel ANCHUSA II.



ALKANNA, vel ANCHUSA III.




ALOE3.



ALOËS.

ALOËS CUM FLORIBUS.



ALLIARIA.




AL




14  
ALLIUM DOM. OPHIOSC. & ELAPHOSC.

ALLIUM SCORODROPASUM.



ALLIUM ANGUINUM.





ARNICA MONTANA, five ALYSMA.

ALKEKENGİ, vel SOLANUM  
HALICACABUM.



ALCHYMILLA, vel STELLARIA.



AL-



ALTHEA.

ALTHÆA five ABUTIL. AVICENNÆ.



ALNUS.




AL-





AMYGDALÆ.






ANAGALLIS MAS.



ANAGALLIS FOEM.



ANETHUM.



AN-



ANGELICA SATIVA.



ANGELICA SYLVESTRIS.



ANISUM.





ANSERINA, vel POTENTILLA.

ANTHORA.



APARINE.



APIUM.



APIUM HORTENSE.

APIUM PALUSTRE.



AQUILEGIA.



ARI-



ARISTOLOCHIA LONGA.



ARISTOLOCHIA ROTUNDA.



ARANEA.





ARMENIACA MALUS.

ARMENIACA MINOR.



ARMORACIA, vel RAPHANUS RUSTICANUS, five VULGARIS.






ARUNDO DOMESTICA.



ARUNDO PALUSTRIS.



ARTEMISIA.



ARUM



ARUM MINUS.

ASPHODELUS, five HASTULA REGIA.



ASARUM.





## ASPARAGUS.



## ASPARAGUS SYLVESTRIS.



## ASTRANTIA.



ATRA.



ATRACYLIS.



AVENA.



AVELLANA NUX.





ATRIPLEX MARINA.



ATRIPLEX DOMESTICA.




AURANTIA MALA.



ATRI-



ATRIPLEX SYLVESTRIS I.



ATRIPLEX SYLVESTRIS II.



ATRIPLEX SYLVESTRIS III.








BALLOTTA.



BALSAMITA.



AURICULA JUDÆ vel FUNGI SAMBUCCI, sive AGARICUS.




BAR.



BARBA CAPRÆ, vel TRAGOPOG.

BARBA CAPRÆ, vel TRAGOPOG.  
ALTERUM.



AURICULA MURIS, vel PILOSELLA.






BASILICUM, vel OCYUM MAJOR. BASILICUM, vel OCYUM MEDIUM.



BASILICUM, vel OCYUM GARYOPHYLATUM.







BARDANA.





BELLIS MEDIA.



BELLIS MINOR.



BELLIDIS MINORIS TRES SPECIES.





BELLIS MAJOR.



BELLADONNA.



BERBERIS, seu CRESPINUS.






BETA ALBA.



BETA NIGRA.



BETA RUBRA.



BET-





BETULA:





30  
BOMBAX, seu GNAPHALIUM.

BOMBAX, five XYLON, vel GOSSIPIUM.



BONUS HENRICUS.





BORAGO, vel BUGLOSSUM.



BOIRYS.



BRUNELLA, vel CONSOLIDA MINOR.




BRAS.



BRASSICA LÆVIS.



BRASSICA CRISPA.



BRASSICA CAPITATA.





BRYONIA, vel VITIS ALBA.



41  
BUCLOSSUM VULGARE.



BUFO.







BUXUS.





CALAMUS, vel ACORUS.

CALAMUS AROM. vel ODORATUS.



CAPILLUS VENERIS, vel ADIANTHUM.






CALAMINTHA.

CALCITRAPPÀ MAGN. vel CENTAUR.



CALENDULA, vel CALTHA.




CAN.




CANNABIS.



CAPPARIS.



CANTHARIDES.




CAR-



CARDAMINE.



CARDIACA.



CARDAMOMI SPECIES..




CAR-



CARDUUS BENEDICTUS.



47  
CARDUUS MARIAE, vel LACTÆUS.



CARDUUS TOMENTOSUS, vel ACULEATUS.



CAR-



CARLINA, vel CHAMÆL. ALBUS.

CARTHAMUS, vel CROC. FLOR.



CARVI, vel CARUM.






CARYOPHYLLATA.



49  
CARYOPHYLLATA MONTANA.



CARYOPHYLLI AROMATICI.





## CASTANEÆ.



## CASTANEÆ EQUINÆ.



## CASSIA FISTULA, vel SOLUTIVA.





CATAPUTIA MAJ. vel PALMA CHR.

51  
CATAPUTIA MIN. vel LATHYRIS.



CASTOREUM.






CENTUMNODIA, vel POLYG. MIN.



CENTUMNODIA, vel POLYG. MAS.



CENTUMNODIA, vel POLYGONUM FOEMINA.






CERASA, vel CERATIA.



CERASUS, vel CERASA RACEMOSA.




CENTAURIUM MINUS.






CEREFOLIUM.


CETERACH, seu ASPLENIUM,  
vel SCOLOPENDRIUM.

CEPA ASCALONICA.







CEPA SECTILIS.



CEPA FISSILIS.



CEPA CAPITATA.





CHAMÆDRYS, seu TRISSAGO.



CHAMÆDRYS, seu TRISSAGO ALT.





CERVUS.



CHA?







CHAMOMILLA ROMANA, seu ANTHEMIS.






53  
CHEIRI, seu LEUCOJUM ALBUM,  
& PURPUREUM.

CHEIRI, seu LEUCOJUM AUREUM



CICERA, vel CICER DOMESTICUM.



CHE-



CHELIDONIUM MAJUS.

CHELIDONIUM MINUS.



CICUTA.






CICHORIUM DOMESTICUM.



CICHORIUM SYLVESTRE.



CITRULLUS, vel ANGURIA.






CITREUM MALUM, vel MED. MALA.



61  
CLEMATIS, vel FLAMMULA.



COCHLEA:



CO-






COLOCYNTHIS.





COLCHICUM.

COLCHICUM ALT. ORIENTALE.



CORIANDRUM.



CO.



CONIZA MAJOR.



CONIZA MEDIA.



CONIZA MINOR.



CON-



CONSOLIDA REGALIS.



CONSOL. SARAC. vel VIRGA AUREA.



CORNA, vel CORNUS.






CORALLIA ALBA.



CORALLIA RUBRA.



CRASSULA, vel FABARIA.






CORONOPUS..



CORONOPUS five SERPENTINA.



CUPRESSUS:








CRITHMUM L.



CRITH.




CRITHMUM II.



CRITHMUM III.



CRITHMUM IV.



CRU



## CRUCIATA.



## CYPERUS LONGUS.



## CUCUMIS, vel CUCUMERES.






CYANUS MAJOR.



CYANUS MINOR.



CUCUMIS, vel CUCUMERES LONGI.







CUMINUM SYLVESTRE I.



CUMINUM SYLVESTRE II.



CUMINUM SATIVUM.






CUCURBITA.



CUCURBITA INDICA.



CUSCUTA.







## CYCLAMEN.



## CYDONIA, vel COTONEA MALUS.



## CYMBALARIA.





CYNOGLOSSUM VULGARE.



75  
CYNOGLOSSUM VULG. FLORID.



CYNOGLOSSUM DIOSCORIDIS.





DAUCUS I.



DAUCUS II.



DACTYLI CUM PALMA ELATA.






DENTARIA MAJOR.



DENTARIA MINOR.



DENTELLARIA, vel PLUMBAGO.






DICTAMNUS ALBUS.



DICTAMNUS CRETICUS.




DIGITALIS.







ELATINE.






DRACUNCULUS MAJOR.



DRACUNCULUS MINOR.



DRACUNCULUS AQUATICUS.







ENDIVIA.






ERUCA SATIVA.



ERUCA SYLVESTRIS.



EQUISETUM L.




EQUI-




EQUISETUM II.



EQUISETUM III.



EQUISETUM IV.






ERICA.

ERICA II.




ERICA BACCIFERA.



ERYN.



ERYNGIUM MONTANUM.



ERYNGIUM MARINUM.



ERYNGIUM PLANUM.






ERYSIMUM, vel IRIO.



ERYSIMUM, vel IRIO ALTERA.



ERINACEUS, vel ECHINUS TERRESTRIS.



ENU.



ENULA, vel HELENIUM.

ESULA, vel PITYUSA

87



ERINACEUS vel ECHINUS MARINUS.



EU.



EUPHURASIA.



FAGOPYRUM, vel FRUMENT. SARAC.



FAGUS.




FAR.





FARFARA, vel TUSSILAGO, sive FARFUGIUM.







FILIPENDULA.



FABA.



FABA SYLVESTRIS.






FILIX.



FOENICULUM.



FRAXINUS.






FOENUGRÆCUM.



FRANGULA.



FRAGARIA.






FUMARIA.




FUMARIA ALTERA.



FUMARIA CORYDALIS.








GALEOPSIS.






GALLIUM.



GENISTA.



GALLÆ.




GEN-




GRAMEN.



GRAMEN MANNAE.



GRAMEN ALTERUM.




GRA-



GRAMEN PARNASI.



GRAMEN ACULEATUM.



GRANATUM, vel MALA PUNICA.






GERANIUM I.



GERANIUM II.



GERANIUM III.






GERANIUM IV.



GERANIUM V.



GERANIUM VI.






GENTIANA MAJOR:



GENTIANA MINOR:




GENTIANA MINIMA.







GRATIOLA.



HELIANTHEMUM.




HIRUNDO.







HELIOTROPIMUM, vel CALTHA.





HELLEDORUM ALBUM.




HELLEBORUM NIGER.



HELLEBORUM ALTERUM.







HEPATICA FONTANA, vel LICHEN.





HEPATICA ALBA, vel PARNASIA.

HEPATICA NOBILIS.




HEPATICA STELLATA, vel ASPERULA.





HERNIARIA.



RHORMINUM, vel SCLAREA.



HIPPOPOTAMUS.



HYO-





HIRUNDINARIA, vel VINCETOXICUM!.






## HYPERICUM.



## HYSSOPUS.




## JACOBEEA, vel SENECIO.





JACEA, five FLOS TRINITATIS.



JACEA ALTERA.



JUGLANS NUX.





JASMINUM.



IMPERATORIA.



JUZUBE, vel ZIZYPHA.




IRIS



IRIS SYLVESTRIS.



Fig  
IRIS SYLVESTRIS ALTERA.



IRIS DOMESTICA.






JUNIPERUS.



LAVENDULA.



LAPATHUM, vel OXILAPATHUM.






LACTUCA CRISTA.



LACTUCA FLORESCENS.



LACTUCA SYLVESTRIS.





LENS.



LENS PALUSTRIS.



LENS PALUSTRIS ALTERA.






LEPIDIUM, vel IBERIS.

LEPIDIUM PIPERITIS.




LINARIA; vel OXYRIS.






## LAURUS.



## LEVISTICUM, vel LIGUSTICUM.



## LACERTA.





LILLIUM ALBUM.

LILLIUM CONVALLIUM. 117



LEPUS.





## LINUM.



## LINUM CATHARTICUM.




## LIGUSTRUM.





LUMINARIA MINOR.



LUPINUS.



LUPULUS.





LYSIMACHIA.



LYSIMACHIA ALTERA.




MARRUBIUM.





MAJORANA, five AMARACUS.

MAJORANA TENUI FOLIA.



MASTYX, vel LENTISCUS.






MANDRAGORA MAS.



MANDRAGORA FOEM.



MALVA.



MAL.



MALVA MAJOR.



MALVA MAJOR ALTERA.




MALVA QUARTA.





MARUM.


MATRICARIA, vel PARTHENIUM.



MELISSOPHYLUM, vel MELISSA HORTENSIS;







MELISSA TURCICA, vel MOLDAVICA.





## MELILOTUS.



## MELO, vel MELOEPONIS.



## MATERPERLARUM.





MENTHA L.



MENTHA ALTERA.



MENTHA GRÆCA.






## MENTHASTRUM.



## MEUM.



## MEZARÆUM, vel THYMELÆA.



MER-



MERCURIALIS MAS.



MERCURIALIS FOEM.



MILLEPEDES.





MESPILUM.



MESPILUM ALTER.



MORUS.






MILLEFOLIUM MAJUS.



311  
MILLEFOLIUM MINUS.



MOSCATA NUX.





MILLIUM SOLIS, vel LITHOSPERM.  
MAJUS.



MILLIUM SOLIS, vel LITHOSPERM.  
MINUS.



MUS MONTANUS.




MUS.



MUSCUS ARBOREUS.



MUSCUS TERRESTRIS.




MUSCUS TERRESTRIS ALTER.






MYRTUS TARENTINUS.

MYRTUS EXOTICA.




MYRTUS ROMANUS.




MYR-



MYRTILLI.



MOMORDICA.



NICOTIANA.





## NASTRUTIUM:

NASTRUTIUM, vel SYSIMBR. HORT.




NASTRUTIUM, vel SYSIMBRIUM SYLVESTRE.





137  
NASTRUTIUM, vel SYSIMBRIUM  
AQUATICUM.



NASTRUTIUM, vel SYSIMBRIUM  
AQUATIC. ALTERUM.



NUMMULARIA.






NAPUS.



NEPETA, vel HERBA GATTARIA.



NYMPHÆA ALBA, &amp; LUTEA.




NYM-



NYMPHÆA PARVA.

NIGELLA, vel MELANTHIUM SAT.




ONORIS.







OLEA, vel OLIVA SATIVA.



OLEA, vel OLIVA SYLVESTRIS..




OLEA, vel OLIVA BOEMICA, five ELEAGNOS.





ORIGANUM HERACLEOTICUM:

ORIGANUM VULGARE.




ORIGANUM ONITIS.






OROBUS.

OROBUS CRÉTICUS..



OPHIOGLOSSUM.





OXIACANTHA, vel ACUTA SPINA.



ORYZA.




POMA, vel MALA.




PRU.



PRUNUS.



PRUNUS SYLVESTRE.



PEUCEDANUM.





PÆONIA MAS.



PÆONIA FOEM.



PERSICA MALA.






PAPAVER ERRATICUM.



PAPAVER SATIVUM.



PAPAVER CORNICULATUM.





PASTINACA DOMESTICA.



147  
PASTINACA SYLVESTRIS.




POPULUS NIGRA.





PERSICARIA, vel HYDROMPER.


PERSICARIA ALTERA.




PENTAPHYLLUM, vel QUINQUEFOLIUM.







PENTAPHYLLUM ALBUM.





PHU MINIMUM.



PHU PARVUM.



PHU MAGNUM.






PIMPINELLA, five SANGUISORBA  
MAJOR.



111  
PIMPINELLA, five SANGUISORBA  
MINOR.



PIMPINELLA SAXIFRAGIA.







## PERFOLIATA.




## PISTACIÆ NUCES.




## PETROSELINUM, vel LEVISTICUM VULGARE.







PETROSELINUM MACEDONICUM.






## POLIUM.



## POLIUM ALTERUM.



## PORCUS.





POLYGALA.



PULEGIUM.



PICEA.





PINUS MARITIMA.



PINUS MARITIMA ALTERA.



PINUS DOMESTICA.





PINUS SYLVESTRIS CEMBRO.



PINUS SYLVESTRIS MUGO.<sup>157</sup>




PINUS SYLVESTRIS MONTANA.







PORTULACA DOMESTICA.



PORTULACA SYLVESTRIS.



PLANTAGO LONGA.





PLANTAGO MAJOR.



PLANTAGO MEDIA.

142



PLANTAGO AQUATICA.






PRIMULA VERIS.



PRIMULA VERIS ALTERA.



PORRUM SECTILE, &amp; CAPITATUM.





PSYLLIUM




PSYLLIUM ALTERUM

151




PORRUM COMMUNE.






PIPER.



PIPER ÆTHIOPICUM.



PIPER INDICUM.







PTMARMICA.



PTMARMICA ALTERA.



PULSATILLA.



X 2

PUL.



## PULMONARIA.



## PULMONARIA ALTERA.



## PYRUS.






PYRETHRUM VERUM.




PYRETHRUM ALTERUM

163



QUERCUS.



164



## RUBUS.

## RUBUS IDÆUS.



## RAPUNCULUS.







RAPUM ROTUNDUM.



RAPUM LONGUM.



RAPUM SYLVESTRE.






RANUNCULUS I.



RANUNCULUS, II.




RANUNCULUS III.





RANUNCULUS IV.



RANUNCULUS V.

169



RANUNCULUS VI.





RAPHANUS I.



RAPHANUS II.




RHABBARBARUM.



RHA-






RHODIA RADIX.








ROSA.





ROSMARINUS, vel LIBANOTIS.

173  
ROSMARINUS CORONARIUM.



ROSMARINUS SYLVESTRE.






RUBIA SATIVA.



RUBIA SYLVESTRIS.



RANA.






RUTA.



RUTA SYLVESTRIS




RUTA SYLVESTRIS ARMOLA.








RUSCUS.






SALVIA MAJOR.



177  
SALVIA MIN. sive SPHACELLUS.




SALICARIA.





SAMBUCUS.

SAMBUCUS MONTANA.




SAMBUCUS AQUATICA.






SATUREJA DIOSCORIDIS.

SATUREJA ALTERA.




SAPONARIA. .






## SATYRIUM I.



## SATYRIUM ERYTRONIUM.



## SALIX.






SCABIOSA MAJOR.





SCABIOSA MINOR.




SARZA, vel ZARZA PARILLA.









SCAMMONEA.







SAXIFRAGIA MAGNA.







SCILLA.



COLOFENDRIUM, vel PHYLLITIS.



SCINCUS.



SCOR.



SCORDIUM.



185  
SCORZONERA HISPANICA.



SCORPIUS.





## SCROPHULARIA.



## SECALE.



SEBESTEIA, vel PRUNUS ec.





SENECIO.



SENNA.



SEDUM MINUS.






SEMPERVIVUM MAJUS.



SEMPERVIVUM MINUS.



SERPENTARIA VIRGINIANA.






SEMPERVIVUM ARBORESCENS.



189  
SEMPERVIVUM ARBORESC. ALT.




SEMPERVIVUM MINIMUM.







SERPILLUM.







SESELLI ÆTHIOPICUM.




191  
SESELLI ÆTHIOPICUM II.




SERPILLUM ALTERUM.







SIDERITIS.






SINAPI I.



SINAPI II.



SINAPI III.





SOLANUM HORTENSE.



SOLANUM SOMNIFERUM.



SOLANUM SOMNIFERUM ALTERUM.






SONCHUS ASPERA.

SONCHUS LÆVIS.



SONCHUS LÆVIS ALTERA.







SORBUS DOMESTICA.



SORBUS TERMINALIS.




SORBUS SYLVESTRIS.







SILIQUEÆ DULCIS.






STOECHAS.

STRAM. five NUX METEL. vel VOM.



SUBER I.




SUC-




SUCCISA, five MORSUS DIABOLI.

109  
SYMPHITUM MAJUS, five CONSOLIDA MAJOR.




SUBER IL.



SE-




SEPIA.



SESAMUM.



THLASPI L.



THLAS-




THLASPI II.



THLASPI III.




THLASPI IV.






## TERTIANARIA:

## THALICTRUM FLAVUM.



## TILIA MAS.





TANACETUM.



THYMUS.



TILIA FOEMINA.





TAMARISCUS, vel MYRICA.



TARAXACUM, vel DENS LEONIS.



TRIFOLIUM PRATENSE.



TRI-



TRIFOLIUM ASPHALTITE:




TRIFOLIUM ACETOSUM. 205



TRIFOLIUM PRATENSE ALTERUM.







TRAGACANTH.







VERONICA MAS.



297  
VERONICA FOEMINA.



URSUS, & VULPES.



VER-



VERBASCUM I.



VERBASCUM II.



VERBASCUM III. vel SYLVESTRE.





VERBASCUM IV.



VERBASCUM LYCHNITE.



VERBASCUM ALIUD.





210  
VICTORIALIS LONGA, vel ALLIUM  
LACUS FOLIA.



VICTORIALIS ROTUNDA, vel  
GLADIOLUS.




VIPERA:



VIN.





VINCA per VINCA, vel CLEMATIS III.






VIOLA.



VITIS VINIFERA.



VISCUM.





URTICA I.



URTICA II.



URTICA III.






ULMUS.



VULVARIA.



UMBELISCUS MARINUS.



UVU.



UVULARIA, vel LAUR. ALEXAND.

VERBENA, vel VERBENACA.



ZIBETHUM, vel ANIMAL ZIBETTI.




XAN-



XANTHIUM, five LAPPÄ.



ZINZIBER, vel ZINGIBER.



F I N I S.











Vol. 1  
Brill. 1891  
C.

112



